

CARACTERISTICILE TULBURĂRILOR DE AUZ CONSECUTIVE OTITELOR MEDII SUPURATE TRATATE CHIRURGICAL

H. Neumann, S. Falutz, M. Muntenescu, E. Crăciun

(Oto-rino-laringologie, III. Nr. 3. 1958).

În general, după o intervenție radicală se observă o înrăutățire a auzului care se poate explica prin modificările structurale importante ce survin în urma operației.

În unele cazuri însă, chiar în ciuda intervenției radicale s-a observat nu numai păstrarea auzului, ci și o anumită ameliorare. O astfel de ameliorare s-a putut constata mai ales la bolnavii cărora pentru prescurtarea timpului de îngrijire li s-a aplicat pe teritoriul operat transplantate de piele libere. În vederea păstrării auzului sau a unei eventuale ameliorări, otologii au elaborat o mulțime de procedee chirurgicale, al căror rezultat este că numărul bolnavilor cu auz ameliorat, după executarea unei operații, e destul de mare.

Cu toate acestea în cursul examenelor sistematice de control efectuate după operații s-a constatat că la anumiți bolnavi ameliorații rezultatul examenelor de audiometrie arată modificări. La 16 bolnavi al căror auz s-a ameliorat după ope-

rație, s-a observat totuși o diminuare a auzului la nivelul sunetelor înalte. Deși acești bolnavi au fost supuși unor intervenții de tip diferit, audiograma lor a arătat fără excepție o înrăutățire pe teritoriul sunetelor de înaltă frecvență (2048—4096), în timp ce auzul a vădit o ameliorare apreciabilă pe teritoriul sunetelor vocale. Tabloul acestor audiograme e independent de extinderea și caracterul otitei medii.

Autorii cred că acest fel de transformări ale auzului pot fi puse în corelație cu leziunile ce survin în cursul microtraumatismelor operatorii. După toate probabilitățile leziunile sînt situate la nivelul curbei bazale a melcului, care e cea mai apropiată de teritoriul operației. Importanța clinică a observațiilor de mai sus constă în diferențierea îmbolnăvirilor neurologice ale n. acustic.

ZOLTAN ZAKARIAS