

DE
VERMIBUS
IN
CORPORE HUMANO
OBVIIS.

THEMA INAUGURALE,

QUOD

CONSENSU ET AUCTORITATE

MAGNIFICI DOMINI

PRAESIDIS ET DIRECTORIS,

SPECTABILIS DOMINI

DECANI,

TOTIUS INCLYTAE FACULTATIS MEDICAE

PRO

LAUREA DOCTORATUS RITE

CONSEQUENDA

IN R. SCIENTIARUM UNIVERSITATE HUNGARICA

PUBLICAE DISQUISITIONI SUBMITTIT

JOSEPHUS MLINARICH

CROATA, BELLOVARIENSIS, E. CONFINIO MILIT. CRISIENSI.


Theses adnexae publice defendantur in Palatio Universitatis
maiori. die Augusti 1832.

BUDAE,


TYPIS TYPOGR. REGIAE UNIVERSITATIS HUNGARICAE

Ardua res est, vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam, et natura sua omnia. Itaque etiam non assecutis, voluisse abunde pulchrum, et magnificum est.

Plinius.



BENEFACTORIBUS
MUNIFICENTISSIMIS,
MODESTISSIMIS,



gratissimus Auctor.

Entozoa RUDOLPHI et OLFERI (quia vi^ta cursum in corpore animato absolvunt) *Splanehelminta* Zederi (*σπλαγχνον*, viscus; *ελμίνς*, lumbrieus) *Enthelmintha* vel *Helmintha* (*Ελμίνδον* i. e. Entozoum) D^ümeril et recentiorum. — Denique *Vermes intestinales*, sunt animalcula, vel vermes in corpore animali vivo orta, vi-entia, et semet propagantia.

THEORIAE ORTUS:

I. Asserebant antiqui: *helmintha per fermentationem et petredinem humorum inquilinorum, alimenterum, accedente praecipue calore oriri.*

Sed refragatur huic genetiae: quod arte producta putrescentia *helmintha* extra corpus humanum non gi-gnatur; — porro, quod in hac theoria renis *vita* in *putredinem* nulla habita sit ratio.

II. *Ova vermium in terra, aquis, degentium per cibum, et potum in corpus hominis pertingunt, et, metamorphosim experta, in vermes intestinales transformantur.*

Jam vero extra corpus hominis non occurrupt *helmintha*, et quae visa asseruntur a Cel. LINNÉ, P. A. GADD, UNZER, TISSOT, BEIREIS, LEVENHÖECK, SCHAEFFER etc. per observatores alios non observata. Er-rores hac in parte admissi non exultae helminthologiae adscribendi. — Ita Cel. GMELIN, juxta testimonium Cel. PALLAS, ova ranarum sibi seriatim adhaerentia pro spuria specie *taeniae* habuit. — Sed insuper aer, aqua etc.

juxta experimenta instituta, non sunt media, in quibus vita constet helminthorum.

Salvare conantur hanc theoriam asserendo: *Causa, quod extra corpus humanum non inveniantur helmintha, in eo sita, quod per vitam corporis animalis forma mutetur*; ita Cel. BRERA, GAUTIERI.

Sed 1. Metamorphoses hae huicdum incognitae, et a recentioribus zoologis non observatae. — 2. Qui per cibos in corpus hominis deveniunt vermes, ii per digestionem validam, vel et per temperaturam insuetam altiorem intestinalium necantur. — 3. Similiter fit cum ovis vermium in intestina delapsis. — Sed quaeritur: quomodo haec ova in foetum utero contentum delabi poterant? cum et in hec quandoque inveniantur vix ex utero excluso, in abortu, in cerebro foetus. — Quomodo multiplicantur vermes hydatidibus inclusi, ubi nulla genitalia conspicua? — 4. Structura helminthorum a vermium in aqua, et terra viventium multum diversa. — 5. Demum dantur helmintha vivipara e.g. *CUCULLANUS*, et *ECHINORINCHUS*; unde ergo horum ova repetuntur? et quomodo viva in partes corporis varias deveniunt?

III. Alii asserunt: *infantem eodem, quo generatur tempore, vel dum in utero foveatur, cum vita et vermium germina ex parentum sanguine haurire.*

Ast. 1. Europeus liber manet a Filaria dracunculo, nisi in regiones torridas Indiae pervenit; — sus Scrofa ab apro sylvestri domesticus factus, et tamen in apro sylv. nunquam *Cisticercus cellulosae* R. inventa, ergo quomodo haereditatio explicabitur?

2. *Polycephalus cerebralis* in cerebro Ovium residens, nisi arte per trepanationem removeatur, mortem semper inducit. Oritur hic frequentissime in ovinis anni unius, antequam coitus foecundi capaces

essent, proin hic cum prima oví perire, et subseque haereditate propagari nequit.

3. Per matrem si propagarentur vermes, tunc foetus a matre semina omnium vermium adquirere deberet, secus deficiente vel unius generis semine, tum foetus, tum tota posteritas ejus liberarentur ab hoc vermium genere; — Concipi vero non potest, per duas, tres generationes in evoluta latere haec semina; et tamen observamus plures generationes nullo adfici morbo verminoso.

4. Praeformata vermium semina in uterum, et in foetum devenire absque fictione concipi nequit. Vasa enim uteri venosa, arteriae, sunt subtilissimi luminis ita, ut nec globulus sanguinis jam transeat, ova helminthorum autem globulum sanguinis magnitudine multum superant. Cel. RUDOLPHI minima helminthorum ova decem mille vicibus globulum sanguinis magnitudine excedere asserit. — Sed dato non concesso, quomodo certae speciei ova in certas partes e. g. cerebrum pertingunt foetus? quare non interdum in alias partes deveniunt, ut ibi ea species vermis efformetur? —

5. Nec per lac matris, ut Cel. THOMAS asserit, communicantur vermes; — nam plures infantes, absque lacte materno educatae, vermis laborant, — et admisso hoc asserto, lac matris esset congeries omnium ordinum, generum, et specierum vermium intestinalium! — assertum sane ridiculum.

IV. *Generatione aequivoqua* — Cel. NEDHAM, BUFFON, PATRINIUS *vermes intestinales oriri asserunt*; — haec theoria notioni de vita, et morte maxime congrua; vita, qua vita, non habet terminum certum, et finis organismi unius refertur ad individualitatem productio-ne et destructione manifestandam, non vero ad vitam ipsam, quae non cessat.

Momenta pro hac pugnantia: 1. Dissimilatio sicut assimilatio in omni parte corporis humani locum habet, proin et vermes ubique oriri possunt.

2. Dissimilatio haec in partibus diversis corporis aliter est modificata, partes enim varia ratione nutriuntur, diversa igitur erit assimilatio, proin et dissimilatio; hinc vermes certi in certis partibus corporis, et determinatae speciei, in diversis licet animalibus, in iisdem visceribus reperiuntur.

3. Vermes intestinales oriuntur sub certis adiunctis faventibus uti: aetate tenera, sexu foemineo magis, victu, constitutione debili corporis etc.; proin adjunctis vitae renisum debilitantibus, infringentibus, dissimilationem causantibus.

4. Primus vermis intestinalis nec aliter oriri potuit, nisi ex materiis organicas sub concursu certorum momentorum, seu quod idem: generatione aequivoca; nam aliunde illae materiae organicae haberri nequivabant.

5. Absque generatione aequivoca nec ortus helminthorum partibus genitalibus, et ovariis destitutorum explicari valet.

6. Ab Analogia. In corpore animali variae pseudo-organisationes oriuntur, ita: polypi, tumores cystici, pterygium, pannus etc. lympha producit in parte efformata organisationes, et partes hae similiter aliis vivunt. — sic producuntur pediculi in morbis variis uti: plica polonica etc. sub summa corporis mundicie — Sic vermes in ulceribus.

7. Huc refertur observatio Cel. NEDHAM et post eum plurium, transformari quippe corpora animalia in vegetabilia, et vicissim. Dein observatio Cel. ADANSON, confirmata per Cel. SPALLANZANI, in piscinis exsiccatis, aqua denuo repletis, pisces rursus generari.

8. Denique oriuntur infusoria similiter, si partibus animalibus vel vegetabilibus aqua destillata adfundatur, sub influxu radiorum solarium, ut et experimenta Cel. Priestlei innuunt.

V. Cel. OKEN proponit generationem aequivocam modificatam, asserit nempe: *generatio aequivoca non est productio animalis ex concursu non organicorum, non nova formatio antea non existentis animalis, sed divisio compositae organisationis in partes constituentes, — non oriuntur foecundatione, nec casu fortuito, — in genere nulla nova formatio, sed discessus infusoriorum in massa una unitorum.* — Proin juxta ejus mentem generatio helminthorum ex infusoriis.

Sed ad hanc theoriam comprobandam prius demonstrari debet, materiam organicam ex meris constare infusoriis. — Quodsi opinio haec Cel. OKEN comprobata fuerit, facile explicabis ortum helminthorum in diversis corporis animalis partibus, atque evolutionem.

VI. Recentissima est theoria Cel. Professoris SHERER *) helmintha oriri e textu celluloso. — Haec opinio fuit HIPPOCRATIS et AETII praecipue de generatione lumbricorum, quorum prior asserit: “ **) *Est autem lumbricus latus, si ita dicere liceat, permutatio membranae intrinsecus tenuia intestina ambientis, in corpus quoddam vivum, quod continuo stomachi morsus affert, et ad cibos inconsideratum appetitum. Intantum patent in longum, quanta sunt intestina, et a*

*) J. A. Scherer Ueber den Ursprung der Eingeweidew. aus d. Zellengewebe. Ost. Med. Jahrb. III 8./II St. S. 98.

**) Hippocratis M. Coacae prael. editae p. L. Durctum Parisiis 1583. pag. 218.; et J. M. a Tengström Coment. in Actii Åmideni Medioi etc. Specimen 1. Aboae 1718.

similitudine fasciarum taeniae vocantur — proin est generatio aequivoca, qua mediante ex materiis organicis, corpus organicum sub certis adjunctis efformatur. — Juxta mentem Cel. Scherer loco cit. “ *Textus cellulosis est formationi entis, quod vitam se ipso altiore non agit, prouti est helminthon, perfecte aptus. Vivit vitam polypo similem; in omni punto suae extentionis potest processus vitalis ejus, per processum organico-chemicum intendi, proin et vitalitas textus cellulosi exaltari.* ” — Quomodo haec vitalitas exaltetur, an aucta temperatur, oxygenio, galvanismo? etc. hucdum definiri nequit, licet processus analogi in natura haud rari occurrant. — Vitalitate in puncto uno exaltata, tollitur aequilibrium dynamicum processus vitalis; pars magis vitalis reddita vel a toto solvit, vel adhuc in nexu cum eodem permanet; prout sub conceptione, sub divisione polyporum, sub divisione infusorii in corpora duo seorsim viventia contingit. — Ita separatum corpus propriam vitam vivit, assimilat modo proprio, nutritur ex humoribus circumdantibus. — Respondet huic opinioni fabrica cellulosa helminthorum, uti Cel. ZEDER et Cel. RUDOLPHI loco citato innuunt. — Insuper hydatides, fine suo textui celluloso concretae, nec textura, nec structura, sed sola vitalitate differunt. Unde Cel. SCHERER loco cit. ait: „ *cum igitur hydatides ex eadem materia efformentur, et cum vitalitas in his solum gradu differat, concludimus hinc ad commune momentum causale. quod formationi utriusque subest.* ” — Porro textus cellulosus, nidus helminthorum, omnia organa obvestit, et in ea se insinuat, in hoc autem solo, textu celluloso quippe, vermes reperiuntur, ita Cel. RUDOLPHI Op. cit. Tomo I. pag. 360 „ *In contextu celluloso animalium fere omnium entozoa facilime proveniunt, ut filarias tam in hominis, quam in mama-*

lium, et avium cellulosa subcutanea, easdem vero et *Ascarides*, et *Distoma*, et *Cysticercos*, in muscularum aliarumque partium interstitiis cellulosis omnibus fere animalibus reperias.“ — Pro hac sententia maxime pugnat opinio Cel. RUDOLPHI, observationibus confirmata, ortus taeniarum, qui loco cit. Tom. I. pag. 411. ait: „sed taeniae quoque proventum oculis meis me usurpasse crediderim. Sub canis fricatoris dissektione, et tractus ejus intestinalis, ob villos examini subjiciendos, attenta lustratione, in superiori intestinorum tenuium parte, nodulos, seu puncta reperi plurima, alba et minutissima, villosae fortiter adhaerentia, quorum antequam natura innotesceret, indagatione microscopica aliquot horas ocupatus fui. Taeniae cateniformis tandem capita esse vidi villis annexa, seu potius cum iisdem coalita, et fere confusa, ut oscula licet earundem suctoria observaverim, locum tamen, ubi villo inhaerere inciperent, non distingvere potuerim. Capita autem sola erant, nec quamvis copiosa, Taenias integras aut harum partes secum ducebant, ut in toto tractu intestinali praeter eadem nil nisi duos. Taeniae cateniformis articulos invenerim. Hoc me saltem judice Taeniarum natales designare videtur, ut earundem nimirum capita sub dissimilazione orta, a villis nondum separata, vel iisdem innata fuerint, postmodum remittenda. Nec ex ovulis Taeniarum reflectis, ortum duxisse dicas, et tum enim articuli non defuisse, sed taeniolae semper, sub embrionis statu, articulatae sunt.“ —

Quod vero plurima helmintha tractum intestinalem incolant explicat Cel. SCHERER sic: „In tractu intestinali contingit continua muci secretio, et superficies libera membranae mucosae in contactum ponitur cum corporibus peregrinis, non assimilatis cibis, gasibus; quare facillime, his positis, vitalitas textus cel-

lulosi, membranae mucosae, in punctis pluribus exaltatur."

Juxta mentem Cel. Ph. C. HARTMANN causa ultima generationis vermium est: *vitae plasticae depravatio, qua fit, ut materiis organicis ad dignitatem animalem extollendis, et perficiendis impar, easdem in gradibus inferioribus, ubi ad plantarum, aut animalium infimorum naturam proprius accedunt, relinquat.* — Hac sententia vermes intestinales oriuntur ex materiis nutrititiis ob debilitatem vitalitatem ad dignitatem altiorem non evectis.

Cel. RUDOLPHI Entozoa seu vermes intestinales dividit in ordines quinque, ordines in genera, genera in species subdividuntur. Singulorum characteres paucis adumbrabimus, solo respectu hahito ad vermes in corpore humano nidulantes.

Ordo I. ENTOZOA NEMATOIDEA seu vermes filo similes: „corpore elongato, cylindrico, tenuissime annulato, elastico,“ distincti.

Genus 1. *Filaria*, cuius „corpus teres, elasticum, subaequale, longissimum, oris apertura orbicularis minima, genitale masculum spirale, ex apice caudae prominens:“

Species: *Filaria Medinensis*, *Filaria Dracunculus*, „*Filaria longissima*, margine oris tumido, caudae acuminis infexo,“ — degit in tela cellulosa subcutanea hominis.

Genus 2. *Hamularia*: „corpus teres, elasticum, subaequale; oris tentacula duo filiformia.“

Species: *Hamularia subcompressa*, „corpore antice attenuato,“ semel tantum in glandulis bronchiorum humanorum inventa.

Genua 3. *Trichocephalus*: „corpus teres, elasticum, parte antica capillari; os orbiculare.“

Species: *Trichocephalus dispar*: „parte capillari

longissima, capite acuto, indistincto, corpore maris spiraliter involuto, foeminae subrecto.“ habitat in intestinis hominis praecipue coeco, et colon.

Genus 4. *Oxyuris*: „corpus teres, elasticum, cauda subulata, apertura oris orbiculari.

Species: *Oxyuris vermicularis*: „capitis obtusi membrana laterali utrinque vesiculari, cauda maris spirali subobtusa, foeminac recta, subulata.“ digit in intestinis crassis, praeprimis recto. — Olim ad Ascarides relatus, nunc a Cel. BREMSERO proprium ei genus adsignatum.

Genus 5. *Ascaris*: „corpus teres, elasticum, utrinque adtenuatum, caput trivalve.“

Species: *Ascaris lumbriooides*, „corpore utrinque aequaliter adtenuato, utrinque sulcato, cauda obtusula“ habitat in intestinis humanis, praecipue tenuibus.

Genus 6. *Strongylus*: „corpus teres, elasticum, oris apartura magna, multiformis, genitale masculum ad apicem caudae vesica, aut membrana cinctum.“

Species: *Strongylus gigas*, „capite obtuso, ore papillis planusculis sex cineto, bursa maris truncata integra, cauda foeminae truncata,“ — in renibus hominis inventus.

Ordo II. ENTOZOA ACANTHOCEPHALA, seu vermes capite uncinato instructi: „corpore teretiusculo, utriculari, subelastico, proboscide seriatim uncinato, retractili.“ — Ordo hic nullos corpori humano hospites suppeditat.

Ordo III. ENTOZOA TREMATODA, seu vermes sugentes: — „corpore depresso, vel teretiusculo, molli, poris suctoriis.“ —

Ex hoc ordine duo genera corpus humanum incolunt:

Genus 1. *Distoma*, „corpus molle, depresso, aut teretiusculum, porus anticus et centralis solitarii.“

Species: *Distoma hepaticum*, *Distoma obovatum*, *planum*, *collo subconico*, *brevissimo*, *poris orbicula-ribus*, *ventrali majore*. "In cystide fellea, et ductibus biliferis hominis raro quidem inventum.

Genus 2. *Polystoma*, *corpus molle*, *depressum*, *aut teretiusculum*, *pori antici complures*. "

Species: *Polystoma pingvicola*, *Treutlerus* describit, *Polystoma depressum*, *oblongum*, *leve*, *antice truncatum*, *postice acuminntum*, *poris sex anticis*, *lunatim positis*. — a descriptore semel in ovario hominis, *pingvedini inclusum*, inventum.

Ordo IV. CESTOIDEA, seu vermes in taeniam extensi: *corpore elongato*, *depresso molli*. — Ex hoc ordine Cel. BREMSER duo genera corpori humano tribuit:

Genus 1. *Botriocephalus*, *corpus molle*, *elongatum*, *depressum*, *capitis armati*, *aut inermis foveis aut lobis oblongis*. —

Species: *Botriocephalus latus* Bremseri, *capite foveisque marginalibus oblongis*, *collo subnullo*, *articulis anterioribus rugaeformibus*, *insequentibus plurimi brevibus*, *subquadratis*, *latiорibus*, *ultimis longiusculis*. "Hic, sub nomine teniae latae huicdum notus, in Germania rarus, Helvetiae, Russiae, Poloniae et nonnullarum Galliae provinciarum incolis familiaris.

Genus 2. *Taenia*, *corpore elongato*, *depresso*, *articulato*, *osculis capitis suctoriis quatvor*. "

Species: *Taenia Solium*, *capite subhaemisphaerico*, *discreto*; *rostello obtuso*; *collo antrorum incremente*, *articulis anticis brevissimis*, *insequentibus subquadratis*, *reliquis oblongis*, *omnibus obtusiusculis*; *foraminibus marginalibus vase alternis*. — in Germania crebro occurrit, nec ubique solitarius; ita in Clinico Vienensi 1830 taenia solium, una cum Botriocephalo lato e foemina expulsa.

Ordo V. CYSTICA, seu vermes vesiculosi „membranacei, plerumque rugosi, cavi, capitis corona uncinata, corporé in vesicam excurrente, vel vesicae adhaerente.“ —

Ex hoc ordine duo genera in corpore humano nidulantur:

Genus 1. *Cysticercus* „corpore depresso, aut teretiusculo, rugoso, in vesicam caudalem excurrente; capite retractili, osculis sugentibus quatvor, et in medio corona uncinata duplici instructus.“

Species: *Cysticercus cellulosae*: „caput tetragonum, rostellum teres, uncinatum, collum brevissimum anfrorsum increscens, corpus cylindraceum longius, articulos mentiens, vesica caudalis elyptica, transversa.“ — In contextu celluloso muscularum, et cerebri humani rarius reperitur.

Genus 2. *Echinococcus* „corpus minimum, subglobosum, caput uncinulis coronatum.“ — Vermiculi adeo exigui, ut non nisi armato oculo distingvantur; includuntur hydatidibus, in fluido in illis contento natant, vel earum internae superficie adhaerent.

Helminthiasis, Vermilio sensu strictissimo est ille abnormis assimilationis status totius organismi sub quo ad junctis faventibus, vermes generantur, qui generati symptomata edunt morbi determinati. — Sensu latoiore est status morbosus organismi, qui producitur, si vermes intestinales praesentes, suam prae sentiam per symptomata mörbosa indicent.

Symptomata varia vermes praesentes edere solent. Subinde symptomata affectionum morbosarum aliarum vermibus adscribuntur, aeger anthelminticis torquetur remediis, licet nulli secedant vermes; — hinc ad evitandum in diagnosis errorem advertendum erit ante omnia ad evolutionem symptomatum successivam, et combinanda haec cum pathogeneticis momentis.

Pro varia sede vermium et symptomata discrepant. Vermes textum celluloso inhabitantes, vel viscera abdominis, seu sic dicti vermes viscerales, splanchnici, licet in cadavere reperiantur, symptomata in vivo difficulter cognoscenda, vel prorsus nulla inducunt. — Functio organi inhabitati quandoque laeditur, sed haec laesio aliis etiam causis induci potest. — Filaria Medinensis seu Tropica faciliter cognoscitur, degit in tex tu celluloso subcutaneo crurum, ubi oboritur dolor magnus, inflammatio extensa usque ad ossa, quae cariosa fiunt; saepe per aperturam cutis pars vermis propendet. — Filaria bronchialis, Echinococcus, Distoma hepaticum, Cysticercus cellulosae symptomata inducunt, aliis ex causis similiter explicanda. Ideo Diagnosis de vermis splanchnicis ne probabilis quidem est.

Longe facilior statuitur diagnosis VERMIUM INTESTINALIUM magis frequentium, licet et haec ipsa variet

pro diversa constitutione aegri individuali, et pro diversa specie vermis intestinalis. — Sed et hic innuendum, plures homines vermes longo tempore, ad tumbam usque, in intestinis suis circumferre, quin ulla morbo-sa affectione, vel habitu cachectico notentur.

Symptomata omnibus communia idiopathica sunt, vel sympathica; — ad priora referuntur: sensus serpen-tis mordentis vermis; — adpetentia farinaceorum, si-tis tempore matutino; fames praecipue tempore no-cturno urget, — saepe anorexia, — halitus oris fatuus, subdulcis, — lingua muco denso obducta, ptyalismus, nausea, nisus ad vomendum ventriculo vacuo, et, post usum ciborum dulcium, vomitus liquidi aquosi; — status aegri exasperatur post usum synapis; allii, ce-pae, aceti etc. — dolores colici praecipue circa umbili-cum cito ingruentes, et cito evanescentes, qui post usum lactis mittigantur; — abdomen expansum, anxie-tas, respiratio difficilis; — diarrhoea cum tenesmo, et al-vo obstipa alternans.

Symptomata sympathica: pruritus narium, illu-siones sensuum, olfactus; visus, auditus; — strabis-mus, pupilla dilatata, chrupsia, scotomia, diplopia, amaurosis temporanea quandoque aegrum molestant; — annuli lividi circa oculos, spasmi muscularum bulbi, stridor dentium, somnus insomniis turbatur; color cutis pallidus, inconstans, cardiopalmus, pulsus frequens, durus; subinde intermittens, respiratio difficilis cum tussi sicca, urinae pallidae, sudor acidus; — vertigo, susurrus aurium. Aeger delassatus, somnolentus, morosus; subinde oedema faciei, palpebrarum, extremitatum, et ipsa febris verminosa adsunt; tandem post longam durationem, et curam neglectam emaciatio, — fe-bris hectica, et mors.

Ad symptomata rariora pertinent: spasmi, con-vulsiones, chorea sancti Viti, epilepsia, tetanus, de-

liria, paralyses, aphonia, alienationes mentis, apoplexia, et varia exanthemata. — Rarissima, et semper periculosa dissenteria, pneumorrhagia. — Non raro epistaxi, et alvo sanguis evacuatur, uti Cel. Pet. FRANK de pueru refert, qui post praegressos dolores circa umbilicum repente irruentes, per anum sanguinem evanavit, et ordinatis anthelminticis, ab eodem pueru septuaginta Ascarides lumbricoides secesserunt.

Symptomatum haec farago non semper adest, subinde solum pauca ex adlatis, subinde omnia haec symptomata aliis debentur morbis uti: scrophulis, rachitidi, hydrocephalo, hysteriae, hypochondriae, et coeteris affectionibus systematis glandulosi, vel lymphatici; — hinc ex summa solum symptomatum omnium, per combinationem, ad vermium praesentiam concludere licet.

Suspicio justa praesentiae vermium adest: si color faciei pallidus variet cito, oculi tristes, annulus lividus sub palpebra inferiori, pruritus narum, ani, — abdomen tumens, inaequale, — extremitates emaciatae, ructus frequentes, nisus ad vomitum, vomitus ipse, dolores colici absque causa cognita orti, et evanescentes; urinae pallidae, lacteae, saepe cum stranguria, in junioribus praesertim febris continuo-remittens raro vehemens, — vertigo, ptyalismus adsint; — si dolores increscant post usum ciborum vermis ingratorum, vel jejuno ventriculo, et si remittant post usum laetis; tandem si symptomata cum novilunio augeantur, et cum eo typum servent exacerbationum. — Symptoma unicum, et infallibile est secessus vermis, vel partim ejus.

Praeter adlata symptomata communia omnibus, quaedam species vermium intestinalium propria edunt, sic:

A) *Oxyuris Vermicularis* Brems. s. *Ascaris vermicularis* Rudolphi in intestino praecipue recto degens,

pruritum hic edit peculiarem (proctalgia verm.) qui manifestatur dolore urente, mordente transitorio, tempore praecipue vespertino, et post alvi, flatum secessum remittente, — nisus ad alvum, urinam subitaneus; saepe sensus quasi a gutta aquae in dorsum labentis, quem sensum, sicut et alvum, horripilations excipiunt; — frictione ani tubercula oriuntur ab haemorrhoidibus diversa; — si vero haemorrhoides simul adsint, provocant earum fluxum, porro blenorragiam intestini recti, vaginae, urethrae, rarius nymphomaniam, — subinde adest tenesmus et nisus continuus ad alvum, qua vermes copiosi evanescunt, qui subiliendo praesentiam suam produnt. —

B) *Ascarides lumbricoides* colicam verminosam praecipue inducere dicuntur, dolores causant frequentes abdominis cito irruentes praecipue circa umbilicum, aegri attenti eos serpere et movere percipiunt. — Evacuantur copiosi per anum, et os.

C) *Bothriocephalus latus* BREMS. *Taenia lata* RUDOLPHI, — et *taenia solium*. Sub motu undulatorio in abdomen, praecipue in parte sinistra, aeger conqueritur de dolore sugente, pungente in regione ventriculi, subinde, praecipue sub contractione vermis, sensum percipiunt rotatorium, — sensus ponderis in eadem regione fixus, subinde sensus quasi transuentis aeris frigidi per intestina, — aeger percipit nisum corporis cuiusdam peregrini repentine sursum ascendentis, vel delabentis. — Abdomen tumet, facies plumbei coloris; — aeger percipit nasum quasi elongari, — Adpetitu subinde insigni, corpus emaciatum — Animus variat, subinde hilaris, subinde tristis. — Quandoque deliria, Stupor omnium organorum, mania, pupilla dilatata, non raro Amblyopia, — non raro tremores artuum, convulsiones, vertigo praecipue in hysteriis adsunt, cum stupore extremitatum. — Nisus ad vomendum sub ideis in-

gratis. — In genere ex his vermibus plurimae affectiones nervosae ortum ducunt, vel eas committantur.

Ad morbi verminosi evolutionem requiritur a) Dispositio peculiaris. Vermes non haereditantur, ut supra innatus, sed dispositio; et haec subinde congenita est, subinde haereditate adquisita, subinde serius per influxum potentiarum nocentium evoluta. Diathesi verminosae magis obnoxia est aetas tenerior, sexus foemineus; auget dispositionem clyma. Sic in Russia, Polonia, bothriocephalus latus frequentissimus, taenia solium rarissimus; — in Gallia et Helvetia pari frequentia et bothriocephalus latus, et taenia solium occurunt. — In Anglia, Hollandia, Germania, apud nos, et in Oriente bothriocephalus latus est rarissimus, taenia solium frequentissimus. — Filaria Medinensis solum sub tropicis habitat. — Subinde atmospherae peculiaris constitutio generandis vermibus intestinalibus favet, ideo auctores multi constitutiones epidemicas verminosas describunt.

b). Causae excitantes; — huc spectant omnia, quae processum vegetationis praecipue in intestinis pervertunt, debilitant, infringunt; hinc vita otiosa, sedentaria, aer humidus, corruptus, palludosus, stagnans, cibi copiosi farinacei, pisces, oleracea; — nec immunes sunt, qui meritis carnibus vescuntur, nam et animalia carnivora vermibus molestantur; in genere omnes cibi, qui muci productioni favent, et statum pituitosum inducere valent; — subinde occurrit morbus verminosus epidemicus, qualem describit Cel. STOLL, CONSBRUCH, MORGAGNI, RAULIN, BERGE, SAGAR etc. Ascarides quandoque migrant e proli una in aliam. — Taenia lata in Helvetia fere endemica.

Differit prognosis pro varia sede, specie vermis, item pro varia duratione, et complicatione morbi. — Vermes splanchnici, qui in diversis partibus corporis

humanī resident, rarissime cognoscuntur, ideo vix curabiles sunt. — Subinde vermes intestinales innocui, hominem a cunis ad tumulum usque committantur, quin ulla producant symptomata mōrbosa; sponte per alvum quandoque secedunt. — Subinde valde molesti sunt, dolores, spasmos causant, adfectiones nervosas quandoque inducunt, succum nutritium consummunt, hinc corporis nutritio imperfecta, emaciatio, tabes, febris hectica inducit. — Credebatur olim vermes intestina perforare, quod repugnat investigationibus a Cel. RUDOLPHI institutis; asserentisque, organa ad id requisita eis deesse. — Copiosi acumulati alvum pertinaciter obstruunt, ileum morbum excitant periculosum; — subinde per vermes excitatur enteritis periculosisima, læthalis prout Cel. Prof. BENE in Schola Clinica Pest. in casibus duobus adnotavit. — Unde authocratiae naturae morbus commissus saepe omnino periculosissimus evadit; morbos alios simul praesentes, uti febres inflammatorias topicas, multum exasperant vermes intestinales, similiter et exanthemata. — Prognosis laeta non dependet a solo secessu vermium vivorum, mortuorum vel putridorum, vel a secessu capitis, taenia praesente; atque cum his nexa allevatione aegri; sed imprimis a statu cachectico, dispositione universalis, nec non conditione primarum viarum emendata.

Methodus, qua vermes e corpore humano climentantur, dicitur *Anthelmintica*; — haec non exserit efficaciam suam contra omnes vermes, — ita vermes splanchnici, sicut non cognoscuntur in vivo homine, ita nec remedia contra eosdem nota. Contra Echinococcum cerebri in morbo gyratorio óvium operatio cum successu quandoque instituta est, in homine nunquam; ideoque cura Anthelmintica solum suscipitur contra vermes intestinales.

Duplici indicatione medicus ductus curam verminum orditur; prima praeceperit removere symptomata periculosa a vermis oborta, et ipsos vermes vivos vel mortuos; — altera sanitatem restituere, et recidivam praecavere conatur. — Indicatio prima vel symptomata periculosa abigit, vel vermes ipsos; utraque cura palliativa solum dicitur; — altera est radicalis. — Omnibus autem methodis Anthelminticis praemittitur Dieta tenuis, non farinacea; optime conducent cibi saliti, oleracea, et vina acida. — Sumuntur vero Anthelmintica stomacho jejuno, vel praemisso purgante.

A) Cura palliativa.

Ad huic satisfaciendum curae, ad sedandas turbas a vermis obortas et symptomata periculosa interna conveniunt sedantia, lenientia remedia; — Iac recenter emulsum, et hoc quidem melius, quam calefactum, vel pro potu, vel qua enema exhibitum, — scopo posteriori adhibetur ad vermes ex intestino duodeno sensiliore ad intestina crassa pelliciendos, — porro oleum Olivarum, Amygd., Ricini in enemate, — Ad spasmos componendos exhibetur inf. flor. Chamomillae, Valerianae, etc. — simul in enemate emulsio spuria Assae foet. — item interne Extr. hyosc. opium, Assa foet. — Cel. DURIETZ contra spasmos sequens praescribit medicamen:

Rp. Gum. Assae foet. drach. duas

Opii

Sal. Volat. Cor. C. ana dr, semis

Essent. Castorei. unc. tres

Digere, et colla.

Atque hujus mixturae gutt. 30 — 40 in vino exhibere jubet. — Cel. ROSENSTEIN subinde laudat emetica. — Si taenia praesens similes causet molestias laudatur extr. Absinth. in vino solutum. — Externe abdomini illiniuntur olea volatilia cum, vel sine opio.

fomenta ex aqua frigida sola, vel cum sedantibus: cicuta, hyosc. unita; — denique balneum universale.

Remedia parti secundae curae palliativae satisfacientia, vermes-necantia, expellentia, propriè dieuntur anthelmintica, et haec pro ratione actionis juxta Cel. BREMSER dividuntur in mechanica, specifica, purgantia, et roborantia.

a) MECHANICE AGUNT:

Hydrargyrum regul. forma enematis; ex hydrargyri puri unc. una, in libra una aquae cocta, addito melle q. s. —

Zincum a Paracelso primo propositum, laudat Cel. THILENIUS, v. SWIETEN et alii.

Stannum vel rasum vel granulatum forma boli, vel electuarii sumitur, dosis unc. semis; simuſ exhibetur purgans. —

Ferrum limatum adhibuit Cel. RICHTER, grana decem usque scr. unum cum saccharo. —

Stizolobium Dolichos pruriens a Dioscoride jam adhibitum, laudatur a Cel. CHAMBERLAINE, SPRENGEL, RUDOLPHI etc. — exhibentur grana quinque infantibus forma electuarii, vel boli. —

Rad. Dauci Corotae vel rasa cruda. vel tosta in pulvere exhibetur. — Cel. HARTMANN opinatur activam esse per evolutum, fermentatione mediante, acidum carbonicum. Cel. PALLAS laudat carbonem ustum. — Cel. BREMSER de his remediis opinatur, artem medicam iis tuto carere posse.

b) SPECIFICE AGUNT:

Aqua frigida. Cel. PALLAS, DARWIN plus aquae salsaे tribuunt. — Cel. LÖFFLER laudat pilulas e glacie, omni minuto exhibitas; — Aquae porro minérales praecipue ferratae. —

Succus Urticae dioicae, et urentis rec. pressus. —

Allium sativ. et *Allium cepa* in frusta sectum, et comedum, vel cum lacte coctum remedium anti-

quum et populare; item succus allii expressus cum suc-
co citri et. saccharo, exhibendo cochl. cib. unum se-
mel de die; Quandoque externe umbilico illinitur, —
vel forma enematis exhibetur. — Cel. RICHTER tur-
bas in abdomen oriri, convulsiones, observavit post
ejus usum. —

Ferula Assa foetida forma pulveris gr. V — Vj.
vel forma pil. infantibus gr. j. exhibetur; jungitur
purgans. — Juxta Cel. HARTMANN effectus hic re-
petitur, quod vermes infestet, actionem vitalem inte-
stinorum exaltet, secretionem muci imminuat, — ad-
hibetur etiam in enemate. —

Semen Santonici, *Sem. Cinae*, *Sem. Contra*,
vel *Artemisia Judacia* praecipuam exserere dicitur vir-
tutem contra Ascarides, vermes necando, organa vero
digestionis roborando. HARTMANN. — Exhibetur pul-
veris rec. tusi grossioris scrup. unus ad Dr. unam,
vel in inf. Dr. duae, nnc. semis. — vel in electuariō,
chiocolada, trochiscis. Cel. RICHTER sequentem for-
mulam praescribit, neciendo statim purgantibus:

Rp. Pulv. Sem. Santon. Dr. duas

— rad. Jalap. Dr. unam

Merc. dulc. gr. sex, usque decem

Syrup. Cort. Aurant. q. s.

fiat Electuarium.

S. Omni bihorio cochl. cof. unum, duo us-
que plures alvi evacuatiōes. — Vel forma pulveris:

Rp. Sem. Santon. gr. quindecim.

Rad. Rhei. Chin. gr. duodecim.

Aloes gr. sex.

Merc. Dulc. gr. tria.

Rad. Ipecac. gr. unum.

M. f. pulvis

Div. in partes acq. N. tres

Exhibeatur infanti trium annorum jejuno stomacho pulvis unus.

Tanacetum vulgare cum priori ejusdem efficaciae, domesticum, et levioris pretii. —

Aspidium filix mas antiquissimum remedium a Dioscoride propositum. Adhibetur praecipue contra tæniam, dosis drach. duae, tres in pilulis, optime bolis; ingreditur plurima remedia composita. —

Helminthochorton in Gallia p̄aeprimis usitatum, contrā ascarides in pulv. scrup. unus, usque drach. semis, — in decocto unc. semis ad Colat. unc. quatvor exhibetur, — paratur inde et gelatina. —

Cortex Geoffreæ Surinamensis in decocto exhibetur, ad quod recipitur unc. una corticis et aquae unc. duodecim, et coquitur ad remenantiam dimidiū; omnibhōrī coch. eib. unum summat aeger, — jungitur purgans e Calomele et Jalappa. —

Radix et herba Spigeliae Anthelmiae et Mari-landicae dosi majori vomitum, diarrhoeam, vertiginem, affectiones nervosas inducit; principio suo narcotico compescit motus excessivos. Exhibetur in pulv. Scrup. semis, usque intégrum, — in infuso Aquae vel lactis Drach. una, vel una semis. —

Nux vomica ob effectum nimium, nunc obsoleta.

Semen Sabadillæ a plurimis medicis laudatur; dosis in pulv. gr. tria usque Scrup. semis bis ter de die, — melius in decocto aquoso vel lactis. — Optime nectitur mucilaginosis, et die quinto exhibetur purgans —

Extr. putam. viridium Nuc. jugland. digestio-
nem promovet, roborat, et simul regenerationem ver-
mum impedit. HUFELAND. — Exhibituntur gr. decem
usque Scrup. unum. — Putamina ipsa in Decoc̄to ex-
hibentur, dosis unc. una. —

Rad. Valerianae Sylv. laudatur, praecipue si sparsim simul adsint. Ingreditur plura composita, ita Electarium STÖRCKII, quod Auctor sequenti formula praescribit:

Rp. Sal. polychresti.

pulp. rad. Jalap.

— Valer. Sylv. ana drach. unam
Oxymel. Scilit. unc. quatvor.

M. D. S. Capiant adulti ter de die cochl. Cib. unum, infantes omni bihorio cochl. cof. unum. — Adhibetur quoque in enemate. —

Camphora: qua Antisepticum agere antiquis visa, virtus praecipua ejus in clystere. —

Cort. rad. punicae granati in decocto. laudat HARTMANN. De quo infra.

Porro ad hujus ordinis redia numerantur: grana Tiliae, Sem. plantaginis latifoliae — Chenopodium Anthelm. — Cortex Angeliae — Helleborus foet. — Cortex Arecae oleraceae, — Sal ammoniacus, — Tartar. tartarisatus, — Cortex peruv. Cinnamomi etc. — Dictamus albus. — Olea diversa: Petroleum, — Ol. Cajeput, — Ol. animale Dippelii, — Ol. Chaberti, — Olea pingvia omnia; Ol. Ricini, — Ol. Therebinthinae, cuius Cel. HILDÈNBRAND gatt. decem in saccharo ter de die summere praecipit. — Flores sulfuris, — Murius Calcis et barytae, — a recentioribus Jodina, — Amygdalarum Amar. Aqua destil. et Aq. Lau-rocerasi, — denique Acid. hydrocyanicum.

Externe qua specifica laudantur inunctio gummi guttae, cholocinthidis, et plurium purgantium drastiorum in umbilicum; — fomenta e camphora in Oleo lini soluta, — Ol. therebinthinae cum vitello ovi, vel sapone veneto — Extr. Absinthii in aqua Menthae piperitae solutum. — Ol. Croton Tigliae gutt. tres usque decem in unc. una ol. Olivaram, v. axungiae porci

solutae. — Ol. tanaceti cum felle tauri, Rutta, Assa foet. — Ol. Cajeput, — Ol. petrae cum allio laudat Cel. ROSENSTEIN. — Cel. BRERA proponit linimentum e fellis Tauri drach. una, cum sapone veneto, et Ol. Tanaceti, — hoc praecipue in enemata laudatur in tractandis prolibus. — Cel. RICHTER formulam prescribit sequentem:

Rp.. Sem. Santon.

Rad. Valer. Sylv. ana unc. semis

Inf. et digere c. aq. f. fery. q. s.

flat Col. unc. octo

Cui adde:

Assae foet. in vitello ovi solutaे drach. unam.

M. D. S. zu zwey Hystiren.

Porro laudantur enemata cum lacte, vel e fumo Tabacae. — Denique ictus electricus, galvanismus et magnetismus.

c) AD PURGANTIA referuntur: omnia salina, oleosa, drastica, Calomel, nec non ex specifice agentibus uti: Geoffroya Sarinam. helminthochorton, Spigelia Anthelmia, chenopodium Anthelminticum, Sabadilla etc. medicis nota, ut ea recensere sit superfluum.

d) ROBORANTIA infra sub cura radicali commemorabuntur.

Praeterea remedia huicdum recensita specifica simplicia dantur et compositiones ab Auctoribus suis laudatae, et comprobatae per medicos alios, quas hic paucis expōnemus, commemorando saltem ex innumeris praecipuas.

Sic Cel. Alex: TRALLIANUS laudat compositionem non satis cognitam ex oleis, Sem. Cumini, Nucib. jugl. et felle tauri. *)

Cel. CERMISSONEN Prof. Med. PATTAVIAE et PAVIAE laudat contra Ascarides compositionem e felle tauri, Absinthio, et Sem. Cinae, praemisso purgante. **)

Methodi praecipuae contra taeniam solium et latam:

Cel. BREMSER curam inchoat electuario sequenti:

Rp. Sem. Cinae rud. cont. unc. semis.

Pulv. rad. Valer. sylv. drach. duas.

— — Jalap. drach. semis, vel scrup. duos.

Tartar. vitriolat. drach. semis, usq. dr. duas.

Oxym. scillit. q. s. nt f. Electarium

D. S. Mane et vesperi cochl. cof. unum sumat.

Hoc consumo exhibet Ol. Chaberti cochl. cof. duo in aqua, mane, et vesperi vel jejuno, vel post jentaculum. Si non fertur, quod raro evenit, dosim immixuit, et exhibet emulsionem. — Dein post dies 10—12. usuati olei purgans sequens:

Rp. Rad. Jalap. scrup. unum.

Foliōr. sennae. drach. semis.

Tart. vitriolat. drach. unam.

M. f. pulv. div. in doses aeq. tres vel quatv.

D. S. Omni hora pulverem unam summat.

Rursus Ol. Chaberti propinatur, usque dum Unc. 6—7. consummantur. — Sub cura videntur omnia.

*) Michaelis Med. pract. Bibliotheca pte. 4. pag. 28.

**) Sprengeli historia Medic. Tom. II. pag. 615.

Quae ructus causant: — Raro recidiva sequitur. Si nisus in mucositatem adsit, tunc exhibit medicamen sequenti formula:

Rp. Tinctur. Aloes comp. Pharm. Austr. dr. unam.

Tinctur. Martis pomatae unc. unam.

Elix. Vitriol. anglic. Pharm. Lond. unc. semis.

M. D. S. summat guttas 10—30 ter; quater de die in pauxillo aquae vel vini. — Dioeta nulla peculiaris observanda. — Criterium vermem secessisse est, si post menses tres nullae partes vermis secedant.

Cel. HERRENSCHWAND exhibit bis de die, mane stomacho jejuno, et vesperi post levem coenam drach. unam pulv. rad. filicis maris. Die tertio sequentem pulverem stomacho jejuno:

Rp. Gummi Guttæ gr. duodecim.

Sal. Absinth. neutr. gr. triginta.

Saponis Starkei gr. duo;

M. intime.

D. ad Chartam:

Sequitur vomitus et diarrhoea; allevatur vomitus potu aquae tep. vel theae, — post horas tres iu fiala juris carnium sumitur unc. una Ol. Ricini Americani vel in ejus defectu Communis; quod repetitur singula hora, usque dum vermis secedit. Vesperi, si vermis non secessit, exhibitur Enema ex aqua, lacte, cum Ol. Ricini unc. tribus. — Haec methodus per auctoritem ipsum frequenter mutata.

Cel. MATHIEU praemissa dioeta exhibit electuarium.

Rp. Lim. Stann. Anglic. pur. unc. unam;

Rad. filicis mar. drach. sex.

Pulv. sem. cinae unc. semis.

Pulv. rad. Jalap. resinos.

Salis polychrest. ana drach. unam.

M. f. cum mellis com. q. s. Electuarium.

S. Summat omni bihorio cochl. cof. unum per

dies duas, tres, usque sensum vermis se moventis ac-
ger perceperit. Dein :

Rp. Pulv. rad. Jalapp. resinos.

Salis polychrest. ana scrup. duos.

Scammon. Alepp. scrup. unum.

Gummi guttae gr. decem.

M. f. cum melle com. Electuarium.

Summat omni hihorio cochl. cof. unum usque ver-
mis secessum; qui si non insequatur, exhibet aliquot
cochl. cib. Ol. Ricini rec., vel enema ex eodem oleo.—
Aetas, sexus, constitutio etc. dosim mutant.

Similis huic est methodus Cel. MARK. opinatur
virtute in hanc stanno deberi ob admixtum Arsénicum.

Foemina NUFFER sequentem methodum propon-
suit: Aeger praeparatur dioeta tenui, uno alteroye die
solum jusculum tenui ex aqua, et pane sale conditum
adhibet. Die sequenti stomacho jejuno accipit pulv.
rad. filicis maris drach. tres, in aquae Flor. Tiliae unc.
sex. — nausea fugatur succo citri modico. Si reme-
dium hoc ingratum vomitu rejiciatur, rursus repeti-
tur. — Post duas horas bolum summit sequentem:

Rp. Panaceae mercurialis

Scammonei ana gr. decem, duodecim.

Gummi Guttae gr. sex, septem.

Tritur. misc. et f. c. q. s. Conf. Hyacinth. Bolus

Haec methodus mense Septembri adhibetur, re-
petatur usque vermis secessum. Cel. RUDOLPHI ad-
vertit esse remedium ingratissimum et periculosum. Cel.
Pet. FRANK dicit aegros, semel hac methodo tractatos,
se ei nunquam submittere velle.

Cel. ODIER Prof. Genevensis similem adhibet me-
thodum, sed loco boli exhibet Olei Ricini unc. tres,
quod omni dimidia hora cochleari cib. in jure carnium
summere praecepit.

Cel. DARWIN exhibet amalgama ex Zinco et hy-

drargyro simile ei, quo specula obducuntur, et quidem omni bihorio unc. unam amalgamatis usque consumtionem librae unius; dein purgans ex unc. duabus Sal. Mirab. Glaub., et unc. una salis com. in libr. duabus aquae solutis, cuius libra semis omni hora consumatur; adjuvat curam ictibus electricis trans abdomen derivatis. — Similem methodum adhibuit Cel. BARBOU circa medium saeculi praeterlapsi.

Cel. DARELLI exhibit Tincturam ROTHENI sequentem:

Rp. Rad. Jalap. unc. qnatvor.

Sem. Cartham. unc. unam

Scammon. opt. unc. semis.

Gumm. guttae drach. duas.

Contund. et superad.

Spir. vini rectif. unc. octo.

Digere. Summat gutt. decem, viginti, bis ter die in saccharo donec alvus sequatur; et multum bibat aquae frigidae. — Tinctura haec vocatur etiam Tinctura catholica purgans, vel Elix. purgans Michaelis. Cel. WERLHOF hanc methodum multum laudat.

Cel. ETTMÜLLER vespere praecedente exhibit scopo mucum solvendi sequens medicamen:

Rp. Merc. dulcis gr. duodecim

Lapid. cancror. scrup. unum.

M. f. pulv. summat vesperi totum.

Ante decubitum vero unc. unam semis Ol. Amgyd. dulcium bibat. Die sequenti mane pulveres:

Rp. Gumm. gutt. gr. triginta sex.

Pulv. rad. Valer. minor.

Pulv. sem. santon. ana gr. septem.

M. Div. in partes aeq. Nro tres.

Summat pulverem unum hora septima cum thea, dein hora nona secundum, quem taeniae secessus excipit. — Aeger jacet sub tota cura in lecto, — dein

ipso exhibentur roborantia. Pulverem tertium raro adhibuit, post quem adhibitum semel, symptomata periculosa secuta.

Cel. HARGEN praemissa dioeta exhibet emeticum ex Ipecacuanha. Die sequenti jejuno stomacho purgans ingratum ex herbae gratiolae serum duobus, Merc. dulc. gr. quinque, Assae foet. drach. semis, et aliquot guttis Ol. Menthae pip. dest. — Statim post hoc sumptum aquam frigidam praecipit superbibere, et post horas duas aliquot cochl. cib. Olei Ricini. — Enema ex cremore lactis. — Ad abdomen totum emplastrum calidum adponit, compositum ex Assa foet., Camphora, Ol. therebinth. Petroleo et Empl. de Galbano.

Cel. CORTUM edoctus de praesentia taeniae adultis per dies aliquot exhibet Decoctum Anthelmint. purgans ex. Sem. Santon., helminthochori, rad. Valer. Spiegel., fol. Sennae etc usque moderatas alvi evacuationes. — Inunctiones in regionem umbilicalem e petroleo, cum Ol. destill. Absinth. et tanaceti fieri jubet. — Aliis loco decocti pulveres ordinavit e rad. filiae maris, Sem. Santon., Valerian., Coralinae, jalapp. Sal. Amoniaco. — Quies aegro per aliquot dies conceditur, nisi quod omni bihorio summat cochl. cib. unum Olei Amygd. dulcium. — Die tertio mane exhibuit Gummi Gutt. cum alcali vegetabili, vel in connubio cum Calomela, Jalappa; et quidem forma pulvris, quorum singulus continebat gr. octo, decem, Gummi Guttæ, — post sumptum pulverem primum cochl. cib. duo Olei Amygd. dulc. et falias aliquot juris carnium exhibet. — Communiter post primam, secundam dosim taeniam secessisse asserit. — Curam absolvit amaris simplicibus, vel tonicis.

Cel. SCHWARZ praemissa dioeta tenui, pilulas exhibet:

Rp. Assae foet.

Extract. Valerian.

Pulv. rad. filicis. ana drach. duas.

Olei tanaceti q. s. ut f. pilulae ponderis gr. duorum.

D. S. Capiat pil. duodecim, quater de die.

Dein exhibit remedium drasticum, quod jam taeniam expellit saepissime. Ea non insequente, ordinat: Pulv. rad. filicis unc. duas D. S. Capiat omni bihorio cochl. cof. cumulatum. — Dicit subinde et ad hoc remedium porrectum solum partes, non vero totam secedere taeniam, hinc nullis jam proficientibus optime se adhibuisse medicamen sequens:

Rp. Petrolei unc. semis.

Essent. Assae foet. drach. sex.

M. S. Sumat gutt. 40. quater de die.

Cel. HUFELAND et alii medici optimo cum successu methodum hanc se adhibuisse asserunt. — HUFELAND addit adhuc barytam, vel calcem muriaticam.

Cel. BURDACH praecipit aegro exhibere decoctum saturatum polypodii filicis Maris cum Aetheris Vitrioli drach. una, post horam aeger persentit ut plurimum motum vermis, tunc exhibit Ol. Ricini Amer. unc. duas cum syrupo aliquo grato, — hoc repetitur die secundo, tertio, quo vermis secedere solet. — Si vermis haereat in intestinis crassis tunc enema ex decocto saturato filicis maris et Aetheris Vitriol. drach. duabus exhibeatur.

Cel. PECHIER 1825 extraxit e polypodio filice mare, filicinam materiam oleosam, quae cum substantia extractiva in pilulam redigitur, singula pillula containeat gutt. unam olei illius, et asserit octo guttis taeniam expelli.

Cel. SCHMITT Berolinensis *) hanc proponit methodum: Die primo jejuno stomacho summat:

*) Huselands Journal. v. p. 5. 1828 Monath August.

Rp. pulv. rad. Valer. minoris drach. sex
 fol. Senae drach. duas
 f. l. a. infusum
 Col. unc. sex. Adde :
 Natri sulfurici crystallisati drach. tres.
 Syrupi Mann. unc. duas.
 Eleosacchari Tanaceti drach. duas.
 S. Omni bihor. duo cochl. cib.

Dioeta tenuis, jusculum, cum halece, et lac. Vesperi lactucam cum halece et perna cruda oleo et saccharo. Sequenti mane:

Rp. Assae foet.
 Extr. gramminis ana drach. tres
 pulv. gummi guttae
 pulv. rad. Jalappae ana drach. una.
 pulv. rad. Ipecacuanhae
 pulv. herbae Digit. purp.
 Sulfuris Aurati Antim. ana scrup. semis.
 Calomelis scrup. duos.
 Ol. Tanaceti Aetherei
 Ol. Anisi Aetherei ana gutt. quindecim

formentur pil. gr. duorum. Summat omni hora pilulas sex.

Pilulas summit eosque, donec vermis secesserit.

In India Orientali contra taeniam adhibetur Cortex radicis punicae granati, ut refert Cel. HUFELAND. *) et 1830 Col. HARTMANN in Clinico Vindobonensi pridie obitus sui adhibuit in foemina optimo effectu, postmodum supplens ejus in Clinico pratico Cel. GÜNTNER in casibus duodecim subsequis optimo successu; mihi ipsi Neoplantae eodem remedio taeniam latam, et

*) Hufelandis Journal t. p. 5. 1822. M. Januar.

Budae in prolibus duabus Ascarides lumbricoides expellere successit, quin nauseam, vertiginem, vomitum; vel dolores abdominis subsequos observaverim. — Praescribuntur Corticis rad. pun. granati unc. duea, coquendae in libr. duabus aquae, ad remanentiam libr. unius. — Cel. HARTMANN sic summere jussit: dividere quippe in doses tres, et has successive interpositio quadrantis horae interstitio absummere et quidem tempore matutino, stomacho jejuno, — quarto quadrante horae purgans ordinavit salinum, jubendo elligere tale, cui nulla virtus anthelmintica propria tributa. — Vesperi taenia una cum capite adfuit in casibus duodecim, in unico casu medicamen ter repeti debuit, et tunc secesserunt taenia solium cum taenia lata in nodum complicatae, taenia solium jam putrida, taenia lata nulla praeseferente putredine.

Contra Ascarides lumbricoides et Ascarid. Vermiculares convenientia omnia huicum recensita, optime purgantia. — Alii svadent Opium ad vermes stupefiendos, alii aquam ad eos rigidos efficiendas. Maxime laudatur Aqua cuni hydrargyro vivo cocta, Helleborus niger, Putam. Nuc. jugl. viridia, allium, Jallappa. — Decoctum herbae Tabacae pro enemate. — Cel. DARWIN laudat Calomel et Vitriolum ferri qua specifica. — Si sedes vermium in ventriculo, vel intestinis tenuibus, enema e lacte exhibitur, ore vero sumuntur talia, quae ut vermis ingrata noscuntur, uti acria, acida, salsa alimenta, pisces harengi, carnes salsa perfumatae, pisces parvi integri comesti, allium etc. RICHTER curam sub plenilunio iuchoandam svadet. —

Ad remedia externa numerantur: Enemata ex oleo cum saccharo, melle, Decoctum allii in aqua salsa, aceto, lacte salito; frustillum laridi ano impositum. Cel. DARWIN Candelam sebaceam illitam ungv. neapolitano ano imittere svadet. — Vapores ano immissi.

Enemata ex lacte cum hydrargyro cocto; Cel. RICHTER svadet Merc. gumos. Plenkii in decocto cum lacte. — Aqua calcis in vehiculo mucilaginoso; — Vapores tabacae; — Enemata ex Aloe, vel Geoffr. Surinamensi, sem. Sabadill. Ol. Ricini, Assa foet. Aqua gellida, et Oleo animali foetido.

Contra Trichocephalum Disparem nulla specifica nota; inhabitat intestinum coecum et crassa pacatus, raro turbas concitat, solo in cadavere saepe reperitur, insons toto vitae tempore hospes, apud animalia reliqua plures accumulati saepe reperiuntur, in homine solitarius occurrit.

Reliqui vermes prouti non satis cogniti vita durante, ita hucadusque nulla contra eos remedia specifica nota.

B) Cura Radicalis.

Consistit haec in praecantione recidivae. Obtinetur curando abnormem statum intestinalium, et impediendo reproductionem vermium, emendando statum organismi cachecticum. Remotio enim vermium, ut dictum, solum est cura palliativa.

Remedia huic indicationi respondentia, abnormem vegetationem organismi, et praecipue intestinalium corrigentia, sunt roborantia, vitalitatem vegetativi systematis intendentia, muci secretionem imminuentia. Talia sunt amara tonica, vegetabilia et mineralia, praecipue Extracta amara, et talia, quae acido carbonico agunt. E vegetabilibus: Quassia, Colombo, Centaurium, Gentiana, Trifolium, Rheum dosi refracta, Polygala etc. juncta aquis destillatis aromaticis. Cortex Peruvianus cum Valeriana praecipue laudatur. E mineralibus: ferrum preeprimis et ejus praeparata. —

Ferrum sulfuricum infantibus a gr. uno usque sex, adultis a scrup. semis usque integrum in pulvere

cum Cort. Peruviano, sem. Cinae; in pilulis cum extr. nucum jugland. in Electuario et Tinctura exhiberi sollet. Cel. SELLE forma sequenti laudat.

Rp. Ferri sulfur.

Extracti Chinae ana scrup. unum

Sem. Santon. drach. unam.

Syrupi Cinam. q. s. ut f. Electuarium.

D. S. Aliquoties de die summat cochl. unum.

Adhibentur quoque flores salis Amon. martiales; Usui ferri semper amara decocta junguntur. — Porro adhibentur Acida Mineralia, Elix. Accidum Halleri etc. Item Aquae minerales roborantes, acidulae.

Sicut in cura ipsa, ita adipicando haecce remedia semper requiritur usus eorum diu continuatus, quo saepe plus, quam variando remedia, lieet optima, obtinetur. — Quae vero remedia in casu individuali maxime congrua, et quae methodus apprime conveniat aegro, optime dijudicabit medicus, eamque seliget ad curam feliciter perficiendam.

LITERATURA.

- Aristotelis historia animalium Lib. V. Cap. 9, Allobrog. 1605.
- Baldinger's Magazin für Aerzte 1. B. 5. S. 385.
- Beddeus S.S, disser. d. verme taenia, Vienae 1767.
- Bloch's M. E. Abhandl. von der Erzeugung der Eingew. und der Mitteln wieder dieselben, Eine von der wissensh. Societ. zu Kopenhagen geförnte Preisschrift, mit 10 Kupfer-tafeln. Berlin 1782. —
- Beitrag zur Naturgesch. der Würmer etc. in den Beschäft. der Berlin, Gesessh. naturf. Freunde, 1, B. S. 534. —
- Bosch, van d., Hist. constit. verm. epid. Amstelod. 1769.
- Bremser, Dr, über lebende Würmer im lebenden Menschen ein Buch für ausübende Aerzte. Mit nach der Natur gezeich. Abbildung, auf 4. Tafeln nebst einen Anhange über Pseudop-Helminthen. Wien 1819.
- Brera, V. L. Lezioni medico-pratiche sopra i principali vermi etc, 1802. Deutsch von Weber, Leipzig. 1808.
- — Memorie fisico-Mediche sopra i principali vermi etc, Cremä 1811.
- Cuvier, G. Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux, Paris 1798. — Deutsch von Wiemann, — 2 Bände, Berlin 1800.
- Dumeril, A. L. Analytische Zoologie aus d. fr. übersetzt, von L. L. Froriep. Weimar 1806,
- Goldfusz über die Entwicklungsstufen des Thieres, Nürnberg, 1817.
- Heineken de morb. nervos. eorumque frequentia ex abdom, origine. Goetting. 1783.
- Himly, K. Beobacht. u. Beschreib. des Finnenmurm's bey den Menschen. In Hufeland's und Himly's Tourn, Dec. 1809.
- Hippocratis Epidemiar. Libr. II Sec. I. Editio Foesii 1595.
- — de infant. et pueror. morbis Lib. VI, Cap. 10,

- Magni coacæ prael. editae. p. L. Duretum
Parisiis. 1588.
- Hufeland's Journal d. Praktisch. Heil. — 1828.
- Jaeger, I. H. Spicilegium de Pathol. anim. etc. Goetting. 1775.
- Müller's, I. E. diss. exhibens causam monstrosi affectus
verminosi. Erfordiae 1702.
- Oken's Lehrbuch der Naturg. 3. Thl. Zoologie 4. Abth.
Leipzig 1815.
- Pallas, P. S. Elenchus Zoophytorum. Hage Comit. 1666.
- Bemerkung über die Bandw. in Menschen und
Thieren. In den neuen nord. Beyträg. Petersb. und
Leipzig 1781.
- Reil's Archiv für Physiol. 2. Bd. Halle 1797.
- Rudolphi. C. A. Beobacht. über die Eingew. In Biedermann's Archiv für Zoologie und Zootomie Braunschweig 1801.
- Bemerkungen aus dem Gebiethe der Naturgesch.
Medizin, und Thierarzneyk. auf einer Reise durch einen
Theil von Deutschl. Holland, und Frankreich Berlin
1804—5. — 2 Theil.
- Entozoorum seu Verm. intest. Hist. natur.
Vol. II cum tab. Aen. Amstelod. 1808—9.
- Erster Nachtrag zu meiner Naturgesch. der Eingew.
Im Magazin der Gesellsch. naturf. Freunde zu
Berlin 6. Bd. 1814.
- Entozoorum synopsis; cui accedunt mantissa
duplex et indices locupletissimi cum tab. III Ae-
neis Berol. 1819. —
- Scherer. I. A. über den Ursprung der Eingew. — In den
med. Jahrb. des k. k. österri. Staates 3 Band 1815.
1816. — 4 Band 1817.
- Zeder J. G. H. Erster Nachtrag zur Naturgesch. d. Eingew.
von A. Eph. Goeze Leipzig 1800.
- Anleitung zur Naturgesch. d. Eingew. mit 4.
Kupferstafeln. 1803. Bamberg.

T h e s s.

- 1 Datur generatio aequivoca.
- 2 Non datur certum remedium vermifugum.
- 3 Cortex radicis punicae Granati ex cognitis huicdum praestantissimum anthelminticum.
- 4 Anatome, causam morbi post mortem quaerens, saepe hallucinatur.
- 5 Systema Hahnemanni adversatur Medicinae scientiae.
- 6 Sangvis non solo cordis impulsu movetur.
- 7 Morte forma et rationes externae, non vero res ipsa deletur.
- 8 Lacti matris nullum aliud idonee substituitur.
- 9 Vires medicamenti ab ejus in corpus vivum effectu judicantur.
- 10 Foetum, tempore graviditatis quocunque, qui expellere, homicidii reus erit.
- 11 Ballnea scopo medico, in salutem generis humani, coordinanda forent.
- 12 Cholera morbus nullo universalis huicdum sanatus. remedio.
- 13 Studia obsunt sanitati.
- 14 Confidentialia aegri, medicina principalis.
- 15 Vinum plus nocet, quam prodest.
- 16 Natura sanat, medicus curat; ideo multi sanantur, male curati.
- 17 Febris in solvendis et sanandis morbis chronicis plutonium saepe contribuit.
- 18 Nulla dantur certa signa graviditatis incipientis.
- 19 Vaccinationis dignitas hucusque famam tuetur illasam.
- 20 Religionis Christianae praeceptis non repugnant principia scientiae medicae.