

Poudre à tirer. I
 $K_2O, H_2O^s + S + C^3 = 3CO^2 + H_2 + H_2S.$

Clinique

D'accouchement, physiologiques
et
pathologiques.



Mr Lepetit Depaul

0 4 12
BAISONS

4652

Peterson

1863.

Paris



1863 19 novembre Clinique obstetricale

Nous avons vu une malade qui souffrait d'une tumeur fibreuse de l'utérus et qui a produit une pyémie.

Etat fébrile intense, douleur rhumatismales, arthralgies très intenses à cause de l'arthrite purpurale suppurative. c'est la pyémie spontanée au puerpéral. Les veines variqueuses sont inflammées: phlébite suppurative puerpérale de la jambe gauche le ventre se météorise: langue sèche, soif vive, subictérique et sclérotique, en un mot le signe de l'infection purulente.

Les hémorrhagies consécutives à l'insertion vicieuse du placenta.
2 cas très graves et un léger

OLVCTIA
PL. KR.
DAIBCFIDAMU



Cette insertion est une circonstance
très grave pour la mère.

Il ya plusieurs variétés d'insertion
placentaire: latérale, centrale,
entre pour centrale, etc. sans
le état intermédiaire.

Les insertions vicieuses du placenta
ne sont pas fréquentes. 1/500

Mais les conséquences de ces in-
sertions sont inevitablement

nécessaires et très graves,
tant pour la mère
que pour l'enfant.

Desormeau
Velpeau
Moreau
idées fausses
sur le col
de l'utérus
du côté
graves

Mécanisme. La modification
du col de l'utérus s'élonge
ment au début. Dès
le 3^e mois il se raccourcit
de devant en dedans.
Ces idées sont complètement
erronées.

Inutile a partagé et a
empêché ces idées erronées

M. Vesperan s'est servi par le
mot d'affaissement du col
de la partie supérieure
par la partie inférieure
comparé à un déroulement
d'une feuille suralée
sur un cylindre

M. Stolz 1826 Day sa thèse
renverse cette théorie.

M. Dubouché a l'idée
de M. Stolz.

M. Lepaut le partage.

M. Stolz dit qu'il faut bien
distinguer les femmes primipares
et les multipares.

chez les primipares - Il faut
prendre garde de voir de
confirmation (Lefort).

au début M. Stolz reconnaît l'
allongement et l'augmentation
en épaisseur du col. On a
dit même que le col est
abaissé, mais cela tient à
la descente de la matrice.

COLECTIA
L. R.
11. CR.
RAJCEVAGIARU



À partir du 4-5-6 mais le
col commence à diminuer
de longueur apparente. Cette
diminution apparente, ce
raccourcissement relatif
résulte du remplissage
de la cavité de la partie
centrale du col, tandis
que les deux orifices restent
à l'état normal.

Ce qui est le cas dans lequel
le col conserve sa forme
primitive. La tige externe et le
denier qui disparaît.

Chez le multipare. — Il faut
avoir signe d'anomalie
et de vice congénital.
Le col est large et en
cône inverse.

Jacquier
1839
Annuaire de
médecine

Exploration & mécanique
de hemorrhagie inévitable
de l'insertion de la placenta
sur le col.

21/9 - 63.

1. Un accouchement difficile, - foetus extrait avec le forceps, mort par le prolongement du travail et des manœuvres chirurgicales, qui ont produit une fracture du pariétal gauche... Une hémorragie générale sur tout le crâne, infiltration ecchymotique.

1000
1000
1000



2. Un vice de conformation: oblitération congénitale de l'œsophage. L'enfant était né depuis 3 jours, quand je fus appelé et je trouvais avec la sonde œsophagienne un obstacle et le malade rendait tout ce qu'il avalait, par conséquent, il mourut par inanition. Il avait une grande avidité pour manger, pour avaler,

Par la même manière, mesurer
et le enfant, qui tétait
une lait mémoai non
nourissant.


3. Une femme avec une tumeur
fibreuse de l'utérus, accoucha
par la céphalotripsie
Le travail a duré 20 heures
Les douleurs de la poche de
eau de rompre, et il s'écoula
une grande quantité de mé-
conium par le vagin.
L'enfant souffrait beaucoup
et rendait le dernier moment
c'est pour cela que M. Depol
se décida à perforer la
tête et à laisser le travail
d'expulsion à la nature
et en effet la contraction
utérine expulsa le
foetus. 3300 sans cerveau

Après la délivrance la femme de
venue très malade, elle se plaignit
d'une vive douleur du côté
de l^e hypochondre et de la
fosse iliaque gauche; plus
tard il se produisit la
phétite suppurative, la
pyéurie et la malade
succomba.

C'est un cas de dystocie par
vice de conformation par
obstruction (Dubois).

Les tumeurs fibreuses de l'
utérus sont très dangereuses
très graves surtout ceux
qui se développent
sur le col ou à côté
du col.

Ces corps fibreux très
petits à peine appréciables
à l'état normal.



peuvent dans la grossesse
un grand développement
suivant l'hypertrophie
de l'utérus.

Apparition de tumeurs d'ovules
spontanément pendant
le travail d'accouchement
(m. cas Depaul)

11 centimètres diamètre
16 centimètres circonférence
prolongée à base
inférieure, et sommet
supérieur prenant
son origine d'insertion
au niveau du col utérin
supérieur du col.

23/19-65

Les rachidiens ont leurs ligaments très développés (Bassin antérieur).
La dilatation complète du col, la tête en
gagée; heura accouchés. Application du forceps
Evitant la rupture de perinée
M. Depaul fit deux incisions latérales
obliques vers les tubérosités ischio-pubiennes
de 1 cent. de longueur. (M. Depaul &
au en cas de déchirure complète

de perinée à la suite d'un accouchement
du forceps de 3 cent. de longueur
Petite hémorrhagie consécutive
arrêtée par le ligle égyptien.


Les hémorrhagies consécutives à l'in-
sertion ancienne du placenta.
hémorrhagies nécessaires ou inévitables

- 1° Modification du col. Liée, de M. Stolz
de Strasbourg.
- 2° Modification de l'utérus pendant la grossesse.
« Antérieurement se développe régulièrement
pendant tout le temps de la grossesse
C'est tout le contraire, parce
que il y a un développement



OLGOTIA
O AL. IR.
RAICOVICIHU

en deux temps. Au début c'est
le fond ou le corps de l'utérus
qui se développe, tandis que
le segment inférieur se
développe vers la fin de
la grossesse.



La partie antérieure se développe
avant la partie postérieure
ce qui fait que le col
est dévié vers la partie
postérieure. Le développement
vaire beaucoup d'après
les pays. Le développement
antérieur produit le changement
de place de la trompe.
La matrice tourne sur elle
même et alors il ne faut pas
s'étonner de l'opération césarienne
si une trompe de fallope ou une
logement large, il faut les
repointer et faire l'incision



sur la ligne médiane

En résumé. L'utérus se développe irrégulièrement pendant tout le temps de la grossesse (depuis).

Diagnose. Si on voit qu'une femme enceinte et qu'elle perd durant les derniers mois de la grossesse il faut être prévenu d'un décollement du placenta. Ces

perdes surviennent en se reportant jusqu'à l'expulsion. Souvent elles s'arrêtent par coagulation de la fibrine du caillot.

Touche

Il ne faut pas chercher à entrer dans le col qui n'est pas encore développé et pour ne pas favoriser le décollement placentaire.

On touche les cul-de-sac du col et alors on trouve des plis amples, plus épais.

OLECTIA
AL. CR.
RAICUVICI.HU



quoique il devrait ne se fier pas
au toucher pour le diagnostic du
détachement placentaire.

26/63
1)

1. Un enfant né par une femme
qui portait une varicelle de
fut vacciné et quoique la
vaccination pris très bien,
après 18^e jours il se
manifesta une éruption
varioloïdique générale.

2. Une présentation de face, le
menton ^{est} engagé sous
l'arcade pubienne. L'accouchement
se termina favorablement
sans pour la mère que
pour l'enfant.

Mais si le travail retard et
que le contractus uterine sous
les farts, le pénis se ressortant
il peut arriver une très

Grand compression sur le
cœu, d'où arret de la circu-
lation venreuse, apoplexie
du cerveau. etc.

L'auscultation ne peut pas
nous donner une idée précise
de la insertion placentaire
Le bruit de souffle n'a
aucun rapport avec le placenta

(d'après)
Le caeu, encéphaloides ramalgé
et sanguin peuvent
donner lieu à une
insertion viciée du
placenta.

Il faut seulement être prevenu.

Praticien. M. Dubois. —

L'hémorrhagie legère ou grave
Le travail est commencé ou non

1. Hémorrhagie legère. — On fait coucher
la femme dans une position



horizontalitate, ergo, absolute date
est & antiphlogistica;
Sed a consuetudine demum autem
moyens: la saignée
et le seigle ergoté
à faible dose.

M. Depaul ne veut pas
l'administration du
seigle ergoté qui peut
causer les nouvelles pertes
et même l'avortement.

La saignée également
produit plus de
mal que du bien.

OLECTIA
D. AL. CR.
BAICOVICIANU

