



CONSPECTVS

MEDICINAE

THEORETICO-PRACTICAE,

TABVLIS CXXXVIII ¹³⁸

OMNES PRIMARIOS MORBOS

METHODO STAHLIANA

TRACTANDOS,

EXHIBENS:

TERTIA VICE EDITVS, CORRECTVS ET AVCTVS,

CVM

INDICE SATIS LOCVPLETE

ET

PRAEFATIONE

EXCELL. STAHLII,

CONSILIARII ET ARCHIATRI REGII,

AVCTORE

D. IOANNE IVNCKERO,


PROF. PVBL. ORD. ET MED. PRACTICO ORPHANOTROPHEI

HALENSIS.



CVM PRIVILEGIO.

HALAE, IMPENSI ORPHANOTROPHEI, MDCCXXXIV.



LECTORI BENEVOLO,
GEORGIVS ERNESTVS STAHL,
FELICITATEM.



Apientiam Diuinam ex operibus eius lustrare gestientibus, illud cynosuræ loco inferuire posse arbitror, vt procul ab omni distractione, & in varios calles exerrante speculatione, quantum fieri potest, simplicem & rectam viam peruestigent; in quam omnes alii tramites desinentes, non aliunde securius spectari, imo perspici possunt, quam ab illa regia via, ad quam semper respectando, securius receptus pateat, ab omni erroris periculo. Cui, ex aduerso, necesse est expositum iri, quando non solum diuisos & diuersos tramites percurfare libido incessit, & magis magisque deuia sectari; sed prorsus aua quærere, perreptare, & tandem

dem limites migrando, alienas regiones ingredi, & in uersa propofiti cursus meta necessario confundi. Facile uero fuerit intelligere, quod uiam, qualem laudamus, ingreffuro, & in illa feliciter progressuro, apprime necessaria fit uigil atque perspicax animi aduersio; tranquillitas, inquam, & bene compositus animus, auidus non solum cognoscendi, sed & ordinatum, & nihil interruptum processum, patienter atque circumspicte prosequendi. Alienissimus imprimis a polypragmosyne, seu multarum diuersarum rerum fugitiua perustratione; quarum uel nullam penitus perspicere obtingat: uel inter plures implicari atque ita confundi necesse sit, ut inde non modo singularum, sed & omnium, usus amittatur. Nihil autem magis atque certius in hos labyrinthos seducit, quam temere de sua sapientia sibi blandiens opinio, & immatura fiducia funditus atque penitus perspecta, non magis habendi, quam dandi, eiusmodi Diuinæ sapientiæ specimina, & uelut in systemate in conspectum producendi, prius, quam pleraque, nedum omnia, eo pertinentia documenta, cognita sint, & in debitum ordinem, redigi potuerint. Ex aduerso, si cum debita animi applicatione, quotquot possunt, phænomena conquirantur, animo bene composito, & iudicio, uti certe absolute necessario, ita etiam horum ausum recte compote, perpenduntur, & iuxta illum ordinem, quem in rei ueritate inter se obseruant, circumspicte colliguntur; fieri aliter non potest, quin multo euidentior agnitio & cognitio inde resultet. Sicut autem huius generis contemplationes de integro suscipere, instruere, & proprio Marte absoluere, profecto non omnium est ingeniorum; ita neque, in plerisque talibus negotiis ulla necessitas hoc postulat: cum utique Diuina benignitas, iam inde ab omni æuo non dedignata sit, hinc inde industriorum hominum solertiæ radium aliquem fulgidissimi illius iubaris suæ sapientiæ obicere, cuius animad-

uer-

vertione non solum oblectari fuerunt, sed etiam posteris suis obseruandum, & magis magisque ad suos vsus applicandum, conamendarunt. Cum autem nihil in sui initio perfectum esse possit, facile utique est intelligere, quod monumenta, ab antecessoribus ad posteritatem transmissa, non possint aut debeant pro tali perfecto systemate æstimari, cui absolute acquiescere sufficiat. Qui certe error, a multis iam seculis, vt varias alias, ita medicam quoque scientiam, impediuit, ne amplius, quam antiquissimis temporibus factum erat, excoleretur & locupletaretur: imo ipsæ præconceptæ opiniones interceperunt passim etiam vtilissima vetustiorum annotata, monita, atque documenta, vt vsibus, quibus inseruire poterant, nusquam admouerentur. Substitit itaque medica scientia seu theoria, vsque ad præteriti seculi confinia, vbi nouæ aliquæ contemplationes, partim ex antiquiorum placitis, partim e propriis æstimationibus variorum phænomenorum (Fernelio, Argenterio, &c.) in mentem venerunt; a medio vero eius seculi, cum anatomia caput efferret, & fermentationis nomen putredinem priscorum antiquaret, rude donatis propemodum plerisque vetustatis sententiis, nihil nisi nouæ opiniones, magno agmine eruperunt; quæ ad hunc vsque diem, quid emolumenti aut detrimenti arti attulerint, peritorum & æquorum arbitrorum æstimationi lubens relinquo. Postquam autem ab Helmontio decantata, & a Willisio latius ebuccinata, fermentatio, a Tachenio, per breuem manum Acidi & Alkali, ad varias commodiores explicationes & applicationes quadrare visa est; & tale systema Syluio imprimis in mentem venit, & a fidelibus aliquot eius Discipulis, non solum per Belgium, sed & Germaniam superiorem, propagabatur: quod quidem tempus in meorum studiorum Academicorum initia excurrrens, sollicitum de solido fundamento medicæ Doctrinæ capeffendo, animum

non potuit non percellere, & in trutinandis, pro viribus, discrepantium dogmatum ponderibus, vigilem & attentum exigere. Cum autem iam ab ipsa teneriore iuuenta mea, chymicarum rerum, & imprimis fermentationis experimentalis, illa ad minimum notitia mihi suppeteret, quæ tam late per ipsum latifundium sanguinis protensam fermentationem, adhuc magis autem tales eius effectus, simpliciter exundatorios & eruptorios, quales, pro statis etiam, imo in exquisitas periodos distributis, commotionibus & excretionibus, allegabantur, pro veris atque ratis agnoscere, nequaquam permetteret: Imo magis magisque pensitati omnes actus strictè & proprie Vitales, longe simpliciore methodia, nempe sola, tempore & loco conueniente, administrata gubernatione motuum secretoriorum & excretoriorum, fieri & absolui solere comparerent: institi proinde potius illi viæ, vt fermentationem quidem, seu in animali corpore, omnino veriore Putredinem, (non tamen tam factam, quam fientem, imo, vt scholæ loquuntur, in fieri,) in febribus præsertim, pro subiecto seu vera materia morbida; tempestiuam & maturam eius amotionem, pro obiecto; secretiones & excretiones, pro medio formali; viarum & meatuum idoneam constitutionem, imo & humorum iustam crasin in reliqua sui massa, pro instrumento materiali; directionem autem motuum illorum, pro causa efficiente, agnoscere, necessarium ducerem. Hoc ipso vero non poteram non simul deprehendere, quod Vita strictè sumpta, corporis inquam vita, qua corpus viuere, & secundum illam viuum dicitur, nihil aliud sit, quam conseruatio eius ab omni corruptione, in quam tamen ex vniuersa sua crasi totum præceps est, & propendet. His certe contemplationibus nihil noui, neque vero etiam quicquam difficilis, vel afferre mihi videbar, vel inferre: quandoquidem simplicissimum hoc systema, vt
 ipsi

ipsi corporis animalis manifesto conspicuæ constitutioni , ita quoque antiquissimorum medicinæ descriptorum vero sensui consentaneum est. Conueniebat etiam apprime, imo inædificatum videri poterat, recentissimæ sententiæ : Quod omnia in corpore animali fiant mechanice : dum exquisite commonstrabat, quod utique tota Conseruatio vitalis absolvatur, & ad vltimum suum finem perducatur, nullo, (præter instrumenta) materiali, sed simpliciter formali, Mechanico Actu, nempe Motu, exquisite ad materiarum suspectarum proportionem, gubernato, vt materiæ illæ alienæ, partim semoueantur, (secernantur) partim tandem ex vniuerso corpore emoueantur (excernantur.) Confidebam autem, totum hoc negotium, ad medicum vsum atque scopum, tanto luculentius inseruiturum, dum ex eo dilucescit, quod vniuersa ita considerata vitalis conseruatio sit vera & indefinens Therapia interna seu spontanea ; cuius rationi plane conformem energiam, pro certissima cynosura : & synergian, pro fidelissimo adiumento, medicus obseruare & asseruare debeat. Vbi simul, aut certe magis magisque, suæ luci vindicare atque stabilire laborabam, impeditissimam illam, & nusquam pro merito & pondere suo, tactam, nedum deductam discretionem, quinam actus & motus, in morbis, reuera symptomatici, œconomix corporis obiciantur, & illi damna minentur : quinam autem contra, actus atque motus vere Energici, contra morbum incumbentem, plane salutariter, pro eius depulsione, instruantur & exercentur. Id quod omnis æui Medici per pugnam Naturæ cum morbo, vix leuiter adumbrare, satis habuerunt ; quibus vero consiliis, auxiliis, atque machinis, illa geratur, designare, nedum demonstrare, nusquam condigne curæ cordique habuerunt. Id quod, ex aduerso, mihi quidem apparuit, satis ex eo elucere posse, quod dicti hi actus Energici, aduersus

mor.

morbos iam præsentés atque incumbentes, salutari-
 ter nullius alterius generis sint, quàm illi, qui etiã ce-
 tera tranquillis corporis rebus, perpetuo præsidio præsto sunt.
 Adeoque in morbis, solo, (præsentì necessitati maiori, con-
 veniente,) gradu, tempore, atque ordine, & tandem loco,
 ita instruuntur, vt expugnationi morbidæ materiæ, & ple-
 nariæ exturbationi, adeoque systematis corporei, eliminatis
 alienis restitutioni in sui homogeneitatem, (amotis hetero-
 geneis,) satisficiant. Dum autem hanc considerationem,
 Medico imprimis vsui commendaturus, illud vbique indica-
 re atque stabilire laboro, quod hæc vitalis conseruatio, atque
 vindicatio, omnino sanæ rationi exquisitè consentanea sit;
 vtique ab ipso corporis animalis primo supremo Architecto
 sapientissime instituta, & ita constituta, vt sana ratio, sci-
 tissimum hunc ordinem, vtique percipere & agnoscere pos-
 sit: Tanto magis autem debeat, quo medicæ methodi ius-
 tam & vere legitimam cynosuram hinc formare liceat: To-
 tam rem altius, & abouo, quod aiunt, exorsurus, antiquis-
 simam illam, & ipsa veritate simplicissimam, sententiam, pro-
 fundamento substerno, quod vera causa efficiens, (directio-
 num illarum, quas pro pure medico scopo, pro efficiente
 causa agnoscere, sufficere poterat,) sit in homine ipsa Ani-
 ma. Agnosco, quod hac propositione, vtpote non tam ad
 medicam, quam physicam anthropologiam, plane superfede-
 re potuissim. Intempestiuo verò metu, ne tam motus in abs-
 tracto, quam insuper directio in abstracto (sicut hoc sensu
 reuera sunt,) pro metaphysicis gryphis, & nudis mentali-
 bus ideis, tanquam Actus sine Agente, mihi imputarentur,
 consultum duxi, Agens ipsum deferre nominare, & Animæ
 has partes deferre, imo asserere, atque vindicare. Tædet
 autem merito, atque piget, imo profecto pudet, altercatio-
 num, quæ super hoc negotio, intentatæ, & per aliquod iam
 fu-

supraviginti annos, vix non singulis diebus, recoctæ appositæ, lassata tandem patientia, ad logicorum atque metaphysicorum in ipsis triualibus scholis scabella litem hanc reiiicere extuderunt. Vbi facile decernetur, quid abstracte metaphysici, vel in hac antiquæ veritatis sententia insit; vel in opinionibus illis, de motu (vt actu, sine agente) materiæ insito; de spiritibus animalibus, motus hos non solum dirigentibus, sed & ad finem, proportionate, gubernantibus: de motuum horum, siue absolutorum, siue insuper directorum, momentaneo obsequio, sine reliquo nexu, ad animæ voluntates; & nude fictitias, & per errorem patheticas, animæ ideas, (non solum in animi pathematibus, corporis motus in instanti, & profunde, turbantibus; sed & in impressionibus pure patheticis & fictitiis, in monstrosos næuos fœtum, exeuntibus &c.) & quæ sunt plura huius commatis postulata. Insuper habitis inanibus huiusmodi oblocutionibus, non destiti nexum veritatis, vtilissimarum depletionum & ventilationum, prudenti & peritæ considerationi commendare; præsertim in negotio spontanearum hæmorrhagiarum, seu sanguinis exonerationum. Vfus sum pro hoc scopo Hippocratis monumentis, quæ de morbis diversarum ætatum successui magis peculiaribus, & quasi propriis, consignata reliquit sub finem tertiæ sectionis Aphorismorum. Quam rem complexus sum Dissertatione de fundamentis morborum ætatum: ostendente, quo modo omnibus ætatibus quidem communes sint abundantis sanguinis depletiones in genere; variant autem Loco, per quem emittantur. Et pariter communes omnibus ætatibus, apparatus, congestiones, & contentiones, ad eiusmodi eruptionem respicientes & tendentes: dum autem, pro diversitate ætatum, versus & circa peculiaribus illa loca eruptionis instruuntur, hoc ipso etiam illos Hippocrati notatos, peculiare, & singulis ætatibus magis proprios, (secundum & per regiones pe-

culiaries corporis) morbos introducant: si nempe sincera per-ruptio in impedito hæreat, & ad effectum difficulter, aut plane non, pertingat. Moui vero omnem lapidem, vt hæc iam ab ipso Hippocrate prudentissime notata veritas, quemadmodum non aliunde, quam e constanti experientia, desumpta est, ita perennis experientiæ euentissimis testimoniis illustraretur & confirmaretur: vnde etiam apud practicos peritos, nempe experientiæ quotidie obseruandæ compotes, sine vlla difficultate, passim, imo, quod sine vanitate dictum velim, longe lateque liberalem assensum obtinuerunt huius generis commentationes. Ego vero nullam occasionem prætermisi, qua hanc eandem experientiam, in varii generis morborum schematibus, ostendere, ad vera illa sua fundamenta reuocare, adeoque aliis aliisque exemplis rem totam demonstratam dare, opportunum videbatur. Tandem autem, quod eo vsque spartim & per ambages egeram, iustiore ordine, & magis concinno systemate, ob oculos ponere suscepi, tractatu, quem medicam Theoriam veram nuncupare iustum & æquum duxi. Sicut autem medicina scientia sola non absolvitur, sed ad experientiæ certam notitiam, & consultam administrationem, tendit; ad quam vera medica pathologia Artificem futurum instruere debet; propterea omnino animo semper sedit, Physiologiæ medicæ, & Pathologiæ, consentaneam Therapiam subiungere: quæ nempe solidis deductionibus monstret, quæ consilia & auxilia talibus læsionibus corporis salutariter adhiberi possint atque debeant. Postquam autem Diuinæ directioni humanarum rerum placuit, ab huiusmodi proposito, qualemcunque quietem & assiduitatem postulante, ad longe diuersos labores me auocare, nihil antiquius mihi omnino esse debet, quam huic humiliter acquiescere, & eo vsque promoti cursus, vix medio in stadio, pedem sistere. Sufficit non in vanum laborauisse, dum, simplex & sincerum testimonium veritati perhibendo,

do, non in vna sola regione, aut gente, excitata sunt, scientiæ atque conscientiæ fatagentia ingenia, ad eandem viam gnauiter ineundam, & magis magisque complanandam. Quod mihi, Divina benignitate adspirante, & cum alacritate atque oblectatione, successit, laboriosum multis aliis visum est; & quæ ego prolixè deducere oblectamenti loco habui, vel audire, nedum legere, perpendere, & prudenter examinare, operosum apparuit. Interim plenus sum bonæ spei, & habeo eius rei non contemnenda indicia, viuere & vigere passim honestos & solertes viros, qui vel de integro hoc stadium decurrere & infinitis Mæandris inuolutum Labyrinthum doctrinæ & artis medicæ, Ariadneo veritatis filo expedire, non fastidiuerint. Si qui vero etiam illis vestigiis insistere non dedignentur, quæ, inter aspreta, sentes, atque salebras, adnitens, hinc inde impressi, spero fore, vt nec ipsos pœniteat, indicem secutos esse. Laboriosius, quam propemodum credere potuissem, hoc iter ingressus est nobilissimus scriptor præsentium Tabularum; quas maximam propemodum partem, e qualibuscunque meis scriptis adornare, non graue duxit. Laudare hanc eius industriam, qui sunt mores hominum, vitio mihi verti posset, & iam propemodum antiquato scommate mihi tribui, quod hoc ipso per obliquum, mearum animaduersionum laudem celebrare, cordi habeam. Sed frustra, profecto iam dudum, sunt tales ineptiæ; posteaquam pridem sincere testatus sum, me nihil horum, quatenus meum sit, sed vnice quatenus verum, vlli mortalium ratum aut commendatum esse velle. Conquisiuisse, quæ vera esse agnoui, in laudis materiam non arripio; officii certe mei duxi, cum Theoriæ medicæ docendæ sparta mihi demandata esset, cum fide & bona conscientia, hoc agere: neque, nisi quæ pro veris comperta haberem, aliis commendare. Quicquid autem horum sit, de quo honestorum & prudentium virorum arbitrio semper liber erit locus, imo ius fas-

que; illud certe, de præfente Tractatu ante ipsos oculos positum est, quod labori atque studio nihil pepererit Dn. Autor, tam in reuoluendis meis, etiam extra puræ connexionis ordinem, Dissertationum forma, in medium propositis, quam aliorum, eodem tendentibus, scriptis. Eadem euidencia liquet, quod ordinem euoluendi atque deducendi perspicua cum peritia seruauerit; quo quidem cæpto non poterit non mereri laudem, & gratiam inire, apud omnes, qui euolutiones thematum, per causas ipso nomine expressas, intelligunt & amant. Quamobrem ego illam methodum, causas inquam nominibus suis exprimendi, non amplexus sim, sequentes fuerunt rationes. Quo tempore ad docendi officium admouebam, & in hac nostra in primis Academia, non bene audiebant scholasticæ *λεπτολογία*; quod etiam, quando (vt fere fit) creperæ sunt, nulla iniuria ipsis euenit: imo vero derisui erant ipsæ voces, apud peritiores quidem, inanes scholæ tricas, apud imperitos autem, metaphysicam in genere, aut logicam redolentes. Imo vero, vt nihil dissimulem, in plerisque, ad medicum studium nomina sua dantibus, minorem, truiualibus scholis allatam, peritiam deprehendebam, cognitionis, nedum veri vsus, primæ & instrumentalis philosophiæ, quam vt expeditum conceptum ipsius ordinis causalis, nedum per ipsa nomina, formare valerent. Quid? quod etiam tot annorum decursus, non sine iusto fastidio, docuit, quam molestas lites hic defectus inspirauerit, etiam illis in locis, a quibus minime omnium exspectari debuissent; & quam tardis, (licet etiam aliæ causæ ad repugnandum instigarent animum,) successibus, tandem pleraque dogmata, a me inde ab initio, demonstrata, in pristinarum opinionum locum substituerentur: elucente tamen perpetuo adhuc, ex insanabili hoc defectu, veri atque firmi nexus vario hiatu. Interim certe nunquam neglexi, quin secundum verum & realem ductum causandi ordinis,

resipias, quas producere animo federat, euoluerem. Subiit autem reuera mirari, quomodo fieri possit, vt passim adhuc, circa ordinem contemplandi, eluceant offensiones, verum de talibus rebus conceptum hinc inde turbantes. Id quod imprimis in ita dictis febribus acutis euenisse video. Putaueram, Dissertatione de Morbis acutis veterum, sublatam esse omnis implicationis occasionem: tanto magis, cum etiam alio schemate, Dissert. de Febre per se nunquam mortifera, veram mentem meam, quin potius ipsius rei constitutionem, liquido monstrasse considerem. Imo aberrationem ipsius Hippocratis detexisse, vbi, dum recenset, quos Morbos Veteres Acutorum nomine notauerint, inauspicato subiicit: quorum Morborum Febres hominem plerumque occidunt. Cum tamen luce meridiana clarius sit, quod ipsi illi morbi, nempe veræ inflammatoriæ stases sanguinis in visceribus, per se, & sibi relicti, sine vlllo interventu Febris, hominem necessario occidant. Ab hoc effectu vero, solius Naturæ viribus, (largiatur autem Divina clementia, vt Ars in solidum multo plus auxilii afferre possit!) nulla alia ratione impediri possint, quam tempestina adhuc staseos discussione; quæ fieri non possit, nisi insigniter aucto & continuato motu locali, seu circuitu, sanguinis: qui tamen iterum aliter fieri nequeat, nisi per pulsus auctum: quem fero inseparabilis comes, calor auctior totius, stipat: qui (eo gradu & duratione,) Febris appellatur: & summa iniuria, non solum pro morbo, sed ipso solo morbo, & mortis autore, proclamatur, cum sit vnicum salutaris spei & euentus subsidium & instrumentum. Ita enim pestis, & iterum febris miliaris, formalis causa indicatur ipsum principium vitale. Certe non e mea porticu; imo veræ constitutionis rei ipsius, suffragio destituyente. Cum Pestis coryphæus morborum acutorum quidem sit; nequaquam vero, proprie, & sua essentia, sit Febris. Ingens utique paradoxon, sed tamen genuinum;


nempe rem ipsam aliter se habere, quam minus exquisito aspectu, & externa specie, videatur, demonstrans. Sane vero audeo sperare, quod genuinus conceptus de Variolis, experientiae & rei veritati conformis, prudentes contemplatores, si quid usquam aliud, de veritate harum rerum luculentissime instituturus sit. Recte itaque Pestis causa materialis arguitur miasma efficacissime putrefaciens: formalis vero causa nulla alia nominari potest, quam ipse actus huiusmodi corruptionis, iam incipiens: & nisi miasma illud tempestive, ipsa halituosa forma, iterum eiiciatur, aut alicubi arctius, in ignobiliores partes externas, iterum dico, tempestive (minime vero praecipitibus turbidis motibus,) e latifundio massae sanguineae, condensatum seponatur, (causa, inquam illa, materialis,) incoercibili impetu longe lateque sanguinem destruens. Unde Febris, huic morbo, salutari spe, (imo, per Dei gratiam, non parvi numeri effectu,) opponenda, non, uti vulgo creditur, vehemens & magna, sed lenis, aequalis, assidua, esse debet: quando vero, inter anxiam trepidationem Naturae, alia methodo, aut inconditis consiliis & artificijs, turbulentius commouetur, aut excussionibus, materiae expellendae indoli non quadrantibus, instruitur, non potest non illa in genere salutari intentione excidere. Unde recte quidem Hippocrates iam ipse observavit, quod morborum acutorum, (seu morbis acutis occurrentes,) febres, *συνεχῆς* sint: quod vulgo interpretantur, continuae: rei vero veritas magis probat, continentes intelligendas esse: nempe aequali tenore, sine exacerbationibus aut remissionibus, assiduas; eo magis, quanto magis salutari spei locum relinquunt; dum omnis impetus, tanto magis vagus & inordinatus, trepidae & fluctuantis administrationis soboles, ab oprato scopo non potest non aberrare. Commendo iterum variolarum, verae experientiae conformem, observationem & contemplationem. Sicut autem adhuc prolixius haec diduce-

re neque locus fert, nec certe animus; ita propterea tamen attingere libuit, ne vel ipsa huius scopi contemplatio sinistris iudiciis occasionem præberet, vel illi superstruenda inuentio iustæ methodi, vel in exæquanda proportione causali, vel in ipso omnino effectu pratico, aliqua deficiat. Quemadmodum autem Dn. Autor, in hoc opere, non tam simpliciter meas contemplationes & animaduersiones, sed aliorum etiam, quibus fidendi rationes suas sine dubio habuit, placitâ, præsertim in remediorum penu, secutus est, ita tanto minus Lectorem quisquam simplicis præiudicii suspicionem concipiet: sed potius e sedula lectione, & prudente pensitatione, totum opus æstimabit. Illud certum est, quod in longe maxima parte operis omnino mecum sentiat; neque vero etiam, vsquam prope modum dissentiat: hic illic autem, supplendo, quæ a me non prolixius tractata sunt, alia quædam, quam mea, adferat: præsertim autem in numero remediorum, qui mihi summo opere placet, quantum vnquam fieri potest, succinctus: & effectus ratione, nisi plane peculiare circumstantiæ suadent, per individua, ab omni commotione, aut præmatura expulsionem abstinens. Vbi præuissimis, quod febrem miliarem attinet, (simpliciore, non pessimam illam, petechiis aut morbillis accedentem,) illud moneo, quod alias benignior in deteriorem statum adducatur, per præcipitem expulsionem; communissime ægrorum propriis inconsultis ausibus: sed & per totum decursum, medicamentis & regiminibus sanguinem calefacientibus. Vbi imprimis voluntariæ sudationes in lecto malæ sunt: spontaneæ modestissime tolerandæ, & non nisi pari modestia, moderandæ potius, quam augendæ: alexipharmacis calidis nullum hic agnosco aut reperiio locum; imo ne fixis quidem diaphoreticis, quorum in talibus affectibus maior, quam vulgo credatur, est sensus. Nitri, parcis, sed repetitis dosibus, quatuor ad sex horarum interualla, præcipuum hic cogno-

ui vsum, præfertim in ipsis etiam puerperis: diarrhœam non inducent; cui tamen vndecunque incidenti, Cascarillæ pulvis, a 10. ad 12. grana, sine regimine affectato, commodius, quam quidquam aliud, consulat: in quavis ætate, præcipue tenera, videntur de gemmis participantia, pretiosa, hic nullius pretii, & in omaibus exanthematibus noxia. Quamuis aliis forte parum ad rem pertinere videri possit, certe tamen non contemnenda est pectoris priuatim, imo ad vmbilicum vsque, defensio ab omni sensu frigoris: etiam in orthostadia sub talibus efflorescentiis. In quali præterea omnibus modis præstat, a desidia abstinere, quam illi indulgere: imo motus corporis, citra lassitudinem aut æstum, ad lenes sudores vsque, minime formidare: a medicamentis autem, quantum licet, sibi temperare &c. Hæc sunt, quæ per occasionem tangere, non abs re visum est. In reliquis autem plerisque omnibus, nullum est dubium, quin Dni Autoris diligentia, illis, qui cum studio medicam scientiam & artem syntagmatico ordine comprehendere voluerint, certissimo emolumento inferuire possit. Quo nomine, talibus hoc opus commendare, nullus dubito. Deus autem, fons & autor veritatis, largiatur omnibus, medicam scientiam & artem, quod profecto decet, vt Diuinorum institutorum, contemplationem, obseruationem, & subsidiariam administrationem intueri cordi habentibus, vt veræ, cognitionis compotes facti, sapientiam Eius venerabundi agnoscant, intellectus sui manu ductionem ad prudentia consilia, & pro cœptis suis auxiliariis omnipotentem Eius benedictionem exorent, & feliciter assequantur.

Dabam Berolini VII. Cal. Octobr.

M DCC XVII



PRAEFATIO
AUCTORIS.

Quindecim anni, BENEVOLE LECTOR, iam circumacti sunt, cum primum deliberarem, qua fieri posset ratione, ut egregiæ illæ obseruationes practicæ, quæ e collegiis STAHLIANIS ab Excellentissimi huius Viri auditoribus præteritis annis passim collectæ sunt, in commodiorem ordinem ac usum redigerentur. Manu enim scripta, quorum non pauca prostant, per tot descriptiones, a rei medicæ imperitis plerumque peractas, tempore progrediente ita deprauata sunt, ut in quam plurimis illorum locis vix sensum aliquem peruestigare possent tirones. Post multas deliberationes laborem hunc, satis diffusum, bona fiducia adgrediebar, & iam diuinam veneror benignitatem, quæ, illius finem attigisse, clementer concessit. Urgent autem prægnantes quædam rationes, ut, quæ circumstantiæ speciales opusculum hocce ambient, paucis significentur. Cum enim numeros meos oneri huic ferendo solos sufficere dubitarem, quia in praxi medica plurimum temporis consumere cogebar, aliorum auxilia quærere in animo habebam.

Elaboratam itaque tabulam de variolis & morbillis speciminis loco trans mittebam præclaro cuidam Practico, Domorum aliquot illustrissimarum Archiatro: cui quidem maximam oneris partem imponi posse putabam, quia certum quemdam studiosorum numerum eo tempore in res medicas manu ducebat, qui sub ipsius cura atque moderamine negotium hoc facile perficere posse a me iudicabantur. Sed hic Vir, quem cum iucunditate animi sincerum amicum nominare licet, difficilis erat ad laborem hunc suscipiendum, & maxime contra germanicum idioma, quo prædictam de variolis tabulam conscripseram, ob abusum inde metuendum, dubia sua mouebat. Non diffiteor, quod, audito tali repudio, id, quod cœptum erat, frigide posthac persecutus sim. Quum vero breui post tempore audirem, laborem hunc, mutata sententia, vni e numero memoratorum medicinæ studiosorum, & quidem tali, qui aliquamdiu amice mecum vixerat, & iam munere Archiatri Illustrissimæ cuiusdam Domus dexterrime fungitur, esse commendatum, nouam spem de votis obtinendis concipiebam. Iuuenis hic eruditissimus, post annum circiter decursum triginta, & quot excedunt, tabulas, iudicio non infimo elaboratas, & ab Archiatro reuisas, mihi exhibebat. Transportans domicilium meum in hanc ciuitatem, has, vt & reliquas meas intentiones, cum amicis quibusdam communicabam, qui definitiones, causas, & plures obseruationes practicas in hisce tabulis desiderabant. Otium mihi datum erat ob loci, vt didictum, mutationem: hinc labori huic omne meum tempus destinare decernebam. Dissertationes STAHLIANAS omnes, theoriam eiusdem medicam, & manu scripta, tantum non omnia, perlegebam, tabulas octoginta, & quæ excedunt, non solum conscribebam, sed & omnes fere illas, quæ ab amico, superius laudato, exhibitæ mihi erant, de nouo prorsus elaborabam, reliquas paucissimas supplebam, donec

tandem hoc, quod vides, **BENEVOLE LECTOR**, opusculum prodiret. Non dissimulo, sub ipso labore animum me sæpius abieciſſe : tantas enim difficultates paſſim inueniebam, vt vel tres aut quatuor hebdomadas in tabulis quibusdam conſcribendis inſumere cogerer, neque tamen mihi ipſi vbique ſatis facerem. Sed Deo humillimæ ſint laudes, cuius auſpicio id, quod factum eſt, quantulumcumque ſit, fieri potuit. Ceterum ſilentio prætereire heic nolo, quod ab illo vsque tempore, quo laborem huncce ſuſcipiendum decreueram, aliquot eiusdem fere conaminis ſpecimina in lucem prodierint: videlicet compendia quædam medica, quorum alia plures, alia pauciores morbos, methodo **STAHLIANA** tractandos, exhibent. Atque in his non ſolum multæ res, ſed & ipſæ ſubinde phraſeologiæ, quæ in præſentibus hiſce tabulis leguntur, occurrunt; cuius rei tamen, **BENEVOLE LECTOR**, nulla Te miratio capiet, ſi conſideraueris, ex vno fonte eadem vtrimque eſſe deriuata. Opus ſane non fuit, ab aliis deſumere, quod & dulcius, & omnino perfectius ex primis fontibus petere licebat: & certe hoſpes eſſet in ſcriptis **STAHLIANIS**, qui cuiquam alii has res tribuendas eſſe cogitaret. Itaque ſi quis me plagii vellet accuſare, ſolus **Excellentiſſimus STAHLIVS** facere hoc poſſet. Hic autem hanc mihi culpam non tantum liberaliter remiſit, ſed & publica, vt vides, præſatione teſtatus eſt, quam minime inuideat illis, qui e ſcriptis ſuis vſum capere, & cum aliis communicare intendunt: quem paternum adfectum vt pia mente recondam, mearum omnino erit partium. Denique de paucis illis, quæ, præter res **STAHLIANAS**, in quibusdam locis inuenies, notare conuenit, quod illa non adieciſſem, niſi peculiaribus plane effectibus probata mihi fuiſſent. De quibus notabilia exempla ſubiungere in animo habebam; ſed temporis anguſtia intentionis meæ effectum excluſit. De altera editioe dicendum eſt, quod incrementa ſatis notabilia,

& , meo quidem iudicio , vtilia , immo certo respectu necessaria acceperit. Priores enim CXVI tabulæ non tantum passim auctæ , sed & XXI nouæ additæ sunt ; vti ipse adspectus docet. Optarunt quidem amicorum nonnulli , vt hoc additamentum *adpendicis* loco subiungeretur , ne illi , qui primam editionem iam possident , geminis sumtibus onerati indignarentur. Quum vero scopus ille , quem tabulis synopticis respicimus , eius modi distractionem materiarum non permittat , iusta hæc vota expleri non potuerunt. Confido autem quam certissime , nouum hoc opusculi augmentum exiguos illos sumtus satis esse compensaturum. Ceterum cautelas illas , quas Excell. STAHLII *prefatio* ratione *purpura* tractandæ continet , secundæ quidem editioni adieci , tabulam autem de *vertigine* , nescio vnde prætermisissam , tertia hac editione restituere & priores mendas corrigere nouasque passim obseruationes interuicere necessarium putauij.

Vale & faue

AUCTORI.

TAB. I.



TABVLA I.
DE
MORBIS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Morbus est status præternaturalis corporis viui, in partibus tam fluidis, quam solidis, vtrarumque crasin & mobilitatem lædens: concurrentibus variis symptomatibus, quæ vel a materiali, noxa, vel a motibus principii vitalis conseruatoriis, materiali noxæ oppositis, vltra gradum naturalem plurimum auctis, rarius remissis, dependent.

II. DIFFERENTIA.

1. *Symptomata non solum ab ipso morbo, verum etiam a se ipsis sollicitè distinguere, vniuersæ medicinæ, tam theoreticæ, quam practicæ, maximam lucem adfundit.*
2. *Est autem symptoma præternaturalis actionum constitutio, quæ vel tamquam vere morbida & passua læsio actionum, vel tamquam actiua, proportionata & salutari intentione suscepta alteratio motuum secretoriorum & excretoriorum, considerari debet.*
3. *Præter ea morborum differentia petitur*
 - a) *vel a læsione quantitatis, vbi humores vel excedunt, vel deficient.*
 - b) *vel a læsione qualitatis, quando humores nimis spissi, vel rarefacti sunt.*

- c) vel a vicio *motuum*, quando hi vel ultra consuetum gradum augentur, vel deficient, vel peruerse instituuntur.
 d) vel ab *accidentibus circumstantiis*.

Harum respectu morbi sunt

- 1) Chronici, acuti, peracuti.
- 2) Continentes, continui, intermittentes.
- 3) Epidemici, endemii, sporadici.
- 4) Contagiosi, non contagiosi.
- 5) Benigni, maligni.
- 6) Legitimi, nothi, regulares, irregulares.
- 7) Habituales, nondum obfirmati.
- 8) Corrupti, non corrupti.
- 9) Idiopathici, sympathici.
- 10) Salutares, lethales.
- 11) Curabiles, incurabiles.
- 12) Simples, compositi.
- 13) Periodici, vagi.
- 14) Vernales, æstiuæ, autumnales, hyemales. *conf. Hippocrat. Sect. III. aphor. I. seq. it. de natura hominis Sect. III.*
- 15) Certam ætatem occupantes, vbi
 - a) in iunioribus caput,
 - b) in iuuenibus pectus,
 - c) in senioribus abdomen magis adficitur. *Conf. Stahl. dissert. de morbis ætatum.*
- 16) Secundum initium, incrementum, statum & declinationem differentes.
- 17) Certis diebus & horis mutationes subeuntes, e. gr. die indicatorio, critico, circa horas paroxysmorum.

III. SIGNA.

1. Motus, siue ultra gradum & ordinem naturæ aucti, siue a vigore, quem principium vitale ordinarie seruat, remittentes.
 2. Actionum, non solum vitalium & naturalium, sed & ipsarum animalium & rationalium perturbatio, exacerbatio, aliqua neglectio, cessatio.
 3. Variarum anxietatum & dolorum symptomata.
- ### IV. SYBIECTA morborum

1. *Generatim* homo viuus, qui tamen a morbis raro infestatur, licet secundum mixtionem & structuram suam ad eosdem summam habeat procliuitatem. Nam multi per totam vitam morbis prorsus immunes viuunt. Vnde *Democriti* assertum, quod *Hippocr.* epist. 2. ad *Damaget.* refert, hominem totum a natiuitate esse morbum, de corpore quidem *mixto* satis verum, de *viuo* autem falsissimum est.
2. *Speciatim* morbis præ aliis obnoxii
 - 1) qui a moribus corporis laboriosis immunes sunt, pleno tamen & lautiore victu gaudent; inter quos litterati, lubricationibus dediti, & molliter educati, principatum tenent.
 - 2) Adfectibus animi grauioribus expositi, e.g. iracundi, admodum sensibiles, meticulosi, suspicaces.
 - 3) Intemperantes, qui cibis non solum variis, sed sapius etiam aduersis, corpus suum nimium replent.
 - 4) Qui diætam scrupulosam & exquisitam ordinarie quidem obseruant, data autem occasione eandem negligere coguntur.
 - 5) Feminae præ viris, ob maiorem inprimis animi sensibilitatem, molliorem corporis texturam, præcipue etiam ob negotium mensium, gestationis, partus & lactationis. Quæ considerationes haud dubie *Hippocratis* elogio, quod femina bis patiatur morbum, ansam dederunt.
 - 6) Homines præ brutis. Licet enim eandem corporis habeant constitutionem, bruta tamen tales excessus in cibo, potu & adfectibus non committunt. Quo magis autem bruta cum corruptis hominum moribus commercium habent, eo facilius etiam morborum subiecta euadunt e.g. canes delicatuli, die Schoog-Hündchen, so die leckere Speißen essen, und auf weichen Küssen schlafen.

V. CAUSSAE.

1. Causa morborum *remota* est materialis corporis constitutio, quæ ad morbos facile subeundos summam habet procliuitatem.
2. Causæ *proxime* sunt
 - 1) vel *generales*: nempe plethora & spissitudo humorum.

- 2) vel *speciales*: vitia scilicet lymphæ, seri, saliuæ, vrinæ, bilis, mucii, sæcum aluinarum &c.
3. *Causse procatartica*, quæ dispositionem ad morbos in actum perducunt, sunt præcipue vitia ex sex rebus, *non naturalibus* dictis, prouenientia, nempe aëre, motu vel quiete, somno vel vigiliis, cibo & potu, excretis, retentis, maxime omnium animi pathematibus, quorum efficacia omnes *materiales* causas longo interuallo post se relinquit.
4. Causæ etiam certorum morborum obseruantur periodi *atatis*, diuersitas *sexus & temperamentorum*.
5. Præcipue autem *adfectudo* ægrotandi & *sensibilitas* subiecti multum valent ad morbos fouendos & reuocandos.

VI. PROGNOSIS.

1. Quo delicatius est subiectum, eo difficilius curatur morbus, & contra.
2. Plenariam visceris cuiusdam aut partis organicæ destructionem reparare, nec arti, nec naturæ concessum est.
3. Morbi, a causis *immaterialibus* dependentes, longe sunt pertinaciores, quam qui a *materialibus* proueniunt.
4. Morbi hæreditarii raro perfecte & prorsus auferuntur, cum primis si per crebrum recursum in habitum & consuetudinem deducti sunt, qui proinde mitigari tantum possunt.
5. Morbi *epidemicæ*, nisi malignitas complicata sit, facilius tolluntur, quam *endemiæ*.
6. Item morbi *periodici*, quam vagi.
7. Porro morbi *simplices*, quam *compositi*.
8. Morbi a *motuum defectibus* prouenientes, maius periculum inuoluunt, quam qui a motuum *excessu* oriuntur.
9. Morbi certis *ætatibus, temporibus & tempestatibus* familiares, si eiusmodi circumstantiis respondent, minus periculosi sunt, quam qui multum inde deflectunt.
10. *Motus* morborum *extraordinarios* si sensibiles non sequuntur excretiones, melioris notæ non existunt.
11. Morbi *vernales* benigniores plurimum sunt, quam reliquorum temporum.
12. *Morbi* sine omni medicatione *sibi relictæ*, longe manifestius indolem suam ostendunt, longe certius itas periodos & dies

dies criticos obseruant, longe felicius & constantius con-
quiescunt, longe etiam tranquillius, si omnino superari
nequeant, ad mortem descedunt, quam qui variis medica-
tionibus, præcipue manifeste operantibus tractantur.

13. Morbi sub initium causam materialem pro fundamento
habentes, in consuetudinem autem degenerati, ita plerum-
que insolescunt, vt, sublatis licet causis materialibus, perti-
naciter tamen durent & recurrant.
14. Multi morbi curantur sine Medico & medicina per *αὐτοκυά-
ταιν* naturæ.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quoniam natura in plurimis morbis per secretorios & excre-
torios motus materiam noxiam e corpore eliminare alla-
borat: Medicus, qui illius minister esse debet, hõce motus
secretorios & excretorios quouis modo imitari, & omni
prudencia adiuuare studeat. Huic scopo inseruiunt remedia
 - 1) *Pharmaceutica* e.g. emetica, purgantia, diaphoretica, diu-
retica, emmenagoga.
 - 2) *Chirurgica*: venæsectio, scarificatio, hirudines, vesicatoria,
fonticuli, setacea, incisiones, paracenteses.
 - 3) *Dietetica*: prudens regimen circa sex res non-naturales
præcipue circa cibum, potum, calorem moderatum & a-
nimi tranquillitatem.
2. Ante autem, quam moueat Medicus, materiam prius mobi-
lem reddere & vias aperire debet, per præparantia, incidentia,
resoluentia, digestiua.
3. Pauciores etiam morbi obueniunt, vbi non conuenit, mate-
riam noxiam directe & immediate euacuarè, sed corrigere.
Quare & in his, licet rarioribus casibus, prudenter se gerat
necesse est. Corrigunt autem remedia alterantia, præci-
pitantia, temperantia.
4. Et quoniam non raro *motus* siue excessu, siue etiam nonnum-
quam defectu in morbis peccant, Medicus firmiter sibi
persuasum habeat, *medicinam motuum* præcipuam esse par-
tem praxeos felicitis, & discat
 - 1) motus *excedentes* placide ad *mediocritatem* reuocare.
 - 2) motus *erroneos* corrigere.

3) *motus deficientes excitare.*

Remedia, quæ motus excedentes & erroneos corrigunt atque sedant, sunt: specifica, anodyna, paregorica.

Motus autem exstimulanti: pleraq; euacuantia superius nominata, item analeptica seu roborantia.

VIII. *CAVTELAÆ ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. Si natura noxiam materiam eliminare intendit, vel actu iam euacuat, caueat sibi Medicus, ne addito stimulo fiat nimium.
2. Euacuaciones *particulares* non adhibeat, nisi præmissis vniuersalibus, h. e. instituta prius, vbi opus est, venæ sectione, catharsi, sudatione &c. Non vero hæc omnia simul in quouis indiuiduo, sed pro ratione circumstantiarum adhibenda sunt.
3. *Quantitas* humorum pluribus morbis ansam dat, quam *qualitas*; quod eo magis considerandum, quia vulgata praxis circa *correctionem qualitatis* materiæ potissimum occupata est.
4. Moderata autem durant, & omnes *tumultuariæ* euacuaciones tantum nocent, quantum *moderate* profunt.
5. *Motuum* magis quam *materiæ* respectum in omnibus morbis habere conuenit: qui proinde, ad euitandum errorem fati communem, non temere sistendi sunt.
6. Ad tempora morborum semper etiam respiciendum est, videlicet num cursu anni legitimo inuadant, ætati ægrorum quadrent, debitasque periodos exhibeant.
7. Denique Medicus dictum sibi putet, quod facilius sit, profus motus suppressere, quam moderari. Cauendum igitur est a falso illo elogio, quod *opiata* ad moderamen tantum motuum, non autem ad completam suppressionem præcipinari possint & debeant.

TABVLA II.

DE

PLETHORA. *Zeitlich's vato Negevig*

I. DEFINITIO.

Plethora est abundantia sanguinis, ordinariam & debitam proportionem excedens, atque multis morbis ansam præbens. Deriuatur a πλήρω, impleo.

II. DIFFERENTIA.

Plethora est vel

1. *Simplex*, vbi sanguis quantitate quidem excedit, sed nondum deprauatus est. Vel
2. *Complicata*, seu cum cacochymia coniuncta, id est, vbi vel notabilis spissitudo, vel alia dyscrasia humorum accedit.
3. Plethora porro diuiditur in eam, quæ est
 - a) ad *vasa*, quando sanguis simpliciter abundans vasa turgida reddit, sine vlla notabili molestia.
 - b) ad *vires*, in qua insignis lassitudo artuum, ac torpor membrorum accedit.
4. Plethora *sibi relicta* bene distinguenda est a *commota*, vbi ebullitio & orgasmus sanguinis concurrunt.

III. SIGNA.

1. Constitutio corporis plerumque florida & sana.
2. Vfus rerum, non naturalium dictarum, satis tolerabilis.
3. Speciatim tolerantia optima ciborum & somnus bonus, profundus ac quietus.
4. Quando autem plethora commouetur, vel corpus calore externo molestius adficitur, iactatio inquieta somnum turbat.
5. Et tum insomnia anxia ac præfigurationes effusionum sanguinis, pluuiæ, transitus per profundas aquas, vulnerationis per bombardas & gladios accedunt.
6. Adspæctus faciei rubicundus in *sanguineis*, spongiosis; in *cholericis* autem & *melancholicis* notabilis vasorum inflatio.
7. Artuum grauitas & stupida addictio, vulgo obdormitio.

8. Vnde segnities ad laborem, & repentina sub qualicumque motu in consuetum fatigatio, palpitatio cordis, atque respirationis difficultas oritur; præcipue quando scalas vel alia loca accliuia scandunt. Quando autem post motum ad quietem veniunt, sensum contusionis per sentiscunt.
9. Capitis vertiginosa aut temulenta adfectio, quando versus terram incuruatur, & repente iterum tollitur.
10. Sub leui excalesfactione, quam cito plethorici incurrunt, obtingit sensus in cute leuissimæ punctationis, quasi seta compungeretur.
11. Facilis sensatio a frigore & æstu.
12. Oculi continuo humidi.
13. Sensatio illa in feminis hysteris, ac si frustum glaciæ capiti impositum esset, de plethora etiam testatur.
14. De reliquo plethorici continenter fere pulsum habent magnum & plenum.

IV. SYBIECTA.

Plethoræ plerumque expositi sunt homines

1. Otiosi & de diæta plena atque lautiore gaudentes.
2. Aetas iuuenilis præ senili.
3. Sexus femininus præ virili.
4. Qui euacuationibus sanguinis, siue naturalibus siue artificialibus, largiter antea adsuæti fuerunt, iam autem illas, siue suppressas, siue omisissas, negligunt.
5. Qui vitæ genus laboriosum in otiosum & sedentarium mutant, ratione nutrimenti autem corpori nihil detraxerunt.

V. CAUSSAE.

1. Causa efficiens est ipsa prouida natura, quæ in iunioribus corporis incremento, in viris viribus ad labores perferendos, in feminis autem negotio generationis prospicere intendit; vbi omnino aliqua penus adesse debet. Hinc erroris non accusanda est natura, dum abundantem sanguinem generat. Quando autem hi fines non obtinentur, quid miri? si morbosa consectaria introducuntur.
2. Causa materialis in subiectis iam indicata est, nempe
 - a) diæta largior cum otio & vita sedentaria coniuncta.
 - b) Suppressio hæmorrhagarum consuetarum.

VI. PROGNOSIS.

1. Plethora *morbus* quidem adpellari nequit, est autem multorum morborum *mater*. Impedit enim sanguinis circulum, & energię motus multum negotii facessit. Hinc debitę secretiones & excretiones impediuntur, & varia craseos vitia sensim introducuntur, donec tandem organa vitalia labem contrahant.
2. Plethora per exagitationem corporis vel animi *commota* v. g. per celerem motum, regimen sudoriferum, potum spirituosum, partum difficilem, iracundiam &c. ineffabile damnum adferre solet.
3. Pręcipue facile oriuntur congestiones, oppletiones, infarctus, stases, inflammationes, febres acutę, spasmi, efferę hęmorrhagię.
4. Leuiores morbi plethoricis obueniens contumaciores sunt, quam in aliis subiectis; multo magis autem grauiores & periculosa febres.
5. Quoniam plurimi plethoricorum motum corporis laboriosum, ceu remedium efficacissimum, renuunt, morbi etiam, pręcipue chronici, a plethora dependentes, funditus in illis non possunt extirpari.
6. Plethora, quę ab hęmorrhagiis siue naturalibus, siue artificialibus suppressis vel neglectis, oritur, facilius morbos producit, quam reliqua.
7. Incommoda, quę a plethora dependent, certius & citius solvuntur per hęmorrhagias naturales, quam per artificiales.
8. Plethora cum *spissitudine* & *cacochymia* coniuncta, non solum plures morbos, quam *simplex* generat, sed & varias morborum anomalias inuoluit.
9. *Nimia obesitas* seu *corpulentia*, quę pręcipue sanguineis ex plethora interdum prouenit, actiones animales & vitales, interdum etiam naturales, offendit, atque multis incommodis & periculis sensim inferendis par est. Facile enim adfectus rheumatico-arthritis, catarrhales, angustię pręcordiorum, palpitationes cordis, asthmata, suffocationes, apoplexię succedunt.
10. Ipse *Hippocrates* passim adnotauit, quod in hoc *athletico* corporis

poris habitu, tamquam summo sanitatis gradu, diu subsistere non possumus, & eiusmodi subiecta repente saepius moriantur.

- II. *Feminas* plerumque facit *steriles*, & si omnino conceperint, abortum non raro experiuntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Plethoram *simplicem* imminuunt duo remedia satis efficacia, nempe
 - 1) *cibus* parcior, &
 - 2) *motus corporis* sufficiens, placidus & continuus.
2. Hæc duo autem remedia efficacissima, imo fere vnica, quia a multis plethoricis repudiantur, Medicus *duo alia*, sed minus efficacia, substituere cogitur, nempe
 - a) *laxationes* & *sudationes* leniores, singulis fere mensibus, exceptis calidis & frigidis, repetendas. Noti sunt hoc nomine *noduli laxantes* cum *elleboro nigro* combinati. Sed quam parum possint, experientia docet.
 - b) *Vene sectiones* æquinoctiales, luna decrescente, in pedibus alternatim instituendas. De plethora prægnantium, venæ sectione subleuanda, *videatur tabula de affectibus granidarum.*
3. Plethora *commota* exposcit
 - a) Orgasmmum sanguinis temperantia; quo nomine egregie conducunt nitr. depurat. ocul. cancr. acido citri saturat. conch. præparat. &c.
 - b) Hæmorrhagiarum naturalium suppressarum, præcipue autem mensium & hæmorrhoidum ratio habeatur. His enim reuocatis artificiales sapissime possunt omitteri.
4. Plethora cum *spissitudine* sanguinis & *cacochymia* complicata, quomodo tractanda sit, sequentes duæ tabulæ docebunt.
5. De *chesitate nimia* tractenda sub *cautelis* pauca dicemus.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quod plethora detur, atque corpori detrimento sit, ipsam *Hippocrates* obseruauit, dicens libr. de sanitate tuenda: *sanguis quum abundat, valetudinem vitiat.* Et sane tam ratio-

ratio-

raciones solidæ a priori, quam experientia practica a posteriori faciunt, vt flaccescant flosculi illi rhetorici, quos *Helmontius* & ipsius affectæ de *thesauro & balsamo visa*, cuius non possit dari excessus, in medium proferunt.

2. *Venasectioes & scarificationes*, quam salutariter plethoricis eueniunt, si legitimo tempore & iusta ratione instituantur, tam notabilia damna iisdem succedunt, quando immaturo & peruerse administrantur. Hinc cauendum
 - a) ab insufficiente sanguinis emissionem, quia facile ad affectus spastico-arthritis, erysipelacei, febres acutæ & inflammatoriæ proueniunt.
 - b) ab immatura venæ sectionis institutione. Quando enim eo tempore suscipitur, quo variæ sanguinis commotiones a quibuscumque causis inductæ sunt, sæpissime morbi, in primis acuti, siue inducuntur, siue augentur. Præstat igitur ebullitionem sanguinis pernit. & temperantia prius placare, vel decursum præsentis morbi exspectare. Sic etiam minus conducit venæ sectio circa solstitia.
3. *Venasectio* omnibus generatim hominibus, vtrique sexui, & cuius ætati conuenit, exceptis fere admodum iunioribus. *Plura videantur tabula chirurgica de Venæ sectione.*
4. *Scarificatio* minoris est efficacæ, & non nisi in subiectis spongiosis, in affectibus intercutaneis, item per paroxysmos repullulantibus laudatur, sub hac autem cautela, vt frequentius, ad minimum singulis anni quadrantibus, repetatur. *Conferatur tabula chirurgica de scarificatione.*
5. Quando incommoda plethoræ per euacuationes sanguinis artificiales sublata sunt, & æger ad plenam restitutionem peruenit, caueat sibi, ne temere easdem prætermittat, quia certius inde damnum subsequitur.
6. Plethora *cominosa* quia grauia damna producere potest, vt sub *prognosi* indicauimus, quam maxime caueat sibi ægrotaans ab omnibus remediis calidis & orgasmum sanguinis inducentibus; cuius census sunt alexipharmaca calida, cum primis sub regimine coacto propinata, olea destillata, purgationes vehementes, emeses, diætæ spirituosa & aromatica,

- balnea & pediluua nimium feruida, & motus corporis repentinus ac violentus.
7. Plethoræ euacuatio per interna medicamenta directe & immediate fieri non potest, sed vel agitando & mobilem reddendo sanguinem, vel naturam ad excretionem stimulando, efficaciam suam edunt; vnde *Paracelsi* adfertum de *helleboro & chamaedri*, quod scilicet tantum sanguinis e corpore expurgent, quanto pondere propinata fuerint, cum grano salis accipiendum est.
 8. Non imminuta prius sanguinis *quantitate*, nemo in animum inducat, *qualitatem* cacochymicam corrigere.
 9. Incommoda plethoræ, quando infimas corporis partes infestant, venæ sectio in brachio instituat, si vero superiores partes obsident, in pede administranda est, non vrgentibus autem incommodis, ad ætatem respicitur. Hæc obseruatio hodie profus fere exoleuit. *Vid. tabul. chirurgica de vene sectione.*
 10. *Nimia obesitas* vri totam vitam satis molestam reddit, ita & in Medicis vltas deliberationes excitauit, qua fieri posset ratione, vt eiusmodi subiecta ab hoc onere liberarentur,
 11. Sed si dicendum quod res est & experientia docet, irrita & manca sunt consilia plurimorum. Secundum enim *veteres* hepar calidum temperare, vel secundum *recentiores* illud fermentum aut sal subigere & corrigere, quod lympham pinguem coagulat, id vanis speculationibus superstructum est.
 12. Immo ne illa quidem methodus, quæ sanis rationibus innitur, hic sufficit. Licet enim blandæ laxationes & venæ sectiones æquinoctiales instituantur, excretiones naturales promoueantur, & diætâ tenuissima imponatur, hæc tamen omnia obesitati nihil detrahunt. Hinc curiosa quidem, sed ad hunc finem inepta est *Sanctorii medicina statica*, licet celeberr. *Boerhaue* de hoc libello iudicet, quod nullus in re medica liber ad eam perfectionem scriptus sit.
 13. Multo minus operæ faciunt pretium illa remedia, quæ *specifica* passim celebrantur, e. gr. piper, sal absinthii, succus citri, acerum squilliticum, decoctum ligni sancti, masticatio foliorum tabaci, & quæ alia auxilia vulgo laudantur.

14. Per *salinationem*, fortissima *purgantia*, frequentes *sudationes* & alia impetuosâ remedia corpulentiam nimiam remouere, temerarium & periculosum est tentamen.
15. Exiguum etiam emolumentum adferunt *chirurgica prasidia*, videlicet vesicatoria, fonticuli, puncturæ cum acubus, vt pinguedo effluere debeat.
16. Moderatus vsus *thermarum & acidularum* salutaris quidem subinde obseruatur, ita vt corpulentia quid detrahat & speciatim sterilitatem in obesis feminis auferat, breui tamen post pristinum pondus resarcitur.
17. Sic & *febres acuta* atque *intermittentes* auferunt quidem sapius obesitatem ad summam vsque corporis extenuationem, non raro autem id, quod consumptum est, mox recuperatur.
18. Hinc nisi vita otiosa & sedentaria in laboriosam eamque *sufficientem* per prudentes successus & gradus mutetur, reliqua omnia erunt manca & inepra. In laboriosis enim, quamquam habitus corporis pinguis nonnumquam reperiatur, ad excedentem tamen corpulentiam non pertingit.

TABVLA III.

DE

SPISSITVDINE SANGVINIS.

I. DEFINITIO.

Spissitudo sanguinis est *consistentia* humorum iusto crassior, a plethora & motuum defectu originem ducens, variisque morbis occasionem præbens.

II. DIFFERENTIA.

1. Spissitudo est

- 1) vel *simplex*, quæ a dyscrasia humorum adhuc libera est.
- 2) vel *complicata*, quæ variis specialibus inquinamentis & spissitudinibus humorum coniuncta, &, vt vulgo dicunt,

dicunt, qualificata est. Eiusmodi specificæ spissitudines occurrunt v. g. in scorbuto, lue venerea, item in febribus quibusdam malignis.

2. Hoc loco de *simplice* tantum spissitudine, aliis autem in locis de *complicata* dicemus.
3. Ceterum distinguunt etiam inter spissitudinem *generalem*, vniuersam sanguinis massam occupantem, & *specialem*, in certa corporis regione, vel in certis visceribus obseruandam.

III. SIGNA.

1. Lassitudo & grauitas totius corporis, præcipue autem artuum.
2. Animus torpidus & anxius. Schwere Blut, schwerer Muth.
3. Frequentes pulsus & motus tonici mutationes.
4. Vnde caloris & coloris vicissitudines dependent, & habitus corporis modo strictior, modo laxior adparet.
5. Respirationis difficultas cum angustia præcordiorum, & cordis palpitatione.
6. Excretionum naturalium omnium qualiscumque retardatio.
7. Somnus inquietus & anxius cum insomniis terrificis.
8. Sanguis per venæ sectionem, vel alio modo emissus, est nigricans, & nexu suo firmiter cohæret, ita vt serosa portio cito & facile non secedat.

IV. SVBIECTA.

Spissitudini sanguinis præcipue obnoxii sunt

1. Melancholici, vel sanguineo-melancholici.
2. Populi septentrionales præ meridionalibus.
6. Seniores præ iunioribus.
4. Femine præ viris.
5. Præcipue sedentarii, otiosi, litterati.

V. CAUSAE.

1. Origo spissitudinis humorum a *motu circulatorii segnitie* dependet: sanguis enim floridus & optimus segni quiete spissescit, & longa mora concreuit.
2. Motus autem circulatorii segnitie quam maxime & primario dependet

- 1) a *plethora*, quæ mole sua proportionem & vim motuum superat, & vasa nimium replet.
- 2) a *motus voluntarii neglectu*, præcipue quando natura simul per profundas meditationes & speculationes ab actionibus vitalibus auocatur.
3. Hæ causæ primariæ quando adsunt, reliquæ, quas iam indicabimus, iniuriam facile vteriolem inferre possunt. Absentibus autem illis, parum iuris habent
 - 1) Refrigerationes immodestæ.
 - 2) Diætâ crassa, acida, potus parcior.
 - 3) Animi mœrores.
4. *Venena & philtæra* repentino & violento quasi modo sanguinem inspissant, eoque ipso periculosos immo lethales adfectus producant.

VI. PROGNOISIS.

1. Spissitudo sanguinis non tantum fonticos morbos producit, sed & alios, aliis ex causis natos, pertinaciter sustentat.
2. Sæpius morbos chronicos parturit, rarius acutos, rarissime repente funestos, nisi quidem ex veneno, philtæris & aliis repentinis causis inducta sit.
3. *Venam portæ* spissitudo præ aliis adficit, & vniuersum apparatus mali hypochondriaco-hysterici cumulat. Quo maiora itaque incrementa sumit spissitudo, eo grauiora quoque per eandem pathemata producantur.
4. Et quoniam talis inueterata spissitudo tam internas, quam externas corporis regiones occupat, paucis diebus non potest auferri; id quod contra tumultuariam & impetuofam methodum in adfectibus melancholicis & aliis probe obseruandum est.
5. Spissitudo uti a motus segnitie primum dependet, ita libertam circulum reciproce magis magisque impedit. Vnde operationes, inflationes, distensiones, stagnationes inducuntur, ita ut spissitudo *simplex* in *complicatam*, id est, *cacoehymias* tandem deoluatur.
6. Et quem ad modum plethora rarius per se, sed per spissitudinem demum in morbidum statum transmigrat, ita vicissim spissitudo in serofos humores eminentius & quasi seorsim

se extendit, & sine plethora peculiare morbos generat.

7. Et hæc sunt communissima pathemata, quæ a spissitudine tamquam causa materiali producuntur. Præter autem ea est simul causa impulsiva, propter quam varii motus vitales extraordinarii spastici a natura suscipiuntur, ut vltiores noxæ, nempe stases & corruptiones, præscindantur.
8. Ab his spasticis motibus resistentibus dependet, quod veræ obstructions, quæ ex causis physicis in vasis exilissimis frequentes esse deberent, multo rariores sint, quam vulgo venditantur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Alvus* per moderatissima laxantia, diluentia, salina, aperiatur, & aperta seruetur.
2. *Plethora* per venæ sectiones, vel etiam in succulentis per scarificationes imminuatur. Quantitatis enim remotione non præmissa, frustra erunt omnia resoluentia & attenuantia.
3. *Euacuationes sanguinis* naturales suppressæ reuocentur, & speciatim hæmorrhoides in viris per iustam hirudinum applicationem respiciantur.
4. Præmissis euacuantibus *corrigentia*, nempe diluentia & resoluentia temperata ex radicibus & herbis forma infusi vel decocti subiungantur.
5. *Dieta* humectans, parum edendo & multum bibendo, coniungatur: calida aromata & spirituosæ excludantur, vinum, modice sumtum, in vsum trahatur ab iis, quorum circumstantiæ sunt tales tolerant.
6. Præcipue autem *motus corporis* placidus & sufficiens eligatur. Hoc enim neglecto, reliqua omnia vel nihil vel parum efficiunt.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Est quidem *motus corporis* præstantissimum & tantum non vnicum spissitudinis corrigendæ remedium, notandum autem quam maxime, quod subiecta, hoc ad defectu laborantia, quia labori non adueta sunt, plus sub initium incommodi, quam leua-

leuaminis ex hoc remedio percipiant, atque eam ob causam illud mature omittant. Hinc quoniam modo cauendum, ne motus corporis impetuose, fortiter & nimis diu primis temporibus suscipiatur, & damna illa, quæ a plethora commota proueniunt, producantur: Moderate potius & constanter omnia sunt peragenda.

2. Sic & omnia remedia pharmaceutica, quæ *impetuose* agunt, plus damni, quam emolumenti adferunt, e. g. emetica, purgantia fortiora, diaphoretica calida eum regimine coacto, volatilia, spirituosæ, oleosæ & reliquæ, quæ sanguinem exagitant.
3. Euitetur error ille crassissimus & vulgarissimus, qui spasmos illos, quibus natura stases crassorum humorum impedire adlaborat, per *anodyna opiata* tractare solet.
4. Non minus euitetur *martialia*. Vis enim aperiens & resoluens, quæ vulgo illis tribuitur, multa discretione accipienda est.
5. *Thermarum* & *acidularum* circumspæctus vsus hic non reiicitur, si modo reliqua paria sint, & præcipue sufficiens corporis motus coniungatur.
6. Minoris efficaciz sunt *balnea*, tepide adhibita, quibus humores copiosius ad peripheriam inuitantur, & fluiditatem quamcumque ibidem nanciscuntur.
7. *Chirurgia infusoria*, quæ aliquando sanguini spisso cacochymico emittendo, & nobiliori infundendo destinabatur, hodie exoleuit. Neque etiam facile locum inuenit, quia talia subiecta plerumque sunt tenerrimo sensu prædita. *Conf. tabul. Chirurgica de transfusione sanguinis.*

TABVLA IV.
DE
CACOCHYMIA.

I. DEFINITIO.

Cacochymia est depravatio *crascos* in massa sanguinea, varias humorum inquinaciones inuoluens, atque a suppressione debitarum se- & excretionum frequentissime originem ducens. Deriuatur a κακός, malus, & χυμός, fuccus.

II. DIFFERENTIA.

1. Cacochymia strictiore quidem significatione *mixturam humorum* innoluit, videlicet quando impuritates salinæ, biliosæ, acidæ, fæculentæ, mucosæ maiore quantitate cum humoribus mixtæ sunt.
2. Latiore autem sensu prauitatem etiam *consistentia* comprehendit, quando scilicet humores vel nimis spissî, vt in scorbuto incipiente, vel nimis tenues, vel nimis oleaginei existunt.
3. Et quoniam partes *solide* pedetentim simul infestantur, adparet inde arctum vinculum, quod *cacochymiam* & *cachexiam* connectit.
4. Distingunt vulgo cacochymiam
 - 1) in *benignam*, quæ iterum diuiditur
 - a) In *biliosam*, quæ e. g. in ictero occurrit.
 - b) *Salsam*, quam v. g. in scabie obseruamus.
 - c) *Mucosam*, quæ in plurimis sic dictis catarrhis apud phlegmaticos obseruatur.
 - d) *Aquosam*, quam hydropici adfectus sistunt.
 - 2) In *maligram*, quæ in lepra, lue venerea obseruatur, & de qua suo loco dicemus.
5. Porro etiam distingunt cacochymiam
 - 1) in *simplicem*, quæ nullo alio morbo iuncta est, raro autem occurrit.
 - 2) *Compositam*, quæ cum aliis morbis e. gr. plethora spissimis

- smis, adfectibus hypochondriaco hysteriis complicata est.
6. Ceterum *impuritas* sanguinis, quæ cacochymici præsto est, differt a vera illius *corruptione*, tunc *caussa* ab *effectu*. Hius modi enim deprauatio humorum sæpe excurrit in effectus vlcerosos, id quod in scorbuto, lue venerea &c. obseruamus; quorum morborum effectus corruptius ipsum malum pertinaciter postea sustentat.

III. *SIGNA.*

1. Quando *crasis* & *consistentia* humorum deprauata est, *organa colatoria* sensim læduntur.
2. Hinc impuritates debite neque secernuntur, neque excernuntur.
3. Speciatim excretiones *alui* & *sudoris* languescunt.
4. *Appetitus* est deprauatus.
5. *Somnus* turbatus.
6. *Habitus corporis* plerumque est pallidus & tumidus, subinde etiam flauescens aut liuescens.
7. Quando *sanguis* quocumque modo emittitur, vitiosa illius crasis ipsis adeo oculis exhibetur.
8. *Urina* est pallida & interdum turbida.
9. *Animus* etiam est torpidus & commotionibus facile expositus.

IV. *SUBIECTA.*

1. Hic eadem primum subiecta accusanda sunt, quæ *precedente tabula* nominauimus.
2. Post hæc speciatim cacochymia corripuntur, quæ cum scabiosis, leprosis, lue venerea correptis &c. intimius commercium habent.

V. *CAUSSAE.*

1. Cacochymiam deriuant vulgo ex intricata illa theoria de *generatione salium* in corpore nostro, & quem ad modum multas salium species supponunt, ita etiam ex quauis specie speciales morbos fingunt.
2. Ne vero in diffusum illud & confusum chaos dilabamur, in quod vulgaris pathologia tantum non omnes morbos, tamquam in suam originem, resorbet, & *cacochymiam* suam *scorbuticam* vbique ebuccinat, bene hic repetenda & digne confide-

- sideranda sunt, quæ sub *caussis præcedentis tabula* diximus.
3. Certissimum enim est, quod plurimi *qualitatum* morbi a *quantitate*, & hæc a *vita otiosa* dependeant. Atque hæc notanda sunt præcipue contra *Helmontium*, qui, negans *cacochymiam*, dicit: *si datur cacochymia, exoptat purgationem, non venesectionem.*
 4. Confirmatur hæc res toto die. Notum enim est, quod laboriosi homines, licet diæta utantur cruda, sælina, sæculenta &c. meliorem tamen sanguinem habeant iis, qui sunt otiosi; licet cibos molles, euchylos optime nutrientes sumant, & omnia in diæta ac vsu medicamentorum impendant, ut sanguinem purum accipiant.
 5. Itaque dicimus, quod *lesã proportio motus ad humores, & humorum vice alterna ad motus palmarium* fundamentum sit *cacochymia*. Sic enim impuritates sufficienter non possunt sequestrari & excerni. Speciatim serum retentum inspissat lympham, atque humores salinos & biliosos in confortium suum trahit, vnde reliquam sanguinis massam, intrando hanc, conspurcat.

VI. PROGNOSIS.

1. *Cacochymia* tam frequenter quidem non occurrit, quam vulgo accusatur; ubi autem revera adest, malum fonticum deprehenditur. Quem ad modum enim lentis successibus introducit, ita altas agit radices, humoribus laudabilibus intime inhæret, & ipsas partes organicas solidas pedetentim lædit.
2. Subitanea hinc & tumultuaria curatio plus nocet, quam prodest. Hæc enim ratione heterogeneitates salino-mucido-biliose ex vinculo massæ sanguineæ non eliminantur, quia massæ laudabili, uti dictum, tenaciter adhærent.
3. *Complicata* deterioris est conditionis, & multo longiorem exoptat curationem.
4. Cæterum si *Ettmullerus* dicit: *Cacochymia proles est cachexia*, explicatur id per ea, quæ num. I. de partibus solidis dicta sunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Quid ars in abstruso hoc negotio valeat, sequentia docent.

- 1) Impuritates sunt *corrigenda*, & quidem
 - 1) *Mucida* per diluentia, attenuantia, incidentia & resoluentia, vt eo melius per loca excretoria euacuari possint. Faciunt hoc
 - a) *Radices* temperatæ sulphureo-resinosæ, e. g. ari, vince-tox. pimpin. alb. zingib. drac. esculent. squill.
 - b) *Herba* eiusdem commatis.
 - c) *Gummata* temperata: e. g. amm. galb. sagapen.
 - d) *Salia* media: tartarus vitriolatus, nitrum antimoniatum, arcan. duplicatum.
 - e) *Tinctura* alcalinæ: e. g. antimonii, salis tartari.
 - 2) *Salino-acres* & *biliose* per absorbentia cum nitro miscenda, it mucilaginosa & gelatinosa.
- 2) Facta correctione & præparatione *euacuatio* mox subiungenda: hac enim non subiuncta, frustra est correctio. Nam *nulla impuritates ita possunt corrigi, vt pro humoribus laudabilibus possint reputari.* Hinc
 - 1) *Blandæ laxationes* corrigentibus subinde interponantur, vel *laxationes per epicrasin*, quæ vtrique scopo satisfaciunt, instituantur.
 - 2) *Diaphoreses* & *diureses* promoueantur per superius indicatas radices, herbas &c. Efficacissime autem per placidum & sufficientem *corporis motum*.
 - 3) *Hæmorrhagia* naturales suppressæ reuocentur e. g. menses, hæmorrhoides.
3. Denique *tonus roboretur*
 - 1) per neruina temperata e. g. per mixturam tonico-neruinam *Stahlii*.
 2. - *Martialia* e. g. tincturam martis *Ludouici*.
 - 3) - *Dietam* moderate aromaticam & vinosam.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Communissimum & vulgatissimum desiderium est ægrotorum, vt Medicus *sanguinem purum* medicamentis suis reddere debeat. Sed hoc opus, hic labor, quoniam causa pri-

principalis, nempe vita otiosa, in quam plurimis ægris non potest remoueri. *Cors. num. 5. & 6.*

2. *Veteres* per cacochymiam subaudiebant *genericam sanguinis deprauationem*, in varias speciales inquinaciones propendentem, atque hæc cacochymia tolerabili effectuum numero ab illis circumseribebatur; *recentiores* autem *cacochymiam suam scorbuticam* in *figuras* ac *potentias innumeras* extendunt, & *modos materie* ita multiplicant, vt in qualibet speciali parte certam *materialem figuram* quærant, cuius acumina obrundi debeant.
3. Conceptus *Hippocratis de mille saporibus* huic conceptui ansam dedisse dicitur, sed *senex* ille magis, quam rimatores illius excusandi sunt: monet enim prudentissime, nihil omnium horum saporum alterare corpus, nisi in suo genere plane *excellat* & *energia sua excedat*.
4. Cæterum negari non potest, quod natura satis compos sit innumeras nouas mixtiones, quas nos ne mente quidem adsequi valeamus, formare.
5. Quoniam optimus & floridus sanguis sub motu suo circulatorio in dies & horas ita resoluitur, vt bonus esse desinat, corpori noxius euadat, & hinc impuritatem humorum augeat, necesse quoque est, vt singulis diebus & horis tale remedium ad manus sit, cuius ope hæc inquinaciones remoueantur.
6. Quis autem hic non videt, decantatas sanguinis depurationes, quas vulgo circa æquinoctia præscribimus, hic non sufficere. Sic etiam transfusio boni sanguinis, quam olim in hunc finem laudabant, & ex vno corpore in aliud deriuabant, huic rei non satisfacit. Si enim omnino per subiectorum quorundam minorem teneritudinem fieri posset operatio, sæpissime tamen repetenda esset, ob dictam inquinacionem, in massa sanguinea quotidie exorientem.
7. *Euacuatio* impuritatum plus valet, quam *correctio*, cuiuscumque etiam speculationi superstructa. Hæc enim, nisi euacuacionem habeat subiunctam, magis auget, quam tollit cacochymiam, quia per remedia talia, quæ corrigentia audi-

audiunt, multæ terrestres, salinæ & sulphureæ partes in corpus ingeruntur.

3. *Thermarum & acidularum* vsus, qua circumspèctione indigeat, *præcedente tabula* indicauimus.
9. Cæterum valent hic eædem cautiones, quæ *præcedente tabula* indicatæ sunt.

TABVLA V.

DE

HÆMORRHAGIIS GENERATIM.

I. DEFINITIO.

Vox folijs

Hæmorrhagia naturalis est vitale negotium naturæ, seu principii agentis in corpore humano, quo sincerus sanguis, quantitate plurimum excedens, euacuatur, ad motum sanguinis progressuum facilitandum, & incommoda grauiâ, quæ plethora inducere valet, præcauenda. Deriuatur ab *αἷμα*, sanguis, & *ῥήγνυμι* rumpo.

II. DIFFERENTIA

Hæmorrhagiæ sunt vel

1. *Naturales*, quæ ab interna causâ, directione, & tacita quasi commotione, nempe ab ipsa natura, dum per motum tonicum sanguinem ad specialem locum congerit, excitantur. Hic excluduntur quidem causæ violentæ, non autem aliæ occasionales externæ. Species sunt

- 1) Hæmorrhagia narium.
- 2) Hæmoptysis.
- 3) Hæmorrhoides.
- 4) Fluxus mensium.
- 5) Fluxus lochiorum.
- 6) Vomitus cruentus.
- 7) Mictus cruentus.

2. *Præternaturales*, quæ a causis externis & violentis originem sumunt, e. g. a lapsu, adlisione, vulæratione, corrosiuis. Huc etiam pertinent hæmorrhagiæ artificiales, per venæ sectionem, scarificationem, &c. inductæ.
3. Hæmorrhagiæ naturales possunt etiam dici *actiua*, & præternaturales *passiua*.
4. Naturales dicuntur, non quod de natura & essentia hominis sint, nam multi sexus masculini per totam vitam ab hæmorrhagiis immunes viuunt, sed quod *natura* hoc remedio utatur, quando per corruptos hominum mores plethora inducta est. †
5. Sunt adhuc aliæ sanguineæ excretiones, quæ extraordinariam & pertinacem agentis intentionem indicant, nempe
 - 1) Quando e. g. in *brachio* vel *pede* sanguis sponte erumpit, de qua re notabile exemplum reperitur in *differt. Stahlis de motu tonico vitali*.
 - 2) Et notæ sunt abunde *varicum* in cruribus fluxiones.
 - 3) De mirabili quadam hæmorrhagia per *umbilicum* legi meretur *Hildanus cent. 3. obs. 37*.
 - 4) De *sudore sanguineo*, modo vniuersali, modo particulari, multa exempla passim leguntur, quæ singulæ ad *naturales* fluxus omni iure referendæ sunt.
6. Hæmorrhagiæ differunt ratione *ætatis* e. g.
 - a) Hæmorrhagia narium familiaris est iunioribus:
 - b) Hæmoptysis mediæ ætati,
 - c) Hæmorrhoides & mictus cruentus ætati prouectæ.
 Ab his per ætatem differentibus hæmorrhagiis dependent *morbi ætatum*. Vid. *Stahlis diff. de morbis ætatum*.
7. Differunt etiam ratione *indolis*, alie enim sunt *modice* & bonæ, alie *nimie* & *male*.
8. Differunt denique ratione *temporis*.
 - a) Alie certa tempora obseruant, & hinc *periodice* dicuntur; ad quas etiam referri potest hæmorrhagia *critica*, in febribus continentibus contingens.
 - b) Alie statas periodos non obseruant, & hinc *vagæ* dicuntur.

III. SIGNA.

1. Hæmorrhagiæ *simplices*, a causis *mere internis* prouenientes, *tacite* quali, & sine ullo notabili sensu, impetu & incommodo plerumque oriuntur.
2. Quando autem omnino sensus aliquis præcedit aut concurrat, est ille plerumque tantum tendens, grauians & premens.
3. Quo *in signior* autem plethora adest, eo difficilius cedit negotium, & eo facilius dolores pungentes & lancinantes circa illam regionem sese exerunt, in qua excretio sanguinis intenditur.
4. Cessant autem hi dolores & reliqua incommoda, quam primum hæmorrhagiæ legitime succedunt.
5. Cæterum *moderate* hæmorrhagiæ sponte sua post sufficientem euacuationem subsistunt; quæ vero *turbantur*, multas anomalias & eruptione & progressionem & cessationem inuoluunt.

IV. SPBIECTA.

1. Hæmorrhagiæ omnibus fere ætatibus solemnes sunt, cuius tamen ætati per peculiaria loca, uti sub *differentia* indicatum est. *Conf. Hippocrates III. Sect. 27. & 29. aphor.*
2. In primis tamen hæmorrhagiis obnoxii sunt iuniores, qui sanam & floridam habent constitutionem.
3. Plethorici, indolis *agilis & sensibilis*, id est, temperamenti sanguineo-cholerici, sanguineo-melancholici, vel cholerico-sanguinei & melancholico sanguinei.
4. Magis illi, qui sanguinem fluxilem, sanum & floridum habent, quam alii, qui eiusdem dyscrasia laborant.
5. Qui de aromatica & vinosâ diætâ gaudent.
6. Maxime omnium, qui vehementibus animi commotionibus, præcipue autem iracundiæ expositi sunt. Hinc
7. In brutis hæmorrhagiæ satis raro obseruantur.

V. CAUSSAE.

1. Hæmorrhagarum causa *materialis* est plethora, consentientibus plerisque antiquis.
2. *Simplex* autem plethora non exhaurit uniuersum negotium

nam multi plethorici ab hæmorrhagiis & aliis *symbolicis* adfectibus prorsus immunes viuunt.

3. Sed *commotio* plethoræ plurimum valet ad hæmorrhagias concitandas.
4. Commouent autem plethoram, & sic ad hæmorrhagias suscipiendas naturam excitant
 - a) Calida, aromatica, spirituosa, fermentatiua, sanguinem rarefacientia.
 - b) Exagitatio *corporis* vehemens, & connisus fortior ad pondera tollenda.
 - c) Constitutio aëris calida.
 - d) Repentina refrigeratio, corpore calente.
 - e) Commotiones *animi* insignes.
5. Causa *efficiens* omnium hæmorrhagiarum naturalium est *principium agens*, quod per tales excretiones plethoram imminuere, & sic multa incommoda auertere intendit. Adsuæcit etiam facile hisce excretionibus, & easdem, licet plethora absit, continuat. Huc pertinent hæmorrhagiæ ex *hereditate* pullulantes.
6. Exsulent itaq; causæ stasium passiuarum, fermentationum, acrimoniæ, vasa arrodentis, item etiam spissitudinis, a cuius intercepto transitu venæ obstruantur & distendantur, vt dehiscere necesse habeant; quæ omnia simplicibus hæmorrhagiarum phænomenis & circumstantiis repugnant.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæmorrhagiæ naturales secundum *intentiones agentis* consideratæ, omnes quidem salutarem finem respiciunt, ob varias autem circumstantias, præcipue ob loca periculosa, per quæ sanguis excernitur, optatum effectum non semper attingunt.
2. Hinc hæmoptysis, vomitus & miætus cruentus periculose sæpius exeunt. Interea tamen non considerandæ sunt hæmorrhagiæ, vt accidens præternaturale, quod thesaurum vitæ perdat. Licet enim non nullæ hæmorrhagiæ excedant, ob hos tamen errores vniuersum negotium non possumus damnare.

3. Reliquae autem haemorrhagiae, legitime & moderate succedentes, eximiam adferunt vtilitatem. Praecipue
 - 1) Multos morbos, qui plethoram sequuntur, praecauent.
 - 2) Soluunt illos, qui ex eodem fonte originem sumserunt.
 - 3) Multa mala chronica, eaque pertinacia, auferunt, e.g. haemorrhoides tollunt pathemata hypochondriaca & plures alios abdominis adfectus.
 - 4) Non solum non debilitant, sed trahunt etiam post sese manifestam corporis alacritatem.
4. Immo, licet haemorrhagiae copiose & impetuose succedant, non facile tamen insignis debilitatio sentitur, multo minus tam frequenter phthysici & hydropici effectus sequuntur, vti vulgo traditur.
5. Quando autem haemorrhagiae, vt moris est, per varia incongrua artificia, praecipue adstringentia, cohibentur, succedunt stagnationes, stases, inflammationes, febres pessimi moris, & alia fontica mala.
6. Haemorrhagiae, quo magis stas periodos formant, eo certius etiam moderate sese gerunt.
7. Omnes haemorrhagiae, quae laborioso *natura* conamine & insigni *nisu* exprimuntur, plerumque ad *excessum* inclinant, principium enim vitale non facile a tali excretionē desistit, quæ multo labore fuit obtinenda.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. Haemorrhagiae moderate, legitime & per loca conuenientia fluentes, nulla indigent medicatione.
2. Quando autem contrario modo se habent, prudenti ratione illis occurrendum est.
3. Ante omnia intentioni naturae, quae plethoram imminuere intendit, satis fiat
 - a) Per *vena sectiones extra paroxysmum*, circa aequinoctia, conueniente loco instituendas.
 - b) Per *scarificationes vel hirudines*, pro diuersa circumstantiarum ratione admouendas.
 - c) Per *motum corporis* laboriosum, modestum, perennantem.

4. *Quantitate* sanguinis imminuta eiusdem *qualitas corrigatur*, & quidem iterum extra paroxysmum.
- Ad crasin sanguinis *sulphureo-acrem* corrigendam adhibeantur *nitrosa & absorbentia*; item etiam *emulsiva & lenia acida* e. g. nitr. depurat. lap. prunellae, ocul. cancr. conchae praeparat. mater perlar. succus citri, berberum, ribium,
 - Ad crasin sanguinis *spissam* attenuandam conducunt *resoluentia, incidentia, attenuantia*; e. g. salia media digestiua, antiscorbutica temperata, & radices alexipharmaco - diureticae. Ex his & lenioribus laxantibus vinum medicatum parari, & per octo circiter dies vsurpari potest.
 - Commendetur potus satis dilutus & parcior victus.
 - Iungiuntur simul cautelae de causis occasionalibus & praecatacticis euitandis, praecipue animi commotionibus.
5. *In paroxysmo* exhibeantur
- Pulueres *orgasmi* sanguinis contemperantes e nitrosis, absorbentibus & cinnabarinis parati v. g.
 Recip. Nitr. depurat.
 Ocul. cancr. acido citri saturat. ana drachm. ij.
 Cinnabar. opt. praeparat. gran. XXX.
 M. & duarum horarum interuallo exhibeatur scrupul. i.
 - His pulueribus interponatur subinde mixtura tonico-neruina *Stahlii*, quae simul effectum habet diuretico-discutientem.
 Recip. Spirit. C. C.
 Tinct. antimon. tartarif. vna vnae. semis.
 M. dof. gtt. XXX.
 - Si his non cedit haemorrhagia, tum vel cortex caesariellae, vel cinnabaris larga dosi cum pulueribus temperantibus propinetur, vel *moderate sistens*, & *sedatio-anodyna* in usum trahantur, dictisque pulueribus immisceantur e. g.

Recip.

Recip. Pulveris iam descripti drachm. I.

Specier. de hyacinth. .gr. XVI.

MP. de cynogloss. gr. IV.

M. D. in 4. partes, & versus noctem vna vel altera propinetur, non neglectis per diem pulueribus *simpli-
citer* temperantibus.

- d) *Adstringentia* autem *fortiora* non exhibeantur, nisi summa urgente necessitate, de quibus sub *speciebus* hæmorrhagiarum plura dicentur.
- e) Post paroxysmum, si ingens sanguinis quantitas euacuata est, analepticis, emulsivis & gelatinosis, non autem spirituosis, æger reficiatur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Facilis est *hæticam* per *adstringentia* prouocare, quam hæmorrhagias per eadem sistere; nam in *parua* dosi exhibita fluxum non sistunt, sed potius augent, quando autem *copiose* ingeruntur, succedunt viscerum obstructions & harum conlectaria, nempe stases, suppurationes &c.
2. Vt itaque error, pluribus communis, euitetur, sequentes regulæ, quæ errare non permittunt, de vsu adstringentium obseruentur.
 - a) Non exhibeantur, nisi omnia prius adplicata sint, quæ superius commendauimus.
 - b) Quando autem casus necessitatis eorum vsum efflagitare videret, tum potissimum *externe*, raro autem, nec *affatim interne* exhibeantur.
3. Nam absurdum & rationi contrarium est, per talia remedia hæmorrhagiis occurrere velle, quæ sanguini, vasa & vias prementi, *exitum* solum, sed non *aditum* prohibent.
4. *Adstringentia*, utpote paucis sæpius granis exhibita, non perueniunt ad locum *dijjctum* e. g. pulmones, vterum, sed ipsi natura, sensu tali adstrictorio cum ventriculo communicato, motum similem imprimunt, quæ deinde eundem non solum in locis periclitantibus, sed facile etiam in aliis visceribus administrat.
5. Ex *amuleticis puluis sympathicus Dygbei* satis probatus est, & in *extremis* sacra ancora: Scrupulosa autem vitrioli ad eundem

- eundem parandum electio, nullum habet vsum: sufficit vitriolum bonum, leuiter contritum, diebus *canicularibus* sub solis radiis ad albedinem calcinare. Soluitur huius pulueris drachm. I. vel II. paucioribus aquæ cochlearibus, cui solutioni sanguis deinde instillatur, seu inspuitur, & sub exiguo calore spatula lignea agitatur.
6. Radix *pseudo acori*, seu *irid. vulgaris, palustr.* in taleolos confissa, & frustulum sub lingua detentum, admodum notabilem adstrictionem efficit, & experientia satis probata est. Modo obseruetur, quod amuletica non *sub impetu* fluxus, sed statim sub *initium*, vel in *declinatione* adhibenda sint.
 7. Radix autem *nigella*, quam *Simon Pauli* admodum deprædicat, manu vel ore detinendam, est quidem *subadstringens*, sed sine successu ab aliis exhibita.
 8. *Bufonis exsiccati* adplicatio, quæ *Helmontii* temporibus admodum inclaruit, bene se commendat; inprimis in hæmorrhagia *uteri*, quadantenus *narium*, non æque adeo in *hæmoptysi*. Inuoluitur linteo, &, ne aperiatur, sigillo munitur, atque sub axillis gestatur. Iuuat aliquando, vbi adstringentia sine effectu adhibita fuerunt.
 9. *Borellus* quam maxime commendat vsum *iaspidis rubre* amuleticum, sub axillis detinendo, de collo suspendendo, seu fronti adplicando.
 10. Vulgus loco *iaspidis* laudat concretum illud minerale, *hamatitem*, nec irritum semper.
 11. *Sanguis ægri tostus*, contritus, & instar pulueris sternutatorii, adplicatus, bonum etiam effectum edere dicitur.
 12. Hæmorrhagia, quæ per adstringentia, specifica, amuletica, sympathetica, suppressa est, mox exposcit vsum *diluentium* & *temperantium*, ne stricturæ contumaciter continuent, atque alia damna producant.
 13. *Circaligaturas* partium sequentia sunt obseruanda.
 - a) Fieri illæ debent in partibus *extremis*, pedum scilicet & manuum.
 - b) Pars ligata non penitus opprimatur, sed maneat aliqualis sanguinis concursus.

- c) Neque nimis *cito* ligatura est solvenda, neque etiam nimis *diu* in illo gradu detinenda ne sphacelus producatur.
14. Ex *empuriosis topicis*, sed *ingratis*, *stercus suillum* seu *equinum* commendatur.
 15. Mixturam tonico neruinam, de sale volatili participantem, in hæmorrhagiis commendare, in quibus sanguis iam notabiliter fluxuus & exagitatus est, videtur rationi planissimæ repugnare; sed volatilia *sola* non commendantur, verum cum *alcalicis fixis* combinata, vtpote optimo effectu sæpissime confirmata.
 16. *Salia autem volatilia*, quando *sola* & insuper largis dosibus adhibentur, in hæmorrhagiis æque ac in febribus tumores œdematosos facile relinquunt.
 17. Multo segnior est efficacia remediorum in *paroxysmo*, si *extra eundem* venæ sectio non fuit administrata, & tamen manifesta plethora concurrit.
 18. Hæmorrhagiis nimis quando vires exhaustæ sunt, caueat sibi æger a multis *lectionibus*, quia oculi quam maxime per eandem tum debilitantur.
 19. Contingit, rarius tamen, vt hæmorrhagia ex *arteriola* cuiusdam extremitate proueniat, actum quidem ad excessum facilius inclinat. Et quem ad modum talis fluxus plerumque a causis paululum vehementibus excitatur, ita & celeritorem quodam modo curationem exposcit.
 20. *Hæmorrhagiæ* ab hæreditatis causa dependentes eadem quidem methodo tractantur, maiorem autem exposcunt patientiam, & regimen animi temperatissimum. Præterea recursus paroxysmi per temperantia & sedatiua mox præscindendus est, vt natura hunc euacuationis actum tandem obliuioni tradat.
 21. Falsus est conceptus vulgaris, quod sanguis vel optimus vel pessimus per hæmorrhagias excernatur. Licet enim consistentia spissa & color nigricans interdum obseruetur, hæc tamen a diuturna illius mora in locis excretoriis dependent.
 22. Hæmorrhagiæ *passiua* quo modo tractandæ sint, *tabula chirurgica* LIX. docet.

TABVLA VI.

DE

HÆMORRHAGIA NARIVM.

I. DEFINITIO.

Hæmorrhagia narium est euacuatio sanguinis, modo per hoc modo per alterum narium foramen, a natura ipsa, motu tonico speciali, & eum quidem in finem suscitata, vt per illam plethora imminuatur & motus sanguinis progressius faciliteretur. Deriuatur ab αἷμα, sanguis, & ῥήγνυμι, rumpo.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt hæmorrhagia narium ratione *indolis*,
 - a) Est enim vel *boni moris*, quæ placide, & proportionate accedit, succedit, & sponte sua salutariter iterum cessat.
 - b) Vel est *mali moris*, quæ laborioso molimine & impetu effero erumpit, quantitatem sanguinis vero nimiam emittit, & varia incommoda producit.
2. Hæmorrhagia narium, quando in morbis *acutis* contingit,
 - 1) vel est *critica*, quæ post commotiones sanguinis insignes in febribus *continentibus* exquisito temporis ambitu circa dies criticos, immo statas horas erumpit, & hoc quasi proprium habet, vt *copiose* profluat, vnde antiquum Medicorum diciturum enatum: *nullum criticum est paucum*.
 - 2) vel est *symptomata*, quæ extra dies criticos morbis accedit, sed euentu non semper salutari e. gr. febribus petechiantibus, variolis &c.
3. Quando autem hæmorrhagia hominibus *extramorbos* constitutis euenit, dicitur illa *chronica*, quæ vel statas periodos seruat, vel incerto tempore erumpit.
4. *Phlegmatorrhagia* narium, a *Salmutho* commemorata, ipso quidem nomine sub primo auditu se distinguit ab hæmorrhagia

gia narium, ratione tamen caussarum nulla insignis intercedit *differentia*; sicut etiam ipsa *coryza*, si modum *fiendi* & *succedendi* consideremus, iisdem cum hæmorrhagia narium rationibus innititur, *Conf. sabula de coryza.*

III. SIGNA.

1. *Mitior* hæmorrhagia narium *sponte* & quasi *tacite* plerumque erumpit, & sine vlllo incommodo succedit; idque frequentius æstiuo quam hyemali tempore.
2. *Mitius*, autem *talis*, laboriosis plurimum moliminibus ante eruptionem conspicua est, nempe
 - 1) accedunt *congestion*es sanguinis modo versus vnum, modo alterum, modo vtrumque capitis latus, admodum *molesta*.
 2. *rubor* genarum.
 - 3) faciei &
 - 4) vasorum colli temporumque inflatio.
 - 5) *tinnitus* & sonitus aurium.
 - 6) *Oculorum dolor* grauatius cum prominentia, siccitate & scintillulis.
 - 7) *Capitis* vertiginosa afflictio, cum pruritu narium & sensu grauatiuo, præcipue circa nasi radicem.
 - 8) *Insomnia* de sanguine, incendiis &c. in nonnullis præcedunt.

In partibus autem *oppositis* & *remotis* a motu tonico nimis aucto proueniunt

 - 1) adstrictio *alui*.
 - 2) *urine* non tantum inminutio, sed etiam tenuitas.
 - 3) *tensiones* in hypochondrio, præcipue dextro.
 - 4) *sudoris* suppressio.
 - 5) *frigoris* partium inferiorum.

IV. SVBIECTA.

1. Hæmorrhagia narium competit plerumque *iunioribus*, intra secundum & tertium septenarium adhuc constitutis.
2. Sexui magis *virili*, quam feminino.
3. Plurimum manifesto *plethoricis*.
4. Vbi autem ab hæreditate dispositio adest, vel *adsuetudo*, aut externæ insolentes *commotiones*, ibi etiam extra plethoræ

infirmam præsentiam euenire toler.

5. Quibus autem *post annum XXX.* & quidem sæpius contingit, illi etiam simul solent vexari *rheumaticis, arthriticis aut spasticis* aliis congestionibus.
6. Nonnumquam per *palindromen* ætate iam adultiore accidit illis subiectis, quæ iuniore ætate eidem hæmorrhagiæ ebnoxia fuerunt, deinde alias vicarias euacuationes experta, ab his autem iam libera sunt.
7. Subiecta hæmorrhagiæ narium *criticæ* per se nota sunt.
8. Quod *scorbutici* hæmorrhagia narium subinde corripiantur, non est mirum, nam scorbutus natales suos plurimum debet plethoræ.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens remota* est *ætas puerilis*, huic sanguinis eruptioni præ aliis fauens.
2. Causa *proxima* est plethora & quidem commota.
3. Causæ *occasionales* sunt
 - 1) *corporis & animi* commotiones vehementes, præsertim exercitium memoriæ in pueris, it. eiulatus, lacrymæ, & sub hoc plorandi actu copiosa in nares deriuata humiditas, unde, stricto collo & pectore, facies rubore perfunditur & venæ capitis inflantur.
 - 2) *adsuetudo.*
 - 3) dispositio & causa hæreditatis.
 - 4) *violente* ad lisiones, contusiones, ictus narium & cortosina.
 - 5) *abusus vini* & aliorum spirituosorum ad inebriationem vsque, vel aromaticorum.
 - 6) *ingens feruor solis* aut conclauium calefactorum.
 - 7) immo subinde leuissimæ causæ hic sufficiunt e. g. sternutatio, refrigeratio, capitis ad terram inclinatio, agitatio narium inter lauandum earumque leuis pruritus, scalprio & fortior emunctio.

VI. PROGNOSIS.

1. Per vulgus notum est, quod hæmorrhagia narium moderate & proportionate succedens, alacritatem adferat, & ab artuum grauitate, ante eruptionem in plethoricis sæpius præsentem, liberet.
2. Quan-

2. Quando autem hæmorrhagia narium *adsuefacta*, sub constitutione plethorica, iterum cessat, vel adstringentibus peruerse tractatur, succedunt gravitas corporis, congestiones circa caput, inflationes vasorum, oculorum rubores & dolores, ophthalmiæ, capitis tendentes, pulsantes & æstuantis dolores, lucis liberioris impatientia, *conf. tabul. de hæmorrhagia narium suppressa.*
3. Metus ille vulgaris subsecuturæ phthiseos, post largiorem in puerili ætate hæmorrhagiam narium, sæpius quidem frustra, interdum tamen non plane de nihilo censendus est. Si enim accedente ætate hæc congestiones a capite in pectus desultant, nec tempestivis sanguinis euacuationibus natura ab hoc loco auocatur, molimina hæmoptyca & tandem phthisis succedere possunt.
4. Hæmorrhagia narium *critica*, largiter profluens, febrem salutariter soluit cum vniuersali euphoria; *minore* autem quantitate succedens, criseos nomen non promeretur, & peius cedit totum negotium. Quando autem per adstringentia supprimitur, phrenitidem & vitæ periculum efficit. *conf. tabul. de febre synocha.*
5. Hæmorrhagia narium *symptomatica*, in febribus petechiantibus, variolis & aliis malignis, optimæ non est prognoseos; in variolis tamen & morbillis, præcipue sub initium, non æque ac in reliquis periculosa.
6. Ita adsuefcunt facile hæmorrhagiæ, vt non solum a naribus per ætatum gradus ad quaelibet alia sanguinis emuntoria tendant, sed etiam tanto promptius iterum ad nares recurrant, quando successus illarum in aliis viis impeditur.
7. *Habitualis* autem illa narium hæmorrhagia, quæ ætate minus congrua contingit, lat'em cuiusdam visceris abdominalis sæpe coniunctam habet. Vnde
8. Hypochondriacis tandem, cachecticis & hydropicis hæmorrhagia narium nihil boni prælagit, imprimis si e latere opposito stillat sanguis.
9. In *senibus* narium hæmorrhagiæ altioris sunt considerationis, quam quidem in iunioribus; præcipue quando hæc

haemorrhoides suppressas excipiunt. Dum enim congestiones ad caput contingunt, fluxus autem secundum mores illius aetatis non legitime succedit, vertigini & apoplexiae porta aperitur-

- 10) *Nimiae* haemorrhagiae narium vires admodum prosterunt, & cachexiam, hydropem, tabem, rarius autem mortem praesentaneam inferunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quoniam voluntaria haec sanguinis eruptio sponte plerumque iterum cessare solet, ablit in paroxysmo omnis medicatio, si fluxus legitime succedit, nempe
 - a) Quando *moderate* fluit.
 - b) sanguinem *floridum* sub satis conspicua plethora exhibet.
 - c) aetati *congrua* respondet.
 - d) praecipue si iam in consuetudinem abiit, & alacritatem potius, quam virium iacturam inferre solet.
2. In *effera* autem narium haemorrhagia, quae nimis *copiose* profluit, ob leuissimas, non euitandas occasionales causas, *sapius recurrit*, aetatem minus congruam occupat, & vires prostermit, sequente methodo incedendum est.

A. in paroxysmo.

1. Ad orgasmum sanguinis sulphureo agillioris contemperandum exhibeantur
 - 1) Pulueres nitroso-absorbentes cinnabarati e. g. nitrum depurat. lap. prunell. mater perlar. ocul. cancr. conch. praeparat.
 - 2) Item acidula, emulsiva & gelatinosa v. g. tinct. flor. bellid mixtura simplex, tinct. papau. erratic. decoct. C. C. decoct. rasur. ebor. serum lact.
- 3) Quod si vero in casu quodam *rebelli* temperantia non sufficerent, lenia anodyna iisdem immitteantur: vbi M. P. de cynoglossi. ad gr. j. ij. pro dosi reliquis praefertur, & versus somnum cum puluere temperante propinatur.
3. Aequalis *motus tonici* distributio promoueatur, imprimis sub declinatione paroxysmi.
 - 1) *interne* conducunt: mixtur. tonico-neruina *Stalii* e sale

fale volatili & alcali fixo parata. It. infusa ex herbis millesfol. fanicul. plantag. pyrol. virg. aur. angust. fol. it. lenia laxantia.

2) *externe*: frictiones, signaturæ veterum, sinapismi, ligaturæ extremorum, adsplicatio spir. vini camphorati, pediluvia tepida, quæ reuelliendi scopo bene se commendant.

4. *Dieta* conueniens iniungatur, nempe

1) abstinencia a cibis aromaticis & potu spirituofo.

2) euitatio æstus nimii solaris & hypocaustorum.

3) moderamen animi pathematum.

5. De *specificis & adstringentibus* in desperatis casibus, externe adhibendis, *vid. cautel. sub hæmorrhag. generatim*. Præ aliis autem in hac fluxus specie laudantur: iaspis rubra, buse exsiccatus, puluis sympathet. dens hyppopot. rad. irid. vulgar. palustr. *vid. etiam subsequentes obseruat. practica.*

B. *Extra paroxyfimum.*

intentioni naturæ satisfaciendum

1. in *adultioribus* per vicarias *venesectiones* in pede, verno & autumnali tempore instituendas, vel pro re nata, per *hirudines* ad hæmorrhoidalìa loca adplicandas.

2. in *iunioribus* vero loco venæ sectionis, ad sanguinem a capite deriuandum, singulis mensibus exhibeantur *laxantia* blandiora ex rhabarb, fenna, manna, tamarind. parata; circa æquinoc̄tia vero potest etiam infusum laxans per aliquot dies præscribi, vbi antiscorbutica temperatiora præcipue addenda sunt, quia in efferâ hac hæmorrhagia, de qua loquimur, plerumque dyscrasia sanguinis concurrir.

3. Conducunt etiam *pedilunia* alternis hebdomadis adhibenda.

4. Ad *equalem distributionem* sanguinis conseruandam mixtura tonica & essent. alexipharmaca *Stahliz* subinde in vsum trahantur, & motus corporis placidus, ceu *optimum tonicum*, non negligatur.

VIII. *CAVTELAÆ ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. Quæ sub cautelis hæmorrhagarum *generatim*, ratione adstringentium, specificorum, amuletorum, ligaturæ partium, monuimus, illa quam maxime hic in animum reuocanda & adplicanda sunt. Hinc

2. *Adstringentium internus usus* tanto magis absit, quia in nulla hæmorrhagiarum specie minoris, quam in hac, est efficaciz.
3. *Externus* etiam vsus prius locum non habeat, quam post inefficacem præscriptæ methodi adplicationem. In tali desperato casu turunda ex alumine, vel solutio illius commendatur, subiunctis tamen discutientibus seu diaphoreticis temperatis. *Vitriolica* autem & *aruginosa* nimis acria sunt, & ozænam producere solent.
4. Ligatura partium extrèmarum in casu tali necessitatis eadem circumspectione suscipiatur, quæ dicto loco commendata est.
5. *Specialis* in hac hæmorrhagiarum specie commendatur *succus millefol.* inprimis a *Borello* succus *urtica minor.* fronti adplicandus; quem tamen alii in hæmoptysi magis laudant.
6. *Lapis carpcionum* triangularis, sub lingua detentus, num efficaciam aliquam exhibeat, vterius obseruandum est.
7. *Lintea madida*, regioni *hepatis* suafu veterum imponenda, magis obsunt, quam profunt.
8. Idem etiam sentiendum est de *ventosis* cum magna flamma eidem regioni adplicandis.
9. Ab *opiatis* vbique abstinendum, præcipue vbi vires iam multum exhaustæ sunt, quo in casu potius analepticis temperatis succurrendum est.
10. Post *enormes* narium hæmorrhagias caput ab *estiu & frigore* nimio defendere, oculisque parcere quam maxime commendatur.
11. De hæmorrhagiis narium *criticis tabula de febre synocha* plura dicemus.
12. Quando *arteriola* in summitate narium rupta & magna sanguinis quantitas iam effusa est, efficaciaz remedia, ob periculum, quod in mora est, mox sunt adhibenda. Conueniunt hic pulueres temperantes largiter cinnabarati & cum speciebus de hyacintho atque massa pilularum de cynoglossa mixti

TABVLA VII.

DE

SUPPRESSIONE HAEMORRHAGIAE NARIVM.

I. DIFFERENTIA.

1. Suppressio hæmorrhagiæ narium est vel *critica*, vel *non critica*.
2. *Non critica* suppressio triplici modo consideranda est
 1. vel enim narium hæmorrhagia numquam adfuit, & tamen *motus* adsunt molesti, qui eandem respiciunt, & exprimere conantur;
 - 2) vel hæc excretio antea familiaris fuit, per datas autem occasionales causas suppressa est, & varia pathemata infra alleganda, produxit;
 - 3) vel cessavit hic fluxus per *ætat*is rationem.
3. Hæc distinctiones vsum practicum in tractatione therapeutica exhibebunt.

II. SIGNA.

Hæc desumuntur a symptomatibus, quæ hanc suppressam hæmorrhagiam excipiunt. Sunt hæc

1. congestiones & restrictiones sanguinis versus *caput*, vnde proveniunt
 - 1) Varii adfectus cephalalgici.
 - 2) Ophthalmia, immo cataracta,
 - 3) Otalgia & tinnitus aurium.
 - 4) Odontalgia.
 - 5) Erysipelas faciei.
 - 6) Tumores parotidum.
 - 7) Adfectus faucium inflammatorii.
 - 8) Tumores vuulæ & tonsillarum.
2. Translationes huius sanguinis ad *pectus*: hinc sequuntur
 - 1) Palpatio cordis.

2) Asthma

- 2) Asthmata, præcipue sicca.
- 3) Catarrhi suffocatiui.
- 4) Hæmoptysis.
- 5) Phthisis.
- 6) Pleuritis & peripneumonia.
- 7) vel aliæ febres acutæ aut hecticæ.
- 8) Diffunduntur etiam nonnumquam congestiones in *artus*, vnde adfectus rheumatico - arthritici exoriuntur, præcipue in illis, in quibus dispositio ab hæreditate subest.
- 9) vel mali hypochondriaci adparatus inuitatur.

III. SYBIECTA.

1. Hanc suppressionem facile incurrunt, quorum temperamentum ante sanguineum vel cholericum, iam in phlegmaticum aut melancholicum degenerauit.
2. Personæ, quæ diætam *vinosam* in cereuisariam vel plane aquosam mutarunt. Dantur enim exempla, vbi hæmorrhagia narium, per aliquot annos suppressa, reuerfa est, quam primum pristina diætã vinosa iterum electa fuit.
3. Item quæ vitæ genus laboriosum in sedentarium permutarunt.
4. Quæ ad ætatem consistentem accedunt, vbi partes, antea huic excretioni dicatæ, magis iam densatæ sunt, vnde natura motus hosce aliorum dirigit.
5. Speciatim quæ sequentibus caullis obnoxie fiunt.

IV. CAUSSAE.

1. Causa interna est
 - 1) vel *spissitudo & mucositas* sanguinis.
 - 2) vel non raro *orgasmus* seu expansio illius.
2. Causæ occasionales, quæ sanguinem reddunt *spissum & mucosum*, sunt
 1. *Tristitia* oontinua, quæ etiam simul naturam facit abiectam.
 - 2) *Adstringentia & styptica*, præmature sub ipso fluxu adhibita.
 - 3) item etiam *refrigerantia* externa, *opiatã &c.*
 - 4) domicilia humida.

3. Caus-

- 3) Causæ autem, quæ *orgasnum* sanguinis producere, & hinc hæmorrhagiam impedire solent, sunt
- 1) Excandescencia animi.
 - 2) vehementes corporis motiones. Huc etiam pertinent.
 - 3) motus sanguinis progressivus *auctior* in febribus, &
 - 4) abusus spirituosorum.

V. PROGNOSIS.

1. Suppressio hæmorrhagiæ narium *critica* facile parit delirium & funestos plerumque eventus, *conf. tab. de febr. synocha.*
2. Suppressio autem hæmorrhagiæ narium *non critica* nisi alius salutatis fluxus substituat, *turmam* pathematum, sub *signis* iam allegatam, in conspectum producit.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quæcumque subiecta hæmorrhagias narium numquam habuerunt, congestiones autem & dolores circa caput experiuntur, in illis *crasis* sanguinis respicienda est:
 - 1) Quando sanguis nimis *serusus* est, blandæ *laxationes* vti esse possunt, e. gr. pilulæ *Becheri*, per 6. circiter dies continuatæ, quibus coniungi potest essent. alexiph. *Stahlii* bis per diem ad gr. XX. XXX. propinanda.
 - 2) Vbi autem sanguis iusto *spissior* est, ibi conducunt attenuantia, incidentia & resolventia, cum laxantibus combinata e. g. infusum laxativum sequens

Recip. rad. ari.

vinctox.

pimpinell. alb. ana vnc. semis.

Herb. cent. minor.

card. benedict.

verben. ana manip. semis.

Fol. fenn. elect. vnc. semis,

Rhabarb. drachm. III.

Rad. helleb. nigr. drachm. II.

Tart. vitriolat. vnc. semis.

Incis. contus. f. species, adfundantur aqua & vinum, sumatur mane, quantum sufficit ad lenem laxationem.

- 3) Si vero *orgasms* sanguinis peccat, post lenes laxationes subiungi possunt pulveres nitroso-præcipitantes, & denique mixtura tonico æruina *Stahlii*.
2. Quibus autem subiectis hæmorrhagiæ narium antea familiares fuerunt, in illis
 - 1) non tantum crasis sanguinis respicienda, & methodo iam indicata corrigenda est,
 - 2) sed conuenit etiam vitæ genus antecedens cum præsentē conferre, & commissos forsau in mutatione quadam errores emendare.
 - 3) Si vero fluxus hac medicatione reuocari nequit, conducit venæ sectionem substituere.
3. Vbi demum hæmorrhagia narium per *ætat* rationes cessat, ibi venæ sectio adhuc magis necessaria est, ne sanguinis restrictio versus *pectus* contingat, & periculosas eruptiones moliat.
4. *Alui obstructio*, ad quam talia subiecta inclinant, numquam toleretur, minime omnium, quando symptomata vrgent. Huic scopo dicta laxantia & dilutiones sufficientes inferuiunt.

VII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Alcum apud ple-osque pathologos est silentium de *incommodis*, e suppressione hæmorrhagiæ narium pullulantibus: hinc tanto magis in hoc negotium inquirendum est, vbi symptomata sub *signis* enarrata in *iuniore* ætate occurrunt.
2. *Medicamenta*, quæ sanguinem euacuare vulgo commendantur, agunt vel eundem exagitando, & mobilem reddendo, vel naturam ad excretionem stimulando, quæ vero in hæmorrhagia narium suppressa minime locum habent.
3. Annus vice-simus circiter quartus quando decessit, sollicite vigilandum est, quorsum natura motus, quos antea versus caput instituit, iam dirigere intendat, vt per tempestiuam venæ sectionem in pede periculosa congestio ad *petus* possit præcaueri.

TABVLA VIII
DE
HAEMOPTYSI.

I. DEFINITIO. *De No: Cœlis*

Hæmoptysis est euacuatio seu excretio sanguinis per vasa pulmonaria profundiora, a natura ipsa ope motus tonici ad plethoram imminuendam, & reliquorum humorum liberiores circulationem promouendam, suscitata. Deriuatur ab *αἷμα*, sanguis, & *πύω*, sputo.

II. DIFFERENTIA.

Hæmoptysis differt

1. a *sputo cruento*, nam in hæmoptysi *sanguis floridus* & purus e pulmonibus eiicitur, placido magis, quam violento conamine; in sputo autem cruento reicitur *salina* cruore tincta, aut *mucus sanguineis* striis commixtus, cum multo laborioso screatu. Sputum insuper cruentum etiam aliunde ortum suum ducere potest, nempe ex infundibulo, e recessu narium ad vuulam terminante, e gingiuis, aut ad summum, e summis faucibus, absque tamen vitio pectoris complicato. Est enim sputum cruentum plerumque confectarium imperfecti moliminis, hæmorrhagiam narium respicientis.
2. a *sputo cruento peripneumonicorum* & phthisicorum, vbi sanguis crassus, vel pus sanguine tinctum cum tussi sensim eiicitur.
3. a *vomitu cruento*. Per hæmoptysin enim eiicitur sanguis *arteriosus*, rubicundus, & quidem, vti modo dictum est, conamine magis placido, quam laborioso; per vomitum vero cruentum excernitur sanguis *venosus*, plerumque crassus, nigricans, coagulatus, sub anxio vomendi conamine & sine vlla tussi.
4. Diuidi de reliquo hæmoptysis potest
 - 1) in *periodicam* & *vagam*.
 2. in *voluntariam* & *violentam*.

III. SIGNA.

Hæmoptysis vti est motus naturæ *actius*, ita generalia duo signa, quæ hic attendi possunt, sunt *motus* & ipse *actus*.

1. Procedunt plerumque tonicæ extremitatum corporis stricture & occlusiones, quibus sanguis ad interiora copiosius restringitur. Hinc
2. Notabilis congestio & oppletio pectoris cum angustia exoritur, coniuncto sensu spastico in thorace, scapulis, immo & hypochondriis.
3. Præcurrit quoque interdum temulenta & grauatiua capitis oppletio, primarum viarum distensio, & horripilationes in extremitatibus & pectoris confiniis.
4. *Tussis* in aliis antecedit non aspera, sed *clangosa* & sonora, *parua* magis, quam impetuosa, maxime omnium *sicca*. In aliis autem *citra* vllam *tussim* sanguis erumpit.
5. Sanguis dum erumpere minatur, sensus profundioris renitus in *pectore* plerumque sentitur.
6. In aliis vero, maxime qui hæmorrhagiis narium antea ad dicti fuerunt, *tacite* magis & tranquille cum sensu tantum alicuius titillationis pruriginosæ per longitudinem arteriæ asperæ erumpit, quasi calidum quid e pectore in fauces scaturiret.
7. Sanguis, qui excernitur, *floridus* est & *spumosus*, cum *copia* aliqua *notabili* conspicuus.
8. Ipsa autem *excretio* tam placide plerumque procedit, vt illi, qui ante eruptionem vehementi tussi correpti fuerunt, sub ipsa sanguinis excussione ne exiguam quidem molestiam ab illa persentiscant.
9. In *spuato cruento* exserit sese in *capite* sensus tendens, opprimens, grauans, æstuans eum insolita siccitate, aut sentitur molesta pressio in *fronte* & narium radice, idque præcipue horis matutinis, quo tempore cum screatu aliquoties sanguinem, plerumque in grumis, eiiciunt, quod tamen breui iterum cessat.

IV. SUBJECTA.

1. Hæmoptysis satis raro contingit, & quæ subiecta occupat, sunt

sunt plerumque *iuuenilis ætatis*, ab anno XVIII. ad XXV. rarius ad annum XXX. rarissime vsq; ad annum XXXV. *confer. Hippocrat. aphorism. XXIX. sect. III.*

2. Obtingit maxime plethoricis, pleno victu, vino & liquoribus spirituosus utentibus.
3. Qui sunt *temperamenti cholericis*-sanguinei, magis adhuc cholericis-melancholicis, aut sanguineo-melancholicis, habitus corporis gracilioris, & qui plus sanguinis in *venis* habent, quam in *poris*.
4. Sexus *femininus* num hæmoptysi magisquam virilis obnoxius sit, ambiguum est. Plura de hac re videantur *tabula de phtisi*.
5. Illi quoque, qui sub aëre denso ac crasso nati sunt & educati, postea autem in aëre subtili degunt, ac plethoram motu insolito commouent, hæmoptysi exponuntur.
6. Quam sæpe etiam *his* euenit, qui clamando aut cantando pectus percellunt, vel perpetuo arctius compresso abdomine sedent, quo ipso restagnatio sanguinis ad pectus contingit.
7. Porro qui ex agili vitæ genere in sedentarium & otiosum transferunt, hæmoptysi corripiuntur.
8. Maxime omnium, quibus aliæ adueta hæmorrhagiæ cessarunt, imprimis narium, tum mensium, rarius hæmorrhoidum: quo etiam pertinet venæsectionis & scarificationis consuetæ neglectus, & ipsa denique dispositio hæreditaria.
9. Ad *sputum cruentum* quod attinet, occurrit illud tam iunioribus, quam paullo adultioribus subiectis, præsertim quæ moliminibus & adfectibus narium hæmorrhagicis obnoxia fuerunt.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *antecedens remota* est ætas iuuenilis & temperamentum, sanguinis excretionibus præ reliquis expositum. *vid. subiecta.*
2. Causa *propior* est plethora; nam nemo alius (exceptis causis violentis) hæmoptysi corripitur, quam qui sanguine, imprimis non sufficienter diluto, ad sensum abundat.

3. *Causla proxima* est valvuli alicujus sanguiferi disruptio, modo in aspera arteria, & præcipue superiore eius parte, modo profundius intra bronchia contingens.
4. *Causla efficiens* est principium vitale, sanguinem motu tonico copiosius ad pulmones dirigens, & moliminibus qualibuscumque spasticis ibidem exprimens.
5. Huc etiam *consuetudo* referri potest; nam natura huic eruptioni semel adueta, hæc congestiones & expressiones reperere solet, licet causa materialis subtracta sit.
6. *Causlae externæ, occasionales & procatarticae* sunt
 - a) *Nisus enormis* in tollendis & gestandis oneribus, præcipue in iis, qui talibus non adueta sunt, it. plagæ, casus ab alto &c.
 - b) Respirationes vehementes in tubis, cornubus, item clamores, cantationes, cachinnus.
 - c) *Spiritus nimis contentus* & tum repentino impetu elisus.
 - d) Commotiones *animi* vehementes, inprimis iracundæ.
 - e) *Corporis* exagitationes æstuosæ, currendo, saltando &c. contingentes, computationes quoque, inebriationes & vomitiones, præcipue in minus adueta.
 - f) Admissio quoque *auræ* inquinatæ & corrosivis fumis depravata.
 - g) Vehemens *tussis hæmoptysin* quidem etiam efficere potest, sed non tam frequenter, uti vulgo creditur, & ubi omnino coniuncta adparet, est potissimum hæmoptysicos effectus.
 - h) Quibus tandem nonnulli adnumerant piscem illum venenatum, *leporem marinum*.
7. *Causla sputi cruenti* sunt
 - a) vel sanguinis *spissitudo*, vel *motuum desuetudo*, vel *erronea motuum exercitatio & applicatio*. Huc enim faciunt
 - b) *Varia animi* perturbationes, & errores, progressas namque hæmorrhagias excipientes. Maxime vero
 - c) *Sanguinis commotiones* qualescumque, præsertim ex cerevicia saturata, potu spirituoso, vinoso.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæmoptysis est adfectus maximæ considerationis, & ratione periculi, ob teneram pulmonum texturam, quæ sanguini copiosum adfluxum concedit, inter reliquas hæmorrhagias principatum tenet.
2. Hæmoptysis repente subsistens, adfectus pectoris suffocantes aut inflammantes & febriles post se trahit, *impetuosius* vero & e profundo pectoris erumpens, aut sæpius recurrens, phthisin producit funestam. Et
3. Licet sanguis non semper tanta quantitate profundatur, ut *presentanea mors* succedat, a remanente tamen cruore extrahato facile *putrefactio*, pulmonum exulceratio, & phthisis oritur. Præcipue
4. Quando fortiora *adstringentia* aut *premature repellentia* in paroxylmo adhibentur, tam *phthisis*, quam *hæctica* abdominalis producitur; phthisis quidem, a portione sanguinis per talem adstrictionem conclusa corrupta, & in ulcerationem deducta, hæctica autem abdominalis ob effectum, quem adstringentia prius in *venam portæ*, quam in pulmones exserunt. Vel
5. Hæmoptysis iterum repullulat, eo ipso autem periculum non minuit.
6. Hæmoptysis *periodica*, quando tussim aut dyspnœam suspectam non relinquit, est quidem periculi minoris, eiusdem tamen, quod ad curationem attinet, difficultatis.
7. A causis tandem *externis*, aut *vaporibus* corrosivis orta hæmoptysis, omnium periculosissima. Item
8. Morbis *chronicis* superueniens, plerumque funesta.
9. *Sputum cruentum* hac pectoris hæmorrhagia longe benignius est, & tantum periculum non inuoluit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus curandi.

1. Quando eruptio sanguinis non cum magno impetu & quantitate, verum moderate succedit, sufficiunt plerumque medicamina *orgasum* sanguinis temperantia; ex quibus *nitrum* cum *absorbente simplici*, interdum etiam *citrato* & *sinnabari* combiatum, omnibus palmam præripit.

2. Quan-

2. Quando maiora paullulum quantitate hæmoptysis erumpit: lene *anodynum* hisce temperantibus addatur; vbi *M. P. de cynoglossa* reliquis præfertur, dos. gr. j. vel ij. Electuarium femin. hyposc. alb. corall. rubr. & cascarilla etiam bono cum effectu dictis temperantibus miscentur.
3. In *effera* autem sanguinis *profusione*, & vbi temperantia non sufficiunt, *adstringentia*, urgente ita summa necessitate, in auxilium vocanda sunt, quibus tamen semper lene anodynum commixtum esse debet. Hic *crocus* ex minera martis solari paratus, tinctura corall. & de catechu, liquor mineræ martis, tinctura vitriol. martis, it. *crocus martis antimoniatu*s *adstringens*, qui e crassioribus scoriarum partibus paratur, adhiberi possunt e. g.

Recip. Croc. martis antimoniat. adstringent. scrup. j.

M. P. de cynogloss. gr. V. M. diuid. in 5. part.

Item *puluis sympatheticus Dygbei* præ aliis hæmorrhagiis, in hæmoptysi momentariam efficaciam habet. *Conf. cant. tabul. de hæmorrhagiis generatim.*

Item *species de hyacintho* a gr. VI. ad VIII. cum anodyno conueniente & cinnabar. iunctæ placidissimam sæpe sedationem operantur.

Tandem e numero *specificorum* passim laudantur ol. lini, verrica, centinodium, & bufo exliccatus.

4. *Reuulsio* & æqualis distributio sanguinis per totum corporis habitum respiciatur.
- a) Efficiunt hoc *diapnoica* temperata e. gr. *potiuncula diapnoica*, vel, si nihil febrilis concurrit, dosis *essent. alexipharmaca*.
- b) *Mixtura tonico-neruina* e salibus volat. & tinctur. alcalin. parata, effectum nonnumquam præsentaneum, cum primis paroxysmo repullulante, exhibet; quæ proinde in casu non adeo urgente cum temperantibus pulueribus combinata sufficere solet.
- c) *Reuellentia* etiam *externa* hio locum & vsum habent e. g. *ligatura, frictions, sinapismi* extremorum, *fotus calidi* manibus & inprimis plantis pedum adplicandi.
- d) *Venasectio* in brachio aut pede optimum quidem reuellendi

lendi effectum haberet, si confectaria abessent, quæ sub *cautelis* indicabuntur.

5. *Aluus* semper succedat, quod per præparata e tamarind. passul. minor. senna, rhabarb. cum cremore tartar. vel per clysteres lenientes obtinetur.
 6. In *declinatione* adfectus, præcipue quando tussis vel dyspnœa remanet, propinentur *pectoralia abstergentia*, ad restitantes forte grumolas in parte adfecta portiones resoluedas, & motum tonicum restaurandum.
 - a) Laudantur in hunc finem *flor. bellid. pratens. heder. terrestr. veronic. urtica min. scordium, salvia, charesfol. sanicul. menth. faracen.* &c. in forma decocti vsurpanda.
 - b) Item *sanguis hirci* exsiccatus, temperantibus pulueribus admiscendus.
 - c) item *lixinium* ex vncia oculorum cancri & libra vini paratum.
 - d) Pro scopo balsamico & consolidante vsus *myrrha, succini & turis* in forma electuar. non quidem reiecitimus, differentiam autem subiectorum & moderationem summam commendamus. *vid. cautel. 10.*
 7. Ad *vires* tandem refocillandas conducunt emulsiones, aut potiones ex aquis analepticis paratæ, maritatæ cum speciebus aut confectione de hyacintho, præsertim ex cinnamomo : coniuncto corporis & animi regimine tranquillo.
 8. In *sputo cruento* eadem curatio locum habet, quæ *tabula de suppressione hæmorrhagiæ* narium indicata est.
- B. Methodus præseruandi.**
1. Supprellio *fluxus menstrui* vel hæmorrhoidalis, si ansam huic malo dedit, reuocetur per prudentem methodum, suo loco commendatam.
 2. Speciatim applicatio *kirudinum* ad hæmorrhoidalia loca quam maxime commendetur iis, qui huius fluxus *molimina* vel *ipsas excretiones* vmquam habuerunt : hæmorrhoides enim legitime fluentes, hæmoptysin optime præoccupant.

3. Præcipue autem *vena sectio in pede* circa æquinoctia non prætermittatur, nec in aduuetis *scarificatio*.
4. Ad æqualem distributionem sanguinis conseruandam *efficax* quidem est *mixtura tonica polychresta Stahlii*, subinde propinata, efficacior autem *motus corporis placidus & perennans*.
5. *Laxationes* quoque moderatæ & repetitæ nonnumquam instituantur, præcipue quamprimum congestiones *versus pectus* obseruantur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quoniam natura in *haemoptysi* ita pertinaciter plerumque se gerit, ut e leuissimis causis occasionalibus hasce sanguinis excretionem repetat, tanto magis methodum præferuandam Medicus sibi habeat commendatam.
2. *In tempore venire & fluxum* repente suppressere, primum esse in haemoptysi, testantur quidem omnes auctores, *remedia* autem, quæ e penu sua in hunc finem proferrunt, maiorem saepius noxam, quam haemoptysis ipsa, inferunt.
3. Alii enim repentinam fluxus suppressionem per *adstringentia* commendant, sed quam grauiam damna per illa producant, sub *prognosticam* indicauimus.
4. Alii *opiata & vulgata narcoti* a promiscue adhibent, quo infelici autem effectu, experientia testatur.
5. Alii *vena sectionem* in ipso paroxysmo, nec sine ratione, commendant, inuoluit autem hoc consilium aliquas non minimi ponderis considerationes.
 - a) In *vigore* paroxysmi, praesertim in iunioribus succulentis, sine effectu instituitur, nisi sanguis copiose educatur, quod tamen, ob multam illius iam perpeffam iacturam, difficultate minime caret.
 - b) Adfectus facile repullulat; nam natura venae sectionem, ceu remedium ipsi exoptatum, denuo efflagitat, & *antecedentem* actum haemoptyseos cum *subsequente* venae sectionis saepius connectit, id est, haemoptysin suscitatur, sub spe securitatis venae sectionis.
6. Docent haec manifestissime, quod magis sit necessarium

motus natura praeoccupare, quam ad *pondus & mensuram materia* corrosivae, quae vulgo supponitur, animum advertere.

7. *Nitrum* in temperanda & coërcenda haemoptysi incredibilem saepissime efficaciam praestat, coniunctis *absorbentibus & cinnabarinis*; quoniam autem effectum non prius edit, quam post unius vel alterius horae spatium, in *effera* haemoptysi, ubi periculum est in mora, satisfacere non potest: quare in tali casu statim *subadstringentia* cum *anodynis* e. g. *Species de hyacintho & M. P. de cynaglossa*, vel fortiora *adstringentia* in subsidium simul vocanda, & cum pulveribus nitroso-temperantibus coniungenda sunt.
8. Quando haemoptysis *tussim* vel *dyspnoeam* relinquit, iusta suspicio subest, quod portiones congrumatae remanserint. Hinc tanto magis necessarium erit, remedia illa *pectoralia abstergentia* adhibere, quae sub *methodo in declinatione mali* commendata sunt.
9. Admodum notabile est, quod antiqui, quando haemoptyses mentionem faciunt, simul quoque *prognosin* phthiseos subsequuturæ adiciant; id quod *methodo illorum adstringenti* apprimè quadrat.
10. Caveatur, ne sub praetextu balsamicorum, vulnus consolidantium, *myrrha* vel alia *calida & concentrata*, quae sanguinem in maiorem orgasmum concitare possent, in haemoptyses paroxysmo adhibeantur.
11. Immo ne ipsae quidem *pilula Stabliana*, licet lenissimae, in usum trahendae sunt, nisi plethora per VSnem imminuta fuerit.
12. Absint tandem remedia valde *incrassantia*, consueta *refrigerantia*, & tussiculosas commotiones excitantia.
13. In *dieta* absint cibi aromatici, eligantur autem molliores & analeptici, multa digestionem non indigentes. Potus quoque sit dilutus, vitanda spirituosae.
14. Ante omnia *venus* exsulet, parum aegroti loquantur, & corporis atque animi tranquillitatem conferuent.
15. Conferantur *cautela*, quae *sabul. de haemorrhagiis generatim* traditae sunt.

DE

VOMITV CRVENTO.

I. DEFINITIO.

Vomitus cruentus est euacuatio sanguinis stricte dicti, plurimum grumosi, o vasis breuibus in ventriculum prius effusi, & deinde vomitu per motum ventriculi tonicum reiecti; qua via, licet incongrua, principium vitale portionem sanguinis, circa venam portae molesti, excernere, & reliquum illius cursum facilitare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. *Vomitus cruentus* quomodo ab *hemoptysi* discernendus sit, *Tabula* præcedente iam indicatum est.
2. Differt vomitus cruentus *ratione causarum*:
 - a) alius enim a causis *internis* sponte prouenit, & hic *stata tempora*, in primis vero *mensis* uel plerumque seruat, unde *periodicus* vocatur.
 - b) alius autem a causis *externis* & *violentis* producitur e. gr. *vomitibus*, *purgantibus* fortibus, *corrosiuis*.

III. SIGNA.

1. Præcedunt *angustie* & *anxietates* præcordiorum, cum tensionibus, & valde grauatis, suspiriosis pressionibus.
2. Præcipue spastica pathemata in *hypochondrio sinistro* per interualla insultant, quæ interdum cum vertigine, *lipothymia* & deliriis coniuncta sunt.
3. Succedit *nausea* & mox *conatus vomendi*, isque maior, quam qui simplicem vomitum respicit.
4. Tandem excutitur *verus sanguis*, plurimum copiosus atque congruatus, quem nonnumquam vomibunda reiectio ciborum antecedit.
5. Tempore intercedentis quietis *sensim* in stomachum colligi sentitur sanguis, qui deinde nouis succedentibus conatibus euacuatur.

6. Quo citius sanguis in ventriculum collectus, excernitur, eo clarior existit; quo diutius autem ibi moratur, eo spissior magisque nigricans, & cum frustis coagulatis eicitur: præcipue quando multæ aciditates in ventriculo contentæ iunt & sanguinem effusum per moram coagulant.

IV. SVBIECTA.

1. *Vomitus cruentus* omnium hæmorrhagarum species est rarissima.
2. Familiarior est *sexui feminino*, quam *virili*, præcipue feminis plethoricis, quæ sunt animi agilis, temperamenti *sanguineo-cholerici*.
3. *Puellis* iunioribus *rarius* euenit, quam illis *adultis*, quæ intra fluxus menstrui periodum adhuc constitutæ sunt.
4. Plurimum illis euenit, quæ fluxus mensium ataxia, aut completa suppressione laborant; item quibus menses *mature* cessarunt: Præcipue
5. Quando feminae plethoricæ post præmaturam mensium cessationem magnas *turbas* & impetus in *abdomine* experiuntur, tum vomitus cruentus non raro erumpere solet.
6. Cessantibus autem *iusto tempore* mensibus, vomitu cruento non facile mulieres corripuntur.
7. *Viri*, quando vomitu cruento corripuntur, sunt plerumque *hypochondriaci*, præcipue tales, quibus *hæmorrhoides* emanferunt, vel suppressi fuerunt, & postea *congestiones* spasticosque adfectus, imprimis autem *dolores* præcætes & pungentes in sinistro hypochondrio experti sunt.
8. Qui *vena sectionem* in pede adfectam intermiserunt, sæpe etiam vomitu cruento infestantur.
9. Quin & ipsæ *pregnantes* ex nitentibus retentis interdum adfliguntur tali vomitu, idque fere sine periculo. conf. *Etmüller*.
10. *Scorbutici* etiam vomitum cruentum nonnumquam incurrere obseruantur, post multas catarrhales adfectiones iam cessantes.
11. Sic etiam, qui *febre quartana* diu laborarunt, vomitum cruentum subinde experiuntur.

12. *Quibus ulcera antiqua consolidata fuerunt, vid. Etmüll.*
13. *Omnibus denique subiectis & cuius ætati, vomitus cruentus a causis violentis externis obtingere potest,*

V. CAUSSAE.

1. *Causa materialis remota est spissitudo sanguinis circa venam portæ, siue ab impeditis mensibus, siue hæmorrhoidibus, siue aliunde originem sumserit. Hinc vomitus cruentus a nonnullis fluxus menstruus aut hæmorrhoidalis ventriculo adpellatur.*
2. *Causa propior est sanguis hypochondriacus venæ portæ, speciali congestione e ramo mesenterico in ramum splenicum restrictus.*
3. *Causa proxima est disruptio aliqua in vasis brevibus.*
4. *Causa efficiens est principium vitale, a quibuscumque causis turbatum, & in hos erroneos motus concitatum; & hic quidem iracundia, item abusus potuum spirituosorum multum contribuere solet. conf. Forest. Libr. XVI. obser. 24. 25. vbi notatu digna exempla occurrunt.*
5. *Quod causæ simpliciter mechanicæ non iusticiant ad hoc negotium explicandum, elucescit præcipue ex illa vomitus cruenti specie, quæ certis periodis recurrit.*
6. *Causæ externa violentæ, procatarticæ, e. gr. vomitus vehemens arte excitatus &c. possunt quidem vomitui cruento animam dare, præcipue in plethoricis, sed longe minorem in illum habent potentiam, quam interna.*
7. *Cæterum quando angustia præcordiorum, vomitum cruentum comitantes, iam adsunt, facile per motum, potum, & animi pathemata adfectus exacerbatur.*

VI. PROGNOISIS.

1. *Vomitus cruentus periculo non vacat: licet enim sanguis tam copiose rarius eiiciatur, vt mors statim succedat, abicit tamen facile in consuetudinem, & tunc plerumque tabem in viris, cachexiam autem in feminis producit.*
2. *Celerius autem vitæ periculum minatur, si æνω και νέρω simul sanguis, & quidem floridus, reicitur. vid. Forest. loc. cit.*
3. *Reuellentia etiam externa in usum trahi possunt, licet mi-*

3. Si per vomitum non omnis in v entriculum effusus sanguis eiacularur, tum ibi stagnans facile abit in *putrefactionem*. Vnde talia symptomata proueniunt, quæ vix a *veneno adsumto* expectanda essent.
4. In iunioribus puellis, via semel trita, facilius repullulat, quam in annosioribus, in quibus minor est intentio *sanguinea* excretionis.
5. In sexu feminino licet *breuius*, quam in virili, duret vomitus cruentus; feminas tamen maiore plerumque impetu, quam viros, inuadit.
6. Apud feminas plerumque sponte iterum cessat, non idem apud viros; & in his circa *tempora æquinoctii* facile recrudescit.
7. Feminis, in primis iunioribus, minus periculosus est, quam viris. *Vbiq̃ue* tamen, quando insolescit, deterioris est consecutionis; præcipue si a caussis violentis primam originem duxerit, & per malam medicationem augmenta ceperit.
8. Sic enim vomitus cruentus *copiosissima eruptione* conspicuus, vel *adstringentium abusu* incongrue tractatus, œdemata, hydropem, hæticam, pathemata hypochondriaco-hysterica, immo spastico-conuulsua producit.
9. Vomitus cruentus in *feminis* facilius *periodis* adfuescit, quam in *viris*.
10. *Periodicus* autem non ita graniter quidem est periculosus, præcipue *mensium vicarius*, quam qui *vagus* est; vid *Forest. l. c, libr. XVI. obs. 25.* si tamen opprimitur, non vero simul iterum discutitur, sanguis *in lie-ne* restagnat.
11. Hanc stagnationem sequitur *stasis*, quam excipit *inflammatio lienis*, corruptio denique illius sanguinis & tandem *vomitus niger*, instar *rob sambuci*.
12. Sic in tali vomitu nigro euentus certissime est funestus, si *initium fuerit acutum, lentiore progressu*, hydrops: *medio modo* graues spasticorum moliminum exacerbationes subsequun-

sequantur. *conf. D. D. Stahl's theor. med. de vomitu cruento.*

- 12 Quantum denique animi commotio iracunda ad reuocandum vomitum cruentum valeat, experientia docet.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

Methodus in vomitu cruento eadem fere est, quam quæ in hæmoptysi, nempe

A. *In paroxysmo*

Sanguis congestus & circa hypochondria stagnans, discutendus, motusque tonicus ad æqualem tenorem reducendus est.

Faciatur hoc

1. *in malo leuiore*

- 1) pulueres nitrosi, absorbentes, cinnabarini, singulis circiter horis repetendi. Commendantur in hunc finem nitrum depuratum, conchæ præparatae, mater perlarum, ocul. cancr. præparat. cinnabaris antimoni, quibus sal digestiuum addi potest, v. gr. tart. vitriolat. nitrum antimoniatum.
- 2) His pulueribus accedat vsus *essent. millefol.* sed prouidus. *vid. cautel.*
- 3) Vel *essent. adianth. albi*, quæ herba eundem specificum effectum in pathematibus venæ portæ edere dicitur, ac millefolium.
- 4) Adhibeatur etiam, vel cum dictis essentiis miscatur tinct. tonico-neruina *Stahl. e. g.*

R. Spirit C. C. rectificat.

Tinct. tart. ana drachm. I.

Essent. millefol. drachm. II. M. dof. gutt. XXX. bis per diem.

2. Quando autem necessitas vrget, & excretio sanguinis pertinaciter continuat, prædictis medicamentis sociari debent *subadstringentia* & lenia *anodyna* e. g. spec. de *lycinth.* tinct. corall. immo corallia ipsa & margaritæ præparatae, tinct. *terra catechu*, tinct. martis aperit. *Ludovic. M. P. de cynoglossa.* item puluis cort. cascarill. eiusque tinctura, croc. mart. antimon. *Stahl's* lap. manati & dens Hippopotam. puluerifat.

minoris hic sunt efficacix, e. g. ligaturæ, frictiones, sinapismi extremorum, cucurbitularum adplicationes cum multa flamma ad furas, focus calidi, plantis pedum & manibus adplicandi. Item ventosarum adplicatio, pediluvia.

4. *Ani adstrictio* impediatur per *clysteres* lenientes, salino stimulo imbutos, aut alia leniora laxantia e. g. pilul. *Stabii*, aut pilul. contr. obstructions.
5. *Tonus ventriculi* est roborandus, e. g. per tinct. vitriol. mart. aperit. *Ludouici*, aut tinct. martis cydoniat. vel pomat. per succum cydoniorum, aliaque acidula.
6. Cæterum in paroxysmo quietata mentis & corporis continentia maxime prodest.

B. *Extra Paroxysmum.*

1. Ante omnia lene aliquod *laxans rhabarbarinum* cessante paroxysmo statim adhibeatur, quo satis mature euacuetur, si quid sanguinis congrumati in ventriculo restitet, e. g.

Recip. rhabarb. subtiliss. pulueris. drachm. j.

Ocul. cancri præparat. drachm. ij.

M. dosis drachma semis, post aliquot dies repetenda.

Si mauis, ordinentur vina laxantia ex rhabarbar. rad. helen. gent. rubr. rubix tinctor. herb. absinth. centaur. m. card. ben. flor. bellid. &c. parata.

2. Ad recursum paroxysmi præoccupandum, *venæsectio in pede* circa æquinoctia instituat, nec non, ad plethoram imminuendam, *scarificationes* in subiectis iisdem adfuetis spongiosis administrantur.
3. Mensium suppressio, si in causa fuerit, congrua methodo tollatur, nam mulieri, sanguinem vomenti, menstruis e-rumpentibus, mali sit solutio, dicit *Hippocrates*.
4. Vel si ab hæmorrhoidum obstructione malum originem sumferit, *hirudines* ad hæmorrhoidalica loca adplicentur: illæ enim, quando reuocantur, morbum soluunt. conf. *Ettmüller*.
5. Maxime autem attendatur, ne in reuocatione mensium aut

hæmorrhoidum *fortiora pellentia* adhibeantur, quia tum facile cruentus ille vomitus recrudescit.

6. Denique pro differentia subiectorum & craseos humorum viciatæ sanguinem & lympham corrigentia adhibeantur: Prodest hic egregie *inct. antimon. tartarizat.* item *essent. alexipharmaca Stahl.* præmissis & subiunctis conuenientibus laxantibus e. g. pilul. *Stahlii* aut *Becheri* correct.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Millefolium* siue in essentia siue in infuso vsurpatum, vti in aliis adfectibus, cum vena portæ connexionem habentibus, sicutiam in vomitu cruento specificam plane efficaciam exhibet. Est enim lenissimum adstringens. Cautus autem sit illius vsus, præcipue in viris, quia hic & a libi facile fit *nimum*.
2. Neque etiam vsus *millefolii* & *adanthi albi* locum habet, quando vomitus cruentus consueta fluxus *menstrui periodo* contingit, aut a suppressione *hæmorrhoidum* dependet.
3. Ad *positiue* adstringentia extra *necessitatis* casum non progrediendum, præsertim quando frustra sanguinis coagulata adhuc notabiliter reiciuntur. Nam sanguis in ventriculum restringitur, vt in putrefactionem abeat; reliquus autem adfluens circa lienem abit in stasim, & vtrinque grauissima symptomata producant *conf. prognos.*
4. Sunt quidem, qui e periculis, vsui adstringentium succedentibus, eluctantur, sed vix alii, quam *robusti*; quorum vegeta natura aduersus incongruum medicamen impetum facit; *sensibiles* autem spongiosi hydropem &c. macilentum hædicam incurrunt. *conf. prognos. num. 7.*
5. *Todica* externa, quæ vomitum sistendo grumorum euacuationem impediunt, & sanguinis putredinem, immo vehementes cardialgias, aliaque incommoda producant, sunt fugienda.
6. *Martialis*, exceptis leniter tonicis, prorsus abesse debent; item etiam *opiata*.
7. Abstinentum quoque est a remediis sanguinem commouentibus, acribus, vicissim etiam a refrigerantibus & crassius obuiscantibus.

8. Ante omnia cauendum a peruersa illa methodo, quæ hypochondriacis & hysteris, de cardialgiis & aliis spasticis circa ventriculum incommodis conquerentibus, *emetica* præscribit. Hac enim ratione vomitus cruentus non raro prouocatur.
9. Sic etiam in primo huius adfectus insultu, ad aluum expediendam *laxantia*, licet etiam sint lenissima, interne, & quidem in subiectis tenerioribus, non habent locum, ob sensibilitatem enim ventriculi, vel mox reuomuntur, vel sinistras commotiones efficiunt, propterea *clysteres* potius vsu veniant.
10. Qui semel vomitu cruento correpti fuerunt, caueant sibi per totam vitam a vomitoriis & purgantibus drastis, præcipue *aloëticis*, quæ in omnibus sanguinis eruptionibus suspecta sunt.
11. Hæc cautio speciatim obseruanda est, quando post paroxysmum menses vel hæmorrhoides reuocari debent, alias vomitus cruentus facile recrudesceat: hinc placidissima tantum & lenissima sunt eligenda.
12. Quæ tabula de *hæmoptysi* sub cautelis ratione diætæ dicta sunt, etiam in vomitu cruento notari debent.
13. Sic etiam cautelæ & obseruationes, tabula de *hæmorrhagiis* generatim traditæ, hic adplicari debent.

TABVLA X.

DE

MICTV CRVENTO.

I. DEFINITIO.

Mictus cruentus est euacuatio sanguinis sinceri per vias urinarias, a congestione illius ad vasa emulgentia in renibus facta, originem sumens, & ad plethoram imminuendam,

motumque sanguinis progressuum facilitandum, ab ipsa natura, licet erronee, instituta.

II. DIFFERENTIA.

Mictus cruentus est vel

1. *simplicis*, seu *spontaneus* ex renum *vasis emulgentibus* proveniens, de quo valet definitio; vel est
2. *calculosus*, seu *violens*, qui a *calculo renum* asperiore excitatur. Sed longe rarior hic est, quam vulgo creditur: innumeri enim fuerunt *nephritici*, qui calculos grandiores & asperos eliminarunt, sine vlllo tamen vestigio mictus cruenti. Et si omnino ille contingit, iusta semper subest suspicio, quod lithontripticorum vsus talem effectum produxerit.
3. Cæterum aliæ adhuc mictus cruenti *species* in *histor. morbor. Fratslaviens.* tom. I. pag. 283. indicantur quidem, e.g. ex *hemorrhoidibus vesicæ*, ex ipsa *vesicæ*, ex *varicibus*; sed hæc specialissimæ circumstantiæ specialissimum vsuum practicum non suppeditant.

III. SIGNA.

1. Mictus cruentus, quo magis spontaneus est, eo certius sine omnibus ferme incommodis, *tacite* quasi erumpere solet. Hinc signa *imminentis* huius hæmorrhagiæ non adeo certa sunt.
2. Quando autem omnino aliqua incommoda præcedunt, sunt illa sensationes *spasticæ* tantum *exiguæ*, quæ partim in lumbis, partim circa illa & inguina, interdum circa pæcinis regionem perferuntur.
3. Concurrit *torpor* totius corporis.
4. *Alus* strictura.
5. Quo magis autem vel a *calculo* aspero, renes lædente, vel a *sanguine coagulato*, in ductu obliquo vterum iuxta vesicæ introitum distendente, vel ab aliis *violentis* causis mictus cruentus excitatur, eo certius dolores sensibilissimi illum comitantur.
6. *Præsens* mictus cruentus dignoscitur, quando *sanguis floridus* cum vrina excernitur, & per temporis moram ad

tun-

fundum secedit, ipsa autem vrina breui post elara iterum supernatat.

7. Quando autem sanguis aliquamdiu iam iam versus hæc loca congestus fuit, tum in vreteribus, ob eiusmodi temporis moram, ita coagulatus est, ut cum vrina sub forma quasi *vermiculari* excernatur.
8. Vbi autem insignis *vrina salsedo* vel plane *exulceratio* siue in renibus, siue in vesica, siue in ipsa vrethra præsto est, ibi loco sinceræ sanguineæ admixtionis, turbulenta, iohorosa, subcruenta materia in vrina conspicitur, atque hic sanguis magis coagulatus sub *lumbricorum*, forma & calami scriptorii crassitie adparet, concurrente anxio & ardente dolore.
9. Sanguis ex *hæmorrhoidibus* nonnumquam proëniens suspicatur, si
 - a) *lapilli* autem non fuerunt excreti.
 - b) nec *vlla* vasorum *lesio* adparet.
 - c) æger vero de hæmorrhoidum *suppressione* tempore præfenti conqueritur.
 - d. insuper mictus cruentus *certas* etiam *periodos* seruat.

IV. SVBIËCTA.

1. Mictus cruentus *simplex* seu *spontaneus* est adfectus raro eueniens, & in primis familiaris est *senibus*, adhuc, vegetis & plethoricis, specialissime iis, qui iuuenili ætate multis *narium hæmorrhagiis* laborare consueti fuerunt.
2. Quod si vero in *iuuenili* aut *virili* ætate adfectus hic observatur, in causis *violentis* fundamentum atque origo querenda est.
3. Quamquam utriusque sexui sine peculiari prærogatiua communis esse videatur, *virilem* tamen magis, quam *femininum* sexum occupare, experientia docet.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens* est plethora.
2. Causa *propior* est sanguinis hæmorrhoidalis translatio, per errorem naturæ ad renes facta. Quamprimum enim hæmorrhoides supprimuntur, sanguis ex *ischiaidicis venis* ad *emulgentes*, vix duorum pollicum spatio ab illis distantes,

redundat. Sola hæc oppletio congestoria circa renes, vrinæ secretionem intercipientis, sufficiens causa mictus eruenti euadere potest.

3. Causa *proxima* est disruptio vasculi sanguinei in *renibus*, raro & non nisi a violentis causis in *vesica*.
4. Causa *efficiens* est principium vitale, quibuscumque incitamentis & præfigurationibus ad hosce erroneos motus inductum.
5. Causæ *externæ, violentæ & procatartica* sunt
 - 1) Abusus *diureticorum* calidorum e. g. balsam. sulphuris, olei succini, præcipue autem cantharidum.
 - 2) *Motus corporis succussatorius* & violentus e. g. equitatio diuturna & vehemens, lapsus vel ictus in regionem lumbarem.
 - 3) Non postremæ efficaciz est *abusus veneris* apud senes: nam conspiratio renum cum vasis spermaticis est efficacissima.
 - 4) *Excandescencia animi* &
 - 5) *Dieta spiritiuosa*, quæ sanguinem nimis agilem reddunt.
 - 6) *Exulceratio* & *calculus* renum.
 - 7) Consuetarum sanguinis *euacuationum* siue naturalium, siue artificialium omisio.

V. PROGNOSIS.

1. Effectus huius euacuationis nullus est veilis, quin præponderent incommoda, immo potius *pericula*.
2. Hoc enim malum, nisi maxime tempestiue iterum mitescat, & intentioni naturæ per ventilationem sanguinis satisfiat, admodum contumax est, & ad irregulares excessus inclinatur; ad quam contumaciam senilis ætatis indoles, tenaciter actionibus suis insistens, multum contribuit, immo facile in consuetudinem abit.
3. Qui in mictum eruentum deuoluuntur *senes*, vix diu post ea viuunt, nisi admodum commode & libere hic fluxus ipsis succedat. Sin secus, intra paucos annos ad vitæ suæ exitum perueniunt.
4. Interdum etiam hic fluxus ingens vitæ periculum minatur, si ex *anthematicis* morbis accedere solet.

5. In primis mictus cruentus iam iam *adsuetus*, repente tamen & *incongrue* plane cohibitus, *grauissima* producit symptomatica: sequuntur enim varii adfectus (*spastici, tabidi, tumores œdematosi, hydropici, febres acuta inflammatoriae viscerum*,
6. Immo sicut *hemorrhysis*, immediate per adstringentia suppressa, ulcerationes in *pulmonibus* relinquit: ita a mictu cruento, repente cohibito, facile tales exulcerationes in *renibus* exoriuntur.
7. Et tum loco sinceri sanguinis turbulenta & subcruenta materia per urinam excernitur, quæ per temporis moram consistentia admodum tenaci ad fundum secedit.
8. Quando autem & hæc excretio *supprimitur*, præto sunt grauiora, anxia, periculosa, lethalia parhemata.
9. Mictus cruentus, qui primum *violentus* fuit, tempore progrediente fieri potest *spontaneus*.
10. *Violentus*, a calculosa læsione dependens, in iunioribus longe securius, quam in annosis cohibetur.
11. *Hæmorrhoides vesicæ* tantum non inuoluunt periculi, quantum ab ipso mictu cruento, ex renibus aut vesicæ originem trahente, expectandum est.
12. Denique in hac hæmorrhagiæ specie maior sanguinis iactura citra vitæ periculum potest perferri, quam in aliis locis, in quibus vasa magis directe ad circulationem sanguinis contribuunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Ad *orgasum* sanguinis & nimiam illius agitationem contemperandam propinentur *nitrosa, absorbentia, cinnabarina*. Huc pertinet nitrum depur. mater perlar. ocul. cancr. conch. præparat. cinnabar. natua vel animonii.
2. Hæc si non sufficiunt, *blanda adstringentia* vel interponantur, vel commisceantur pulueribus temperantibus, modo indicatis.
 - 1) Hic omnibus aliis palmam præripit dulce illud adstringens nempe *vitriolum*, quod ex *minera martis Hassiaca* extractione cum aqua pluuiali & crystallifatione paratur.

- rur. Soluicur in aqua, & in hac forma liquida circiter drachm. II. pro doli propinantur.
- 2) Huc etiam pertinent alia mitiora adstringentia e.g. corallia, spec. de hyacintho, crocus martis aperitiuus *Zwölfferi*, croc. martis antimoniatus aperitiuus *Stahlii*.
 - 3) Paullulum fortius subadstringunt tinct. martis aperitiui. *Ludouici*, tinct. martis solaris, tinct. terræ catechu, trochisc. de carabæ, vt & tinct. opii *Longelotti*.
 - 4) *Specificè* laudari solent *succus urtica*, item decoctum *equiseti*, inprimis autem *radix asparagi* in forma thee vsurpanda.
3. *Aluus* semper aperta seruetur; cui scopo clysteres satisfaciunt, vel serum tamarindinum, vel etiam laxans quoddam rhabarbarinum, immo etiam pilulæ *Stahliaue*.
 4. *Æstus* cum dolore ardente continuans exposcit *emulsiones amygdalatas* temperantes, vel oleum amygdalarum dulcium, cum spermate ceti remixtum.
 5. *Decoctum nephriticum Foresti*, si a calculis malum dependet, locum quidem, sed effectum non adeo insignem habebit.
 6. Remedia illa, quæ alias *exulcerationi pulmonum* destinata sunt, e. g. herb. heder. terrestr. alchimill. pentaphyll. fanicul. vincæperuinæ, hyperici, præ ceteris autem *virga aurea Gesneri*, item gummi mastich. iunip. & medicamenta mucilaginosâ ex lacte & cremore hordei parata, vsurpari possunt, si malum a causa quadam *Violenta*. e. g. a cantharidibus, originem suam traxit. *Conf. cant. 9.*
 7. *Aequalis* tandem sanguinis distributio promoueat per iaterpositionem mixturæ tonico-neruinæ *Stahlii*
- B. *Extra paroxysmum.*
1. Post paroxysmum continentur *pulueres* temperantes, & *mixtura tonica*, ne malum recrudescat.
 2. Et quam primum opportunum tempus accedit, *venæsectio* præseruatorio-reuulsoria paullo largior in superioribus

ribus partibus, manu scilicet vel brachio, interdum etiam, quando alia non urget necessitas, in pede instituat, atque hæc in futurum sub prætextu sequi non facile prætermittatur.

3. Præterea, quando hæmorrhoidum vel mensium obstructio huic malo ansam dedit, horum fluxuum ratio habeatur per methodum, suo loco commendatam; qua occasione applicatio *hirudinum* ad hæmorrhoidalia loca in *viris* quam maxime commendatur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Si hæmorrhoides, secundum *Hippocratis* observationem, *nephriticis* sunt salutares, salutares etiam esse debent iis, qui *mictu cruento* laborant.
2. Tanta est conspiratio mictus cruenti & mali podagræ cum hæmorrhoidibus, præcipue *externis*, ut mictus cruentus hæmorrhoides suppressas in nonnullis mox excipere soleat; quæ observatio, ad effectus hosce legitime tractandos, eximiam habet utilitatem.
3. *Anodyna* in adfectibus *renum* & *lumborum* incommodum profusè edunt effectum; nam *effluxum* supprimunt, *adfluxum* autem non intercipiunt. Unde ægri in grauia pathemata abdominis coniciuntur, quæ prius non cessant, quam mictus cruentus cum nouo impetu erumpit.
4. In casu tamen *effero*, si omnino anodynum aliquod necessarium iudicatur, *M. P.* de cynoglossa reliquis præferenda, & cum pulueribus temperantibus commiscenda est.
5. In mictu cruento *pertinaci* herba *equiseti* aliquem effectum præstat, in casu autem *mitiore*, quia adstringens est, ab illa abstinendum est.
6. *Hedera* autem *terrestris* in lentiore tantum paroxysmo locum habet, & quidem vsu successiuo.
7. *Cherifolium*, in copia adsumtum, aliquid præstat, alias iners. Pariter tamen *urgente* paroxysmo non exhibeatur, sed tantum *leuiore*.
8. *Schenckius* commendat *millefolium flore albo*.
9. Porro commendantur quidem specificè *succus urticae minoris* recens, *virga aurea* *Gesneri*, *pentapbyll.* sed hæc omnia

- ad summam rei nihil faciunt, nisi intentioni naturæ satisfiat per sanguinis ventilationem.
10. Circumspectione opus est, ne hæmorrhagia hæc per *adstringentia* repente supprimatur, alias *phthisis renalis* cum spasticis pathematibus producitur, vti sub *prognosi* iam diximus.
 11. *Etmüllerus* & alii mictum cruentum *criticum*, eumque salutarem, obseruarunt, quo quidem in casu ipsa ratio dicitur, quod talis hæmorrhagia minime omnium immediate sistenda sit.
 12. Causæ *occasionales*, finita curatione admodum sollicitè euitentur, quia *leuissima* etiam hunc adfectum reuocare possunt, præcipue caueatur ab iracundia, vsu vini & vneris.
 13. Præstat *chysteribus* alium expeditam seruare, quam naturam vel leuissimis stimulis laxantibus turbare. Hinc ipsi ad eo pilulis polychrestis possumus supersedere,
 14. *Topica*, quæ ordinarie commendantur e. g. *unguent. Commissæ, infrig. Galeni* &c. formam magis, quam effectum exhibent.
 15. *Balsama acriora*, e. g. *Augustanum* & alia, quæ vulgo ad consolidandum vulnus præscribuntur, plane reiicienda sunt, quia orgasmum sanguinis iam præsentem augent, & malum exasperant.
 16. *Dietæ* sit moderata, non aromatica, nec spirituosæ; *motus* autem corporis modestus.

TABVLA XI.

DE

HAEMORRHOIDIBVS INTERNIS
ORDINATIS ET NIMIIS.I. DEFINITIO. *Voi Polin*

Hæmorrhoides sunt euacuationes sanguinis e vasis hæmorrhoidalibus, siue *internis*, circa profunditatem intestini recti, siue

sive *externis*, versus orificium illius, a natura ipsa, per motum tonicco-spasticum, eum in finem instituta, ut plethora imminuatur, impeditus sanguinis circa venam portæ progressus promoueatur, & reliqua graua incommoda, quæ circa illam ab huiusmodi contentionibus resultatura essent, præoccupentur. Deriuatur ab *αἷμα*, sanguis, & *ῥίω*, fluo,

II. DIFFERENTIA.

Quamquam mutua sit *conspiratio* externarum hæmorrhoidum cum ipsis internis, merito tamen a se inuicem distinguuntur: in iplo enim fluxu euidentis veritas huius conspirationis non æque se exlerit. Hinc hæmorrhoides sunt vel

1. *Internæ*, vbi sanguis e ramis *hæmorrhoidalibus* venæ portæ profundius in intestinum rectum effunditur, & deinde cum fecibus aluinis eliminatur. Has iterum distinguimus in

1) *Ordinatas* seu legitime & moderate succedentes, corporis constitutioni & reliquis circumstantiis proportionatis respondentes, & sine insignibus molestiis fluentes, & in

2) *Nimias*, quæ vel nimis frequenter recurrunt, vel nimis copiose prodeunt, vel per plures hebdomadas & menses, immo nonnumquam annos continuant. Vel

2. *Externæ*, quæ e ramis *iliacis* venæ cauæ originem sumunt, & circa orificium intestini recti cum expressione scybalarum induratorum sese manifestant.

3. De internis, quæ *fluentes* etiam dicuntur, hoc loco, de externis autem *tabula sequente* agetur.

4. Distinguuntur porro hæmorrhoides in

1) *Periodicas*, quæ stata tempora, siue menstrua, siue æquinodialia, siue anniuersaria &c. obseruant. Sic notus est vir, qui per plures annos die cuiusuis mensis decimo octauo præcise hæmorrhoides experitur, licet menses numero dierum impares sint. Et in

2) *Vagas*, quæ sine ordine vel rarius vel sæpius recurrunt.

5. Hæmorrhoides etiam distinguendæ sunt a copiosis illis euacuationibus sanguinis, quas Germani Blut-*Entschung*

gen vocant, & quæ post longos adfectus hypochondriacos sine præuia scybalorum excretionem cum impetu erumpunt, atque sine dubio e superioribus intestinis oriuntur.

II. SIGNA.

A. Imminentium.

1. Antecedunt in plurimis subiectis motus congestorii & dolores tensiui, vibratiui, magis vel minus spastici, circa loca venæ portæ connexa, nempe circa ventriculum, mesenterium, lienem, hepar & intestina, item circa hypochondria, os sacrum & lumbos.
2. Hi motus acerbiores obseruantur, quando hæmorrhoides difficilius erumpunt, & tunc ægroti percipiunt sensum aliquem circa exitum intestini recti, æsi nucleus durus, vel pinea aut cornus ibi hæreat; & quo magis *introrsum* hic sensus percipitur, eo difficilius hæmorrhoides perueniunt ad eruptionem.
3. Interdum etiam admodum leniter & tacite procedunt, & cum moderato *tenesmo* exeunt. Sed talia exempla, quibus hæmorrhoides sine villo sensu molesto aut cum mediocri tantum perumpunt, sunt pauciora.

B. Præsentium & moderate fluentium.

1. Excretio sanguinis non obtingit spontaneo & perpetuo successu, sed expectat semper pressionem sub exoneratione alui contingentem; vbi primum *scybalæ*, plerumque *duriora*, eliminantur, quibus deinde *sanguis* ipse, durantibus adhuc vacuis illis conatibus egerendi, sine villo sensu molesto succedit.
2. In nonnullis subiectis excrementa *struis sanguineis* mixta deprehenduntur.
3. Sanguis, qui excernitur, est plurimum *floridus* & rubicundus, in illis nempe, quibus hæmorrhoides libere & frequenter fluunt.
4. *Spissus* autem & nigricans est sanguis, quando fluxus raro reuertitur, & impeditur succedit.
5. Atque in his circumstantiis *facies* e flauo viridescens conspicua est, secundum *Foresti* obseruationem. Et

6. Cum *urina* crassa sedimentum rosei coloris, nonnumquam etiam tartaream concretionem exhibens, excernitur.

C. *Nimiarium*,

1. Quando *tempore* peccant, & solito *maturius* in ætate minime conueniente se offerunt, intemperantis indolis deprehenduntur.
2. Quando *promte* reuertuntur, ita vt singulis fere hebdomadis ægros inuadant.
3. Quando *nimis diu* continuant, ita vt per aliquot hebdomadas hic fluxus pertinaciter duret.
4. Quando *quantitatem & mensuram* tolerabilem egrediuntur, & singulis deiectionibus tam largiter prodeunt, vt ægri vires notabiliter exhauriantur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Hæmorrhoides eueniunt quidem *sexui utrique*, cum euidente tamen masculini præ feminino prærogatiua, quam paucis hic adlegare licet.
 - 1) Tanta multitudo feminarum, quam virorum, non obseruatur, quibus hæc excretio obtingit.
 - 2) Neque adeo exquisitam temporis mensuram & statos atque ordinatos successus in feminis seruat, vt in viris.
 - 3) Neque æque sæpe aut copiose in iis emicat.
 - 4) Neque pari leuamine & certa *πρὸς φύλαξες*; dum in feminis promptior indoles est ad translationes & vaga molimina.
2. Omnibus fere sine discrimine *temperamentis*, præcipue autem sanguineo-cholericis, aut sanguineo-melancholico.
3. *Ætati* plerumque *consistenti*, virili nempe & senili, immo & summæ senectuti proximæ.
4. Feminis, quæ præmaturam mensium cessationem aut partum difficilem experiuntur.
5. Viri, qui ætate adolescentili narium hæmorrhagias, postea vero congestiones in pectore & adfectus hypochondriacos habuerunt, accedente virili ætate, si temperamentum simul conspiret, accipiunt hæmorrhoides fluentes.
6. Quando autem *iunioribus* hæmorrhoides fluunt, subest potilli-

tilimum hæreditaria dispositio, quæ plerumque ad excedentem fluxum in his subiectis ansam præbet

7. Hæmorrhoidum fluxum facile etiam experiuntur homines valde *plethorici*, qui per externas violentas causas plethoram commouerunt, ut sequentibus temporibus, aperta semel ad exitum porta, non solum intentior inclinatio ad hoc genus euacuationis, sed etiam continuatio & repetitio eiusdem sequatur.

V. CAUSSAE.

A. Interna.

1. Causa efficiens est naturæ ad exonerandum intentio.
2. Causa materialis est *plethora*. & quidem insigniter commota, præcipue in temperamentis modo indicatis.
3. *Hæreditaria* dispositio, quæ non modo *certam*, sed etiam *acutam, præmaturam & abundantem* commotionem & excretionem adfert.
4. *Spissitudo* sanguinis sæpissime, rarius autem nimia *tenuitas*, contra communem sententiam, quæ tenuitatem & acrimoniam semper adcurat.
5. Causæ absolutæ non suppetunt, cur excretio sanguinis per hæc specialia loca excernatur, nisi fortan e connexionne *genitali* aliquid eliciendum sit.

B. Externa, occasionales & procatarctica.

1. Violentæ abdominis concussiones, e. g. equitatio diuturna præter consuetudinem, celerior cursitatio vsque ad sensum inflationis illius dolorificæ in sinistro hypochondrio. quæ a splene dependet.
2. Nisus fortior in partu, & incubitus vteri prægnantis in intestinum rectum.
3. Vita sedentaria, otiosa, vbi compresso sæpius abdomine motus sanguinis circa venam portæ impeditur.
4. Euacuationum sanguinis naturalium & artificialium consuetarum prætermisio.
5. Incondita remedia, per quæ ordinatus hæmorrhoidum fluxus impeditur & offenditur, ut nimius exinde oriatur.

6. Tempeſtas calida.
7. Abuſus potuum ſpirituoſorum, aromatatum, aloëticorum, helleborinorum & aliorum calidorum: vnde hæmorrhoides in Saxonia inferiore admodum familiares, ob vſum elixir. propriet. vti in Hungaria ob alii abuſum.
8. Pertinaces alui obſtructiones a grauioribus torminibus colicis exortæ.
9. Refrigerationes diuturnæ & frequentes.
10. Animi inſignes commotiones, in primis autem ſuppreſſa iracundia & terror.
11. Adſuetudo etiam in ætate his excretionibus conueniente, aut apræcedentibus ætatibus continuata, hic maioris eſt efficaciæ, quam in aliis hæmorrhagiis.
12. Infectio venerca magis ad hæmorrhoidum coccarum cauſas referenda eſt.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæmorrhoides in idoneis, peculiariter ad illas prædiſpoſitis, ſubiectis facile ordinate & moderate fluentes, ſunt beneficium naturæ, in comparatione damnorum, exinde metuendorum, ſi talis excretio non procedat, & *tamen interim diſpoſitio ad eamdem maneat.*
2. Præcipue autem vniuerſam ſcenam mali hypochondriaci claudunt.
3. *Hippocrates* iam obſeruauit, quod hæmorrhoides inſanientibus ſuperuenientes, delirium ſoluant. *Aphor. 21. Sect. VI.*
4. Soluunt etiam non raro adfectus pertinaces arthriticos, nempe malum iſchiadicum, gonagram, podagram.
5. *Excedentes* autem omnem illam ſalubritatem deſtruunt, quæ in ſto ſucceſſu ſperanda eſſet.
6. Non facile enim illam excedendi in quantitate, prompta reuerſione, & pertinaci continuatione *ἀταξίαν* amittunt, hinc interdum tam refractariæ ſunt, vt omnem fere medicationem eludant.
7. Inter ea fluxus hæmorrhoidalis non facile tanta copia e-

- rumpit, vt præceps vitæ iactura inde metuenda fit. Conferantur exempla notatu dignissima a D. D. *Stahlio theoria medica pag. 754. seqq.* commemorata.
8. Hic ipse fluxus tamen, si nimis diu continuat & nimis frequenter recurrit, vires prostermit & successu temporis cachexiam producere valet.
 9. Quando autem hæmorrhoides, siue legitime siue ad excessum fluentes, supprimuntur, longe grauiora pathemata immo vitæ pericula succedunt.
 10. Nempe viscerum infarctus, scirrhi, inflammationes, colica, melancholia, mania, vomitus cruentus, catarrhi suffocatiui, apoplexia, hydrops, icterus flauus & niger, vniuersus mali hypochondriaci apparatus, asthmatica pectoris afflictio, tussis humida, & plura alia mala.
 11. Transeunt etiam facile hæmorrhoides *internæ* suppressæ in motus hæmorrhoidum *externarum*.
 12. Et quando etiam tales turbantur, succedit malum ischiadicum, gonagra, podagra, mictus cruentus, calculus, dysuria, tumor scroti. Vid. *tab. sequens*.
 13. Motus hæmorrhoidales *transfugi* & *titubantes* non solum incommodi sunt, sed etiam successu temporis periculum minantur: nam nihil *constantis* per illos agitur, sed ab vno tentamine ad alterum fit transitus, inter ea vires consumuntur, & motus hosce colicos tandem *paralyfes* excipiunt.
 14. Quibus valde iunioribus hæmorrhoides eueniunt, iugiter etiam continuant, & vt plerumque fit, minus moderate succedunt: illi raro insigne senium attingere solent. Apud tales enim constantiam non facile seruant, sed cessant iterum, & tum trahunt post se coniuncta pathemata grauiora.
 15. Contra vero, quibus iam annosioribus hæmorrhoides perueniunt, moderatis etiam & ordinatis successibus progrediuntur: his familiariter longam vitam pollicentur.
 16. Hæmorrhoides quando *re vera nimia* sunt, & continuo

fere fluunt, labes visceris alicuius in abdomine, siue fūr-
rhosa, siue vlcerosā sit, est meruenda.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In moribus tantum hæmorrhoidalibus.

1. Quando hæmorrhoides numquam fluxerunt, & tamen molimina ad easdem vrgent, promotio illarum promissue non commendatur: nam dubius semper est successus, & quando omnino fluxus obtinetur, in paucioribus tamen ad votum succedit, & tum vniuersa fontica congestaria inuoluit.
2. Vbi itaque ratione habitus corporis & temperamenti de felici hæmorrhoidum successu dubitandum est, ibi adfluxus repellatur per venæ sectionem in brachio, & pressio circa has partes relaxetur per *tonico-dyscutientia*, & per infusum *millefolii* vel *adianthi albi*.
3. Vt autem intentioni naturæ omnino satis fiat, venæ sectio circa æquinoctia repetatur, vel assiduus & continuus labor ægro imponatur.
4. Si vero hæmorrhoides aliquoties iam fluxerunt, molimina earum conueniente ratione promouenda sunt. Fit hoc commodissime
 - 1) *Interne*: per pilulas *Becheri* polychrest. per pilulas balsamicas *Stahlii*, per modestum vsu elixir. propriet. per essent. hellebor. nigr. e resinoso extracto cum spiritu vini paratam.
 - 2) *Externe*: per *hirudinum* adplicationem, per tempestivam sectionem venæ *popilitis* aut *malleorum*, qua sane rebellibus & dolorificis istis pathematibus feliciter sæpe occurritur.

B. In ipso hæmorrhoidum fluxu.

1. Hæmorrhoides *legitime* fluentes non indigent medicatiōne, sed conueniente tantum regimine & diætā; abstrahendo a cibis flatulentis & obstruentibus; item a potu spirituoso. Alius bene succedat, exulent animi commotiones.
2. Si vero *impedite* fluunt, promoueantur eadem methodo, quæ *tab. de suppressione hæmorrhoidum* indicata est.

3. Vbi autem hæmorrhoides *re vera nimia* adsunt, & ægrotantis vires per illas notabiliter exhauriuntur, sequente methodo illis commodissime succurritur:

a) *Sub ipso fluxu.*

- 1) Temperantia nitrosa & cinnabarina exhibentur.
- 2) Quæ si non sufficere videntur, coniungitur mixtura tonico-neruina *Stahlii* ad gutt. XXX. ter per diem propinanda.
- 3) Virgente autem necessitate lenia *anodyna* pulueribus temperantibus immiscetur, e. g. gr. I. M. P. de cynoglossa.
- 4) Clysteres salutariter adhibentur.
- 5) Pilulæ *Stahlianæ* & *Becheri* genuinæ fluxum nimium, nondum adeo inueteratum, egregie moderantur.
- 6) Denique etiam hoc præstant *specificæ*, circumspècto vsu propinata, quorum facile princeps est *millesolium*, vel *adanthum album*, in decocti vel essentia forma adhibendum. *Vid. cautel.*

b) *Extra paroxysmum.*

- 1) Tempestiuæ venæ sectiones circa æquinoctia quam maxime commendantur: nam ab onere si natura leuata est, minore postea labore opus habet ad fluxum reuocandum; hinc etiam eo citius ab hac excretionem desistit.
- 2) Exhibeantur nonnumquam *lenissima laxantia*, in primis rhabarbarina, quæ biliosam acrimoniam abstergunt, quæque etiam, modeste adhibita, in ipso paroxysmo vsu habere possunt, tenesmum enim & nisum expressorium mitigant.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Frequens est *fluxus* hæmorrhoidalis, frequentior *nisus* sine plenario successu, frequentissimus autem *motus longinquus*, seu molimina in partibus remotis, nempe splenico-cólico-hypochondriaca pathemata.
2. Hinc summæ considerationis negotium est, *motus* hæmorrhoidales in iis promouere, qui ad fluxum talem ob habitum corporis minus dispositi sunt.

3. Sanguis hæmorrhoidalis æque bonus, ac reliquus venarum, nisi quod mora quadam in vena portae spiffescat. Leges etiam circulationis talem sanguinis boni a malo selectum non concedunt, vt plerumque speculationibus hoc negotium figuratur.
4. *Specifica* quando in nimio hæmorrhoidum fluxu adhibentur, cauendum est, ne quid fiat *nimis*.
5. Traditiones enim illae, quasi temperare solum modo, non vero penitus supprimere fluxum liceret, cum grano salis accipiendæ sunt: nam longe facilius completa & pertinax suppressio, quam moderamen eiusdem obtinetur.
6. Notum enim satis est, quid *millefolium* in sistendis hæmorrhoidibus possit; sic etiam reliqua *specifica*, e.g. dens hippopot. lap. manat. priapus ceti, citius sæpe fluxum cohibent, quam expedit.
7. Huc etiam pertinet *mus marinus*, & *Helmontii amuleticum* remedium, nempe *buso* exsiccatu, eadem cautione adhibendus.
8. *Adstringentia* hic multo magis excludenda sunt: nam pauca quantitate propinata, fluxum potius augent; si vero tanta copia ingeruntur, vt cohibitionem producant, sequuntur omnia illa pathemata, quae sub *prognosi* indicata sunt. Conf. etiam *tabula de suppressione hæmorrhoidum*.
9. *Martialium* decantatus vltus solidam vtilitatem non praestat: pleraque enim agunt *adstringendo*. Praemissis autem praemittendis, *unct. martis Ludouici*, placide continuata, vsui esse potest.
10. Optandum sane, vt hæmorrhoides *suppressæ*, praesertim si iam *ascit. cum* aut *hecticum* quid successit, tam certo & cito reuocari, quam *fluentes* per talia *specificæ* & *adstringentiæ* supprimi possent.
11. *Acidularum* vsus numquam suadendus est, nisi spongiosis sanguineis. Insuper hoc habet incommodi, vt leuamen; si aliquod forte adferat, vix ad annum perduret, & si non repetatur, grauiora adhuc symptomata producat.
12. *Mixtura tonico zcruina*, e sale volatili & tinctura alcalina parata, fluxum *nsmium* intra paucissimum profecto tem-

- poris spatium *imminuere*, immo *sedare* solet, si quotidie ter vel quater ad gutt. XXX-XL. exhibetur.
13. In hæmorrhoidibus longo interuallo reuertentibus, in primis si exitus sit impeditior, apud robustos & sanos *urina* crassum sedimentum rosei coloris exhibet, apud sensibiles autem, qui dolores grauius & tenuius circa lumbos & os sacrum habent, in *urinae* emissionem crassa in fundo deponuntur granula, fibuli instar, saturato tamen rufo colore conspicua, & quoniam in arthriticis adfectibus eadem granula in *urina* excernuntur, hæc obseruatio ad distinctionem non solum horum adfectuum inseruire, verum etiam illorum cognationem indicare potest.
14. Quoniam intestinum *rectum* sub motibus hæmorrhoidalibus notabiliter adficitur, & intestinum *colon* de hisce motibus per consensum participat: oritur inde *colica hæmorrhoidalis*, Hippocrati *ileon hæmatides* dicta. Quod adeo verum est, vt vix vniquam tormina durabilia colica (præter causas externas) vlli homini eueniant, nisi quæ ad motus hæmorrhoidales tendant.
15. Idem sentiendum est de connexionione *rami splenici*. Vnde in motibus hæmorrhoidalibus non solum *splen* adnexum, verum etiam per & propter vasa breuia, ipse ventriculus simul adficitur.
16. Motibus hæmorrhoidalibus iungunt se plerumque *nephritici adfectus*. Vnde multi hæmorrhoidarii obseruantur simul calculosi. Et vice versa, qui nephriticis adfectibus, immo ipso calculo *renum* torquentur, ad hæmorrhoides procliuus sunt.
17. Quibus hæmorrhoides *raro*, præcipue *extra* vernum & autumnale tempus accidunt, illis plerumque tumultuose & minus ordiuate succedunt.
18. *Motus* hæmorrhoidales, quo magis se exerunt in regione *hepatis, splenis, ventriculi* & superiorum intestinorum, eo pertinacius quidem durant, finem autem excretionis sanguinis difficilius attingunt.

19. Si vero circa *mesenterium* & inferiora intestina motus obtingunt, doloribus nempe grauatiuis per longitudinem ossis sacri &c. tum maior spes est de sanguinis eruptione.
20. Motus hæmorrhoidales *interni* per calida diaphoretica & regimina facile in motus externos transeunt. Hinc adfectus *podagrici*, & in feminis *epileptici*, non raro succedunt.
21. Pari ratione motus *externi* in *internos* transmigrant, e. g. per incongrua topica. Vnde palindromæ deducendæ sunt, quæ *podagricis* obtingunt, vt, stupefactis scilicet externis doloribus, præsentissime internas angustias, cardiacas, vomitus, phlogoses & inflammationes ventriculi incurrant.

TABVLA XII.

DE

HÆMORRHOIDIBVS EXTERNIS
ET CAECIS.

I. DEFINITIO.

Hæmorrhoides externæ sunt motus ad fluxum hæmorrhoidalem quidem tendentes, & sanguinis abundantis depletionem respicientes, loco autem legitimæ eruptionis, quæ rarior est, cæcis solum conaminibus infarctus vasorum hæmorrhoidalium externorum circa orificium intestini recti generantes, & modo turgidam inflationem, modo tumorem inflammatorium inuoluentes. Deriuatur ab *αἷμα*, sanguis & *ῥέω*, fluo.

II. DIFFRENTIA.

- I. Hæmorrhoides externæ non tam pro noua, quam potius anomala specie hæmorrhoidum agnoscendæ sunt, eoque ipso ab *internis* differunt
- 2) Ratione *vasorum*, ex quibus originem sumunt. Nam in-

ternæ e *vena porta*, externæ autem e *vena caua* proueniunt. *Vid. tab. de hemorrhoid. internis.*

- 2) Ratione *mensurae & modi* excretionis. *Interne* enim, præcipue *statae*, plerumque moderata sanguinis quantitate fluunt, & si turbantur, ad multam quoque profusionem excedunt; *externæ* vero, ob vasa minutiora, quantitate vix aestimanda conspicuae sunt, & sæpissime per vesicalem tantum extuberationem vel tumorem inflammatorium, rarissime autem per genuinum sanguinis stillicidium sese manifestant.
 - 3) Ratione *temporis & periodorum*. *Interna* statas magis periodos, & non raro menstruum cursum obseruant; *externæ* rariores habent periodos, & circa vernum vel autumnale tempus potissimum proueniunt. Repullulant vero promptius & plus sanguinis emittunt, quando vesicula aliquoties enata est.
2. Quamquam autem minime negari possit, hæmorrhoides cæcas interdum a motibus *internarum impeditarum* oriri: sæpissime tamen *externa* ob difficilem eruptionem in cæcas transeunt.
3. Sunt hæmorrhoides *caca* aliae *turgentés*, aliae *tumentes*: hæc *dolentes*; illæ *indolentes* vocantur.
- 1) *Turgentés* referunt circa extremum ambitum orificii ani vesiculam mollem, translucidam, atro-rubente sanguine plenam, sine notabili dolore aut vlllo insigni sensu stipatam: nisi quod sub alui excretionem sensus quidam premens, quasi faba aut pruni nucleus ibi hæreat, percipiatur, & ardor quidam alternatim occurrat.
 - 2) *Tumentes* paullo *profundius* intra limbum delitescunt. Hinc quando sermo est de hæmorrhoidibus *cæcis*, hæc *tumentes* plerumque putantur, & κατ' ἐξοχὴν *caca* vel *clausa, oclusa* vocantur. Exhibent tumorem durum inflammatorium, atque hinc nihil aliud sunt, quam verus *furunculus*, & propter sensibilitatem tunicae nerueae & musculosae intestini recti exquisitissimos dolores

lores ardentcs, lancinantes, vellicantes & pulsui rcspondentes producant.

4. Huc etiam a nonnullis referuntur reliqua fungosa tubera, & vlcerantes excrescentiæ, quæ circa anum contingere solent. Vulgo dicuntur hæmorrhoides *notha* seu *spuria*, quæ plerumque quidem a contagio venereo oriuntur, interdum autem sine hoc præveniunt, nempe in corporibus vel vlcerosâ serositate adfectis, vel a *surgentibus* diutius & pertinaciter continuantibus, atque in verrucosam consistentiam siccescentibus. Variè nominantur, nempe thymus, ficus ani, marisei, rhagades, condylomata, formicæ, verrucæ, clauiani, sycosis, germ. Feig. W. r. ken, Mastfôrner, Zacken, Belg. Zacken.
5. Possunt tamen *venerea* exulcerationes in hoc loco facile distinguî ab vlcerationibus *hæmorrhoidalibus*: illæ enim exhibent *crustam*, hæc autem *foramina*.
6. Referri etiam huc potest *serpigo hæmorrhoidalis*, quæ generatim *pruritus ani* dicitur. Et hæc serpiginosa vlceratione exprimitur per intervalla humiditas tenuis, limpida, mucilaginosâ & flavescens, quæ sudor hæmorrhoidalis solet adpellari. *Vid. prognosis & tabula chirurgica de vlceribus serpiginosis.*
7. Variant extuberationes hæmorrhoidales secundum *magnitudinem*: quædam enim ad nucis auellanae, quædam ad iuglandis, quædam ad minoris oui molem accedunt.
8. Distinguuntur etiam ratione *figuræ*, quam sub varia extuberandi forma exhibent,
 - 1) In *morales*, quando fructus mori similitudinem *representant*.
 - 2) *Vuales*, si velut acini vuae liuidæ *supereminent*.
 - 3) *Vesicales*, quando venulæ, ambitum orificii ani coronantes, inflatæ & insigniter *dilatata sunt*.
 - 4) *Verrucosâs*, quando tubercula vesiculosa exsiccant, & in duriora rugosa schemata transeunt.

III. SIGNA.

Hæc ex illis, quæ sub *differentia* dicta sunt, desumuntur, nempe

1. *Externa simplices* quando omnino proueniunt, *stillicidio* magis, quam *fluxu* se se manifestant, & quidem continuo fere, extra tempus alui n̄ excretionis, quam hæmorrhoides *interna* semper expectant.
2. *Caca surgentes* circa orificium ani *vesiculam* exhibent mollem, quæ per cuticulam tenuem colore sanguinis nigro-purpureo translucet & dolorem vix sensibilem infert.
3. Hæc vesicula vel sponte natura, vel scilpando, propter pruricum ei familiarem, vel sectione aperitur, & tum non solum sanguinem, quem continet, fundit, sed etiam plus eius suppeditare continuat, & quidem sub alui depositione, dum voluntaria pressio & conuulsus hanc manationem promouet.
4. *Tenesmodes* enim irritatio sæpissime cum hæmorrhoidibus externis concurrit.
5. *Caca tumentes*, quæ etiam *clausa* seu *occlusa* vocantur, altius introrsum hærent, nec facile exitum obtinent; sed referunt tumorem *inflammatorium*, doloribus acutissimis, stringentibus, tendentibus, lancinantibus, ardentibus, gangraenodeis constipatum, ita vt aegri non facile decumbere, sedere aut incedere queant, sed quocumque se vertant, maximos cruciatus experiantur.
6. Molimina harum hæmorrhoidum *longinqua* obsident dorsum, coxendices, femora, crura, pedes, immo suas palindromas facile sumunt ad organa cum vena portae coherencia, atque hic adparatum motuum hypochondriaco-hæmorrhoidalium multis doloribus torminosis, splenicis, hepaticis per mesenterium, & interdum per totum abdomen fauientibus, ostendunt.
7. *Aluius* sub his doloribus plerumque est *clausa*; quæ si liberatur & exprimitur, præsentis dolores ita exasperat, vt aegri interdum in lipothymiam incidant.
8. Neque *urina* excretio satis libera & prompta est, sed vel paululum imminuitur, vel impedita ad modum fluit.
9. *Animus* sub his acutis doloribus valde angitur, vires imminuuntur.

minuuntur, adperitus somnusque deficiunt, & nonnumquam cominotio febrilis vaga accedit.

IV. SVBIECTA.

1. Hæmorrhoides *caca* vix aliud temperamentum, quam vel phlegmaticum, pituitolum, mucidum, vel de hoc multum participans, infestant.
2. Generatim quidem virili sexui familiares sunt; licet feminæ ab iis non prorsus immunes sint, sed *turgentes* non raro sub ultimo gestationis tempore, præcipue si multum sedeant, experiantur. Idem contingere solet sub partus doloribus, vbi foetus in peluim grauius recumbit, aut paullo grandior est, & intestinum rectum comprimit. Vnde in puerperis sensum ardoris circa orificium ani persentiscunt.
3. Obtingunt i primis personis ætatis consistentis, nisi causa quædam hæreditatis efficiat, vt iuniores ab eisdem corripiantur.
4. Sæpius quoque infestant illa subiecta, quæ hæmorrhoidalem fluxum primum parturiunt, quam quæ iam diu eidem aducta fuerunt.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens remota* est plethora cum spissitudine sanguinis mucoso-pituitosi coniuncta.
2. Causa *propior* est restrictio sanguinis versus hæc loca, plethoræ imminutionem respiciens.
3. Causa *proxima* est infarctus & stasis sanguinis in vase aliquo hæmorrhoidali: vnde vel vesicula sanguine repleta, vel tumor inflammatorius produeditur.
4. Causæ *occasionales, præcatartica & aduentitia* sunt
 - 1) Immodicæ harum partium attritiones, siue ab equitatione insueta & diu continuata, siue a pruritu, siue a nisu exprimendi faeces aluinas, siue a partu difficili proueniunt.
 - 2) Infectio ab infectione super sella quadam adhuc calida, cui insedit, qui hæmorrhoides habuit vlcerosas.
 - 3) Illi quoque, qui venereis impuritatibus adfecti sunt, peculiare interdum vlcerationes circa orificium intestini recti experiuntur, id quod præcipue dependet a *venatu*

rum connexione. Ex vena enim *iliaco-hypogastrica* ramos accipiunt & partes genitales & intestinum rectum.

- 4) Abusus spirituosorum, aromatatum, aloëticorum, helleborinorum & aliorum calidorum.
- 5) Neglectio consuetæ venæ sectionis & scarificationis in partibus corporis inferioribus.

V. PROGNOSIS.

1. Hæmorrhoides *externæ* æque ac *caca* ad finem quidem salutarem, nempe plethoræ imminutionem, respiciunt; sed ob vias minus commodas & vasa exilia vix unquam eundem impetrare valent.
2. Hinc quia nulla ex iis speranda est utilitas, longeque maiores molestiæ eas comitantur quam fluentes, aurea illa qualitas (die guldene Idet) de illis non potest prædicari.
3. Præsertim *caca*, quia in nudo furore, impetu & strepitu consistunt, & eam ob causam *furentes* dicuntur, multos eosque periculosos effectus producunt.
4. Siquidem eis superueniunt pathemata hypochondriaca, nephritis simplex & calculosa, dolores coxendicum & podagra, nonnumquam molimina ad mictum cruentum & pathemata iliaca, præsertim si incongrue tractantur.
5. *Turgentium* vesicula, vel sponte vel manu chirurgica aperta, copioso humorum versus hæc loca adfluxui, & non raro ipsis hæmorrhoidibus *internis*, legitime fluentibus, ansam præbet.
6. Quando *vesicales* hæc congestiones cum insigni cuticulæ dilatatione factæ sunt, immo actu denique etiam perumpunt, facile, quamquam sine insigni dolore, ulcerare solent.
7. Vesicula quando aperta est, tum sæpius flaccida atque rugosa restat, & papulas quasi format, quæ, neglecta consolidatione, interdum sub sacum aluinarum tortiore expressione sanguinem de nouo fundunt. Cuius rei exempla prostant, quorum sanguis per plures annos sensim & perpetuo effluerit.
8. Vel hæc papulæ in vlcuscula prurigine molesta degenerant; quæ ad afflictio *serpigo hæmorrhoidalis* seu *pruritus ani serpiginosus* dici meretur.

9. Serpigo hæc hæmorrhoidalis non raro occurrit; licet rara sit illius apud auctores mentio. Late non serpit, sed sæpe per plures menses in vno loco subsistit, & si ex illo loco propellitur, in vicinia iterum erumpit; neglecta autem adfectus arthritico-dolorificos & decubitus acres producit.
10. *Tumentes æque ac turgentes*, licet satis molestæ sint, vitæ tamen periculum non inferunt, nisi diu *adsuetæ* incongrue supprimantur.
11. *Tumentes*, nisi mature resoluantur & discutiantur, ad *suppurationem* perueniunt; quæ satis familiariter in ulcerationem *fistulosam*, a *turgentibus* non timendam, transit; præcipue si vel ante *maturationis* tempus profundius & latius inciduntur, vel iam suppuratæ nimis diu sine apertione hærent, vel mundificatio negligitur aut protrahitur.
12. Hæc corruptio quando in tubulo vasculoso fistuloso inualescit, & in texturam intestini recti adiacentiumque partium musculosarum serpit, *hæctica* tandem ægrotantes succumbunt.
13. Cæterum *ulcerosi* adfectus hæmorrhoidales maxime sunt contagiosi.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus curandi.

1. *Turgentium*

- 1) Hæc multum difficultatis in curatione non inuoluunt: rupta enim vesicula maturam tantum exposcit mundificationem & consolidationem per externa illa balsamica, quæ sub *tumentium* tractatione indicantur.
- 2) Quando autem *siccescunt*, & verrucosam faciem exhibent, vel madent & ardent, atque salsa acrimonia his partibus molestiam adferunt, tum maiore circumspectione tractandæ sunt, nempe secundum methodum, qua alia vlcuscula tractantur. Actum quidem manus chirurgica in talibus fungoso-verrucosis excrecentiis & ulcerosis atque pruriginosis pustulis requiritur.
- 3) Ante omnia autem *aluis* tempestiue promoueatur, siue

- per decocta prunorum, *lenientia*, mucilaginoſa, pinguis, ſiue per uſum *rhobarbari*, ſiue per *chyleres* lenientes.
- 4) Pro ſcopore uellendi, ſeu ut dicunt, *diuertendi*, conducunt, *pedilunia*, pedum *frictiones*, & cucurbitularum cæcarum ad ſuras & femora adplicationes.
- 5) Ad dolores ſpaſticos, qui ſtatui vlcerofò, de quo loquimur, accedunt, mitigandos exhibeantur pulueres nitroſo digeſtiuo-cinnabarini.

† 2. *Tumentium.*

- 1) Diſcuſſio per tres vel quatuor priores dies tentetur; licet, ob loci præcipue incommodum ſitum, difficulter ſuccedat. In hunc finem laudantur
- a) Venæ ſectio in pede; quando in ſignis plethora concurrat.
- b) Radices & herbæ *reſoluentes* & *moderate reprimentes*, e. g. rad. apii, vincetox. caryophyll. ireos Flor. bryon. ſigill. Salom. biſtort. lilior. alb. herb. hyſſop. verben. chærefol. beton. agrimon. matricar. ſcord. ſalu. menth. flor. chamomill. melilot. anth. ſambuc. verbafc. ſem. fœnugræc. fœnicul. caru. bacc. laur. quæ lacte prius coquuntur, & addita pauca portione camphoræ ſacculis includuntur.
- c) *Specificè* infuſum *milleſiſſi* ſaturatum, nempe pugill. III. ad dimidiam menſuram aquæ.
- d) *Suffimigia* ex ture, maſtiche, benzoc & ſpeciebus ſuperius nominatis parata.
- e) *Specificè externa* laudantur
- α) Unguentum *delinaria* flor. lut. vel decoctum illius pro inſeſſu adhibendum.
- β) Appenſio rad. *ſcrophulariæ* & *ſabariæ* ſecundum *Wedelium* in A. N. C. Quorū tubercula in ano ſunt, tot bulborum radicem eligendam & de dorſo adpendendam iubent.
- γ) *Suffimigium* ex *muribus marinis* & exuiis *anguilla*.
- δ) Rad. *plansag. aquat.* manu detenta, donec incaleſcat. Vide *Prauoſium* in medicina pauperum.

rum. Eodem modo radicem acori adulterini vsurpandam commendant.

e) De his & aliis plura sub *cautelis* dicentur.

2) Quando autem discussio non magis speranda est, *maturatio* promoueat; id quod faciunt cataplasmata suppuratoria, cepæ assatæ, oleum lini, medull. crur. vitulini; item decocta, siue cum linteolis, siue cum spongia adhibenda, & ex rad. alth. Jilior. alb. ireos Flor. sigill. Salom. gent. rubr. aristol. rot. apii, herb. scord. absinth. card. ben. cent. min. agrimon. sanic. chærefol. flor. chamom. rosar. rubr. sem. caru. bacc. laur. præparata; addendo aliquid mellis & myrrhæ.

3) Et quoniam *dolores* ante ruptionem valde vrgent, *interne* nitrosa, emulsiva, & in casu necessitatis anodyna, propinanda sunt; *externe* autem oleum verbasci, oleum calendulæ; præ omnibus etiam oleum ouorum conueniet.

4) Quam primum maturatio diiudicata est, *apertio* sufficiens, ope lanceolæ, instituat.

5) Denique *mundificatio* & *consolidatio* omni studio promoueantur,

a) *interne* per laxantia & sanguinem ac lympham depurantia, e. g. mannata, sennata, item mixturam e tinct. antimon. tartarisat. essent. succini, essent. alexipharm. *Stahlii*; interpositis orgasmum sanguinis temperantibus.

b) *externe* per balsamica e. g.

R. Essent. myrrh.

Succin. ana drachm. II.

Balsam. Peruu. scrup. I.

ol. philosoph. scrup. II. M.

item per vnguentum ex melle, vitello oui, liquamine myrrhæ, ture, mastiche, teberinthina; aut per linimentum ex oleo ouor. liquam. myrrh. & exiguo olei hyperici paratum: non minus conueniunt miscela ex melle despumato, vitello oui, ali-

quot guttulis balsami de copaiua & olei hyperici,
nec non olei mastichini & laurini.

- 6) Quando *fistula* subnata est, opportuna & dextra incisio-
nesons & radix mali tempestiue detegatur, quæ bre-
uissima via est, præoccupandi vltiorem fistulæ *cuni-
cularem* progressionem.

B. Præseruandi.

Præseruationi fauent

1. Venæ sectiones æquinoctiales.
2. Scarificationum adfuetarum repetitio.
3. Adplicatio hirudinum ad hæmorrhoidalia loca. *vid. can-
tel.*
4. Promotio excretionis aluinæ.
5. Mobile vitæ genus, diætæ congrua, animus tranquillus.
6. Moderatus vsus infelluum & pediluuiorum.

VIII. CAVTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Hæmorrhoides *externæ*, quamquam raro ita occurrant, vt
vena aperta sanguinem simpliciter effundat, notus tamen
est casus singularissimus, quo stillicidium per quinque
dies fuit continuum. Quum vero die sexto sanguis sub-
sisteret, eo momento mirificis phænomenis versus caput
dirigebatur. Videlicet sentiebatur adscendere quasi de
puncto ad punctum per vniuersum truncum sensu non
quidem ardoris, attamen notabilis calor. Quum ad tho-
racem perueniret, angustabat, in collo stringebat, in o-
culis visum prorsus impediobat, sente keinen *Stich* sehen. At-
que hæc omnia intra quartam fere horæ partem obtin-
gebant, donec tandem in vertice sublisteret, & dolores
prementes paullulum durantes generaret.
2. Quoniam hæmorrhoides caecæ quam plurima incommo-
da adferunt, & tamen intentio naturæ vix vniquam per
illas obtinetur, tanto magis prudentiæ Medici commen-
dantur, quæ tab. de *hæmorrhoidibus internis sub method.
num. 2.* dicta sunt; nempe quod tales motus prudente ra-
tione ad alias vias reuellere magis conueniat, quam illos
tolerare.

3. Frequenter venae sectiones, & quod praestantius est, laboriosum vitae genus hoc in casu quam maxime commendari merentur.
4. Interea de *cæcis* etiam observandum est, quod *tabula de internis* haemorrhoidibus, ratione imprudentis cohibitionis per adstringentia & alia incongrua remedia, dictum est.
5. Absint itaque positivae *purgantia*, *stimulantia*, *calesfacientia*, *aloëtica* & *elleborina*, quae hosce infarctus haemorrhoidales augent, sanguinem exagitant & veras inflammationes producant.
6. Absint quoque *marzialia*, tam adstringentia, quam sic dicta aperitiva.
7. Externe evitentur *repellentia*, *exsiccantia*, *refrigerantia*, *corrosiva*, *rubefacientia*, *septica*, e. g. terrae bolares, lithargyrium cum aceto.
8. Vfus quoque sulphuris & mercurialium sedulo evitetur.
9. *Vnguinosa* rancida malum eventum efficiunt.
10. *Hirudines* in paroxysmo ad *turgentes* quidem cum cucurbitula adplicari possunt, ad *tumentes* autem illas adhibere, neque satis securum est, neque officio suo satis faciunt. Non enim fugunt in adfectibus inflammatis & ubi aliquid ulcerosae aut suppurascens corruptelae subest. Ad recursum autem *cacatum* impediendum, quater vel sexies per annum bono cum effectu possunt adhiberi.
11. *Millefolii* vsus in sedandis doloribus *cacatum* omnibus aliis specificis palmam praeripit, quando in forma thee adhibetur.
12. *Ricerius* & *Villanovanus* illius vsum per integrum mensem continuandum suadent, & haemorrhoides numquam reuersuras promittunt, sed quaestio est, num etiam bono successu in futurum? Cauendum potius a tali periculoso conamine, nisi venae sectiones perite & feliciter simul in subsidium veniant.
13. Herba & vnguentum *linariae* specifico quidem effectu hic commendantur, minime autem operae pretium faciunt; nisi

- nisi haemorrhoidibus iam actu exulceratis, vel ad ulcerationem maxime pronis; & tum unguentum cum oleo ouorum aut vitello oui temperari debet; addendo pauxillum mercurii currentis aut praecipitati albi. In *tumensibus* parum aut nihil efficiunt.
14. *Chelidonium minus*, ob signaturam radicis grumosae, ad haemorrhoides caecas valere dicunt; sed neque in his neque in scorbuto, licet Scharbeck's Kraut κατ' ἐξοχήν vocetur, efficax est.
15. Radices *scrophulariae*, *fabariae* & *chondrillae* in doloribus caecarum sedandis faciunt, quod possunt, raro autem, quod de illis praedicatur: nam haec & alia amuletica vix ullam spem in hoc adfectu, praecipue vigente paroxylimo & praesente inflammatione, adferunt. Notum tamen est exemplum, in quo efficaciam aliquoties praestitit *fabaria* amuletice gestata.
16. Contra *mures marini*, sub forma fumi ad sedem adhibiti, egregium saepe effectum mitigantem praestant. Hoc concrementum, quod a *pisce rana* per interiora excernitur, haemorrhoides caecas signatura sua quodam modo repraesentat. Circumspectius autem, nempe sub initium, in furentibus adhibendum est; alias effectus illius reprimens stas in sanguinis non discutit, sed obfirmat.
17. De *specificis* generatim adhuc notandum, quod effectus illorum variet
- 1) Ratione *subiectorum*: quod enim remedium in hoc homine dolores mitigat, in altero saepe sine effectum adhibetur.
 - 2) Ratione *temporum*: nam vnum idemque medicamentum hoc tempore bonum effectum, altero plane nullum praestat.
18. Interea *Weisbachius* asseuerat, quod in dolentibus haemorrhoidibus numquam sine effectum adhibuerit *folia recentia sambuci* conuassata. Dicit enim, quod, si quater circiter reperantur, inflammationem discutunt & dolores sedent. Adhibuimus etiam ipsi haec folia bono

semper cum effectu. Hyeme *sedum vermiculare minus* substituendum serio dictus auctor, commendat.

19. *Annulus Helmontii*, e filo ferreo candente, per vngulam pedis posterioris *equæ* pro mare, *equi* pro femina, traiecto, paratus, a nonnullis, qui ad experientiam prouocant, laudatur.
20. *Essentia succini* in hisce & aliis adfectibus serosis, partim discutiendo partim euacuando, commodissime se gerit, adeo, vt in adfectibus arthriticis efficaciam edat non contemnendam.
21. *Oleum ouorum* præcipue valet ad adfectus ardentis & rodentes demulcendos, aliosque cutaneos casus subleuandos; in vnguentum autem redigendum est cum liquore florum verbasci, sed sine multa frixatione, daß es nicht verbrate.
22. *Cauterisationes* & stimulantis *injectiones* in fistula hæmorrhoidali nequaquam admittendæ sunt.
23. Complicatur interdum declinante ætate *dysenteria* cum hæmorrhoidibus *cæcis*; quo in casu necesse est, vt Medicus circumspecte agat, & talia adhibeat medicamina, quæ vtrique adfectui salutaria sunt. Laudantur in hunc finem præcipue *millefolium* & *cascarilla*.

TABVLA XIII.

DE

HAEMORRHOIDIBVS SVPPRES- SIS, DECOLORATIS, ALBIS, MVCIDIS ET FLVXV HEPATICO.

I. DIFFERENTIA.

Quem ad modum *precedente tabula* speciem alicuius suppressio-

M

NIS

nis in hæmori hoidibus cæcis exhibuimus; ita hæc tabula reliqua vitia, quæ in negotio hæmorrhoidali obueniunt, exhibebit.

1. *Suppressio hæmorrhoidum quadruplici respectu est consideranda.*

- 1) Vel enim hæmorrhoides *numquam* fluxerunt, & tamen tam conspicua ad illarum perruptionem *molimina* a natura instituuntur, vt omni iure fluxus expectari debeat. Hæ ab aliis hæmorrhoides *molientes* vocantur
- 2) Vel hæmorrhoides iam quidem *adsuctæ* fuerunt, successus autem illarum admodum fuit impeditus, insufficiens, turbulentus, inordinatus, molestus: quod in hæmorrhoidibus *externis* seu *cæcis* frequenter contingit.
- 3) Vel hæmorrhoides placide, moderate, ordinate & statis temporibus antea fluxerunt, iam vero citra euidentem & manifestam causam iterum deficiunt; id quod in hæmorrhoidibus *internis* sæpius obseruatur. Has alii *emanentes* adpellant.
- 4) Vel denique hæmorrhoides, antea legitime fluentes, siue a causa interna siue externa præcipue per incongruam medicationem & regimen improvidum interceptæ & repressæ sunt. Quas hæmorrhoides *suppressas* sentu *strictiore* nuncupare licet.

2. *Hæmorrhoides decoloratæ, albæ & mucidæ.*

Loco sanguinis sinceri in hæmorrhoidibus internis sæpius excernitur materia *albicans*, gelatinosa, instar *tragacantha* solutæ; Galli adpellant hæmorrhoides *altas*; alii *decoloratas*, *mucidas*. Hæc materia interdum fluxum hæmorrhoidalem antecedit; interdum eundem sequitur. Discrepat autem

- 1) ab *excrementis* ordinariis ratione consistentiæ & coloris. Hæc enim fluo colore fere semper conspicua sunt, illa autem materia est pallida, albumen oui aut sperma ranarum referens.
- 2) a *diarrhæa* variis speciebus, respectu quantitatis materiæ,

riæ, quæ in his magna plerumque copia euacuatur, in hæmorrhoidibus autem albis tam moderata quantitate effunditur, vt qualibet depositione dimidii cochlearis, & vix semper tanta quantitas excernatur.

- 3) a *dysenteria*, vti vocatur, *alba*, respectu ingentium torminum & tenesmi; quæ symptomata, licet in nostro adfectu etiam reperiantur, tam immania tamen non sunt, vti in *dysenteria alba*.
- 4) ab *apostemate* intestinorum & purulento alui fluxu.
- 5) ab *ulcere* & *fistula ani*.
3. *Fluxus hepaticus* est species diarrhœe siue alui fluxus, in quo excrementa liquida & instar loturæ carnis rubentia excernuntur. Distingui vero etiam debet
 - 1) a *dysenteria*. Nam
 - a) in *dysenteria* excrementa magis tincta sunt *sanguine* vel *mucosæ*; in fluxu autem hepatico humor loturæ carnis instar excernitur.
 - b) *Dysenteria* motibus febrilibus, modo lenioribus, modo acutis coniuncta est; fluxus autem hepaticus nunquam.
 - c) *Dysenteria* mense augusto & septembri; hepaticus autem fluxus promiscue occurrit.
 - 2) *Adiarrhœa* strictè dicta, in qua excrementa fluida quidem, colore tamen rubicundo minime tincta sunt, vti in fluxu hepatico.
 - 3) Ab *hæmorrhoidibus albis*, in quibus materia non est tam diluta & aquosa, vti in hoc fluxu deprehenditur.
 - 4) *Alienteria* & *diarrhœa cæliaca*; quam differentiam signa inter se collata dabunt.
 - 5) *Fluxus hepaticus*, iuxta veteres est vel
 - a) *verus*, quando serum tinctum solummodo excernitur. Vel
 - b) *spurius*, quando partes acres biliosæ, aut aliæ faeculentæ ac corruptæ excrementis admiscentur, ad eorum excretio propter mordacitatem eorum cum molestia & dolore contingat.
4. Reliquæ *ærcmalia* hæmorrhoidales consistunt in motibus

ad fluxum hæmorrhoidalem quidem tendentibus, sed a vero tramite & ordine deflectentibus, & ad *insolitas vias* sæpe excurrentibus. Sunt autem hæc anomalie vel

- 1) *Passiva*, quando sanguis spissior difficulter erumpit, & post eruptionem ægrius fluit; aut quando viae nimis strictae & densae sunt. Vel
- 2) *Activa*, quando natura motus hæmorrhoidales siue in defectu siue in excessu administrat; aut quando modo huc, modo illuc, modo sursum, modo deorsum, modo ad latera, aut ad insolitas vias euagatur. De qua re plura sub *prognosi* dicemus.

II. SIGNA.

A. *Hæmorrhoidum suppressarum.*

Hæc sumuntur a *symptomatibus*, quæ hæmorrhoidum suppressionem comitantur.

1. Suppressionem hæmorrhoidum *internarum* presso pedè insequitur vniuersus mali *hypochondriaci* apparatus. *Conf. tab. de malo hypochondriaco.*
2. Quæ pathemata primo quidem quasi *leuisa* adparent, & præcipue circa *sinistrum* hypochondrium regionemque lumbarem sese manifestant, nempe tensionibus & pressurionibus.
3. Progrediente autem tempore *grauiores* turbæ succedunt, præcipue in illis, quibus fluxus antea *impeditus* & cum maiore nisu procedere consuevit. Sequuntur videlicet dolores spastici, colici grauissimi, lienis inflationes, vomitorii conatus, alui adstrictio pertinax, durities abdominis flatulenta & torminosa, viscerum infarctus, scirrhi, inflammationes, conuulsiones, melancholia, mania, vomitus cruentus, cachexia, hydrops, œdemata, hectica & phthisis, apoplexia, hemiplexia, paralyfes &c.
4. Suppressionem autem hæmorrhoidum *externarum* sequuntur magis adfectus arthritici, podagratici, ischiadici, nephritici, calculosi, mictus cruentus, varices, contracturæ, ariduræ, paralyfes sphincteris ani & vesicæ &c.
5. Symptoma autem maxime consuetum, quod suppressionem hæmorrhoidum quarumcumque sequitur, est respi-

spirationis difficultas seu asthmatica adflictiō, plurimum *hypochondriaca*, nonnumquam etiam *peccoralis*, cum tussi humida coniuncta.

B. *Hæmorrhoidum albarum.*

1. Antecedunt motus tendentes, stringentes, in abdomine & hypochondriis.
2. Intercurrunt borborygmi, flatus & ructus.
3. Superueniunt pressiones in lumbis & circa os sacrum; tenesmus quoque iam cum punctiōe ani, iam cum scindente & ardente sensu.
4. Sub his adflictiōibus excernitur cum aliquali sibilo materia instar albuginis, paullulum flauescens, interdum cum colore aliquali subruffo & quasi roseo, aliquando etiam cum striis cruentis.
5. Ob insolitam humectationem sæpius in partibus ani externis pruritus & excoariatio obseruantur.
6. Habitus corporis constrictus, & facies pallida est.
7. Vrina parciōr & saturatiōr effluit.

C. *Fluxus hepatici.*

1. Excernitur sub frequentibus deiectionibus humor per aluum, loturæ carniū similis.
2. Concurrunt dolores tendentes, murmurantes in abdomine, & spastici motus circa lumbos.
3. Qui motus spastici nonnumquam in latus dextrum versus hepar se extendunt.
4. Interdum ticillationes & lenes morsus in intestino recto percipiuntur; interdum vero ægri vix vllum huius rei sensum habent, neque vllis doloribus adficiuntur.
5. In nonnullis tenesmus accedit,

III. *SVBIECTA.*

1. Subiecta, quæ ad excretionem hæmorrhoidalem generatim disposita sunt, *tabula de hæmorrhoidibus internis* indicauimus.
2. Speciatim *suppressioni* hæmorrhoidum facile obnoxia sunt temperamenta sanguineo-melancholica, aut melancholico-cholerica.

3. Homines *immitigati*, & qui *commotionibus animi* terrificis continuoque noctis corripuntur.
4. Ad hæmorrhoides *albas & fluxum hepaticum* dispositi sunt homines phlegmatici, melancholici, & quidem mediæ ætatis, iuvenes scilicet & viri.
5. Feminae mensium imminutione aut suppressione afflictæ, interdum etiam ab his molestiis corripuntur.
6. Præcipue autem omnibus hisce anomalis obnoxii sunt, qui vitæ genus laboriosum in *sedentarium* mutarunt.

IV. CAVSSAE.

A. *Hæmorrhoidum suppressarum.*

*Leckley 1849
1849
1849*
 Variæ quidem sunt causæ, quæ ad suppressionem hæmorrhoidum contribuunt, nulla autem necessitas urget, ut inimicam sanguinis dyscrasiam, iam acidam, iam atrabiliariam, iam acrem, stimulantem & genus nervosum vellicantem, aut alias materiales qualitates accusemus. Præcipue ad eam contribuunt

1) *Interne*

- 1) Animi pathemata, maxime terror, timor & tristitia.
- 2) Spissitudo sanguinis abundantis, non minus autem
- 3) Orgastica illius commotio.

2. *Causæ externa & occasionales* sunt

- 1) Mala artificia seu medicamina, e. g. *vomitória*, *refrigerantia* interna & externa, abusus *adstringentium*, si nempe fluxus hæmorrhoidum legitimus, aut alii morbi, in primis febres intermittentes, per talia incongrua remedia temere tractantur.
- 2) Potus frigidus corpore exæstuante. Accusare etiam solent decocta théæ & caffèæ valde saturata; sed ego, non peruideo rationes.
- 3) Dieta crassa, fermentescens.
- 4) Largior potus spirituosorum, in primis ardentium.
- 5) Alui indurationes.
- 6) Aër frigidus-humidus.
- 7) Refrigeratio abdominis & partium inferiorum immodesta.

B. *Hæmorrhoidum albarum.*

Quod

Quod hæmorrhoides tam confuse tamque perturbate ac præpostere se gerant, in culpa esse obseruantur

1. Ipsa *natura*, quæ motibus suis congestorio-spasticis a vera methodo & scopo aberrat, & loco sanguinis sinceri lymphatico seroso-ichorosam portionem eiicit.
2. Viæ & partes paullulum strictiores, vt sanguis non recte transpirari queat.
3. Humorum spissior consistentia.
4. Plethora cum impetu commota.
5. Sudores matutini autocratici neglecti, & vrina nimis diu retenta.
6. Venæ sectiones & scarificationes consuetæ neglectæ.

C. *Fluxus hepatici.*

1. Antiqui accusabant debilitatem hepatis, sanguinem neque bene attrahentis, neque recte retinentis, vnde lapsus eiusmodi sanguinis ad intestina oriatur.
2. Magnam autem conspirationem hic fluxus habet cum hæmorrhoidibus; & sicut in vicio mensium talis sanguinis decolorationes sæpius contingunt, sic etiam in vicio hæmorrhoidum idem fieri vero simillimum est.
3. Ad talem anomaliã contribuit
 - 1) Plethora.
 - 2) Qualiscumque orgastica sanguinis commotio, quæ impedit, quo minus sanguis ad eruptionem directe peruenire queat.
 - 3) Impeditus & retardatus eiusdem progressus per venam portæ. Vnde contingit, vt in vasis hæmorrhoidalibus restagnet & in mucidam talem secessionem abeat.
4. Aliquando etiam ad talem fluxum disponit scirrhus aut infarctus hepatis, qui sanguinem, per venam portæ fluentem, intra hepar sese effundere non permittit; vnde regressus & exundationes fiunt ad regiones hæmorrhoidales, vt sanguis deinde turbulenter ex iisdem erumpat, & mixtam talem ac impeditam excretionem offerat.
5. Nonnumquam etiam adest excoariatio intestinorum in hominibus dysenteria male curatis, quæ ad hunc fluxum ansam præbet.

A. PROGNOSIS.

1. Quam graua symptomata suppressionem hæmorrhoidum excipiant, *sub signis* iam indicatum est.
2. Est ad tactum satis quidem rebellis, facilius autem medicationi auscultat, quando a causis internis, nempe a spisso sanguine originem sumit, quam si per incongruum adstringentium vsum productus est.
3. *Molimina* hæmorrhoidalia licet numquam erumpant, minoris tamen sunt periculi, quam si ipse fluxus antea adfuit.
4. In feminis hæmorrhoides suppressæ minus periculum adferunt, quam in viris; nisi periodum, qua menses fluere adhuc possunt, transgressæ fiat.
5. Quo diutius hæmorrhoidum suppressio durauit, eo certius sanguinis producit translationes, partim ad viscera hypochondriaca, partim ad alia loca, excretioni sanguinis accommodata.
6. Priore casu vniuersa mali hypochondriaci scena introducit; conf. *signa*; posteriore vero asthma conuulsium, catarrhus suffocatiuus, vertigo, apoplexia, hæctica in siccioribus, hydrops in succulentis.
7. Inter acerba pathemata, quæ suppressionem consequuntur, eminet *colica hæmorrhoidalis*, de qua *vid. tab. de hæmorrhoid. internis & tab. de colica*.
8. Sic etiam hæmorrhoidum cohibitiones variis *ulcerationibus* ansam præbent; inferunt præter ea tumores pedum œdematosos, asciticos, tympaniticos, & alias humorum deprauationes.
9. Et quoniam *lien* in suppressis hæmorrhoidibus plerumque in consensum trahitur, multi morbi splenici inde deriuantur.
10. Neque minus attendendus est *decubitus* ille humorum, qui ex hæmorrhoidibus suppressis *pectus* occupat, vnde asthmaticæ angustię, palpitatio cordis, molimina hæmoptica veræ hæmoptyles, inflammationes pectoris, phthisis &c. oriuntur.
11. Fiunt quoque translationes sanguinis ad *caput*, ex quibus verti-

vertigines, aurium tinnitus, auditus grauitas, hæmorrhagiæ narium, oculorum & dentium dolores, angina multæque aliæ afflictiones ingruunt.

12. Ad insolitas quoque vias, ad quas hæmorrhoides euagari solent, pertinent etiam hæmorrhoides, quæ in feminis mensium cessationem interdum excipere solent.

B. Hæmorrhoidum albarum.

1. Quem ad modum in negotio menstruo *fluor albus* vices sinceræ hæmorrhagiæ supplet; ita in negotio hæmorrhoidali *albicans hæc excretio* vices fluxus hæmorrhoidalis tenet.
2. In quibusdam subiectis hæc excretio alba in talem consuetudinem abit, vt, quoties hæmorrhoides recurrunt, toties easdem comitentur.
3. Et quando hic albus fluxus cum sincero hæmorrhoidum successu alternat, completa fluxus hæmorrhoidalis suppressio extimescenda est.
4. Licet tamen hæc euacuatio ad anomalias hæmorrhoidales pertineat, natura tamen eam ita adprehendit, ac si verus & sincerus sanguis exoneratus esset.
5. Nam materia hac excreta præcedentes immoderatiores motus spastici placantur & pathemata infimi ventris tolluntur. Vnde hoc respectu hæc excretio salutaris dici potest.
6. Quando autem hæmorrhoides in iustum ordinem restitutæ sunt, tunc hæ albæ excretiones iterum euanescent, nec in posterum, rebus sic stantibus, facile comparent.
7. Si vero hæmorrhoides albæ per mala artificia repente opprimuntur, eadem grauia pathemata & morbidæ confectiones eueniunt, quæ turbatas hæmorrhoides excipere solent.
8. Quo diutius hæmorrhoides albæ durant, eo magis perturbant aluinas euacuationes, & futuræ primarum regionum labi periculum minantur.
9. Immo sæpe in colicam hæmorrhoidalem, & vehementes spasmodicas afflictiones circa venam portæ faciunt, transformantur,

C. *Fluxus hepatici.*

1. Fluxus hic multoties chronicum est malum, & curationem difficulter admittit.
2. Si malum est recens & subiecta adhuc sunt iuniora atque vegeta, curatur interdum; in senibus vero ac morbo iam inacterato nulla curationis spes est, praesertim si tabes, quae ordinarie adesse solet, in viscere quodam infimi ventris haeret.
3. Compluries, si nimis diu durat & vires admodum proster nit, in cachexiam & hydropem, nonnumquam vero in tabem siue hecticam degenerat.

VI. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *Haemorrhoidum suppressarum.*

1. Fluxus haemorrhoidalis si numquam adfuit, motus tamen ad eundem excitandum vrgent, admodum circumspicte agendum est: non enim promiscue molimina talia, praecipue *remota*, promouenda sunt. *Conf. tab. de haemorrhoid. internis.*
2. Vbi itaque temperamentum & reliquae aegrotantis circumstantiae legitimae & sufficientem fluxum non pollicentur, ibi praestat motus tales *desuescere*
 - 1) Vel per vicarias venae sectiones,
 - 2) Vel, quod melius & efficacius est, per sufficientem & laboriosam corporis motionem.
3. Suppressio autem *adsuetarum* haemorrhoidum sequente methodo tractatur.
 - 1) *Quantitas* sanguinis est imminuenda, vt intentioni naturae aliquo modo satis fiat & symptomata mitigentur.
 - a) Venae sectio itaque in *pedibus* instituatur. *Conf. cautel.*
 - b) Aluus autem, si non legitime succedit, prius aperiatur per clysterem emollientem & carminatiuum, e. g. per decoct. chamomill. cum lacte.
 - 2) *Qualitas* sanguinis post venae sectionem est corrigenda.
 - a) Si *orgasmus* peccat, placandus ille per nitrosa, praecipitancia & acidula.
 - b) Quando autem *spissitudo* humorum adest, resoluentia &

attennantia illa adhibeantur, quae *tabula de suppressione mensium sub methodo* indicantur.

- 3) Facta correctione motus ad locum excretionis blande invitandus & leniter stimulandus est.
 - a) *Interne* per helleborata, myrrhata, aloëtica, elixir. proprietat. crocum, boracem, pilulas *Stahlianas*, *Becherianas*, laxantia per epicrasin.
 - b) *Externe* per adplicationem *hirudinum* ad haemorrhoidalia loca, clysteres stimulantés, suppositoria acriora, frictiones.
 - 4) Tandem *tonicaroboratio* suscipiatur per mixturam tonico-neruinam *Stahlii* & per usum martialium, optime preparatorum; quo tempore tamen aluus semper aperta seruetur, siue per clysteres, siue per laxantia interna subinde adplicanda.
- B. *Hæmorrhoidum albarum.*

1. *Præseruandi.*

- 1) Ante omnia videndum est, ne natura per spissitum sinem sanguinis molestam & serum mucidum ad hosce erroneos motus suscipiendos inuitetur. Hinc necesse est
 - a) Vt sanguis depleatur per *vena sectiones* acquinotiales, per *hirudinum* adplicationem & per *scarificationes*.
 - b) Vt serum copiosum imminuatur, & eius vberior ad haemorrhoidales venas adfluxus intercipiatur per moderata *laxantia*, *diuretica* & *diaphoretica*. Faciunt hoc
 - α) Rhabarbarum, folia sennae, fibrae hellebori nigri aut vinum medicatum ex resoluentibus & abstergentibus paratum, cui exiguum de fibris hellebori nigri commisceri potest, vel, quod securius, polypodium.
 - β) Salia incidentia: sal tartar. genist. onoid. tartar. vitriolat. arcan. duplic. &c.
 - γ) Absorbentia: conch. preparat. antimon. diaphoret. bezoardic. mineral.

- δ) Essentiæ resoluentes: essent. alexiph. tinctur. an-
timon. tinctur. tartar. mixtur. simpl.
- c) Vt humores in iusta fluiditate conferantur, & viæ in
debitum flexibilem statum redigantur per motum
corporis sufficientem, per diluentia, humectantia
diætetica.
- d) Vt intestina & primæ viæ abstergantur, ne transitus
sanguinis vilo modo offendatur & impediatur. In
hunc finem laudantur
- α) Salina digerentia & colliquantia, siue enixa, siue
tartarifata.
- β) Clysteres lenientes & roborantes.

2. Curandi.

- 1) Ad motus hæmorrhoidales in ordinem redigendos præ
aliis remediis conducunt pilulæ *Stabliane*, quæ maioris
sunt efficaciz, quam reliqua laxantia.
- 2) Irregulares commotiones mitigant antispasmodica cin-
nabarina cum absorbentibus & diaphoreticis fixis
combinata.
- 3) Profunt etiam resoluentia & æqualitatem motus sangui-
nis promouentia; additis temperatis dosibus roboran-
tium, e. g. essent. vincerox. helen. pimpin. alb. gent.
rubr. mixtur. tonico-neruina *Stablii*.
- 4) Aluus semper aperta seruetur.
- 5) Et cum venæ hæmorrhoidales propter frequentem mucii
effluxum admodum laxæ reddantur, adeoque talis
fluxus facilius recurrat, ad roborandas hæc partes de-
tur tinctur. mart. *Ludou.* mixtur. tonico-neruina
Stablii.
- 6) In feminis purgationis menstruæ ratio habeatur, vt in
iustum ordinem redigatur.

C. Fluxus hepatici.

1. Quoniam fluxus hepaticus pro adfectu hæmorrhoidali di-
iudicatur, eadem etiam methodo, quæ sub impedito hæ-
morrhoidum negotio commendata est, omni iure tra-
ctatur,

Statum, nempe remediis mediocriter temperantibus & abstergentibus, cum lenibus laxantibus.

2. Per aliquot itaque dies rhabarbarum a scrupul. I. ad drachm. semis, vel pilulæ *Stahlii* propinari possunt.
3. Deinde temperantia & abstergentia salina adhibeantur, e. g. nitrum, tartar. vitriolat. arcan. duplic. nitrum antimoniac. sal centaur. min. card. bened. absinth. mater perlar. conch. præparat. ocul. cancri.
4. Denique mixtura tonico-nervina *Stahlii*, vel sola, vel cum essentia pimp. alb. aut adianth. alb. mixta propinetur.

VII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Multi opinantur, quod hæmorrhoides sint præternaturale
i. e. noxium accidens; unde necesse esse iudicant, quo
hæmorrhoides coercantur. Omnibus itaque cogitationibus in id feruntur, ut per adstringentia, narcotica,
vomitiva, purgantia hosce motus inordinatos temperent, & acrimoniam scorbuticam, ut volunt, corrigant. Cum tamen, si ministri naturæ esse vellent, id vnicè agere deberent, ut ei omni modo succurrerent, & dexteritate atque peritia sua medica eandem subleuarent. Facilius enim est hæmorrhagias quascumque suppressere, quam referare.

2. Ex hoc errore etiam fluit, quando multi Medici hæmorrhoides suppressas relinquendas censent. Aureus enim hic fluxus aureas suas qualitates non exferit, nisi legitime succedat.

3. Abstinentum itaque est a vomitoriis, quæ facile motus hæmorrhoidales tam ad ventriculum quam superiorem corporis regionem ducunt, & ad vomitum cruentum disponunt, aut in hepate & liene periculosos effectus provocant.

4. Si vero certo exploratum sit, quod ab hæmorrhoidibus suppressis aliquid sanguinis in ventriculum secesserit, quod ad vomitum cruentum disponere posset, tunc liene vomitorium, e. gr. per radicem ipecacuanhæ, locum habere potest.

5. Purgationes fortiores & *clysters* acres, item *suppositoria* stimulan-

- mulantia, & reliqua impellencia, calefacientia, motus & humores magis exagitant, neque tamen suppressas hæmorrhoides referare solent.
6. Aloetica, helleboriua, colocynthiaca stimuli quidem loco adhiberi, ad præcauendam autem ebullitionem sanguinis nitrosa & absorbentia interponi possunt; alias facile graues exacerbationes, nempe colica, splenetica, anxia pathemata oriuntur.
 7. Absint *narcotica* opiata, quæ præsentis motus vno impetu obruunt, & ad futuros intarctus ac stases, immo ad adfectus tympaniticos, œdematosos, hecliccos & hydropicos disponunt.
 8. Nocent adstringentia, incrassantia, præcipitantia, quæ in viis suspectam stricturam & in humoribus maiorem spissitudinem produciunt.
 9. Nil iuuant antiscorbutica acriora, edulcorantia.
 10. *Vene sectio*, licet in grauioribus spasticis moliminibus a natura non facile attendatur, cum primis, quia venæ, quæ secari possunt, immediatum cum vena portæ commercium non habent; præstat tamen eandem medicationi præmittere, quam prorsus prætermittere.
 11. Præmissis generalioribus applicatio *hirudinum* quam maxime commendatur, tamquam remedium omnium tutissimum & efficacissimum. Licet enim hirudines venam hæmorrhoidalem *internam* immediate non attingant, per conspirationem tamen venarum *externarum* non raro *interne* hæmorrhoides prouocantur.
 12. Ad roborationem viscerum hypochondriacorum *tonica* præcipue *martialia* non præmature, sed in progressu medicationis, & obtento semel fluxu, adhibeantur, ne infarctus & obstructio augeatur.
 13. Molimina hæmorrhoidalia si sponte natura cessant, caueat sibi Medicus cum *impetu* illa resuscitare.
 14. Immo licet motus tales *incongrua arte* suppressi essent, e. g. opiatas, lapid. manat. dent. hippopot. vnicorn. ver. priap. cet. medicatio tamen impetuosa minime locum habere t.
 15. *Acidularum* vsus, ad quem ægri post varias & sæpe peruersas medi-

- medicationes ordinariæ relegantur, cachexiam, tumores œdematosos & denique hydropem producit.
16. *Salia volatilia* caute hic vsurpanda sunt, non, vt moris est, ad humores præparandos, sed ad *viscera* roboranda.
 17. Adfectus œdematosi si hæmorrhoidum suppressionem sequuntur, res fere conclamata est: fluxus enim difficulter reuocatur, & si omnino reuocetur, œdemata tamen pertinaciter sæpius solent durare. Occurrendum in tali casu per methodum *tabulae ad œdemate* indicatam.
 18. Diætâ crassior euitetur : abusus vini & aliorum spirituosorum valde nocet. Curru, non adeo commodo, sed concussionem modicam excitante, vehi, aut æquitare, vel alio modo abdomen placide concutere, quam maxime conducit.
 19. *Fluxus hepaticus* rarius quidem in frigidis regionibus obfertur, veteribus tamen non ignotus fuit, qui sibi religioni ducebant, per adstringentia eum tractare; & hoc quidem omni iure: nam a directa illius cohibitione eadem damna exspectanda sunt, quæ ab aliis fluxionibus, per adstringentia & alia incongrua artificia suppressis producantur.
 20. Humores serosi & corrupti per amara optime corriguntur, perque laxantia mucoso-aquosæ partes eliminantur. Hinc rhabarbaro, supra commendato, herbarum amararum & radices resoluentes addi possunt, e.g. herb. fumar. centaur. min. rad. ari, ostrutii, leuistici &c.

TABVLA XIV.

DE

FLVXV MENSIVM ORDINATO,
NIMIO ET HAEMORRHAGIA
VTERINA.

I. DEFINITIO.

Fluxus mensium est euacuatio sanguinis striete dicti, femininò sexui propria, quæ singulis ordinarie mensibus notabilis illius portio, foetui nutriendo specialiter destinata, per genitalia excernitur, omnibus illis annis, quibus ad gestandum idoneae quidem existunt, actu autem ipso a negotio generationis immunes reperiuntur.

II. DIFFERENTIA.

1. Fluxus mensium est vel *suppressus*, vel *ordinatus*, vel *nimius*.
2. De fluxu *suppresso* tabula de suppressione mensium agitur: de *ordinato* autem & *nimio* hac tabula dicemus.
3. *Nimius* fluxus non debet confundi cum *ordinato largiore*, quo quidem copiosa sanguinis excretio contingit, & incommoda quaedam grauatua atque tensua, praecipue ante eruptionem, sentiuntur; quae tamen sub ipso adhuc fluxu notabiliter mitescunt, & aegra deinde ad spectu sano ac constitutione satis bona fruitur. In *nimio* autem fluxu grauiora phaenomena occurrunt, vti ex *signis* illucescet.
4. Contingit non raro, vt cessante menstrui fluxus periodo sanguis plerumque grumosus & viscidus, modo vehementer impetu, modo successibus placidis, sed fere continuis, per vias vterinas extrudatur; quae quidem euacuatio non amplius mensium fluxus nomine venit, sed *haemorrhagia vterina* Medicis audit.
5. *Hæmorrhagia abortiua* tabula de *lochiis* explicabitur.

III. SI-

III. SIGNA.

A. *Fluxus ordinati.*

1. Exserit sese hic fluxus cum pubertate feminina, anno circiter decimo quarto.
2. In *otiosis* & de dicta plena atque calida gaudentibus paullo *prius*, in *laboriosis* autem notabiliter *serius* exoritur.
3. Præ omnibus aliis hæmorrhagiis hic fluxus stata seruat tempora : recurrit enim ordinarie singulis mensibus, computando a die illo, quo erupit, vsque ad diem nouæ eruptionis.
4. Quando fluxus *legitime* succedit, excernitur sanguis *stricte dictus*, & quidem ita tranquille & moderate, vt vix aliqua incommoda adferat.
5. Exceptis illis, quæ a restrictione sanguinis ad inferiora dependent. Ob hanc enim causam angustias & difficilem aliquo modo respirationem perferunt, præcipue quando corpus fortius commouent, vel scalas aut colles ascendunt.
6. Præter ea in peripheria corporis adparet subsidencia partium & exinanitio vasorum cum adpectu pallido & constricto.
7. Quo magis vero in subiectis, quæ sanguine spisso & viis artibus prædita sunt, menses *impedite* fluunt, eo maiora incommoda ægræ præcipue ante eruptionem perferunt; nempe pressiones & tensiones spasticas, torminosas, colicas, cardialgicas, distensorias &c. in abdomine, præcipue circa vteri atque sinus regionem; quibus fastidium animi plerumque accedit.
8. Durat hic fluxus, pro differentia subiectorum & reliquarum circumstantiarum, per tres, sex, immo nouem dies, quo tempore sanguis prioribus diebus paullo *largiter* e genitibus excernitur, posterioribus autem notabiliter remittit, donec sensim penitus subsistat.
9. Extendit sese hic fluxus ordinarie ad quinquagesimum vsque annum; quo tempore intentio naturæ ad concipiendum & gestandum cessare obseruatur.

10. In multis, præcipue laboriosis, prius cessat; in paucioribus vero quinquagesimum annum transcendit.

B. *Fluxus nimii.*

1. Antecedunt fluxum *nimum*

1) Insignes circa præcordia anxietates.

2) vagæ horripilationes & phlogosæ.

3) efferuescentia sanguinis.

4) siccitas oris.

5) respiratio difficilis.

6) grauitas artuum & lassitudo totius corporis.

7) Speciatim autem variæ pressiones & torsiones in abdómine, præcipue circa os sacrum.

2. Hæc incommoda excipit fluxus ipse, isque *impetuosus*, seu ad minimum *copiosus*, interdum etiam cum frustorum coagulatorum excussione coniunctus.

3. Durans iusto diutius, ad duas vel tres hebdomadas.

4. Vel nimis cito, & plurimum inordinate recurrens, e. gr. post duas aut tres hebdomadas.

5. Reliquens veram debilitatem, cum malo colore, magis magisque increbescente, coniunctam.

C. *Hæmorrhagia uterina.*

1. Præcedunt & comitantur eadem symptomata, quæ sub mensium fluxu *nimio* indicata sunt, sed longe maiori vehementia ægras excruciant, ita vt syncopiticis deliquiis non raro adfligantur.

2. Excernitur sanguis ordinarie spissus, viscidus & valde grumosus, immo frusta sanguinis coagulata nigricantia & alia id genus impuritates cum atrocissimis nonnumquam doloribus atque anxietatibus expelluntur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Quod fluxus mensium omnibus feminis competat, quæ intra annos supra notatos viuunt, & extra tempus gestationis aut lactationis sunt constitutæ, adeo certe verum est, vt pauciores illæ, quæ eodem destitutæ sunt, tantum non omnes grauia incommoda & damna certissime incurrant.

2. Fluxus autem *nimius* in pauciora subiecta cadit, nempe in feminas plethoricas, in primis

- 1) Cholerico-melancholicas, & quæ infigmibus animi commotionibus obnoxia sunt, aut speculationibus venereis indulgent,
 - 2) Quæ ad tempus mensium cessationis accedunt, quo notabilis plerumque excessus observatur.
 - 3) Quibus post abortus vel molæ exclusionem insignis erosio vasorum vteri inducta est.
 - 4) Quibus fortiora *emmenagoga*, vel ad suppressi mensium fluxus reuocationem, vel ad nefarie pellendum foetum adhibita sunt.
3. *Hæmorrhagia vterina*, quæ post cessationem menstrui fluxus contingit, eadem subiecta agnoscit, nempe feminas plethora & spissitudine sanguinis laborantes: præcipue autem eiusmodi impetuosa & copiosa sanguinis excretio illis accidere solet, quæ peculiari quadam vteri vel impuritate vel læsione vera adfectæ sunt.

V. CAUSSAE.

A. Fluxus mensium ordinarii.

1. Causa antecedens est intentio specialis ad foetum nutriendum.
2. Quando autem hic finis ob varia impedimenta & circumstantiarum rationes obtineri non potest, natura hanc sanguinis abundantiam per eadem loca excernit, quibus illa destinata erat.
3. Quod autem præcise singulis ordinarie mensibus hæc excretio contingat, videtur rationem critica periodi fouere. Conf. programma D. D. Stablii de fluxus menstrui, quatenus *menstrus, causa*.
4. Grumolitas itaque sanguinis, vias obstruens, & sic fluxum mere passuum constituens, illis relinquitur, qui tali speculatione satis sibi facere, & vniuersum huius fluxus negotium hisce causis exhaurire putant.

B. Fluxus mensium nimii, &

C. Hæmorrhagia vterina.

1. Causa antecedens est plethora, præcipue in temperamentis cholericis-melancholicis, cum vasis capacioribus & habitu corporis constricto præditis.
2. Causa proxima est *orgasms* sanguinis, quacumque ratione inductus.

3. His internis caussis adnumerari possunt, *barcitaria* dispositio & *consuetudo*.
4. Causæ *externæ & aduentitiæ*.
 - 1) Evacuationum artificialium adfuetarum neglectio.
 - 2) Frequens *exclusio abortus*.
 - 3) *Specialissime* concrementa e reliquiis *secundinarum* repululantia.
 - 4) Vel, quod tamen rarius, *mola* aliunde subnata.
 - 5) *Erosio* insignis vaforum vteri.
 - 6) *Animi* vehementes commotiones, vbi iracundia facile princeps est.
 - 7) Item impetuosa corporis æstuationes, quando nimirum saltationibus, aut aliis grauioribus motibus plethoram commouent.
 - 8) Dieta aromatica & spirituosa.
5. Quod *hemorrhagia vterina*, quæ in nonnullis post mensium periodum contingere solet, impuritatem vteri aut læsionem pro causa specialissima habeat, in *subiectis* iam indicauimus.

VI. PROGNOISIS.

1. Mensium fluxus, quo magis cum *phasibus lune* notabilioribus conspirat, eo melius, tranquillius & impeditius succedit: propterea etiam hic fluxus a nonnullis *purgatio lunatica* vocatur.
2. Quando menses, qui *largiter & copiose* fluunt, statim pro fluxu *nimio* reputantur & variis artificis cohibentur, plurima inde mala proueniunt. Conf. tab. de *suppressione mensium*.
3. Immo ipse *nimius* fluxus quando per adstringentia &c. incongrue supprimitur, longe maiora damna producit, quam si sibi soli relinquatur.
4. Succedunt enim immediate quasi suffocationes hysterico-epilepticae & vniuersus apparatus, qui mensium anabie suppressionem.
5. Incommoda a fluxu nimio manifestant sese potissimum circa negotium generationis: siue enim maiores molestias tempore gestationis & partus hae feminae sentiunt;

sive facile abortiunt, sive plane steriles reperiuntur. Si autem vitium illud vteri, quod nimium mensium fluxum excitavit, & feminas abortui, vel sterilitati obnoxias reddit, remouetur, tunc ad conceptionem interdum denuo aptae euadunt. *vid. Stahl. patholog. pag. 525. & seqq.*

6. Quod si vero immodicum illud vteri profluuium, quod facile abit in consuetudinem, diu perennat; disponit tandem corpora ad cachexiam, febrem lentam, oedemata pedum, hydropem, tabem, magnamque animo & corpori adfert debilitatem.
7. Sic etiam feminae *hemorrhagia vterina* laborantes tandem hectica consumuntur; nisi natura congectionibus suis absterforio elisoris, labem vteri discutiatur, resoluatur, abluatur, atque eliminetur. Curatio autem huius adfectus est longe difficillima.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quod *ordinatus & moderatus* mensium fluxus nulla medicatione indigeat, sed quouis potius modo fouendus sit, per vulgus satis notum est.
2. Ipse etiam *largior* fluxus consultius toleratur, quam inhibetur. Praestat tamen nitrosa & temperantia cum pilulis *Stahlii* vel *Becheri ante & sub* ipsum fluxum in subsidium vocare.
3. Fluxus autem *nimius* sequente modo tractatur,
In paroxysmo.

- 1) Paucis diebus ante eruptionem, & sub ipso fluxu, ter per diem propinentur pulueres, orgasmum sanguinis contemperantes. Huc pertinent nitrosa, absorbentia, acido citri aut tartari saturata, & cinnabarina.
- 2) Eodem tempore versus somnum quotidie exhibentur *Pilulae Becheri* genuinae, vel, quae meliores sunt, *Stahlianae*. Hae enim specifica quadam energia nimium fluxum placide moderantur.
- 3) Haec methodus aliquoties repetatur, ita ut dicti pulueres & pilulae singulis mensibus, per sex circiter dies, tempore videlicet instantis & praesentis fluxus propinentur.

nentur: quibus decenter obseruatis adfectus hic, alias pertinax, plerumque ad iustum moderamen reducitur.

- 4) Quodli vero casus quidam rebellis occurreret, cui hæc methodus sine effectu opposita fuisset: tum subadstringentia, seu potius *tonica*, cum lenibus *anodynis* addi possent. Huc pertinent species de hyacinth. corall. præparat. tinct. corallior. tinct. martis *Ludou.* essent. millefol. & adianth. alb. crocus mart. antimoniat. aperitiu. *Stablii*, M. P. de cynoglossa, semen hyosc. alb. item vitellus oui, ex gallina mactata extracti, cum nuce moschiata a *Rosino Lentilio* commendatus in *miscell. pract.* pag. 440. Sequens formula laudari quoque meretur.

Rc. nitri depurati

conch. præparat. & acidò tart. saturat. ana
drachm. II.

specier. de hyacinth. scrup. I.

corall. præparat. gr. XXV.

cinnabar. opt. drachm. semis

M. P. de cynogloss. gr. XV.

M. f. puluis, ad scrup. I. exhibendus & post tres
horas repetendus.

- 5) *Reuulsiones externa* quando omninò necessariæ videntur, *ligatura extremorum* reliquis præferenda est.

Extra paroxysmum

- 1) Venæ sectio plurimum hic prodest, siue in brachio, siue, sine omni trepidatione, in pede instituta, modo tempus intermedium obseruetur, vt nempe 14 circiter dies ante nouum insultum suscipiatur.
 - 2) Octo dies ante, quam menses de nouo erumpunt, mixtura tonico-neruina *Stablii* ter per diem salutariter exhibetur.
4. *Hamorrhagia uterina* eadem fere methodo tractatur. Exhibentur nempe
- 1) temperantia, ex nitrosis, absorbentibus & cinnabarinis para-

parata. Si autem hæc malum non soluunt, ordinantur

- 2) subadstringentia, tonica & anodyna superius recensita.
- 3) Interponuntur, ad vterum mundificandum, pilulæ quædam balsamicæ e. g. *Stahlianæ*.
- 4) Ad præseruandum denique venæ sectio instituitur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quod luna absolutum imperium in hunc fluxum non habeat, experientia toto die testatur: multæ enim extra lunæ *phases* eundem experiuntur.
2. Exspirarunt propemodum *antiqua nenia* de venenosa sanguinis menstrui qualitate: quæ enim de corruptione *musti, cereuisiæ, marcis plantarum, obfuscatione speculorum,* a tactu, vel solo obtutu *menstruata*, vulgo circumferuntur, multa experientia satis refutantur.
3. Licet etiam hic sanguis, per vterum & partes spermaticas oberrans, *orgastica* aliqua inquinamenta concipere possit, tanti tamen hæc non sunt momenti, vt effectus tam notabiles præstare queant.
4. Et quando leges *Mosaicæ* hunc sanguinem impuritatis accusant, inniritur hoc non crassis physicis sed sublimioribus fundamentis.
5. Excernitur hic sanguis non tantum per vasa, quæ in ipsa vteri cavitate quæque minus capacia sunt, sed potissimum etiam per *hamorrhoidalia*, quæ ad ceruicem & collum vteri porriguntur; vnde tam præsens est consensus hypochondriorum cum vtero, vt varia pathemata circa venam portæ excitentur, quam primum fluxus hic non recte procedit. Hinc
6. Femina quædam lactantes & grauidæ experiuntur aliquando singulis mensibus emanationem vteri sanguinis e genitalibus, quæ per aliquot dies *placide* continuat & loco fluxus menstrui fluit.
7. Quam maxime etiam notandus est *consensus primarum viarum* cum vtero, nam exinde dilucescit ratio, cur cibus *dyspeptus* tempore mensium commestus, e. g. panis calidus,

- dus, varia frixata &c. præsentaneam fluxus inhibitionem adferant.
8. De fluxu mensium *nimio* idem verissimum est, quod *tab. de hæmorrhoidibus nimis sub cautelis* diximus; nempe longe facilius suppressionem in vniuersum, quam iustum illius moderamen obtineri, si *adstringentibus*, immo etiam *specificis promiscue* tractetur.
 9. *Vena sectio* sub methodo præseruatiue commendata, tanto magis necessaria est illis, quarum menses antea *largiter* vel *nimum* fluxerunt, iam vero per ætatis rationem ad finem properant: alias *finis* mensium fit *initium* multorum malorum. *conf. dissertat. D. D. Stahlis de fine mensium, initio malorum.*
 10. *Vena sectio* quando in *brachiis* instituitur, non debet esse *larga*, ne nimia ad partes superiores fiat reuulsio, & fluxus suppressio omnimode sequatur.
 11. *Quæ tabula de hæmorrhoidibus* ratione *specificorum* monuimus, hic etiam obseruanda sunt. Licet enim tam positue non adstringant, sed *specificè* magis effectum suum præstent, non promiscue tamen, nec nimis confestim exhibenda sunt.
 12. *Hippocrates Sect. V. aphor. 50. Mulieri*, inquit, *si menstrua velis cohibere, cucurbitam quam maximam ad mammas adpone.* Sed hoc consilium cautius, & non nisi præmitta venæ sectione, adsumendum est.
 13. *Quæ damna opium*, in hæmorrhagiis friuole vsurpatum, inferat, præcedentibus tabulis iam indicatum est.
 14. Sic etiam *purgantia & aloëtica* malum exasperant.
 15. In *hæmorrhagia uterina* adstringentia non nisi urgente maxima necessitate exhibeantur, ne huius fluxus suppressio, sanguinis stasis, febris acuta inflammatoria, putrida, &c. sequantur.
 16. Quando feminæ, *nondum maritatae*, de nimio mensium fluxu, eoque cum impetu ac violentia insigni frustisque coagulatis coniuncto, conqueruntur, res plerumque est suspecta. Excipimus autem illos casus, quando ad resc-

randos

randos mentes *fortia pellentia diu* vsurpata sunt, vel specialissima animi sensibilitas cum vita sedentaria concurrit.

17. Que. n ad modum mensium fluxus ordinarie circa finem septenarii secundi incipit, & sub finem septimi iterum cessat, sic dantur exempla, licet rariora, in quibus sub finem primi septenarii menses iam erumpunt, & satis mature cessant; quæ festinatio autem seu potius præcipitatio naturæ, raro summam senectutem pollicetur.
18. Tempore menstruo, præcipue quando fluxus *nimius est*, caueant sibi ægrotæ ab omni refrigeratione, in primis pedum, a terrore, ab iracundia, a violentis corporis motionibus, a diætâ crassa, aromatica & spirituosa.

TABVLA XV.

DE

SVPPRESSIONE MENSIVM.

I. DEFINITIO.

Suppressio mensium est symptoma excretionis debitam eüacuationem, feminino sexui propriam, siue penitus interuertens, siue plurimam partem suspendens, cum effectibus variis expectandis.

II. DIFFERENTIA.

Suppressio mensium triplici ratione consideranda est.

1. *Emanfio* dicitur, quando menses in innioribus debito tempore non proueniunt, sed ad annum vsque 16- 18- 20 vel per totum vitæ curriculum emanent. Talis emanfio est vel

1) *Tolerabilis*: sunt enim laboriosæ, quæ sub illa satis commode viuunt, nec vllum indicium congesti ad vterum sanguinis obseruant; vel

2) *Minus tolerabilis*, vbi ordinaria symptomata huius suppress-

pressionis vrgent. *conf. Progn.* Huc etiam referri possunt rariora illa exempla, quando feminæ quædam per totam vitam menses non experiuntur, quarum aliæ, docente experientia, nulla inde incommoda perferunt; aliæ autem satis misere viuunt.

2. *Retentio* seu *obstructio* vocatur, quando menses, qui antea fluxerunt, ex quacumque causa, siue prorsus suppressi sunt, siue tamen *non satis* succedunt, insuper etiam ante consuetam periodum subsistunt. Hæc autem suppressio vel *languide* & sensim, vel *simul* & *semel* contingit.

Ad hanc retentionem referri etiam potest *decoloratio mensium*, ubi vix sanguinis vestigia apparent, sed humor tantum pallidus, flauescens, subcruentus excernitur, cum variis spasticis incommodis coniunctus.

3. *Cessatio* nominatur, quando menses præmature & ante annum 49 cessant, eosque varia pathemata excipiunt.

III. SIGNA.

1. Varii motus spastici & congestiones: primum circa loca *confinia*, nempe mesenterium, hepar, lienem, ventriculum & intestina; successu autem temporis in locis etiam *remotis*, circa pectus & caput.
2. Grauitas artuum, angustia pectoris, difficultas respirationis, sub motibus corporis, præcipue ad ascensionis.
3. Appetitus prostratus, vagus, aut maior frigidorum & acidorum, quam calidorum, adpetentia.
4. Excretionem male procedentes, sudores vel nulli vel multi; alius modo præter naturam sicca, modo lubrica.
5. Vrina in aliis pallida, turbida, crassa; in aliis flammea excernitur.
6. Somnus vel multus, sed in somniis terrificis sæpius interruptus, vel nullus obseruatur.
7. Tristitia insignis, amor solitudinis, ad lacrimarum profusionem, ob leuiorem etiam causam, propensio.
8. Facies pallida, labia liuida, habitus vniuersi corporis respectu coloris & inflationis diuersus, pallidus scilicet in aliis

liis & turgidus, in aliis constrictus, cum maiore vel minore vasorum sufflatione.

9. Adspectus oculorum tristis, absentia fulgoris eorundem, circulus interdum liuidus eos ambiens, turgida palpebrarum constitutio.
10. *Signorum* loco etiam esse possunt omnia reliqua pathemata, quæ ab hac suppressione proueniunt, & sub *prognosi* indicabuntur.

IV. SVBIECTA

1. *Emanationis* sunt *puellæ*, temperamenti plerumque phlegmatici & melancholici, vitæ sedentariæ deditæ, morosæ; vbi sanguis non tantum in quantitate, sed etiam in qualitate peccat.
2. *Retentionis* seu obstructionis sunt familiaris plethoricæ, otiosæ, mœroribus & aliis anxiiis mentis afflictionibus expositæ. Vnde *sanguis* spissescit & *serum* mucido-viscosum contrahit lentorem. Item etiam illæ, quarum antea fluxus qualiscumque cum phasibus lunæ minus conspirauit.
3. *Cessationis* sunt feminæ intra annos circiter 35. & 45. constitutæ, quibus menses ob modo dictas vel corporis vel animi adfectiones præmature cessant.

V. CAVSSAE.

1. Causa *interna* quaerenda est vel in
 - 1) *Quantitate* sanguinis *simplicis*; nam præsentis insigni plethora natura non facile suscipit hæmorrhagias, ex timore, ne nimium fiat; vel in
 - 2) *Qualitate* seu spissitudine humorum, a qua etiam vitium viarum prouenit; vel in
 - 3) *motu*, qui vel *segnior* est, vt in valetudinariis, extenuatis, phlegmaticis; vel *erroneus*, vbi humores in alia loca, e. g. versus caput, pectus, ventriculum, diriguntur.
2. Causæ *externæ* & *occasionales* sunt
 - 1) *Mentis alterationes* e. g. subitus & ingens *terror*, vel *vehemens iracundia*, eaque suppressa, præsentis mensium fluxu contingens.

- 2) *Dieta* cruda & crassa, aut alia incongrua e. g.
 - a) *Panis* siccus vel adhuc calidus, modo ex clibano extractus.
 - b) *Massa friza*, minus fermentata.
 - c) *Placenta* pinguiores.
 - d) *Oua* dura nimium ingesta.
 - e) *Potus* frigidus, corpore calente immoderate haustus; aut potus ordinarii neglectio.
 - f) *Quævis acida & austera*; quæ omnia ob conspirationem primarum viarum cum vtero menses obstruere vel impedire possunt.
- 3) *Habitatio* in locis humido frigidis.
- 4) *Otiosum* & sedentarium vitæ genus.
- 5) *Refrigeratio* immodesta, præcipue quando pedes & partes inferiores aquæ frigidæ immerguntur, & quidem tempore, quo menses fluunt; lotricum exemplis.
- 6) *Sudores* nimii, qui multum liquaminis subtrahendo sanguinem spissiore reddunt,
- 7) *Abusus adstringentium & opiatorum* non tantum sub nimio fluxu, sed etiam in aliis morbis adhibitorum.
- 8) *Friuolæ venæ sectiones*, exque largiores in partibus superioribus eo tempore institutæ, quo fluxus proxime instat, aut iam iam erupit.
- 9) Emetica fortiora drastica.

VI. PROGNOISIS.

1. Innumera fere sunt mala, quæ mensium suppressionem sequuntur; plurimi enim huius sexus morbi ab hac dependent.
2. In *abdomine* succedunt
 - 1) Pathemata hypochondriaco-hysterica.
 - 2) Grauitas circa regionem vteri.
 - 3) Tormina abdominis.
 - 4) Punctiones circa vmbilicum.
 - 5) Grauillimæ intestinorum stricturæ, a quibus aliquod leuamen accipiunt, si abdomine introrsum complicato sedent.

6) Nau-

- 6) Nausea & conatus vomendi, immo vomitus cruentus.
 - 7) Dolores lumbares, tendentes & adgrauantes.
 - 8) Nephritis.
 - 9) Suffocationes cardialgicae, als wenn man ihnen mit zwey Händen etwas zusammen drückte, daß ihnen der Athem ausbleiben möchte.
3. In *thorace* exoriuntur
- 1) Angustiae praecordiorum & respiratio difficilis.
 - 2) Palpitatio cordis.
 - 3) Pleuritis spuria.
 - 4) Haemoptylis, aut aliae sanguinis consueto mensium tempore per loca insolita excretiones.
 - 5) Pulsus inordinatus, modo aequalis modo inaequalis, celer, tardus &c.
 - 6) Asthmata sicca & convulsiva.
4. Circa *caput* manifestant sese
- 1) Capitis dolores, in aliis grauantes & tendentes, in aliis vero lancinantes, spastici aut rheumatici,
 - 2) Vertigines.
 - 3) Cephalalgiae pertinaces.
 - 4) Hemicraniae.
 - 5) Anginae.
 - 6) Haemorrhagiae narium effrenes.
5. In *artibus* eueniunt
- 1) Lassitudo post motus etiam leniores increbescentes.
 - 2) Spasmi & dolores varii artuum rheumatici.
 - 3) Inflationes pedum oedematosae.
6. Per *uniuersum corpus* proueniunt:
- 1) Crebriores motus tonici in corpore mutationes, siue caloris & frigoris alternationes.
 - 2) Cachexia.
 - 3) Hydrops.
 - 4) Scabies, eaque modo sicca modo humida, vtraque vero curatu difficillima.
 - 5) Apostemata & ylcera mali moris.

- 6) Adfectus conuulsui, imprimis circa nouilunium aut consuetum menstrui fluxus terminum adfligentes.
- 7) Paralytes spuria &c.
7. Mensium defectus longe frequentior est, praesentiora quoque & grauiora damna infert, quam eorum excessus.
8. Mensium suppressio licet frequentius occurrat, facilius tamen congrua methodo fluxus reuocari potest, quam in aliis haemorrhagiarum speciebus.
9. Quando autem in paullo annosioribus *martialia* ad menses reuocandos frequenter adhibita sunt, vix vnumquam deinde fluxus restituitur; licet genuina methodus & optima quoque remedia ath beantur.
10. Suppressio aut cessatio mensium male tractata fluori albo benigno facile ansam praebent: vel tabida in aliis corporis consumtio cum variis hecticis symptomatibus tandem succedit.
11. Quibus fluxus mensium admodum praecox emicat, in illis quoque maturius cessat, & in vicem versam; quibus tardius erumpit, in his longius durat. Excipiendae autem sunt plerumque laborio'sae.
12. Quae fluxum menstruum plane non experiuntur, illae plerumque sunt steriles aut valetudinariae; interim tamen prostant exempla, vbitales, & nonnullae quidem frequentius pepererunt.
13. Mensium emansio aut suppressio, lente succedens, tanto periculo non exponit mulieres, quam praecipis mensium fluentium obstructio.
14. Fluxus menstruus in annosioribus per aliquot hebdomadas immo mentes suppressus, larga saepissime compensatur euacuatione per 14, immo quandoque 21 dies durante; licet non absque incommodis eius modi personarum.
- VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*
 Methodus secundum tres primarias causas, supra allegatas, tria etiam inuoluit momenta.
1. *Quantitas* sanguinis, si notabiliter vrget, ante omnia imminuenda est; alias reliqua medicatio minus commode & ad vota succedit.

Huic scopo inferuit venæ sectio, de qua tamen probe no-
tentur, quæ infra sub *cautelis* allegata sunt.

2. *Qualitas* sanguinis corrigenda est.

1) Ad *spissitudinem* sanguinis & mucidam feri conditionem
corrigendam commendantur resolventia, incidentia
& digestiuo-aperitiua, e. g.

1. *Radices* ari, pimpinell. alb. rub. tinctor. imperator.
vincetox. helen. angelic. petasitid. leuistic. ci-
chor. tarax. curcum. gramin.

2. *Herbæ* abrotan. absinth. cent. min. fumar. capill. ven.
marub. alb. cuscut. chamædr. rorismar. mar. ver.
serpill.

3. *Semina* anisi, foeniculi.

4. *Gummata* ammoniac. sagapen. galban.

5. *Salia digestiua* tartar. vitriolat. nitrum antimoniat.
arcan. duplicat. sal absinth. centaur. min. card.
ben.

6. *Composita*: pilulæ *Stablianae*, *Beckeri*, tinct. antimon.
essent. succin. essent. alexipharm. *Stablii*.

7. Item *infusum* ex herb. veronic. chærefol. heder.
terrestr. bellid. hyssop. rubiæ tinctor. & laxanti-
bus paratum.

2) *Orgasmus* sanguinis, qui interdum concurrit, & fluxus
successum turbat, contemperatur per nitrosa, præcipi-
tantia & cinnabarina.

3. *Motus* denique, tacta sufficiente correctione, ad locum ex-
cretorium blande inuitandus & leniter stimulandus est.
Faciunt hoc

1) Venæ sectiones in pede *conf. cautel.*

2) Pediluuiâ & infusus. Item frictiones pedum.

3) Adapplicatio cucurbitularum cæcarum ad femora & co-
xæ adicum regiones: item clysteres lenientes & mo-
deste simul stimulantés ac roborantes.

4) Laxationes per epicrasin; vbi radices & herbæ modo
commendatæ, cum fol. sennæ fibr. hellebor. nigr. &
rhabarb. in forma *infusi* possunt adhiberi.

- 5) Emmenagoga, quæ specifica virtute prædita esse dicuntur. Eminent inter hæc
1. *Radix bryoniæ.*
 2. *Herba: meliss. sabin. puleg.*
 3. *Flores: calendul. cheiri,*
 4. *Composita: myrchata, succinata, crocata.*
- 6) *Externe* laudatur, sed raro adhibetur, *sal volatile*, per instrumentum *Glauberianum* immediate adplicatum.
4. Ne in motibus instruendis & stimulantibus error committatur, ipsius *agentis interni* motus probe observandi & imitandi sunt. - Vbi itaque variæ spasticæ commotiones in abdomine & circa vterum sentiuntur, ibi convenit illos motus imitari.
5. Laboriosa conamina si excedere videntur, *essentia millefol.* stimulantibus ad sociari potest. e.g.
- Recip. Essent. myrrh. drachm. III.
succin. drachm. II.
pimpin. alb.
millefol. ana drach. I.
M. f. Mixtura.

dof. XXX. gutt. legitimo tempore propinanda.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Circa venæ sectionem sequentia sunt notanda.
 - 1) In iunioribus, infra annum vicesimum adhuc constitutis, non tam facile ad venæ sectionem festinandum est. Licet enim satis efficax sit, natura tamen facile ei adfuescere & in posterum idem remedium pertinaciter extorquere, alia autem, vtut optima, auxilia & medicamenta respicere solet.
 - 2) Quando itaque vena non secatur, methodus debet esse *temperatissima*, primum *attenuando*, deinde *inuitando* & denique *leniter stimulando*.
 - 3) Quando autem præsentiora incommoda vrgent, & quæ iam dicta sunt, non sufficiunt, tum sine trepidatione etiam in iunioribus venæ sectio instituat, modo in posterum non temere repetatur, nisi natura vehementer eandem efflagitet.

4) Si

- 4) Si vero venæ sectio necessaria videatur, non adeo abiolute opus est, vt cum illa curationis *intu* fiat, sed nonnumquam reliquæ methodo interferi, & sic post principia locari potest. Obseruandum autem est, quod extra phases nouilunii & plenilunii instituenda sit. *Conf. tabul. chirurg. de vena sectione.*
- 5) In tali casu medicatio æque *blanda* esse debet, ac in isto, in quo vena plane non secatur.
- 6) Quando autem cum venæ sectione medicationis fit *missum*, tum leniter stimulantia statim cum generalioribus combinari possunt. Hæc methodus est efficacior & breuioris temporis; molestior autem ob venæ sectionis repetitionem.
2. Facta venæ sectione solæ *pilula Stahlianæ* vel *Becherianæ* sufficere possunt: nam *qualitatem* sanguinis corrigunt, motus ad locum excretionis dirigunt & leniter stimulant. Modo hac methodo propinentur, vt versus tempus, superius indicatum, per sex circiter dies singulis mensibus exhibeantur, donec menses erumpant.
3. Eadem methodo exhibentur etiam hæc pilulæ in fluxu *imminuto*, vbi paucis diebus ante sanguinis eruptionem propinantur, & *sub ipso fluxu* continuantur: Nullo habito respectu ad vulgatam illam opinionem, quasi tum temporis medicamenta non conueniant. De incongruis hoc quidem verum est, de placidis autem & genuinis falsissimum. Nam hæc tali tempore longe efficacius operantur: hinc etiam *imminutio* mensium ob hanc temporis commeditatem multo citius, quam obstructio, in ordinem potest reuocari.
4. *Cessatio* mensium eandem exposcit medicationem. Quo diutius autem cessarunt, eo magis venæ sectio necessaria erit: nam refractarius est adfectus.
5. *Decoloratio* mensium, loturæ carnis instar, nihil aliud est, quam fluxus imminutus, & hinc eiusdem tractationis.
6. Quando autem menses per ætatis rationem cessant, præcipue, qui antea largiter fluxerunt: tum quam maxime opus

- pus est, verno & autumnali tempore venæ sectionem in pede substituere, & ad senium vsque eandem continuare, motusque per nitrosa & temperantia mitigare.
7. De *otiosis* loquimur: nam quæ feminæ vitæ genere laborioso fruuntur, illæ his omnibus facile superfedere possunt.
8. Modestus *corporis motus* ante omnia medicationi substituitur: illo enim absente sanguis non facile attenuatur, licet diluentia ad nauſeam quasi propinentur. Si vero *diluens* cum *diluendo* bene subagitur, salutaris ordinarie sequitur effectus.
9. *Stimulantia* & *pellentia* si improvide adhibentur, e. g. in statu insigniter plethorico, & quando primæ viæ nondum expurgatæ sunt, nec sanguis attenuatus est: plerumque inducunt
- 1) Maiores obstructions.
 - 2) Summas angustias præcordiorum.
 - 3) Non raro heteroclitas per aliena loca sanguinis eruptiones.
 - 4) Febres lentas, hæcticas, pthificas.
 - 5) Adfectus cephalgicos, spasticos, immo conuulsuôs.
 - 6) In spongiolis cachexiam & tandem œdemata.
10. Idem quoque iudicandum est de *falsis volatilibus*, quæ pariter tum non quadrant, si quantitas sanguinis nondum imminuta, nec qualitas correctæ est.
11. Prostant quidem obseruationes, quod *martialia* fluxum menstruum producerint; plura autem habemus exempla, in quibus ab illorum vsu suppressio huius fluxus subsecuta est. Vnde haud dubie practicoꝝ obseruatio pullulauit, quod *martialia* modo *obstruant*, modo *aperiant*.
12. Sed *tempora* sunt distinguenda. Quando enim exhibentur, dum sanguis circa vterum congestus est, blandam venæ portæ vasorumque vicinorum efficiunt stricturam, & sic *stringendo aperiant*, seu expressionem sanguinis per vterum promouent.
13. Extra has peculiare circumstantias *martialia* tam certo

hic nocent, quam ipsa *adstringentia*; & licet *laxantia* illis *interponantur*, illa tamen vix sufficiunt, stricturam semel inductam relaxare.

14. Symptomata grauiora e. g. anxietates, dolores & phlogoses intercurrentes, quæ omnibus fere hoc adfectu laborantibus communes sunt, optime per nitrosa cum cinnabarinis sociata mitigantur.
15. Aliquando menses, per aliquot periodos suppressi, solo *nitro regenerato* referati sunt.
16. Tempore *in termedio* ab *emmenagogis* abstinendum est, & diluentia tantum cum aperientibus vsque ad nouam periodum exhibere conuenit.
17. Inter remedia, *sanguinem* successiue attenuantia, & *seri mucorem* resoluentia, optime se gerit *succinum* & eius essentia.
18. Non minus etiam *essentia* alexipharmaco-diuretica *Stahlii*.
19. In serosioribus imprimis conducunt *radices ari*, *petasid. leuistic.*
20. *Specifici* aliquid habet *sabina*, indeque parata *essentia*; *oleum* autem destillatum nimium efficax ad stimulandos conatus; & proinde cautiùs adhibendum est. *Vid. num. 24.*
21. *Artemisia* longe effoetior est, nec, nisi in magna copia, aliquid præstat.
22. Herba *persicaria*, sub calcaneis gestata, alicuius efficaciam deprehenditur.
23. *Myrrha* ad *diluendum* & *attenuandum* non commendatur: sanguinem enim non solum resoluit & attenuat, sed etiam *infundendo* illo valde efficax est, & maiore præcipue dosi adhibita, eundem insigniter commouet. Cauendum ergo, ne sanguis prius, quam dilutus est commoueat.
24. *Olea destillata* sanguinem vehementissime commouent: absit igitur illorum vsus, vbi sanguis adhuc spissus est, & viz nondum satis præparatæ sunt; immo vix vnquam necessarium est, vehementia talia in vsum trahere: nam

methodus *lenior*, supra commendata, plerumque sufficit; nisi insignis cachecticus status aut diætæ vitium concurrat.

25. Fluxui *mensum*, præ omnibus aliis hæmorrhagiis, proprium quasi est, consueta loca relinquere, & alia eligere: hinc præsentē illo ab omnibus *reuellentibus*, siue internis, siue externis abstinendum est, e. g. a venæ sectione in brachio. Ex hisce considerationibus reicitur etiam *cucurbitula* mammis adponenda, quam *Hippocrates* scđ. V. aphor. 50. menstruis cohibendis destinat.
26. Fluxus quando semel reuocatus est, sollicitè nõua illius suppressio præcaueatur, multo enim pertinacius in ordinem post ea redigitur.
27. *Dieta* sit euchyala; abstinendo a cibis crassis & acidis: potus sit sufficiens, corpus bene moueatur, & aluus semper succedat.

TABVLA XVI.

DE

FLVXV LOCHIORVM ORDINATO ET NIMIO.

I. DEFINITIO.

Fluxus lochiorum est enacuatio solis puerperis propria, qua post exclusionem foetus siue *legitimi*, siue abortiui, siue *mole*, sincerus sanguis prioribus diebus, in tertiam subinde hebdomadem peculiari motu tonico per genitalia excernitur. Deriuatur a *λοχέω*, parturio.

II. DIFFERENTIA.

1. Fluxus lochiorum differt ab illa *speciali hæmorrhagia uteri*, quæ teminis quibusdam plethoricis, vel in matrimonio vel

vel extra illud constitutis, post mensum cessationem obtingit. *Conf. tab. de mensum fluxu.*

2. Fluxus lochialis est vel

- 1) *legitimus*, qui post partum, legitime exclusum, contingit, & siue *ordinate & moderate*, siue *nimum* succedit; vel
- 2) *abortiuus*, qui abortum non tam sequitur, quam potius illum antecedit, aut sub actu exclusionis enormiter perumpit.

3. Suppressionem lochiorum tabula sequens exhibebit.

III. *SIGNA.*

A. *Legitimi.*

1. Excretio *sanguinis* e genitalibus per 8-10-12-14. immo plures dies, statim post foetus & secundinarum exclusionem initium sumens.
2. Prioribus quidem diebus sanguis stricte dictus, grumofus, coagulatus, aut ad minimum humor cruentus, larga prorsus quantitate excernitur.
3. Post quartum vel quintum diem hæc excretio cum odore graui, nonnumquam plane foetido, coniuncta est.
4. Posterioribus autem diebus humor loturam carniū refert, & magis magisque flauescit, tandem prorsus pallescit, & vltima excretio lymphatica existit, quæ neque *coloribus* insolitis, neque *edoribus* foetidis inquinata deprehenditur.
5. Hæc omnia *ordinarie* successibus *moderatis & proportionatis* succedunt, vt fluxus sub initium *largiter*, successiue autem sensim *moderatus* sequatur, donec tandem prorsus subsistat.
6. Quando autem *secundina* diutius retinentur, aut portio illarum auulsa in vtero restitat, vel aliæ accidentales causæ accedunt, e g. quando puerpera diu quæta cubat, & effusus in vterum sanguis in frustra coagulatur, tum fluxus lochiorum facile *excedit*, & varia spastica incommoda in abdomine, & in primis circa vterum oriuntur.

B. *Abortivi.*

1. Conspicua *graviditatis* iudicia, quæ antecedunt, videantur
tabul. de affectibus gravidarum.
2. Ante, quam *abortus* excluditur, sanguis ordinarie leniter
& modeste profluit, deinde autem consumacii motu & en-
normi copia effunditur.
3. Vel *statim* sub initium cum tali violentia erumpit, præci-
pue quando feminae sunt vel plethoricae & largis men-
struis purgationibus adiuctæ, vel corporis & animi insi-
gnes commotiones præcesserunt.
4. Hanc sanguinis profusionem largam sequitur ipsius abor-
tus excretio, siue profus immaturi, siue maturioris,
siue alius concrementi seu molæ. Coniunctis plurimum
anxietatibus, lipothymiis & syncopiticis deliquis, nec
non spasticis in abdomine doloribus.
5. Vbi autem abortum aliquoties perpessæ sunt, ibi nego-
tium minore difficultate & paucioribus incommodis
succeedit.

IV. *SVBIECTA.*

1. Fluxui lochiorum *ordinato* obnoxia sunt omnes puerperæ,
quæ partum legitimum excluderunt.
2. *Nimum* autem fluxum facile incurrunt
 - 1) plethoricae.
 - 2) temperamenti præcipue cholericæ melancholici.
 - 3) quæ insignibus animi pathematibus, in primis iræ, obno-
xiae sunt.
 - 4) Porro quæ de vinosâ & aromatica diætâ gaudent.
 - 5) Quæ fluxum mensium antea *nimum*, vel tamen notabi-
liter *largum* habuerunt.
 - 6) Nec venam secandam tempore gestationis decente mo-
do curarunt.
 - 7) Quæ a laboribus liberae viuunt.
3. *Abortivo* fluxui obnoxiae sunt, quæ aliquoties abortum iam
excluderunt, aut in puerperio, proxime prægresso, mi-
nus recte expurgatae sunt.

V. CAVSSAE.

A. Fluxus legitimi & moderati.

1. Huius caussa est omnino *plethora*, quam prouida natura opportuna hac occasione imminuere intendit.
2. Licet enim *abruptio secundinarum* a tenerrimis ramulis capillaribus vterinis caussa occasionalis utique habenda sit, docent tamen vniuersæ circumstantiæ, quod hic fluxus magis *actiue*, quam *passiue* considerari debeat. Nam
 - 1) Fluxus sanguinis minorum vasorum *passiuus* in vulnere tantum *crudo* & nihil *alterato* contingit; nemo autem hanc vulnerationis vteri speciem tam diu crudam & nihil vsquam mutatam sibi persuadebit. Immo
 - 2) reliqua *vteri* substantia, ne per superficiem quidem totam, nedum profundius hac vulneratione adfecta est, sed solum in subtilissimorum vasorum extremitatibus. Hinc
 - 3) horum vasorum subtilium libertas, facta foetus exclusione, vterique subsidentia, & strictura satis promte accedente, potius opprimitur; prout hoc in aliis vulnerebus profundioribus tenuiorum ramificationum euenit
 - 4) Inprimis autem *actiuam* huius fluxus indolem illustrat proportionata illa & moderata, per plures dies continuans, sensim sensimque deficiens *excretio*, quale quid in nulla hæmorrhagia *passiua*, a solutione continui orta, obseruatur. Tandem
 - 5) hic ipse fluxus facile per diætam, terrorem, refrigerationem tam internam, quam externam, imminui potest aut supprimi. Quæ sane cuncta satis confirmant, causam non simpliciter a passiuo sanguinis lapsu, sed potius ab actina excussione dependere; id quod clariùs & magis confirmat fluxus *abortiuus*.

B. Legitimi nimii.

1. Causam generalem cum ordinario fluxu eandem agnoscit.
2. Causæ *occasionales* præcedente membro in *subiectis* plurimum indicatæ sunt.

3. His adhuc adiicimus

1) *secundinarum* deficientem excretionem.2) Vsum *pellentium* & sanguinem fortiter commouentium, sub partus difficili exclusione.C. *Abortiui.*

1. Sanguis superfluus valdeque molestus, siue per animi pathemata siue per alias occasiones vehementer commotus, ad abortum disponit.

2. Si vero aliquoties abortus iam contigit, causa magis in *moralibus*, quam phisicis rebus quaerenda est.VI. *PROGNOSIS.*1. Fluxus lochiorum, *legitime* succedens, insignis est *utilitatis*; deficiente autem illo, plura incommoda ac grauiora pericula inferuntur. *Vid. tabul. sequens de suppressione lochiorum.*2. Prae omnibus aliis haemorrhagiis hic fluxus *excessui* expositus est: praecipue quando secundinae aut portiones tantum illarum remanserunt. In hoc enim casu non prius, quam excreta sunt retenta, obtineri potest mitigatio.3. Lochia quando *mediocriter* tantum excedunt, minus quidem periculum minantur; quando autem *prodigiose* & cum impetu sanguis effunditur, aegrotantis vires intra paucas horas insigniter exhauriuntur, immo penitus consumuntur. Denique4. *Ingentes* huiusmodi profusiones lochiales, qui sibi relinquuntur, longe minora incommoda post se trahunt, quam illae, quae incongrua arte cito supprimuntur.

5. Quo immaturior abortus a tertio mente existit, eo grauior haemorrhagia exclusionem illius ordinarie comitatur. Et hoc phaenomenon clarius docet, causam non simpliciter a passiuo sanguinis lapsu sed ab actiua excusione dependere.

6. Licet sanguis multo impetu non procedat, non exiguae tamen est considerationis, quando diu continuat aut per breuia interualla recurrit. Nam uterus non satis expurgatur; vnde postmodum grauis mensura perturbatio,

& no-

& nouus facile abortus, vel sterilitas, aut certe infelicioꝝ gestatio succedit; ante omnia vero febres acutas, inflammatorias, tum etiam torminosos, spasticos vteri & mesenterii adfectus producit.

7. Vbi sanguis *copiose* iam profluxit, ibi abortus nulla ratione impediri potest; licet optima *cohibentia* & *roborantia* adhibeantur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Fluxus lochiorum *moderatus* nulla quidem indiget medicatione, ad præcauendos tamen siue excessus, siue defectus, aliaque symptomata præoccupanda, pilulæ *Stahlianæ*, per nouem priores dies quotidie ad gr. XV. propinari possunt. Quando autem vsitatissimo more *crocum* vel in cibis vel in *essentia* adhibere placet, necesse est, vt moderatissimis dosibus & paucis guttulis vtamur.
2. Fluxus autem *nimius* eadem ferè methodo, qua nimius fluxus *mensium*, tractatur, nempe
 - 1) exhibentur ter per diem remedia, quæ *orgasum* sanguinis temperant, videlicet *absorbentia* & *nitrosa* cum pauca *cinnabari* combinata.
 - 2) Versus noctem autem dosis pilularum *Stahlis* porrigitur, & hac ratione quotidie continuatur.
 - 3) His non sufficientibus ab aliis remediis operæ pretium vix exspectandum erit; probari tamen adhuc possunt *mitiora cohibentia* & *lenia anodyna*, e. g. spec. de hyacinth. coralliata, crocus mart. antimoniat. tenerior, tinctur. vitriol. marr. *Ludouici*, item M. P. de cynoglossa, trochisc. de carabe, *millesol.* siue in forma infusi siue extracti ad gr. I-II. pro dosi. Porro *castarilla*, gestatio *bufonis* exsiccati. Quod ad dietam attinet, potus bene defœcatus, cum tantillo citri vel nuc. moschataræ mixtûs utilis est.
 - 4) Quando constat, quod *secundine* vel in totum vel ex parte resistent, vsus pilul. *Stahlis* tanto magis commendatur. Potest etiam illarum exclusio promoueri per *hepar anguille*, ad scrup. I. cum portione *analeptica* propinatum.

3. *Fluxus abortiuus* eandem exposcit medicationem, quam *nimus*: vbi enim profusio sanguinis præsentissimum lethalem exitum minatur, & lipothymici adfectus superueniunt, ibi spectatorem otiosum agere non conuenit, sed exclusio foetus vel molæ quantocyus promouenda est per dosin pilularum *Stahlii*, quæ prius solui & post 12. horas, si necessarium erit, repeti potest. Quando autem pilulæ hæ ad manus non sunt, *hepar anguilla* vsurpari debet.
4. *Abortu cum secundinis* rite excluso mitigatio fluxus tentetur per remedia *temperantia*, orgasmum sanguinis sistentia, & lenia adstringentia: coniuncto vsu pilularum *Stahlii*.
5. *Hæmorrhagia* tandem sedata propinentur discutientia interna, v. g. *mixtura tonico-neruina Stahlii*, vel *essent. alexipharmaca* cum *essent. millefol.*
6. Ad fluxum lochiorum *nimum* præoccupandum commendantur
 - 1) *Vena sectio* in brachio aut pede circa medium gestationis tempus administranda, immo si reliquæ circumstantiæ exigere videntur, etiam circa *instantem* partum repetenda.
 - 2) *Ligatura* abdominis post legitimam foetus & secundinarum exclusionem.
 - 3) *Quieta & tranquilla animi ac corporis continentia*, in primis abstinencia ab adfectata illa orthostadia & multis fermocinationibus.
7. Ad nouum abortum præcauendum commendatur
 - 1) *Vteri expurgatio* ope pilularum *Stahlii*, statim post illius exclusionem per plures dies propinandarum.
 - 2) *Vena sectio* congrua circa illud tempus, quo antea abortus exclusus est.

VIII. CAUTELEÆ ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Puerperæ tamquam *vulneratae* merito considerantur, quibus *exleuissimis* causis febres inflammatoriæ accedere possunt. Hinc remediis, sanguinem fortiter *commo-*

- uentibus*, quouis modo abstinendum, & quidem in ipsis adeo phlegmaticis, nedum sanguineo-plethoricis.
1. *Adstringentia*, quæ motus salutares, exclusionem respicientes, opprimunt, quantum vniquam fieri potest, euitentur. Quando autem vrgente casu necessaria iudicantur, parcius adhibenda sunt: interpositis temperantibus & diapnoicis, ne febres inflammatoriz accedant, vel hydrops aut hæctica subsequatur.
 2. In omnibus hæmorrhagiis, in quibus *nimum* factum esse videtur, *alexipharmaca* moderata locum habent.
 3. *Aluum* prouocare per communia laxantia non decet. Quando itaque *pilula Stabliana* desunt, *clysteres* emollientes commodissime adhibentur.
 4. Sæpe obseruatum est, quod *pilula Stabliana*, per nouem dies exhibitæ, prioribus ne vnicam quidem sedem produxerint, puerperæ autem fluxum lochiorum ad vota & cum optima euphoria habuerint. Quod sane negotium, recte pensitatum, satis demonstrat, pilulas hæc nullam naturæ vim inferre, sed illius *intentioni* apprime respondere.
 5. Idemetiam obseruare licet, quando pilulæ *Becheri* genuinæ puerperis, modo non adeo sensibilibus, offeruntur.
 6. Pro restaurandis viribus *analeptica* locum habent: pro quo scopo in aduetis *potus vinosus* non reformidandus est. Conducit etiam *usus vini medicus*, nempe cochlear vnum vel alterum vini Canariensis, Maluatici, Hispanici, subinde exhibendum, vt & lactinia, emulsiva, pultacea, amygdalata.
 7. *Species de hyacintho* in omni nimio fluxu merentur laudari; nam præter virtutem tonicam, quam habent, & subadstringentem, *analepticum* quid simul fouent.
 8. Exsulent remedia valde *incrassantia*, *narcotica* vulgaria & *acria* externa *repellentia*.
 9. Iactura sanguinis quando contigit insignis, caueant sibi ægræ non tantum ab *animi* & *corporis*, verum etiam *se-*

- suum commotionibus* e. g. a limpida & splendida luce, oculis nocente.
- ¶ 1. *Potus* magna circumspeditione puerperis porrigendus est: *calidus* enim, multo magis autem *frigidus*, facile tormina & flatus potest excitare. Hinc *sepius* tantum offeratur, refracta, sed sufficiente, portione.
 - ¶ 2. Magis profunt decocta *hordei* decorticati, *avenæ* decorticatæ, *iufcula tenuia*, cum sufficiente conditura aromatica; addito non nisi momento *macis* seu nuc. moschat. *iufcula vinosa*, postquam partes spirituosæ in vase aperto per lenem coctionem quodam modo auolarunt; addendo dimid. part. aquæ fontanæ, modicum sacchari, vitellum oui, paucum boni butyri, & tantum *croci*, quantum iufculum moderate tingendum requirit. Et hæc quidem omnia in statu lochiorum ordinato & moderato.
 - ¶ 3. Potus *ceruifæ* fermentescentis puerperis non conducit.
 - ¶ 4. *Abortus* quando contigit, soli naturæ negotium non relinquendum est, quia non semper sufficit vtero recte expurgando. Vnde non raro postea nouus abortus exoritur; ad quem præcauendum tanto magis sollicite ea obseruentur, quæ sub *methodo* commendata sunt; in primis motus corporis *moderatus* ad æqualem sanguinis distributionem multum confert; contra onerum gestationes grauiores nocent.
 - ¶ 5. Ceterum, dum non leges tantum diuinæ, sed & multæ considerationes physicæ thori vsum præmaturum puerperis interdiciunt, optandum esset, vt, qui Christiani audiunt, intra illos ad minimum limites, quos modesti etlanici transcendere erubuerunt, se continerent.
 - ¶ 6. Conferatur *tabula de affectibus puerperarum*.

TABVLA XVII.
DE
SUPPRESSIONE LOCHIORVM.

I. DIFFERENTIA.

Suppressio lochiorum est vel

1. *Completa*, quando nullus sanguis excernitur; vel
2. *Incompleta* seu *imminuta*, ubi fluxus in aliis quidem periodum suam per 8. 10. 12. dies seruire solet, sed tam impedita tamque *parca* quantitate sanguis provenit, ut pro tali fluxu vix possit reputari; in aliis autem subito ante terminum consuetum plane supprimitur.

II. SIGNA.

1. *Completa* suppressio per se constat.
2. *Imminuta* autem illa habenda est excretio, quæ a norma, quam *tabula de fluxu lochiorum* sub *signis* indicauimus, deflectit.
3. In diiudicanda autem *imminuta* excretionem distinguenda sunt temperamenta & reliquæ puerperarum constitutiones, secundum quas fluxus lochiorum variare solet, e g.
 - 1) Quæcumque feminæ *largiorem* fluxum *mensium* extra impregnationis tempus habuerunt, illæ etiam *lochiam* largiora experiri solent.
 - 2) Quibus autem *mensis* *parcius* fluxerunt, in illis etiam fluxus *lochiorum* non ita copiosus est expectandus.
 - 3) Respicienda etiam sunt *lochiam* *prægressa*, nam ad horum indolem succedentia plerumque accedunt.
4. Manifesta tandem huius fluxus imminuti aut subito suppressi signa sunt
 - 1) *abdomen* tensum, durum & tumidum cum variis spasmodicis, torminibus & anxietatibus.
 - 2) *Sensus* doloris grauantis, tendentis & lancinantis, infimum

mun ventrem, lumbos & inguina occupantis; coniuncto ardore ac pulsatione.

III. SYBIECTA.

Suppressioni lochiorum siue *completa* siue *imminuta* præ aliis obnoxia sunt

1. *plethorica*,
2. Quæ sunt *temperamenti sanguinei*, laxo corporis habitu, exiguisque *venis* instructæ.
3. Quæ *marori*, *timori* & *terrori* valde obnoxia.
4. Item quæ turbatam aut plane suppressam purgationem menstruam antea expertæ sunt.
5. Denique quibus causæ aduentitiæ subsequentes succedunt.

IV. CAUSSAE.

A. Interna.

1. *Motus tonicus* alteratus, quo vel ipsa uteri textura, vel exitus eiusdem rigide ocluditur.
2. *Orgasmus* abundantis sanguinis, qui ad suppressionem multum contribuit; neque obstat, quod & *nimis* fluxus causa interdum esse solet.
2. Licet enim *plethora simplex*, nedum cum *spissitudine* quadam coniuncta, hæmorrhagias quaslibet impedire possit, minor tamen illius est efficacia, quam si *plethora commota* concurrat, & vasa turgida conspiciuntur.

B. Externa & aduentitia.

1. *Refrigeratio* corporis & *potus frigidus*.
2. *Remedia pellentia*, quæ ad partum excludendum adhibita fuerunt.
3. *Abusus calidorum* remediorum: quando enim talia pro lochiis *imminutis* adhibentur, *completa* facillime suppressio producitur. Huc pertinent *myrrhata*, *crocata*, *salia volatilia*.
4. *Animi pathemata*, præcipue *terror* & *iracundia*, per quam sanguis ad orgasmum insigniter concitatur.
5. *Immodici* & *præmaturi* puerperarum labores ad partum, a quibus expansio sanguinis etiam notabiliter producitur.

V. PROGNOISIS.

1. Nulla datur hæmorrhagia, cuius defectus tam *præsentia*, & tam

ram presso pede *succedens* pericula ac damna certo adfert, quam suppressio fluxus lochiorum; maxime vero quando subito & repente facta est.

2. Illa quidem suppressio seu imminutio, quæ ex *abundantia* sanguinis, cum *spissitudine* qualicumque coniuncta; originem sumit, *mitiores* consecutiones habet, nempe

- 1) angustias præcordiorum.
- 2) inquietas corporis agitationes,
- 3) capitis dolores.
- 4) adpetitus prostrationem.

3. Quando autem suppressio lochiorum ab *orgastica* seu turgida sanguinis commotione dependet, tum *graviora* pathemata producuntur, nempe

- 1) *febres* acutæ, inflammatoriæ, præcipue exoritur in quibusdam regionibus *purpura miliaris* cum manifesta sæpius malignitate.
- 2) *Congestiones & stases* circa caput, vnde deliria, angina, aphthæ, it.
- 3) *Afflictiones suffocativa, syncopica, summe cardialgica,* vomibundæ aut hæmato-emeticæ sequuntur, quæ vel præcipitem sortiuntur exitum, vel chronicum morbum constituunt e.g. heticam, cachexiam, colicam conuulsivam, tympanitem, ascitem.

4. Sed hæc pathemata, quæ *presente* tempore producuntur, non sufficiunt: sæpe enim contingit, ante omnia post *abortum*, vt lochia, cito suppressa, in *futurum* etiam damna sua extendant, nempe

- 1) in *utero* facile coagula, concrementa, vlcerationes relinquuntur.
- 2) quæ *novam* in posterum *conceptionem* vel impediunt, vel
- 3) factam conceptionem non parum turbant, dum foetui nutrimentum subripiunt, & nouo facile abortui ansam præbent.
- 4) His incommodis plerumque accedunt *mensum ataxia,* *stabiles inflationes* abdominis, & varij spastici hypochondriaco-hysterici adfectus.

- 5) Qui tandem transeunt in conuulsiones epileptico-hystericas, vel motuum syncopicas omissiones,

VL. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Vbilochiorum tantum imminutio præsto est, ibi
 1) interne, leniter *stimulantia*, moderatissimis tamen dosibus, adhiberi possunt. e. g.

Recip. essent. myrrh.

succin.

scord. ana drachm. I.

croc. scrup. I. M. dosis 20 25. gutt. bis

per diem exhibenda.

Coniungi hic possunt diluentia, infusa, iuscula vinosa parcius crocata: in *robustis* quoque *elixir. proprietat.* item essent. alexipharm. cum pauca portione essent. melissæ, cinnamomi, pulegii remixta.

- 2) Externe cataplasmata aut *sacculi* ex temperatis vegetabilibus resoluentibus, neruinis & roborantibus adhiberi possunt; additis oleis lenientibus & paululum camphoræ, croci orientalis, castorei.

Item *pediluua* & *fomenta* moderate vaporosa ex herbis peruinis temperatis.

2. Quando autem lochia prorsus suppressa sunt, circumspectio experimentis probata vix vniquam concedit, fluxura *directe* & per *stimulantia* reuocare. *vid. cautel.* minime omnium, si suppressio iam per aliquot dies durauit.
3. Conuenit potius ad causas huius suppressionis, præcipue vero ad *orgasmm* sanguinis respicere, & aestuationes *febriles* præoccupare. Huic scopo inserviunt *pulueres febriles* nitroso-temperantes, & *potiones* diapnoicæ ex aquis destillat. e. g. plantag. card. benedict. flor. sambuc. scabios. vlm. paratæ. it. iuscula pinguia, decocta gelatinosa & emulsiua.
4. *Aluus* semper sit libera, & vrgens quando adest plethora, moderata *vena sectio* statim in pede instituat.
5. *Febris* ipsa si accedit, iidem pulueres & eadem potiones diapnoicæ conducunt, neglecta illa, circa *utri* usum;

for-

formidine vulgari. *Confer. cautel. & tabul. de adfectibus puerperarum.*

6. Post puerperium menses in illis, quæ vel lactare non possunt, vel peruerse nolunt, promouendi sunt, per remedia suo loco indicata.

VII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Pilulas Stahlis*, vel etiam *Becheri* genuinas, qui dextre poterit adhibere, omnibus aliis stimulantibus & pellentibus, utpote minus fidis ac tutis, commode supersedebit.
2. Quando lochia *plane* supprimuntur, numquam Medicus in animum inducat, per *pellentia* & alia *calida* remedia fluxum reuocare, quia negotium hoc non solum difficillime succedit, sed & variis periculis expositum est.
3. Quæ cautela tanto magis est obseruanda, quanto frequenter contra eamdem insignes committuntur errores, dum febrilia calida, aloëtica, myrrhata, & sic dicta vterina promiscue exhibentur.
4. Damna, quæ inde redundant, communia sunt illis, quæ *tabula de suppressione mensium*, per eadem pellentia tractata, indicauimus: nempe obstructio vel augetur cum grauioribus abdominis pathematibus; vel, si omnino fluxus iterum erumpit, facile tamen febres inflammatoriæ vterinæ succedunt.
5. *Opiata*, quæ ad sedanda tormina colica, & spasmos abdominis compescendos, quibusdam in usu sunt, lochia profus supprimunt, & afflictionem adaugent.
6. Per *vena sectionem* lochia reuocare velle, secundum consilium per vulgus notum, nullo modo potest commendari.
7. Licet enim in quibusdam indiuiduis plethoricis, quæ tempore medio gestationis venæ sectionem non admiserunt, excretio talis artificialis nonnumquam vtiliter possit adhiberi, hoc tamen consilium circumspectioni Medici est relinquendum; qui vero, quo magis sanguis *qualitate* peccat, eo minus per eandem optatum successum obtinebit.

8. Metus ille vulgaris, quod *nitrum* ob expectandas diarrhoeas, puerperis periculosas, tuto non possit adhiberi, sufficiente in contrarium experientia, satis iam est sublatus. In *medico* hic consistit virtus: ad *sex* enim circiter *grana* nitrum exhibitum tantum abest, vt diarrhoeas prouocet, vt potius illas praecoccupare & sedare soleat.
9. *Essentia succini non alcalisata, sed alcoholisata*, seu per solum spiritum vini rectificatissimum sine salibus parata, & cum paucissima portione *essentia croci* combinata, parcius & repetitis dosibus adhibita, extra commotiones febriles, vsu suo non caret.
10. In *orgastico* sanguinis statu absorbentia egregie se gerunt. Temperant autem nimiam hanc sanguinis exagitationem non tam *absorbendo*, quam potius *interponendo*: quilibet enim motus intestinalis sanguinem reddit subtiliorem; quando autem crassiuscula absorbentium corpora interponuntur, effectus ille resoluens & turgidus impeditur.
11. *Dietam*, puerperis conuenientem, *tabul. de fluxu lochiorum* iam indicauimus, *conf. etiam tabul. de adfectibus puerperarum*.
12. Speciatim adhuc notandum, quod in fluxu lochiorum *tantum imminuto* parcissimus *croci* vsus, ad leuem iusculorum cincturam adhibitus, extra commotiones febriles vtiliter adhiberi possit; vti sub *methodo* paucis iam dictum est.
13. Sic etiam modicus *generosi vini* vsus, praecipue in adfuetis siue iusculis, siue potionibus sumtus, non solum a periculo hic alienus est, verum etiam aliquem adhuc effectum ad fluxus impediti promotionem praestare solet.
14. Regimen tandem non sit anxium & aestuosum, omnesque irritationes ad euacuationem aluinam hic euitentur.

TABVLA XVIII.

DE

CONGESTIONIBVS COMPLETIS
GENERATIM.

I. DEFINITIO.

Congestio est specialis directio sanguinis, a natura ope motus tonici versus loca peculiaria copiosius & hunc quidem in finem ordinarie collecti, vt per hæmorrhagiam ibidem euacuari, & illius abundantia hac ratione imminui debeat.

II. DIFFERENTIA.

1. Indoles horum adfectuum optime exprimitur per vocem *congestiorum*; hac enim aliquid actiui designatur. Contra vocabula *regurgitationum, stagnationum, stasium, obstructio- num*, quæ his in morbis vulgo adhibentur, & passiuam si- gnificationem habent, neruum rei non attingunt. ♀
2. Congestiones enim *actiuam* sanguinis compulsionem ad certa loca hæmorrhagica designant. Hinc differunt
 - 1) *A stagnationibus*, in quibus progressio sanguinis in parti- bus siue porosis siue vasculosis ita impeditur, vt licet simpliciter nondum subsistat, tam copiose tamen re- fluere non possit, quam quidem adfluit.
 - 2) *A stasibus & obstructioibus*. Nam in his non tantum motus progressiuus, sed & qualitas humorum insigni- ter alteratur; in congestionibus autem, qua talibus, horum neutrum contingit.
3. Congestiones sunt
 - 1) Vel *simplices, completae & directe hæmorrhagicae*, in quibus sanguis versus talia loca restringitur, quæ ad illius per- ruptionem & effluxum apta sunt, e. gr. versus nares, pulmones, ventriculum, vterum, intestinum re- ctum.

- 2) *Vel incompleta, latius se extendentes & diuagantes, quæ rheumatismi nomine veniunt, & in quibus sanguis verus easdem quidem regiones & in eundem finem hæmorrhagicum congeritur; quoniam autem minus tantum & in loca, quæ a viis hæmorrhagicis longinque distant, congeritur, perruptio illius non potest expectari. Contingunt autem incompletæ tales congestiones in rheumatismis stricte dictis, in adfectibus arthriticis & in omnibus sic dictis frigidis catarrhis.*
4. Congestiones differunt porro ratione loci.
- 1) In *unioribus enim caput,*
 - 2) *Media ætate pectus,*
 - 3) *Consistente autem ætate abdomen, videlicet renes, ventriculus & hæmorrhoidalium loca, ordinariè ab iisdem in festantur.*
5. Tandem congestiones differunt ratione effectus & euentus,
- 1) *Vel enim veri sanguinis euacuatio succedit.*
 - 2) *Vel si ob materiæ qualitatem aut colatoriorum constrictionem toti massæ sanguinæ alior aditus non conceditur, tenuiores tantum illius portiones euacuantur. Vnde effectus seroso mucidus, catarrhalis dictus, vel seroso-salsus & corruptioni ulcerose propinquus emergit. Germani vocant: scharffe salzige Stülße. Huc pertinent coryza, tussis humida, asthama humidum. Has congestionum species bechicas vocare solemus.*
 - 3) *Quando autem plane nulla euacuatio succedit, humores congesti vel sensim iterum discutiuntur, vel in stagnationem & stasin deducuntur. Vnde varii effectus inflammatorii & suppuratorii, vel pro materiæ & locorum diuersitate œdematosi, glandulosi & scirrholi sequuntur.*

III. SIGNA.

Hæc desumuntur ab effectibus congestionum.

1. In partibus enim adfectis obseruantur
 - 1) *Infarctus, inflationes & distensiones vasorum, ita quidem, vt & exilissima vascula, quæ visum alias estugiunt, turgida sæpius adpareant.*

- 2) *Dolores* opplentes, tendentes, grauentes.
 - 3) Quando autem altius & acrius sese exserunt congestiones, accedit *rubor* & *calor* præter naturam, & dolores obseruantur acuti, lancinantes, fremebundi, pungentes, pulsui respondententes.
 - 4) Quam primum autem euacuatio sanguinis sequitur, plurima hæc incommoda cito sæpius euanescent; id quod nonnulli ægrotantes ipsi præfagiunt dicendo: Wenn nur das Biuten kâme, so solte der Kopf bald leichter werden.
 - 5) *Hæmorrhagia* autem non succedente complicantur facile tumores, acuti dolores, inflammationes, immo vlcerationes manantes.
2. In partibus *remotis* occurrit
- 1) constrictio spastica, ita, ut vasa penitus detumescant.
 - 2) Sensus frigoris, immo interdum veræ refrigerationis.
 - 3) Reliqua signa e *congestionibus* specialibus, quæ *tabulis* subsequentibus exhibentur, elucescent.

IV. SVBIECTA.

Congestiones, quamquam frequenter occurrere videntur, non omnibus tamen hominibus eadem facilitate eueniunt, sed illis præcipue,

1. Qui insigniter plethorici existunt.
2. Qui vitæ otiosæ, sedentiæ & diætæ lautæ dediti sunt.
3. Qui euacuationibus sanguinis, siue naturalibus, siue artificialibus adsueti fuerunt, & iam immunes ab illis viuunt.
4. Huc etiam pertinent, qui euacuationes *serosas*, quas habuerunt, neglexerunt, e. g. foniculos, setacea, vesicatoria.
5. Ceterum non quælibet ætas ad quamlibet, sed ad illam tantum congestionem habet procliuatatem, quæ cum hæmorrhagia, cuius ætati competente, habet connexionem.

V. CAUSSAE.

1. Fictiones *Veterum* de *electiua missione*, quasi animæ vel spiritus certas quisquilias ad idonea loca exportent & proiciant, negotio congestionis sufficientem lucem non accendunt.

2. Interea tamen plus rationis habent, quam *Recentiorum* causa *passiua* fermentationis spumescens, stasium & obstructionum. Vera enim obstructio est accidens satis periculosum, quod tam frequenter in corpore humano contingere, vti quidem congestiones, numquam vero similem est.
3. Quamquam etiam negari non possit, quod congestiones dentur, quæ hæmorrhagiam non respiciunt, quodque *Recentiorum* materia acris, neruos vellicans, modo biliosa, modo salina, in certa quadam regione hærens, stimulo suo congestiones interdum prouocare solet, tanto magis, quando iam veræ stases & corruptiones adsunt: hæc tamen congestiones non *passiua* sed *actiua* censendæ sunt. Natura enim per adfusionem humorum acrimoniam temperare, abstergere vel quamcumque aliam molestim auertere intendit.
4. Præter ea acris illa materia non per se in tali loco *passiue* colligitur, sed per prægressam qualemcumque aliam congestionem ordinarie eo ducitur; id quod in rheumatismis præcipue est familiare. Et sic sinister euentus *primæ* congestionis prouocat *secundam*, quæ primam exacerbabat.
5. Interea tales congestiones, quæ vel materiæ acris temperationem vel alia molesta auctenda respiciunt, longe rariores sunt, quam congestiones simpliciter *hæmorrhagica*.
6. Et sic pro *primaria* causa *materiali* congestionum accusamus *plethoram*, præcipue insigniter *commotam*.
7. Pro causa *specialiore* habemus difficultatem successus hæmorrhagiæ. Quando enim vel ob humorum spissitudinem vel ob viarum stricturam sanguis strictè dictus non potest euacuari, tum vel portio tenuis serosa tantum excernitur, vel plane nulla euacuatio contingit.
8. Causa *efficiens* est intentio naturæ ad sanguinem abundantem exonerandum.
9. Causæ *occasionales externa* sunt
- 1) Exagitatio impetuosa.
 - 2) Infolitus vini potus.
 - 3) Aer humido-frigidus, non raro etiam humido-calidus.

- 4) Speciatim quando solis aestus capiti, parum tecto, diu admittitur.
- 5) Item hypocausta humilia, cum primis proxime terram sita, ubi pedes & crura frigore, caput autem calore adificitur.
10. Restat, ut de *caussis dolorum* nonnulla adiiciamus, qui vel ab *actibus* vel ab *effectibus* congestionum dependent, seu vel *ab ipsa* congestione, vel *per* & *propter* illam excitantur.
- 1) *Ab ipsa* congestione oriuntur
- a) Vel *materialiter*: Quando enim materia congesta *stagnans* est, sub mora sua format *calores*, *ardores*, *pruritus*; & quando in *stasi* deducta, eoque ipso corruptionibus obnoxia est, tum *resiones* & intolerabiles *ardores* ad ulcerationem usque efficit.
- b) Vel *formaliter*, nempe ab ipso actu congestionis. Ab hoc dependent sensus *infartuum*, *tensionis*, *granitatis*, immo *frigoris* & *stuporis* cum subsequente sensu illo fremebundo *dormitionis*.
- 2) *Per* & *propter* congestiones veniunt dolores, dum peculiaris renisus seu actus reciprocos expulforius, disculforius & repulforius a natura per actiuam stricturam in parte adfecta distenta suscipitur, ut vel effectus congestionis promoueri, vel metuenda stasis praecipuari & molesta partium solidarum distensio auerti debeat. Oriuntur hinc motus *spastici contentiosi*, praecipue per fibras singulares, & ab his dependent *punctiones*, *lancinationes*, *vellicationes*, *tractiones*, *torfiones*, immo vibrantes, palpitantes & fremebundae commotiones.
- 3) Paucis: omnes dolores dependent vel ab acuta actiuam *tensione*, vel a calore insigniter aucto, vel a vera & sine tropo dicta *acredine salina rodente*. Acerrima autem dolorum species est illa, quae a tensione originem ducit: cuius rei verum documentum est *tortura*, quae secundum *Hildanum* podagricos dolore superat & profligat

VI. PROGNOSIS.

1. Apparatus congestionum non raro maior est, quam destinatus illarum finis requirit. Hinc varii sinistri effectus *stagnationum, stasum* inflammatoriarum & *corruptionum* oriuntur; de quibus sub *signis* iam diximus & tabulis sequentibus per species fulius dicetur.
2. Interdum etiam *stupores & paralyticae* debilitates partem adfectam occupant; quæ tamen mitioris sunt prognoses, quam veræ paralytes.
3. Quo minus euacuatio *hemorrhagica*, quam natura respicit, obtinetur; eo pertinacior est congestio, & eo maiora incommoda spastica & dolorum inde sunt expectanda. Hinc congestio *incompleta rheumatica* difficilius curatur, quam *completa*.
4. Congestiones, quæ in *pectore* fiunt, grauioribus & acutioribus morbis portam pandunt, quam quæ in capite & abdomine oriuntur. Sanguinis enim euacuatio, quam natura intendit, felicem in pectore exitum obtinere non potest.
5. Quæ congestiones in *consuetudinem* iam abierunt, illæ, licet causa materialis subtracta sit, non facile cedunt medicationi, sed leuissimis potius occasionibus nouam scenam ludunt.
6. Congestiones, quæ *incongrua ætate* contingunt, periculo non carent.
7. Peruersæ congestionum tractationes, præcipue quæ fiunt per *narcotica* incongrua, per *remedia calida & regimen sudoriferum coactum*, efficiunt vel crebriores paroxysmorum recursus, vel morbos maxime irregulares; de qua re sub tabulis specialibus plura dicemus.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. *Aluus*, quæ in congestionibus ordinariè stricta est, soluatür & soluta seruetur

- 1) Vel per blandum *laxans* e. g. rhabarbarinum, pilul. *Beycheri* cum extracto ellebori nigri combinatas, magnesi-
am albam &c.
- 2) Vel per *clysterem* emollientem & demulcentem. Hac
ratione *reversio* quoque humorum a superioribus par-
tibus obtinetur.
2. Nimia *sanguinis expansio* & *spastica fibrarum* stricturæ, quæ
sub moribus congestiis, iisque immoderatis, oriuntur,
demulceantur per absorbentia, nitrosa, cinnabarina,
cum diaphoreticis fixis combinata, e. gr. conch. præp. o-
cul. præparat. nitr. depurat. antimon. diaphoret. cinnab.
antimon. vel nativ. Hi pulveres sæpius per diem repe-
tantur.
3. Quando autem *dolorum atrocitas* nimis vrget, tum ad agentis
acerbitatem placandam lene *anodynum* diætis pulveribus
addatur & ante somnum exhibeatur. Laudamus in hunc
finem M. P. de cynoglossa cum cortice cascarillæ.
4. Hisce pulveribus interponantur & subiungantur illa reme-
dia, quæ *aqualem sanguinis distributionem* promouent. In
hunc scopum commendantur
 - 1) *Alexipharmaca temperata*, moderatis dosibus & opportu-
na horarum discretionem propinanda. e. g. essent. ale-
xiph. *Stablii*.
 - 2) *Diaphoretica blanda*, diluentia largiter & calide hausta e.
g. infusa thée, coffeæ, veronicæ, teucris folio, salv. flor.
lauendul. &c.
5. Ad sanguinis congesti & restagnantis discussionem adhi-
beantur simul *topica*; sed cum cautelis inferius notatis v.
g. spiritus vini camphoratus, liquamen lumbricorum ter-
restrium cum spiritu vini camphorato mixtum; item e-
pithema illud, quod per vulgus notum est, & ex semine
carui, baccis iuniperi, sale communi & mica panis fer-
mentati paratur. Subordinentur eodem tempore *lenia*
repellentia ex nitro, saccharo saturni & aceto rosaceo præ-
parata.
6. Denique tonus partium adfectarum *roboretur*.

- 1) *interne* e. g. per tinct. tonico-neruinam *Stablii*, essentialiam succin. cum essent. lign. & sarsaparillæ combinatam.
- 2) *externe* per facculos nervinos cum spiritu vini camphorato & crocato madefactos.

B. *Extraparoxysmum.*

1. *Ventilationes sanguinis præservatoria* circa æquinoctia instituantur & constanter repetantur.
2. His sanguinis euacuationibus præmittantur & subiungantur *laxationes per epicrasin*, quæ spissitudinem sanguinis & cacochymiam corrigunt. *Conferantur tabula de spissitudine & cacochymia.*
3. Rerum non-naturalium conueniens vsus obseruetur; in primis quod ad motum corporis placidum & perennantem attinet. Hunc enim qui negligit, illum optima quoque remedia a congestionibus non defendent.

VIII. *CAVTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. Ex causis allatis manifesto concludere licet, quod in congestionibus legitime tractandis *quantitatem* imminuendam magis quam *qualitatem* corrigendam respicere debeamus.
2. Et quoniam in ipsis etiam *bechicis congestionibus* e. g. coryza, tussi humida, tumore œdematoso & reliquis, imminutio sanguinis a natura intenditur, hoc autem *indicatum* a paucissimis obseruatur: necessarium est, vt Medicus communem viam hic deserat, & negotium sanguinis abundantis in his adfectibus primario consideret.
3. *Quem ad modum egregium momentum prudentiæ practicæ est, quamlibet congestionem cum relatione & respectu ad hæmorrhagiam illam specialem, cui respondet, tractare: ita non minoris dexteritatis nota est, noxios congestionum motus cum noxiis hæmorrhagarum speciebus conciliare & eadem ratione æstimare. Qui hac cautela incedit, ille e. g. in congestionibus pectoris, non facile expectorantia, sed potius reuellentia & discutientia adhibebit.*
4. In omnibus congestionibus abstinendum est ab *immodestis euacuantibus.*

5. Non minus ab *alexipharmaco-diaphoreticis calidis & regimine coacto*. Temperata autem ante, quam adhibentur, alui legitimum successum exposcunt.
6. In *incremento & statu* congestionum a *discutientibus & repellentibus topicis* prorsus abstinendum est. Alias adfectus non mitigatur sed acerbatur.
7. *Anodyna* eadem cautela exhibentur. Quando enim sub doloribus, vti plerumque fieri solet, & ante debitam euacuationem adhibentur, grauia & pertinacia mala inde expectanda sunt.
8. Quæ de *venæ sectionibus*, in paroxysmis institutis, sub hæmorrhagiis passim indicauimus, quod scilicet in *presens* tantum, non autem in *futurum*, auxilium adferant, & præter ea inconuenientes consecutiones producant: illa in congestionibus omnibus probe etiam sunt obseruanda.
9. Quid de *pediluniis, vesicatoriis & fonticulis* obseruandum sit, & in quibus congestionum speciebus locum habeant, sequentibus tabulis indicabitur.
10. In pertinacibus illis congestionibus hypochondriaco-ischiadico podagrico-hæmorrhoidalibus talis efficacix sunt *hiruadines*, orificio intestini recti adplicatæ, qualis a nulla alia medicatione expectanda est.
11. *Essentia succini* in omnibus congestionibus, dolores post se trahentibus, officium suum optime facit, quando cum essentia alexipharmaca *Stahlii* iungitur & repetito propinatur.
12. In congestione, quæ *copiose*, & præcipue in corpore *spongioso* exoritur, abstinendum est sub *initium*, & in ipso *statu* a salibus volatilibus vrinosis, in primis largius propinatis; in notabili vero *declinatione* bene se gerunt. Notandum autem, quod a paruis dosibus sit incipiendum.
13. Quæ vero congestio *paucam* materia contingit, e. g. hemicrania minus plethoricorum, illa in ipso etiam *statu* admittit *salia volatilia*, sed remixta cum *unctura salis tartari* vel *antimonii*. Nam alcalica hæc fixa per acrimoniam suam promouent diureticam euacuationem, serosam etiam tenacitatem potenter incidunt, & sic ad æqualem humo-

- rum distributionem atque congestionum & discussionem multum contribuunt.
14. *Liquamen lumbricorum terrestrium* per spiritum vini præcipue camphoratum & pauca nitri portione a corruptione præseruatum, est antispasmodicum non contemnendum.
 15. *Analeptica*, quæ in forma emulsionis gratæ & quodam modo dilutæ exhibentur, pertinaciam rigidæ & spasticæ constrictionis egregie demulcent.
 16. *Embroche* seu stillicidia balnearia, præsertim paullo fortius allabentia, sæpissime effectus sunt non poenitendi, & illis quidem in casibus, quorum congestionibus dolores fixi, in partibus præcipue carnosis, accedunt.
 17. *Blandus calor* tum in ipsa parte adfecta, tum in reliquo corporis habitu, tam efficaciter prodest, quam refrigeratio nocet. Notandum autem est contra communem morem, quod calor in parte adfecta blandior esse debeat, quam in aliis partibus, ad quas humores deriuandi & reuellendi sunt.
 18. *Ligatura partium* oppositarum suam habent vtilitatem, præcipue quando circa initia, quo tempore humores in motu adhuc constituti sunt, fulcipiuntur.
 19. Quando autem humores quiete quasi iam restagnant, plus possunt *frictiones*. Hæ enim sensum fremebundum latius diffundunt & eo ipso spasticum toni rigorem demulcent.
 20. *Amuletica & specifica* interdum satis efficacia sunt, in subiectis præcipue sensibilibus. In usum autem non trahenda sunt prius, quam vel plane sub initium, vel vniuersalibus præmissis.
 21. Ex amuleticis *buso exsiccatus* in plerisque congestionibus efficaciter solet adhiberi; cuius rei in congestionibus *angimode* experimentum habemus, quod per ipsum vulgus satis notum est.
 22. Cautelæ, quæ de usu *rerum non-naturalium*, præcipue autem de scrupuloso victus & aëris selectu, passim inculcantur, illæ fontem, ex quo congestiones primario oriuntur,

untur, non attingunt. Notum enim est, quod illi homines a congestionibus satis liberi sint, qui omnes aëris iniurias perferre & victum dyspeptum adsumere tenentur.

23. *Animi autem commotiones* turbulentæ sollicitè evitentur: multum enim conferunt, ut congestiones repullulent.

TABVLA XIX.

DE

CONGESTIONIBVS INCOMPLETIS

SEV

RHEVMATISMO.

Michaelis Jacob Folyata

I. DEFINITIO.

Rheumatismus est contentiosum & diffusum molimen hæmorrhagicum, quo principium vitale humores per congestionem incompletam ad varia corporis loca & præcipue in *viciniam* illorum, quæ sanguini euacuationem concedunt, copiose quidem adpellit, quoniam autem hisce motuum adparatibus ad ipsum exitum directe non tendit, sed *latiore* ambitu partem obsidet & tergiuersando *eminus* tantum hæmorrhagiam respicit; loco sanguinis euacuationis stagnatio illius & varia incommoda tensionis, grauitatis, pressionis atque acris ardoris, & tandem vltiores noxii effectus & euentus introducuntur. Deriuatur a *ῥέω*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Rheumatismus vi vocis rem maxime generalem denotat, & potius ut *caussa* variorum adfectuum instrumentalis quam *morbis* considerandus est. Motus enim suos tam

simpliciter non seruat, neque tam *uniformes* conatus diu prosequitur, vñ quidem *hemorrhagia*, sed in varia schemata admodum pronus, & vlterioribus nouorum morborum generibus generalem, vt dicunt, influxum supeditat.

2. Hæc generalis rheumatismi acceptio *Hippocratisiam* temporibus nota fuit. Quando enim *libro de prisca medicina* prolixam mentionem facit non tantum *rheumatismum* generatim, sed *acriam* humorum, qui *fluxu* in partes deterrantur, speciatim; tum rheumata non vt ipsum morbum sed vt *causam* aliquot morborum, ibidem nominatorum, arguit.
3. Differunt autem rheumatici decubitus
 - 1) Ratione *loci*. Modo enim
 - a) *exteriora*, modo
 - b) *interiora* corporis loca occupant.
 - 2) Ratione *extensionis*. Modo enim
 - a) *arctioris & particularis* sunt ambitus; modo
 - b) *latius* sese extendunt, & non contentum *circa* illum locum, qui exitui sanguinis patet, adfigunt, sed integram aliquam corporis regionem occupant; modo
 - c) *latissime* & per vniuersum corporis ambitum eiusmodi contentiosæ diffusiones exoriuntur. Et hic vniuersalis quasi rheumatismus egregiam habet conuenientiam cum molesto illo *fatigationis & contusionis* sensu, quem plethorici post insolitam & vehementem corporis agitationem a simplice sanguinea tensione, in partes porosas insolentius retundante, sequente die experiuntur.
 - 3) Ratione *causæ*.
 - a) Qui enim rheumatismi *latioris* sunt ambitus, illi a simplice sanguineo-ferosa materia & a sinceris sanguineo-hæmorrhagicis moliminibus dependent, atque de his *simplicibus & sinceris* præcipue valet *defini-*

110.

b) Qui

- b) Qui vero *arctioris & particularis* sunt ambitus, illi, præcipue in membris *interioribus*, sumunt quidem etiam aliquando occasionem a negotio sanguinis impedito, in *exterioribus* autem locis plerumque a causis, quæ sunt præter naturam, producuntur.
4. Rheumatismus differt ratione *ætatis*. In iunioribus enim præcipue caput, in *adultioribus* pectus, diaphragma & præcordia, in *senibus* autem modo hypochondria, unde *lumbago rheumatica*; modo totam venam portæ cum visceribus adnexis; modo inferiores corporis partes infestat.
5. Differt etiam ratione *indolis*; quo respectu alius est
- 1) *Mitior*, nempe ille, qui latioris est ambitus, & exteriora loca occupat; nisi quidem in adfectum phlegmonodeum degeneret.
 - 2) *vehementior*, qui angustioris est tractus & interiora loca occupat. Hic enim acrioris est sensus & ardoris.
 - 3) *Perinacissimæ indolis*, qui ex adfuetu humorum decubitu vel discrasia sanguinis individuali contumaciter sustentatur. Præcipue autem maxime importunus, & stasibus mali moris formandis idoneus est rheumatismus, quando tenuiores sanguinis particule ferro viscoso intertextæ intra penitissimas porosarum partium angustias coarctantur.
6. *Rheumatismus* seu congestio *incompleta* quo modo a congestione *simplice & completa* differat, præcedente tabula indicatum est.
7. Discernendus etiam est *rheumatismus* ab *inflammatione*. In hac enim vera humorum *stasis & feruidus æstus*, in illo autem, quam diu adhuc genuinus est, simplex tantum *stagnatio* cum *acri* ardore occurrit. Quando autem insultus rheumatici sunt fortiores, ipsa inflammatio accedit, quæ *interne* fit phlegmonodes, *externe* ordinarie erysipelato-des, numquam autem apostematodes.
8. Porro differt rheumatismus ab *arthritide*. Licet enim hi duo adfectus non sint res maxime diuersæ, sed subordinatæ & sæpius complicatæ, leuior etiam arthritidis rheumatis

tis nomine non raro laruatus occultatur ; differunt tamen sequentibus circumstantiis.

- 1) Rheumatismus veram *humorum restagnationem* format, arthriticis autem *spasticam contentionem* per partes solidas exercet.
- 2) Rheumatismus sedem habet in partibus *musculosis*, arthriticis vero *iuncturas* partium potissimum occupat.
- 3) Rheumatismus arthritidem ordine antecedit,
9. Differt denique *rheumatismus a catarrho*. Hunc enim constituit materia *pituitosa* & sic dicta *frigida*, illum autem materia *acris*; & quoniam hæc partem illam, quam infestat, præter reliquos dolores, etiam *ardore* adficit, *calida* solet vocari. Vnde Germanorum differentia, *kalte und hitzige Flüsse*, nata est. Et sic rheumatismus catarrhum *sensibilitate* longe superat.

III. SIGNA.

1. Restrigitur sanguis in certam corporis regionem, qui ibidem *restagnans* varias molestias producit.
2. Videlicet sensum *tensionis*, pressionis, grauitatis, fatigationis.
3. Conspicitur *inflatio* & leuis *distensio* partis adfectæ.
4. Coniuncta est *ineptitudo* illius membri ad *motum*, præcipue propter sensum, quem infert acutum & contulorium, quam primum sensui huic *pressorio* qualiscumque *repressio* seu *renisus* siue per contactum, siue per motum voluntarium aut situs mutationem accedit.
5. *Calor*, qui in suffarctu hoc adhuc mobili sentitur, & a *materiali distensione* multum dependet, & magis *acris* & *inquieta*, quam *feruidus* & *astuans*. Atque hæc signa sunt rheumatismi *simplicioris*.
6. In illis autem rheumatismi speciebus, quæ *accidentali* constitutione fiunt *indolis deterioris*, omnia symptomata obseruantur *acerbiora*. Fortior est impetus, impetuosior adfluxus, maior humorum restagnatio & partis distensio, exquisitior etiam est sensus tendens & vibrans, ardor autem ad dolorem inflammatorium fere accedit.
7. Præter ea comitatur interdum *fortiores* hosce insultus rheu-

rheumaticos sensibilis *motuum tonicorum alternatio*, & quæ nexu haud separabili cohæret, *frigoris & caloris volatica variatio*; quæ vero, licet generali sensu pro actu febrili haberi possit, cum specialibus tamen febris circumstantiis non conuenit; nisi omnia maxime sint acerbata.

8. Atque hæc incommoda semper sunt *mitiora* in rheumatismis *externis*, adhuc sinceris; *acriora* in sinceris quidem, fortioribus tamen *internis*; non minus in *externis phlegmonodeis*; *acerrima* in *phlegmonodeis internis*.

IV. SYBIECTA.

1. Rheumatismus occupat plerumque homines *vegeta ætatis* & quidem vtriusque sexus.
2. In quantum cum negotio hæmorrhagico simpliciter conspirat, in tantum proprius & familiaris est *plethoricis otiosis*, præcipue quando præter consuetudinem fortio rem corporis motum interdum admittunt.
3. Quod ad *temperamentum* attinet, primum locum occupat *sanguineum*, quod laxo & spongioso corporis habitu iunctum est.
4. Præter ea infestat *teneros & animi pathematibus* obnoxios.
5. Quando autem *robusti & laboriosi* a rheumatismo corripuntur, non plethoricæ sed *externæ* causæ subesse deprehenduntur. *Vide causas externas.*

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* rheumatismi *simplicis* est *plethora*, præcipue *commota*. Non opus autem est vt rheumatismus *crasi determinata* circumscribatur, quia ex sincera tota massa decubitus fieri solet; quamquam negandum non est, quod acris & tenuis humorum dyscrasia altius penetrare & acrius adfligere possit.
2. Pro causâ *formali* motus quidem hæmorrhagicos agnoscimus, quos principium vitale, tamquam causâ *efficiens*, instituit: quoniam autem incompleta sunt molimina, quæ non directe sed *eminus* tantum hunc finem respiciunt, non possunt non a scopo suo aberrare. Cur vero *eminus* solum exitum tentet natura, id vel in abiecta spe liberalis

hæmorrhagiæ successus, vel in aliis impotentiis atque difficultatibus quærendum videtur.

3. *Causa instrumentalis* est motus tonicus alteratus & auctus, quo humores in partes musculosas deferuntur & propelluntur. Quoniam autem crassiores sanguinis particule altius penetrare non possunt, solæ tenuiores salino-sulphuræ & organico-serosæ ad partes sensibiles membranaceo-neruoso-tendinosas secedunt, molestum illis sensum imprimunt, & hinc vltiorem humorum adfluxum facile accelerant.
4. Hæc valent de rheumatismo, qui *latis* est ambitus, & a *sanguineo-serosa* materia atque a moliminibus sinceris hæmorrhagicis initia sua sumit. Qui vero *exigui* seu *arthrici* ambitus est rheumatismus, ille quidem, præcipue quando in partibus *interioribus* exoritur, etiam ab *hæmorrhagicis* moliminibus interdum dependet, frequentius autem in *exterioribus* corporis regionibus a causis, quæ *præter naturam* sunt, originem suam ducit. *Vid. n. s. & signa.*
5. Causas *externas, violentas & procatarticas* sequente ordine collocamus.
 - 1) Tempestatum mutationes, aut aliæ frigoris & caloris repentinæ commutationes & vicissitudines.
 - 2) Venæ sectionis & scarificationis consuetæ omissio.
 - 3) Vesicatoriorum & fonticulorum, diu gestatorum, neglectio.
 - 4) Hæmorrhoidium adfuetarum impeditus successus.
 - 5) Mensium qualiscumque suppressio.
 - 6) Læsiones partium solidarum, vel diurnæ illarum irritationes, e. g. contusiones, dislocationes, luxationes, fracturæ, ulcerationes diu manantes, vulnera cum grauibus inflammationibus stipata, ambustiones, pernioles. Hisce enim indiuiduis mutationes tempestatunæ, commotiones animi, vel aliæ irritantes causæ insultum rheumaticum, & quidem in loco vniquam læso, facillime prouocant.
 - 7) His accidentalibus causis merito subiungimus *febres*, quæ interdum symptomaticæ eius modi rheumatismos

smos seu particulares decubitus & metastases humorum efformant, quando legitime non decurrunt.

- 3) Tandem *consuetudo* horum motuum & dispositio *hereditaria* rheumatismos pertinaciter sustentat.

VI. PROGNOSIS.

1. Rheumatismorum effectus numquam est utilis.
2. Quum enim *simplices & sinceri* a moliminibus hæmorrhagicis incompletis dependeant, sanguinis autem euacuationem non adsequantur, neque etiam alio modo imminutioni humorum satis faciant: facile concludendum est, quod nihil aliud, quam congeriem incommodorum, sub *signis* nominatorum, introducant.
3. Euentus *benigniores*, qui rheumatismos *moderatos, & sincera* materia præditos, sequuntur, hi sunt, ut omnia incommoda post aliquot dies, vel sine vel cum quacumque euacuatione, sponte & successiue remittant, & hæc quidem cum lenibus successibus, extra *stata tempora*, quasi indifferente modo.
4. Euentus autem *peiores* sunt copiosæ stagnationes, quæ nonnumquam per plures hebdomadas perseuerant, & stases, non suppuratoriæ, sed erysipelacæ & phlegmonodæ, quarum hæc posteriores rariore quidem, sed & periculosiores sunt, præcipue in partibus internis.
5. Et quando remediis calidis atque calido regimine tractantur, hoc periculum augetur.
6. Quando autem per *repentinam & impetuosam* horum adfectuum oppressionem *velox translatio ad interiora* contingit, periculosior adhuc est euentus. Hac enim ratione materię quantitas in angustiore locum cogitur.
7. *Expulsio* autem ab *interioribus ad exteriora* pari effectu minime succedit. Non enim ut erysipelas aut phlegmone, sed ut rheuma ad exteriora erumpere possunt, quia hic non sunt simplex & directus adfectus vel perpetuus effectus, sed potius rheumatismorum male cedentium solus euentus. Et quando discussio staseos obtenta est, tum nouam eius concentrationem seu collectionem in exterioribus partibus minime expectare debemus.

8. Multo minus rheumatismus, qui diætarum inflammationum fomes est, *translationem sinceram* ab vno loco in alterum admittit, sed contentus est vera *discussione*.
9. Non est familiare *simplici* rheumatismo, vt repentina, copiosa & stabili congestione in artum quemdam incumbat, & contumaciter illum obsideat; solemnius autem est illis rheumatismis seu *apostasibus*, quæ *febris*, incommodè cedentibus, proueniunt, & cras, in primis *alterum*, impetu quodam inflare solent.
10. Hic infarctus quando mature non dissoluitur, sed stabilis subsistit, *arx & sedes* fit, ad quam commotiones rheumaticæ, vndecumque orientur, iuratum quasi *receptum* habent; promptius etiam ob leuiore causas paroxysmi recurrunt, & maiora incommoda adfectæ parti conciliant.
11. Videlicet augefcit ardor, rubor, vibratus & fremebundus dolor cum febrili languore, inquietatione, prostratione adpetitus, agrypnia, angustis præcordiorum.
12. Hæc constitutio quouis modo periculofior est, quam *simplex* rheumatismus, quia facile *inflammatorie febres* accedunt, vel *relapsus ad interiora* periculofus contingit.
13. Ceterum recursus rheumatismorum sunt benigniores, præcipue in ferofioribus, quando excreciones placidæ & successiuæ accedunt; id quod Medico lucem genuinæ tractationis accendere potest.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Curandi.

1. Resolutio & discussio humorum restagnantium respiciatur.
 - 1) *Interne* per antimon. diaphoret. arcan. duplic. bezoard. min. lumbric. terrestr. præparat. coniunctis temperatis alexipharmacis v. g. essent. alexipharmac. *Stablis*, mixtur. simpl. essent. scord. pimpin. alb. vincetox. & in mitiore adfectu, succini, absque regimine coacto sudorifero.
 - 2) *Externe* per spirit. vini rectificatiss. camphorat per sacculos ex speciebus resoluentibus & discutientibus paratos, v. g. ex herb. chanaom. rorism. mentæ maioran. puleg.

puleg. matricar. hyssop. epithymi, betonic. thymi, flor. chamom. sambuc. melilot. stœchad. lauendul. cum camphora.

- 3) Quando autem pertinacius se gerit adfectus, spirit. vini camphorat. cum modica quantitate spiritus formicar. vel spiritus abstractit. serpilli maritatus conducit. Ipsæ denique embrocationes cum decoctis temperate neruinis & pediluuiis vsus haud sunt contemnendi.
2. Motus congestorio - spastici modeste cohibeantur, organus sanguinis temperetur, & partium stricturæ leniantur per nitrum cum absorbentibus, it. decocta gelatinosa & emulsiva cum modica quantitate papaueris, per ipsum denique serum lactis ac potum dilutum & sufficientem.
3. Quando autem necessitas vrget & adfectus pertinaciter continuat, dictis imperantibus misceatur cinnabaris, corall. rubr. præparat. M. P. de cynogloss. semen papauer. & syrup. eiusdem.
4. Ante omnia vero alius semper aperta seruetur per lenia laxantia, aut mitiora euacuantia; cui scopo inseruiunt rhabbarbarina, fennata, tamarindinata, magnesia alba, extract. panchymag. *Crollii*, massa pilul. de succino *Cratonis*, & instar omnium pilulæ *Stahlianæ*.
5. Tandem in declinatione adfectus circa finem mixtura tonico-neruina *Stahlis* obferatur.

B. Præseruandi.

1. Ratio maxime habeatur euacuationum sanguinearum tam naturalium, quam artificialium. Hinc circa æquinoctia venæ sectio in pede instituat, & in aduictis scarificatio interdum interponatur.
2. Præcipue autem hoc necessarium est, quando hæmorrhoides vel menses impeditæ fluunt; quo casu applicatio hirudinum ad loca hæmorrhoidalia subiungenda & turbatæ aut suppressæ hæmorrhagiæ modeste reuocandæ sunt.
3. His ob primarum viarum saburram & sanguinis abundantiam ferosam subinde interponatur laxatio per epicrasin.

4. Theriacum vñs, præsertim in spongiosis subiectis, hic non reicitur.
5. Optimum autem & præstantissimum remedium, nempe *motus corporis sufficiens & perennans*, vbique coniungatur. *Vid. cautel.*
6. Tandem *causæ occasionales*, quæ paroxysmos rheumaticos reuocare solent, quouis modo euitentur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In rheumatismo exsulent remedia *agitantia* calidiora, aut *refrigerantia*, lympham & serum densantia: grauiora enim & vehementiora incommoda post se ducunt.
2. Non minus euitentur *humida*, quia tonum admodum relaxant & eneruant.
3. *Opiata* adfectum rheumaticum præsentem non tantum reddunt contumacem, sed & quacumque leui occasione eundem reuocant.
4. *Salia volatilia* partes subtiliores facile repellunt, & crassioribus relictis tumores ac stupores inducunt.
5. Maxime omnium sibi caueat Medicus ab *oleis destillatis*, item ab *unguosis, emplastis* tenacibus, & omnibus maturantibus atque abcessum facientibus. Non enim est indoles rheumatismorum, abcessionem strictè dictam formare.
6. Minus quoque & sibi & ægrotis consulit Medicus, quando fortiora *purgantia & emetica* aut calidiora diaphoretica cum regimine coacto propinat: facillime enim cum aliis grauissimis pathematibus *arthritidis* inducitur.
7. Ipsa *venæsectio* curandi scopo instituenda locum non habet; nisi summa vrgeat necessitas: nam & præsentia incommoda, si non reperatur, parum minuit, & futura reddit admodum: fontica, nempe nulli, nisi huic medelæ, amplius cedit adfectus.
8. De *spiritu vini* notandum, quod sit rectificatissimus. Si secus, plus detrimenti quam emolumenti adfert. Quando autem *salis* non est ad manus, topica in forma sicca tutius adhibentur.

9. *Ellentia succini* hoc in adfectu præseruandi scopo, præmissis quæ sanguinis quantitatem immittunt, egregiæ est efficacitæ. Immo in ipso paroxysmo, non adeo acerbato, laudatur.
10. De *motu corporis* in paroxysmo negandum quidem non est, illum sub initium maiores dolores, immo eiulatus, excitare; adseueramus autem & multis testibus confirmamus, quod hoc remedio, placide primum adhibito & deinde moderato tenore per tres vel quatuor horas continuato contumacissimi rheumatismi, qui alias optimis remediis per plures hebdomadas resistunt, vno die felicissime profligentur.

TABVLA XX.

DE

INFLAMMATIONE GENERALITIM.

I. DEFINITIO.

Inflammatiõ est principii agentis negotium vitale, quo illud per motum humorum congestorium & adpulsorium, in aliqua corporis parte ultra gradum naturalem auctum, sanguinem in veram stasim deductum discutere, vel, sin hoc non amplius obtineri possit, sulphureas, fermentescentes & summe agiles particulas, in hac stasi contentas, subtrahere, & reliquam languidam, minus noxiam, materiam in pus laudabile coquerere conatur; vt hac ratione corruptio putrida, seu sphacelosa, a stasi tali expectanda, præoccupetur, & præcepta fermentescens diffusio intercipiatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Inflammationis tres sunt species.

1) *Erysipelas* dicitur, quando inflammatio in superficie occur-

currit, & per membranaceas partes in *latitudinem* diffunditur, tumoremque æqualem, mediocriter ardentem, & dilute roseum format. Germanice vocatur die *Rose*, der *Nothlauf*.

- 2) *Phlegmone* adpellatur, quando inflammatio in *latum* & *profundum* æqualiter & satis amplo spatio extenditur. Differentias speciales mox subiungemus.
 - 3) *Apostematodes* inflammatio vocatur, quæ vel in superficie, vel subtus, arctiori spatio circumscripta est, & *profunditatem* illius partis, quam obsidet, magis penetrat. Huic inflammationum speciei partes carnosæ aut glandulosæ in primis sunt expositæ.
 - 4) *Gangrena* non est peculiaris species inflammationis, sed potius infelix istius, præcipue apostematicæ, euentus.
2. *Erysipelas* differt a *phlegmone gradu*:
- 1) nam in *latum* tantum est diffusum, & ita solum *cutis* inflammationem exhibet. *Phlegmone* autem tam in *latum* quam in *profundum* tendit.
 - 2) in *erysipelate* color magis ad flauedinem, in *phlegmone* autem ad ruborem excedit.
 - 3) *Erysipelas* mutat subinde sedem suam, & ex vno in alium locum cedit, augmenta etiam celeriter sumit; *phlegmone* autem in vno loco subsistit, & tardius augetur.
 - 4) *Erysipelas* maiorem quidem feruorem inducere obseruatur, *phlegmone* autem, uti non raro a *metastasi febrilis* exoritur, ita plerumque motus febriles habet coniunctos. Nam motus inflammatorius *particularis* quando in vniuersam humorum massam diffunditur *febris* inflammatoria adpellatur.
 - 5) *Erysipelas*, quando premitur, color dispareret, & mox redit, *phlegmone* autem propter duritiem suam hanc coloris mutationem non subit.
 - 6) Inter ea hoc habent commune, ut ad *suppurationem* non inclinent. Quando autem incongrua arte maturatio promouetur, corruptio *seroso-salsa*, loco laudabilis suppurationis, facile producitur:

- 7) De *phlegmone* notare adhuc conuenit, quod ab auctori-
bus non æque exacte describitur. Plerumque enim
generico sensu ab illis sumitur. Est autem *species* in-
flammationis, quæ stasin sanguinis intra poros & te-
nuissima vascula in *latum* & *profundum* inuoluit.
3. Inflammationes differunt ratione *materia*, stasin, forman-
tis, & hinc dicuntur vel
- 1) *simplices*, quæ a stasi pure *sanguinea* in partibus carnosis &
vasis sanguineis oriuntur, & ad corruptionem siue
suppuratoriam, siue putredinosam proclives sunt, vel
 - 2) *compositæ*, quæ multum seroso-lymphaticæ substantiæ
comprehendunt, & in falso-ulecrosas corruptelas
abeunt.
4. Differunt etiam *ratione locorum* adfectorum, & secundum
hanc diuisionem sunt vel
- 1) *externæ*.
 - a) Huc pertinent omnes erysipelacei adfectus faciei, ma-
nuum, brachiorum, genuum, tibiarum, pedum.
 - b) Apostemata externa.
 - c) Furunculi in peripheria corporis prouenientes.
 - d) Tumores inflammatorii v.g. parotidum, tonsillarum,
vuulæ, mammarum, testium.
 - e) Ophthalmia, odontalgia, otalgia &c. vel
 - 2) *internæ*.
Huc non solum pertinent phrenitis, angina, pleuritis, pe-
ripneumonia, paraphrenitis, hepatitis, nephritis, sed
etiam omnes febres inflammatoriæ, in quibus motus
auctior, antea particularis, per vniuersam sanguinis
massam diffusus est. De his speciales tabulas intra
exhibebimus.
5. Ardor *inflammatorius* non confundendus est cum æstu san-
guinis *congestorio*, ille enim semper veram stasin, hic au-
tem stagnationem tantum sequitur.

III. SIGNA.

A. Inflammationum *externarum*.

1. Generalia.

- 1) Facta sanguinis stasi mox accedit *tumor*, qui non solum

X

par-

- partem immediate adfectam, verum etiam viciniam occupat.
- 2) Huic tumori tempestive succedit *rubor* & *æstus*, seu potius *ardor*, ad tactum sensibilis, & ægro ita molestus, vt inquietationem, impatientiam, immo internum angorem sæpius incurrat.
 - 3) *Dolor* concurrat lancinans, pungens, arteriarum pulsui respondens, sensibilior in partibus sanguineis, obtusior in exsanguibus & glandulosis.
 - 4) Hæc symptomata, quando per aliquot horas duraerunt, contingit *interdum*, vt sensim mitescant, & tandem prorsus auferantur.
 - 5) Et sic æger pristinae integritati restituitur in stasi quidem *profundiore* intra *quatuor* circiter dies; in *late* autem diffusa *septem* dierum spatio negotium demum absoluitur.
 - 6) Quando vero *discussio* obtineri nequit, staseos succedit *corruptio*, eaque vel laudabilis, *purulenta*, substantia nempe alba, aut ad summum leuiter flauescens, inodora; vel *puredinosa*, de qua sub *prognosi* plura dicemus.
 - 7) Omni illo tempore, quo stasis ad corruptionem purulentam properat, æstus & ardor potissimum in circuitu adfligunt, & rubor circulum quasi in peripheria partis adfectæ format, in centro autem tumoris hæc omnia mitiora, tepidiora, & magis pallida adparent.
 - 8) Quo grauior est inflammatio, eo magis reliquum corpus spasmodica constrictione adficitur & ad spectus est macilentus: sensu subhorrido concurrente.
 - 9) Reliqua signa sub *differentia* iam indicata legantur.
2. *Specialia.*
- 1) *Erysipelazis.*
 - a) Præcedit *rigor* quidam in parte illa adfecta.
 - b) Hunc excipit *dolor* congestionis in eadem parte.
 - c) Succedit *tumor aequalis*, qui intra exiguum tempus tale sumit argumentum, vt *cuticula* nitescat.

d) Non-

- d) Nonnumquam *mador* quidam, vesiculas quasi formans, in hoc tumore obseruatur.
- e) Continuat hic tumor per *dies* circiter *quatuor*, quo tempore sensim iterum decrescit.
- f) *Colorem* exhibet non tam insigniter rubicundum, quam flauescens. Quando autem magis pallidus est tumor, quod rarius obseruatur, a *Germanis* adpellatur: *Die weiße Rose*.
- g) Aliquando de loco in locum migrat, immo per vniuersam corporis peripheriam se diffundit.
- 2) *Phlegmones*.
- a) *Tumor* adest non solum in *latum*, verum etiam in *profundum* diffusus, durus, rubicundus, præter naturam calidus, in *altitudinem* non adeo eleuatus.
- b) In *peripheria* accedunt *dolores* spastici, lancinantes.
- c) *Duratione* hæc species inflammationis longe superat *erysipelaceam*.
- d) Sponte sua uti ad suppurationem non est idonea, ita si peruersa arte eo deducitur, legitimum & bene coctum *pus* non exhibet, sed materiam *ulcerascentem*. Vnde & facile in vlcus manans, serpiginosum, vel plane fistulosum transmigrat.
- e) Commotiones *febriles* plerumque præcedunt & coniunctæ sunt.
- f) Quando a *metastasi febrili* exoritur, inuadit eum *horrore*, per vnam & alteram horam durante.
- g) Huic succedit *astus*, quem sensus *ardoris* excipit.
- h) Contingunt eiusmodi stases phlegmonodes in *carnosis* ordinariæ & *spongiosis* locis.
- i) Insuper, quod notatu dignum, in *extremis* sæpissime partibus, nempe in brachio, cubitu, crure, rarius femore. Confer. *caussa*.
- k) Aliquando etiam in facie occurrunt, e. g. duræ illæ, rubræ & ætuosæ inflammationes, quæ interdum dentium dolores excipiunt, *phlegmones* indolem sistunt; præcipue si minus dextre tractentur.

3) *Apoſtematis.*

- a) Sanguis, qui extra vaſa ceſſit, in vnum quaſi nodum collectus, & hinc arctiore ſpatio circumſcriptus eſt.
- b) In partibus præcipue carnoſis & glanduloſis.
- c) Reliqua videantur *tabul. de abſceſſu.*

B. Inflammationum *internarum.*

Harum ſigna diagnoftica *ſpecialia* tabulis febrium inflammatoriarum ſpecialius indicabuntur ; *generalia* ſunt ſequentia.

1. Quo ſenſibilis eſt viſcus, eo magis acerbis & a-dens eſt *dolor*. Hinc in pulmonibus, pleura, renibus & ventriculo eſt exquisitiſſimus, in hepate autem, liene & pancreate obuſior ſentitur.
2. Ingens a-deſt *æſtus*, horror admodum notabilis, & inferiores corporis partes magis adfligens, *ſitis* ſare inextinguibilis, ita vt magna faucium ſiccitas poſt potum mox redeat.
3. *Urina* flammea, interdum poſt temporis cuiusdam ſpatium ſedimentum roſei coloris, circa incrementum vero & ſtatum inflammationis, multo tenerius, tempore vero declinationis tenacius & ſubmucidum deponens.

IV. *SVBIECTA.*

1. Vix vnumquam alii homines, quam *plethorici* inflammationibus obnoxii ſunt.
2. Præcipue ſanguinei, qui habitus corporis ſueculenti, laxioris & poroſioris exiſtunt, in quem ſanguis altius & copioſius penetrare poteſt. Hinc inflammationes præcipue in partibus carnoſis, deinde in ſic dictis parenchymaticis, rariffime in exſanguibus occurrunt.
3. Maxime omnium illi, qui corpore quidem otioſi, animo autem multis commotionibus expoſiti ſunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Cauſſa materialis *antecedens* eſt plethora. Inflammationes enim ſatis frequenter ab intra ortum ſuum habent, & per modum *decubitus*, vt vulgo loquuntur, ſive expulſionis ad exteriora corporis, nempe ad artus materia

ex-

expellitur: præcipue in phlegmone post febres acutas rheumatico - inflammatorias.

2. Causſa materialis *proxima* est ſtaſis ſanguinis in aliqua corporis parte.
3. Ad hanc ſtaſin diſcutiendam & corruptionem putredinoſam præoccupandam natura, tanquam cauſſa *efficiens*, motus inflammatorios excitat.
4. Locum hinc omnino habet *adſertio antiquorum*, quod eiuſmodi expulſiones inflammatoriæ a natura ſoleant inſtitui vtili quadam intentione, dum illa materias noxias a partibus nobilioribus vitalibus deponat ad partes ignobiliores.
5. Et ſane dignam meretur conſiderationem, quod tam *phlegmone*, quam *eryſipelas* in *extremis artuum* plerumque proſueſcant e. g. in brachio, manu, cruribus, pedibus, non vero facile in reliquo corporis trunco, rarius etiam in femore, & ibi quidem non ſine ingenti periculo & malo ſucceſſu, in primis, ſi error in curatione committatur. Hoc etiam valet, quando in capite, in primis in facie ſe ſiſtit; id quod frequentius feminis, quam viris, ob inordinatos menſes euenit.
6. Cauſſæ *inſtrumentales* ſunt
 - 1) directio & reſtrictio copioſioris ſanguinis, bene adhuc fluidi, ad portionem illam, motu ſuo iam priuatam.
 - 2) Motus auctior & fortior tranſpulſus huius fluidi & viuidi ſanguinis per coagulas & concretas illas portiuſculas. Vnde non ſolum tumor, rubor & calor oriuntur, ſed etiam corpusculorum concretorum aliqua abraſio, diuulſio & diſcuſſio obtinetur.
 - 3) Quando autem hæc coagulatæ molecule tam craſſæ & denſæ ſunt, vt illarum diſcuſſio non amplius obtineri queat, tum intimiorem mixtionis ſuæ diſſolutionem ſubeunt.
 - 4) Qua ratione tenuiſſimæ tantum, nempe ſulphureæ particule *ſenſim* & hinc *innocie* in reliquam ſanguinis maſſam reſorbentur, & per diaphoreſin euacuantur; reliquæ autem minus agiles particule in pus conuertuntur.

7. *Causse occasionales & procatartica*, quæ ita in sanguinis producere valent, sunt vel
- 1) *externa*, e. g. violentæ relaxationes a contusionibus, vulnerationibus, item pruriginosæ scalptiones & punctiones, frictiones cum panno aspero: unde sanguis exardescit, porro in tenerioribus ardor solis, aut æstus ignis in foco culinario; tandem meatuum interceptiones & ligaturæ; vel
 - 2) *Interna*, vbi rarissime simplex spissitudo sanguinis, sed potissimum præceps & impetuosa actiua congestio adcusanda. Hinc etiam omnis violenta sanguinis expansio eius modi causse internæ occasionem suppeditat; quo spectans
 - a) vehementes corporis motiones, saltationes, iracundia, diæta vinosa, ponderum grauiorum tractatio.
 - b) Partus difficilis, lochiorum & fluxus mensium simulque omnium hæmorrhagiarum siue naturaliter, siue artificialiter adfuetarum, imminutio, immatura emanatio & obstructio, immo etiam cessatio, earumque singularum incongrua prouocatio, vel imprudens nimiarum adstrictio.
 - c) Omnes refrigerationes, præ ceteris autem potus frigidus corpore calente intemperanter adsumtus.
 - d) Incongruæ febrium per adstringentia aut expellentia tractationes.
 - e) Porro omnes dolorum spastico - arthriticorum inflammationumque erysipelaccarum imminuta profligatio & repulsio.
 - f) His tandem adnumerandæ qualescumque excretiones subcutaneæ, quæ non nullis plethoricis, venæ sectionibus æquinoctialibus adfuetis, admodum frequentes sunt.
8. De causis *dolorum*, qui sub actu inflammatorio occurrunt, legi potest *tabula medica de congestionibus completis & tabul. chirurg. de abscessu.*

VI. PROGNOSIS.

A. Generalis.

1. Sanguis extra motum suum alicubi stagnans, vel *discuti*, vel *exsicari*, vel *suppurari* debet: si nihil horum contingat, simpliciter *putrescit*.
2. Optima ex his est *discussio*, proxima est *suppuratio*: mala & sæpe periculosa est *exsiccatio*; nisi plane superficialis sit congestio. Pessima, immo funesta est *putredinosa* corruptio, ad minimum parti adfectæ, subinde etiam vicinis.
3. *Stasis inflammatoria* eademque externa, ultra quartum diem absque cessatione tumoris, duritiei, ardoris & doloris pungentis perennans, magisque indolescens, felicem sui *discussionem* non solum respuit, sed certissime etiam transit in corruptionem siue *purulentam* laudabilem, siue *putredinosam* parti adfectæ *lethalem*.
4. Licet in scirrhum quoque interdum desicetur, hic tamen semper ad alterutram harum corruptionum habet proclivitatem, magis autem ad putredinosam, quam suppuratoriam.
5. Quando dolores tendentes & prementes late circa partem adfectam sese extendunt, & ardor grauissimus ruborque intensissime rubicundus, fuscus, liuescentibus & nigricantibus striis intertextus, fibræ vero flaccidæ, eneruatæ vel plane dilaceratæ & contusæ adparent: tum inflammatio male cedit. Hæc enim phænomena designant præsentem gangrænam, quæ summus gradus est inflammationis, mox in putredinem abituræ.
6. Quando tamen his præsentibus vniuersus dolor repente cessat, ardor & calor tepescit, immo refrigerescit, tum paucis horis pars adfecta flaccescit; deinde mollities, tandem diffuentia in tabum cum foetore graeolento succedit; qui adfectus *sphaceli* nomine insignitur, & nihil aliud est, quam simplex sanguinis coagulati putredo.
7. Quo plus *sanguinis* sinceri in stasi aliqua concurrat, eo magis ad suppurationem procliuis est: hinc in erysipelaceis inflam-

inflammationibus nulla ordinarie suppuratio contingit.

8. Quo magis *lymphatico-saliualis & seroso-salse* materia stasis quædam continet, eo peioris moris ulcerosa, colliquatiua & corrosiua corruptio inde emergit; quam *cancerum* nominare solemus.
9. Abscessus suppurati profundiores in *glandulosis* externis partibus, sine artis auxilio vix vnumquam consolidantur, & nisi perita prorsus medicatio adhibeatur, etiam artis conatus pertinaciter eludunt: nam manatio ulcerosa semper impedit consolidationem.
10. Quæ autem suppurationes in *carnosis* partibus obtingunt, illæ sponte sæpius natura, nedum accedente congruo artis subsidio, restituntur.
11. Inflammationes partium *internarum* omnes quidem sunt periculosa, gradu tamen perniciæ differunt, e. g. inflammatio *hepatis* omnium est periculosissima; hanc excipit inflammatio *stomachi, intestinorum, pancreatis, uteri, lienis*; quam sequitur *vesicæ, renum & vtererum* a calculo exorta,
12. Inflammatio partis alicuius internæ numquam sine anticipatiuentu & vitæ periculo ad *suppurationem* peruenit: perpetuus enim humorum per partes internas motus harum laceratione sufflamatur, & restauratio ob continuum sanguinis adfluxum impeditur.
13. Quæ inflammationes *interne* mox non sunt perniciose, illæ lentas immo hecticodeas consumptiones & labe viscerum post se relinquere solent.
14. Pleuriticæ & peripneumoniacæ inflammationes prouetiori ætati magis, iuniori autem minus periculosa euadunt. De singulis infra seorsim.
15. Quando inflammatio febris *acuta* vel ad sociatur, vel eidem succedit, tunc *repulsio* cum vitæ periculo contingit.

B. *Specialis.*

1. *Erysipelatis.*

- 1) Erysipelas sibi relictum, præcipue in partibus ignobilioribus, non facile est periculosum. Quando autem, ut moris

moris est , ad interiora *repellitur* , frequentissime mortem adfert. Conf. *Hippocratis aphorism. 25. Sect. VI.*

- 2) In partibus nobilioribus maioris est momenti e. g. in capite, facie, faucibus, pectore, immo in femore.
 - 3) Periculosum est, si incongrua arte ad *suppurationem* perducitur.
 - 4) Non minus fonticum est malum, quando ulceribus, vulneribus, fracturis & luxationibus superuenit.
 - 5) Quo magis febris complicata est , eo maioris est momenti.
 - 6) In partibus *internis*, de quibus hoc quidem loco proprie non agimus, plerumque est perniciosum.
 - 7) Soluitur hæc inflammationis species quando vel pruritus, vel formicarum sensus, vel squamulæ in parte adfecta observantur.
 - 8) Quo magis in consuetudinem degeneravit, eo facilius eleuissima causa repullulat, ad morem aliarum translationum humorum, proprio naturæ motu contingentium.
 - 9) Et ysiipelatis corruptio peior est, quam quæ in aliis inflammationibus contingit.
 - 10) *Sphacelus ex erysipelate natus* per aliquot dies in cute delitescere solet.
2. *Phlegmones.*
- 1) In *phlegmonodeis* inflammationibus, late diffusis, & in notabilem tumorem non collectis, *discussio* maxime locum habet.
 - 2) *Phlegmone* senibus & valetudinariis periculosior est, quam iunioribus, robustis & bene constitutis.
 - 3) Citius succedit negotium discussionis in iis, qui sanguinem habent tenuem & floridum, quam in quibus spissitudo peccat glutinosa.
 - 4) Quo magis *temperata* est *aura*, eo facilius superantur, in regionibus autem calidis & diebus canicularibus grauiores sunt inflammationes.

3. *Apostematis.*

- 1) Quando inflammatio in tuber veluti coaceruata, & tam in profundum, quam in latum collecta est, tunc *maturationis* requiritur.
- 2) Præcipue *copiosiores* stases inflammatoriæ, ab externis causis inductæ, & in nodum quasi collectæ, si non cito medicationi obterantur, ad discussionem rarissime perueniunt, sed vel ad *suppurationem*, vel ad *gangrænam* tendunt. Nonnumquam imprudente tractatione indurescunt, & tunc proxima occasione præcipientes sunt ad ulcerationem *cancrosam subeundam*.
- 3) Stases autem illæ mollescentes & rubroliuidæ extuberationes (grosse Beulen) a lapsu, ictu, verberibus repente exortæ, si mox ipsis occurritur, commode discutuntur.
- 4) Quando vero grandiores eius modi congestiones mollescentes iam per plures horas detentæ sunt, tum neque inflammatio æqualis, neque debita suppuratio, (ob transitum motus sanguinis inflammatorii minime sufficientem) contingit. Vnde *gangræna* & *sp. acelus* in mediâte succedunt.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A *Methodus generalis.*1. *Inflammationum externarum.*

- 1) In his ante omnia prioribus diebus tentanda est *discussio* per *subtilia* resoluentia, quæ odore magis quam resinosa acrimonia agunt. Huc pertinent
 - a) *Radices*: irid. Florent. sigill. Salomonis, bryon. vincecox. bardanæ, pimpin. alb. rub. tinct. angelic. caryophyll. galang. quibus moderata quantitas radicis bistort. ad strictionem inferendam adiiciatur.
 - b) *Herbæ*: apii, chærefol. hyssop. abrotan. sabinæ, rutæ, saluizæ, meliss. menth. crisp. & Saracen. laudatur etiam cortex medius sambuci.
 - c) *Flores*: chamomill. meliot. sambuc. bellidis, summitat. origan, rolar. violar.

- d) *Semina*: anifi, fœniculi, carui, dauci, fœnugræc.
- e) *Camphora*, quæ hic principatum tenet, præcipue spiritus illius recte præparatus & legitime adplicatus. *Conf. cautel.*
- f) Ex his possunt fieri species, quæ sacculis, vino calido imbutis, & satis iterum expressis, regioni adfectæ calide adplicentur. Nam ipsum *vinum* præstans est remedium ad inflammationem discutendam.
- g) *Emplastrum diaphoreticum Mynsichii*, item de *spermate ceti*.
- 2) Fiente adhuc inflammatione & urgente statu plethorico utilis est *vena sectio reuulsoria*, ne adfluxus sanguinis ad partem adfectam nimis copiose contingat; præmissis laxante & subiunctis remediis *internis*, nempe in cholericis pulueribus temperantibus nitrosis cum sale digestiuo, antimoniato fixo & momento cinnabaris mixtis; in aliis autem essentia alexipharm. *Stablii* coniuncta.
- In *leniore* inflammatione neque *vena sectio* neque *interna* remedia necessaria sunt.
- 3) Quando autem *discussio* non amplius potest obtineri; quod a stasi ultra quartum diem subsistente & dolore in horas augefcente diiudicatur: tum *suppuratio* & *maturatio* promouenda est. Maturant autem, quæ poros aliquo modo obstruunt, & sic portionum humidarum exhalationem impediunt, simul tamen fibras partis subtili neruina acrimonia roborant. Laudantur ad has indicationes obtinendas
- a) *Radices*: lil. alb. althææ.
- b) *Herbæ*: parietar. malu. branc. vsin.
- c) *Flores*: verbasci, linariæ.
- d) *Semina*: psyllii, lini, cydonii.
- e) *Pinguedines*: anseris, gallinæ.
- f) *Olea* per infusionem parata, e. g. chamomill. verbasco, lil. albor.
- g) *Gummi-resinæ*: ammoniac. galban.

- h) Hæc in forma cataplasmatibus adhibenda, ubique obseruando, vt roborantia emollientibus admisceantur.
- 4) *Quam primum maturatio facta est, statim de apertura cogitandum. Hanc promouent*
- a) Ipsa sæpissime natura, sine artis auxilio.
 - b) Cepæ assatæ.
 - c) Mel cum farina secalina mixtum.
 - d) Fermentum recens.
 - e) Pinguedo leporis.
 - f) Incisio chirurgica in apostematibus profundis.
 - g) *Cauteria potentialia, e. g. magnes arsenicalis, præsertim causticum Sutorianum, quod efficaciam suam sine insigni sensu & humorum adfluxu egregie exserit. Sic etiam efficax est causticum Zwingeri, quod ex calce viua, minio & saponenigro paratur & parum doloris efficere dicitur.*
- 5) *Tandem ad mundificationem apostematis & consolidationem adhibeantur balsamica & neruina, e. g. essent. sequens balsamica Stahlianæ passim commendata.*
 Recip. essent. myrrh. drachm. III.
 succin. drachm. II.
 olei terebinth. gutt. X.
 Misce, instillando gutt. X. XX. XXX. pro conditione subiecti & apostematis.
- 6) *Anodyna externe quidem locum habent in inflammationibus ad modum dolorificis; sensationem tamen in integrum non tollunt, sed tantum mitigant; in incremento autem potius, quam circa statum adhibenda sunt.*
- 7) *Blanda per aluum euacuatio, si reliquæ circumstantiæ concedunt, ante omnia instituat.*
2. *Inflammationum internarum.*
 In his placida tantum *discussio* locum habet: suppuratio enim ubique periculosissimum inuoluit euentum. Conf. omnes *tabule*, quæ de febris inflammatoriis agunt & infra sequuntur.

B. *Methodus specialis.*1. *Erysipelatis.*

- 1) In *leuiore* casu negotium discussionis vel soli naturæ relinquatur, vel topicis conuenientibus promoueatur. Talia sunt
 - a) *Camphorata*, quæ vel in sicca forma, vel soluta, nempe spiritu vini rectificatissimo, adplicentur. *Vid. cautel.*
 - b) *Farinacea & surfuracea*, e. g. farina secalina, triticea, lupinorum, fabarum, hordei; quibus camphora commisceatur.
 - c) *Saturnina*, superius iam nominata, sed cum discutientibus maritata.
- 2) In *grauiore* erysipelacea inflammatione præstat remedia *interna*, quæ superius indicata sunt, cum *externis* coniungere.
- 3) Quæ *specificè* ab auctoribus laudantur, sub *cautelis* recensebimus.

2. *Phlegmones.*

- 1) In hac inflammationis specie quadrat potissimum methodus generalis, superius tradita.
- 2) Discussientia vegetabilia superius adlegauimus.
- 3) Præcipue in maiori stasi hic non adquiescendum in solis topicis, sed interna debent coniungi.
- 4) Quo maior & profundior hæc stasis est, eo magis conueniunt *emplastra*, cum larga quantitate camphoræ remixta, e. g. præ aliis diaphoretic. *Mynsichi*, de spermate ceti eiusdem, de meliloto, diachylon cum gummatibus, de ammoniaco *Foresti*, saponar. *Barbette*, præcipue etiam de spermate ranarum, quod simul impetuosum ad inflamatam partem adfluxum modeste cohibet; alia vero acriora & vnguinenta admiscere minus conuenit. Coniungantur autem vbique interna resoluentia & discutientia.

3. *Apostematodes.*

- 1) Hanc inflammationis speciem primis diebus discutientibus

tibus itidem tractamus; quando autem ad maturacionem tendit, tractatur, vt abscessus. *Conf. tabul. chirurg. de abscessu.*

- a) Stasibus repente congestis, nempe rubrō-liuidis illis extuberationibus, a contusione, lapsu, verberibus inductis, mature occurratur:
- a) Compressione cum frigido ferro.
 - b) Præcipue autem eum medicamentis, sanguinem mature *resoluentibus*, nempe rad. irid. Florentin. sigill. Salomonis, bryon. herb. hyssop. chærefol. bellid. min. femin. anisi, cuius oleum *Forestus* eximie laudat ad eiusmodi contusiones impuras.
 - c) Coniunctis leuiter *repellentibus*, inter quæ hoc loco ferre præcellit radix symphyti maioris,
 - d) Hæc puluerisata cum *vino* vel *urina*, quæ nonnullis arcanum hic est remedium, cocta, atque in forma cataplasmatum adplicata discutiunt satis potenter, *es muß aber nicht zu naß seyn.*
 - e) In *ambitu* spiritus vini camphoratus, vel his ipsis admisceri, vel camphora adipergi debet.
- 3) Quando autem grandior talis congestio per plures iam horas hæsit, ita vt neque *discussio*, neque etiam debita *maturatio* expectanda sit, præstat corruptionem putredinosam *per-sectionem* auertere, & quidem ante, quam vel insignis inflammatio, vel plane corruptio accellerit. *Apertio* satis sit magna, vt ita sanguis grumofus, in corruptionem tendens, vno actu euacuetur. De hoc negotio legi ueretur *Seuerinus de recondita abscessuum natura* libr. VII. & de *efficaci medicina* §. 37. *Conter. etiam tabula chirurgic. de contusionibus.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Solemnis est quæstio, num *vene sectiones*, quam veteres & multi recentiorum stasibus inflammatoriis dissoluendis dicarunt, tam necessariæ sint, vt, secundum *Schelhamnerum*, bona conscientia non possint prætermitti? de qua sequentia sunt notanda.

2. *Vtilis* est venæ sectio *fiente* adhuc inflammatione, ne adfluxus sanguinis copiosior fiat ad partem adfectam.
3. *Vtilis* etiam est, quando vulnere hæmorrhagiis, cito per adstringentia suppressis, grauior inflammatio superuenit, subiungendum autem est regimen diapnoicum *Confnum.* 40.
4. *Nexia* magis est, quam *vtilis*, si non statim circa initia administretur.
5. Hinc in inflammationibus *internis*, vbi signa diagnostica, præter peripneumoniam, satis intricata sunt, consultius illa omittitur, quam temere aliquid tentatur.
6. Ancipitis autem in primis euentus est, quando febris talis inflammatoria *typum* qualemcumque exhibet.
7. Dantur tamen aliquando casus & circumstantiæ, vbi etiam in inflammationibus *internis* venæ sectio quodam modo necessaria videtur, e. g. in statu summe plethorico, in grauioribus sanguinis commotionibus, a quibuscumque causis inductis &c. de quibus suo loco dicemus.
8. Medicus si vena inæcongrue secta aduocetur, *transpirationem* placidam tanto magis commendatam sibi habeat: sero autem vocatus, deterius iam se habente ægro, non dubitet prognosticon funesti euentus formare.
9. In omni inflammatione a *forti refrigerio* abstinendum est: sanguinem enim coagulat, malum grauissime auget, & opem in perniciem permutat; ad *praoccupandam* autem statim inflammatoriam post contusionem & collectionem sanguinis adhuc fluidi compressio per ferrum *frigidum*, diu continuata, vsum præstat.
10. Cauendum a nimia *humectatione* & *emollientibus*, quæ dum fibras relaxant, copiosiori humorum irruptioni locum præbent, statimque notabiliter augent. Exsulent itaque aquæ illæ destillatæ e. g. flor. sambuc. chæresol. flor. o-minium, vel calcis viuæ: quæ passim a chirurgis adhibentur. Idem sentiendum de *oleosis*, præcipue de farnosis illis eterebinthina paratis; it. ol. templinum, iuniperi. Emplastra mucida etiam nocent.
11. *Pinguia, virginoſa* quam maxime nocent, & per talia vulgi

- remedia amicus amicum nonnumquam trucidat. e. gr. dum hanc tabulam conscribimus, vir quidam vxoris suæ inflammata faciem butyro inunxerat, quæ intra duos dies moriebatur.
12. Ab emollientibus hisce tanto magis in *erysipelate* & *phlegmone* abstinendum est, quoniam tales inflammationes ad maturationem per se non tendunt; & quando peruersa tractatione omnino impetratur, parsque inflammata irsuper intempestiue secatur, non est laudabilis maturatio, sed potius vlceratio canerosa, ob coneursum seri cum sanguine, vel plane sphacelosa corruptio. Proueniunt hinc talia vlcera, quæ olim Dehl. Schenckel vocata fuerunt, in quibus nulla consolidatio speranda; vel si omnino in loco quodam consolidatio facta sit, in altero loco duo, tria vel plura foramina eueniunt. Vnde quouis modo discussioni opera est nauanda.
 13. Abstinendum ab intempestiua & nimia *adstrictione*, quæ sufficientem aditum & transitum sanguinis fluidi, statim resoluturi, præcludit, & sic salutarem naturæ intentionem turbat.
 14. Abstinendum a nimis *calefacientibus*, quia sensum ardoris molestum frustra augeat, & exsiccando in scirrhosam constitutionem statim promouent.
 15. Abstinendum ab immatura eaque magna ac profunda *incisione*, quia, tensionem fibrarum relaxando, transpulso-rium & abstersiuum motum impedit, & suppurationem reddit difficiliorem.
 16. Differentia ἀποσάσεως & ἀποσημάτων, secundum Hippocratem, bene obseruanda est, ne confusio in praxi oriatur: apostases enim phlegmonodes & erysipelatodes, vt pote ab omni maturatione & abscessione alienæ, quando medicationibus ad hunc effectum acrius pellentibus tractantur, in graua mala coniiciuntur ægrotantes. *Conf. tab. chirurg. de abscessu.*
 17. In abscessu *grauiore*, multum puris continente, materia non prorsus & eodem tempore, sed successiue euacuanda

nimis flaccescunt, & lipothymici facile adfectus superueniunt.

18. *Dolores dentium* post se trahere solent tumores phlegmonodes, qui tamen, si modo non nimis negligenter habentur, sponte & mature iterum solent dissolui. Contra illi tumores, qui hoc in loco sine prægresso dolore dentium oriuntur, & æstum, ardorem, dolorem prurientem, pungentem & lancinantem secum ducunt, non carent periculo, in primis si improuide repelluntur.
19. De inflammationibus *erysipelaceis* turgidioribus illud notatu dignum est, quod *sanguinea* illarum portio non sola, sed *totâ* stasis simul discutienda sit; alias euanescit quidem omnis calor & dolor, tumor autem valde contumax & discussioni refractarius remanet.
20. Hinc in stasi *erysipelacea* copiosiore, ubi cutis notabiliter inflammata adpariet, cauendum est, ne *sanguis seorsim* discutiatur, portio autem *lymphatico serosa* relinquatur, & tumorem *œdematosum* constituat. Huic incommodo occurritur, si spiritus *modice* camphoratus, & ad notabilem fluuedinem *crocatus* est. Crocus enim sub initium talis discussionis non modo serosam substantiam ad dissipationem aptiorem reddit, sed & fibras roborat, ut repressio eo melius procedat. Vel quando *camphora* in forma sicca adplicatur, remedia serum fundentia & tonum partis restituentia coniungenda sunt, v. g.

Recip. farin. fabar. vel secalin.

Flor. sambuc. ana manip. I.

Rad. irid. Florent. drachm. II.

Ceruff. drachm. III.

Camphor. drachm. I. fiant species, sacculo immittendæ & adplicandæ.

21. *Camphora* scopo discussionis, tam in phlegmonodeis, quam erysipelaceis inflammationibus, satis facit, in primis si adhuc recens est malum.
22. *Spiritus camphoratus* hac cautela adhibeatur, ut per initia

eminus tantum, nempe ad peripheriam partis inflammatae adplicetur, & deinde, quoties spiritus in auras abiit, ad centrum propius admittatur. Modo sit *rectificatissimus* spiritus, alias damnum potius, quam auxilium adfert.

23. *Optima methodus* est, ut spiritus breui temporis spatio sub aura exhalet, & sola camphora linteis adhærescat. Quando autem linteum spiritu adhuc madidum adplicatur, diuturna illius mora ardorem infert, cumque in *erysipelate* vehementem; quo casu ad spiritum profligandum aura, sed non sensibilibiter frigida, dolenti parti admoueat, unan bläst dem Patienten, am besten mit dem Munde, an den schmerzhaften Ort.
24. *Camphora* etiam maturantibus non inutiliter miscetur, ne adfluxus humorum nimis copiose contingat, & dolorem exasperet.
25. *Interno* autem usu exsulent hic camphorata; effectum enim resolventem & discutientem, quem *externe* præstant, nullo modo *interne* producant, sed potius sanguinem concitant, & calorem augent; quod etiam de aliis calidis & acrioribus sentiendum est, e. g. de gummis-resinis, galban. myrrh. &c.
26. Abstinentiam quoque a *renocantibus* medicamentis, qualia sunt *purgantia*, quæ in talibus casibus maxime nocent. *Laxantia leniora* tolerantur, sed in principio principii. Commendantur hoc nomine pilulæ *Becherianæ*, & in primis *Stahlianæ*. Multo minus conueniunt *emetica*, quæ multis ansam mortis præbent.
27. *Saturnina* ad inflammationes ipsas, præsertim insigniores, minus commendantur; quia illorum abusus ulcera inducit maligna, quæ vulgo erstickte Schäden, TodtenBrüche, vocantur, vid. *Stahlii theoria pag. 1286*. *eminus* autem circa ambitum adplicata, pro *defensione* valent; sed camphorata semper addenda sunt.
28. *Erysipelas* quando per *saturnina* vel alia incongrua topica repellitur, *hydropem* inducit. Vid. *tabul. de acemate* sub *prognosi*.

29. *Alexipharmaca temperata* post tertium vel quartum diem commode adhibentur. Securissime agitur, si leniora diapnoica, absorbentia & nitrosa exhibentur, & his semel vel bis per diem lene alexipharmacum interponitur, quo nomine essentia alexipharmaca *Stablii*, cum larga portione essentiae pimpinell. albæ combinata, egregie se gerit; hæc enim radix leniter resoluit & abstergit.
30. *Essentia petasitidis* commendationem tum meretur, si stasis diu iam durauit; non autem sub initium.
31. *Specifica* passim laudatur, sed optandum ut effectui semper responderent, e. g.
- 1) *Felcarpionum*, iners remedium.
 - 2) *Sanguis mensstruus*, prima vice erumpens.
 - 3) item *sanguis leporis*, a canibus agitati. Hunc exsiccatum ad dimidiam drachmam in vino propinant, simul lincto excipiunt, exsiccatum aqueo rore madefaciunt, erysipelati imponunt, atque intra 14 horas bonum effectum spondent.
32. *Lapis medicamentosus Crollii* quid præstet, experiendum est; modo prætermittenda non prætermittantur.
33. Sunt, qui ad inflammationes, præcipue internas, commendant *dentem apri* præparatum, *maxillas luci piscis*, immo vniuersa capitis illius præparata; sed optandus potius est, quam expectandus ab illis specialis effectus.
34. Semen autem *cardui Mariae* ad pectoris inflammationes specifica efficacia prædicum esse, si non sola medullaris sed *integra* seu *tota* substantia exhibetur, experientia satis est confirmatum. Confer. *tabula de pleuritiside & peripneumonia.*
35. In *sphacelo metuendo*, actu autem non præsentem, ad discussionem & roborationem partis immediate adfectæ, *oleum cinnamomi* a recentioribus peritis magni æstimatur.
36. Quando erysipelas in consuetudinem degenerauit, ita ut a quavis exigua causa repullulet: conducit circa æquinoctia *vena sectio*, & blanda per aluum *enachatio*; respi-

- ciendò simul *crasin* sanguinis sulphureo-acrem, ad vias urinarias inuitandam & per easdem eliminandam.
37. *Calore* leni pars adfecta, præcipue tempore suppurationis, semper fouenda est, vt particulæ sulphuræ agiliores per transpirationem possint excerni & coagulata substantia in maiore laxitate conseruari: vnde & formulæ *repide* applicari debent.
38. *Frigus* autem & siccum & humidum discussione præiudicium adfert; & corruptioni tempus atque materiam supeditat.
39. Quando post contusionem aut aliam violentam causam, magna sanguinis collectio cum tumore tactu *mollis* contingit, tum absente adhuc inflammatione proximum est, vt incisio & sanguis collecti euacuatio instituat, quia tales collectiones neque discussionem neque laudabilem suppurationem admittunt. *Conf. tab. chirurg. de contusionibus.*
40. Inflammationes partium *vulneratarum* plerumque exposcunt venæ sectionem prudenter instituendam, non reformidando prægressam hæmorrhagiam. *Conf. caut. 3.*
41. *Diureses* in omnibus profunt inflammationibus, per absorbentia cum teneris acidis saturata obtinendæ, e.g. per ocul. cancri aceto vel vino imbutos, corallia præparata cum crystallis tartari remixta; quæ remedia acrimoniam sanguinis irreciunt.
42. Quando inflammatio a causis *internis* producta est, externa remedia paululum differenda sunt, donec orgasmus sanguinis deferbuerit.
43. Post *repulsionem* inflammationis non vtile tantum, sed & necessarium est *internis* alexipharmacis temperatis, vt potè leniter expellentibus & discutientibus, cum regimine succurrere. *Extrinfecus* vero melius tunc est, nihil applicare, donec excretio illa ab intra extrorsum plurimum peracta sit; præcipue abstinendum, si spiritus vini camphoratus non sit *rectificatissimus*.

TABVLA XXI.

DE

CEPHALALGIA.

I. DEFINITIO. *Tō fōgōs*

Cephalalgia est species dolorum capitis ab humoribus, per motum tonicum copiosius ad caput congestis, nulum autem exitum ibidem inuenientibus, ordinarie originem ducens. Deriuatur a κεφαλή, caput, & ἀλγέω, dolco.

II. DIFFERENTIA.

Cephalalgia est vel

1. *Idiopathica*, quæ a plethora & hinc immediata sanguinis ad caput congestione exoritur; vel
2. *Symptomatica*, quæ vel ex vitio primarum viarum, per consensum *paris vagi* neruorum, vel in aliis morbis, e. g. febribus acutis, a translatione humorum ad caput originem sumit.
3. Diuisio cephalalgiae in *sanguineam* & *serosam*, *catarrhalem*, *phlegmaticam*, *biliosam*, *melancholicam*, licet non *caussum*, sed subiectorum tantum & temperamentorum differentiam inuoluat: in praxi tamen non prorsus prætermittenda est. Ita enim cephalalgia *serosa* differt a *sanguinea* sequentibus circumstantiis.
 - 1) Plerumque occupat phlegmaticos aut sanguineo-phlegmaticos.
 - 2) Frequentius desinit in *coryzam*, *raucedinem* & reliquos affectus serosos.
 - 3) Dolores minus sunt pulsaciles & æstuantés, magis vero grauatiui.
4. Differt etiam *sanguinea* ab ista cephalalgia, quæ præcurrit à *poplexiam*.
 - 1) Hæc enim magis *occiput* quam *synceput* inuadit, & a *nucha* quasi incipiens pergit ad interiora cerebri, doloribus maxime *tendentibus*.

- 2) *Adulesores*, in primis suame plethoricos, post insignem sanguinis commotionem *improviso* quasi corripit.
- 3) *vertiginosi* fiunt, & sensuum vigorem *breui* amittunt.
5. Cephalalgia differt a *cephalæa*
 - 1) *Gradu*: nam in cephalæa omnia sunt acerbiora & pertinaciora.
 - 2) *Tempore*: cephalalgia ordinarie breviores habet periodos; cephalæa autem chronicus & habitualis est affectus.
 - 3) Dantur tamen etiam pertinaces & fere *continua* cephalalgia; a cephalæa parum differentes, quæ per frequentem causarum repetitionem & consuetudinem in habitum deductæ sunt; & hæc in feminis quidem præcipue observantur.
 - 4) Reliquas differentias cephalalgia & cephalæa, *signorum* huius & sequentis tabulæ comparatio manifestabit.
6. Differt porro cephalalgia ab *hemicrania*, quæ arthritico-spasticæ indolis est: certa enim intercedit differentia inter dolores, qui a congestione simplice dependent, & inter illos, qui vnicè a contentionibus spasticis proueniunt. Specialiorem differentiam *signa* huius tabulæ, & illius, quæ *hemicraniem* exhibet, docebunt.
7. Differt denique cephalalgia ab *ulceroso-ichoreosis congestionibus*, quæ vel a violentis externis causis, vel a qualicumque humorum corruptione, maxime omnium a *lue venerea*, originem ducunt; hi enim dolores a cephalalgicis sequentibus se distinguunt:
 - 1) Salso ardore rodunt, acriter morficant & terebrant.
 - 2) Continuo durant, nec vquam in *solidum* desinunt.
 - 3) *Nocturno* tempore notabiliter acerbantur, cum primis incaléscente per quietem corpore; vnde Germani dicunt: Diese Schmerzen können keine Federn vertragen.
 - 4) Plura de his doloribus *tabula de lue venerea* exhibebit.

III. SIGNA.

1. Exserit se hic dolor aliquando per *totum caput*;
2. Plurimum in *fronte* & per *tempora* sursum ad *bregmata*.

3. In primis circa *radicem nasi*; vnde ægri ibidem *ardorem*, & circa *os cribrosum* eximie pressiois sensum accusant.
4. Simul in intimis fere *oculorum bulbis* de grauiter premente & compungente dolore conqueruntur.
5. Infert etiam sensum vel *lancinantem, pungentem* pressiosum, vel *pulsatilem*, cum pulsibus *synchiorum*, qui tamen post aliquas horas *remittit*, & non ita raro *sub somno* in totum desinit.
6. Circa frontem etiam obseruatur calor *tactui* manifestus.
7. Dolor concurrat *odontalgicus*, fluctuans & reciprocus, ita vt, dolore dentium urgente, reliquus capitis dolor aliquo modo cesser, & in vicem versam.
8. Vnde *dentes* sæpe corrumpuntur, & corrupti eo facilius de nouo inuitant dolores.
9. Tinnitus *aurium* & susurrus sæpe etiam accedunt.
10. *Oculi* siue exquisite rubent, siue tamen *vascula* aliqua inflatione distenduntur; ad minimum *visui* non sufficiunt, neclumen liberius possunt tolerare.
11. Color faciei plerumque satis rubet, nisi iam spasticum quid concurrat, in quo casu *pallor* potius, saltem rubor *male distributus* conspicitur.
12. Coniatur hunc ruborem *inflatio* faciei aut certe *vasorum temporum* & simul fere *ingularium*. Hinc vulgus cum filo capitis incrementum & decrementum solet percontari.
13. In *feminis* occupat hic dolor tempora *menstrua*, & prouenit modo *ante* mensium eruptionem, modo *sub* fluxu illorum *imminuto*, modo *post* eundem *prematuro* subsistentem, & ita singulis mensibus scenam suam ludit.
14. Interdum, sed rarius, accedunt adfectus vertiginosi, qui de insigni congestionis gradu testantur.
15. In partibus remotis ob motum strictiorem tonicum sese manifestant
 - 1) adstrictio *alui*.
 - 2) pauca & tenuis *urina*.

IV. SVBIECTA.

Cephalalgia præcipue corripiuntur

1. *Sanguinei*, habitu corporis florido, & facie rubicunda præditi, item sanguineo-melancholici.
2. *Iuniores* præ senescentibus.
3. *Femina* præ viris.
4. Senes arthritide vexati.
5. Perlonæ, quæ de vita otiosa & sedentaria gaudent, cum diætâ lautiore, aromatica, spiritiuosa.

IV. CAVSSAE.

1. Causa *materialis interna* est plethora, quæ simul *qualitate*, præcipue apud hypochondriacos, solet peccare.
2. Hunc abundantem sanguinem principium vitale, tamquam causa *efficiens* congestionum, exonerare intendit, eumque in finem humores motu tonico copiosius versus caput restringere solet.
3. Ex hac restrictione oritur æstus capitis insignis, & quia libere non refluit sanguis, vasa inflantur, & membranæ multum distenduntur.
4. Causæ *externæ & occasionales*, quæ talem congestionem possunt prouocare, multæ obseruantur, e. g.
 - 1) Euacuationes sanguinis naturales, in primis narium, suppressæ.
 - 2) Euacuationum sanguinis *artificialium* consuetarum neglectio.
 - 3) Consuetæ *alia* euacuationes neglectæ. e. g. purgationes, sudationes, certis temporibus celebrari solitæ: huc etiam pertinent sudores repulsi.
 - 4) Insignes corporis & animi commotiones, in primis iracundia.
 - 5) Potus spirituosus, præcipue ad ebrietatem sumtus.
 - 6) Somnus & vigiliæ quando extra consuetum tempus elinguntur.
 - 7) Deprauatio primarum viarum, tamquam causa *consensualis* consideranda quidem est, quia neruorum *paris oëtan* consensum negare non possumus, certissimum tamen est, quod

quod *consuetudo*, humores versus caput dirigendi, plus efficaciz habeat, quam prædictus consensus. Conf. num. 13)

- 3) Vapores acres per nares attracti.
- 9) Pedum & crurum refrigeratio, præcipue humida.
- 10) Capitis *olim* concussio & vulneratio.
- 11) Translatio humorum versus caput in febribus acutis.
- 12) Dispositio hæreditaria.
- 13) Consuetudo citra congestionis rationem.
- 14) *Sensibilitas*: unde odor grauis & suaucolentus, præcipue in feminis, satis frequenter cephalalgiam prouocat, e. g. odor mofchi, zibethi, rosarum, fumantis ellichnii; ubi mechanicæ rationes, quæ vulgo allegantur, non sufficiunt: possunt enim alia foetida perferre, v. g. castoreum, asam foetidam.

VI. PROGNOISIS.

1. Cephalalgia tantum *periculi* non inducit, quantum *incommodi* adtert.
2. Adfectus tamen vili non pendendus est: facile enim in prauam consuetudinem ita degenerat, vt deinde non solum frequentius reuertatur, verum etiam pertinaciter duret & *cephalææ* indolem exhibeat.
3. Præfagit cephalalgia
 - 1) Læsiones *visus*: ophthalmiam, suffusionem oculorum, guttam serenam.
 - 2) Læsiones *auditus*.
 - 3) Adfectus arthriticos.
 - 4) Ætate prouectiore lethargum, apoplexiam & paralyfin, præcipue, quando vertiginosi adfectus accedunt.
4. Cæterum hæc congestio cum effectibus suis dolorificis duobusmodis soluitur:
 - 1) vel enim contingunt *euacuationes*
 - a) Siue *sanguinis* per nares; & cum dolores præsentissime sapius soluantur;

- b) Siue *feri*, e. g. e naribus per eruptionem coryzæ, item ex oculis, per illorum lippitudinem;
- c) Siue *puris* modo e naribus, modo ex auribus: in gravissimis nempe & fere inflammatoriis casibus;
- 2) vel congestio *successive discutitur*, & dolores *sensim* solvuntur; id quod contingit
- a) *Promptius* in iunioribus;
- b) *Tardius* in annosioribus, præcipue feminis;
- c) *Tardissime* in *adsuetis*, in quibus insultus cum impetu erumpunt, per certum tempus durant & absoluta periodo demum decedunt.
5. Cephalalgia quando in *consuetudinem* iam degeneravit, & vitæ genus sedentarium non mutatur in laboriosum; optima methodus & remedia efficacissima constans auxilium non possunt adferre.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In Paroxysmo.

1. Motus humorum *specialis* a partibus superioribus ad inferiores reuocandus est: hinc ante omnia *aluus*, quæ ordine adstricta, solvatur
- 1) vel per *chyliferes* emollientes, carminatiuos;
- 2) vel, in casu minus urgente, per *lenia laxantia*, e. g. pilulas *Stahlii*, *Becheri*, extracto hellebori nigri paululum acuatæ, rhabarbar. sale Anglicano.
2. Deinde exhibeantur remedia, quæ *orgasmm* sanguinis temperant, & spasticam fibrarum stricturam demulcent.
- 1) Faciunt hoc nitrosa, absorbentia, cinnabarina cum diaphoreticis fixis combinata, e. g. nitrum depurat. ocul. cancri, cinnabaris antimon. bezoardic. mineral. antimon. diaphoret.
- 2) Quando crasis sanguinis *spissior* est, addatur sal digestivum e. g. arcan. duplicat. tartar. vitriolat. de quibus pulueribus ter vel quater per diem scrup. i. potest propinari.
3. His subiungantur, quæ æqualem sanguinis distributionem promouent, & sic congestionem circa caput dissipant.
- Faci-

Faciunt hoc alexipharmaca temperata, & blanda diaphoretica horis ante meridiem & quidem exiguis dosibus propinanda, e. g.

a) Ess. alexipharm. *Stahlii*.

b) Decoctum e radie. sarsaparil. cichor. chin. scorzoner.

c) Diluentia aquosa largiter & calide hausta, nempe infusa thée, coffée, veronicæ teucryi folio, lauendulæ.

4. *Dolores* autem quando hisce cedere recusant, lenis & circumspecta *sedatio* locum habet: in quem finem gran. i - ij. M. P. de cynogloss. vel gr. ij - iij. theriac. cœlest. pulueribus temperantibus versus somnum immisceri possunt; obseruando hoc præcipue tempore, vt excretiones alui legitime succedant.

5. *Externa remedia*, quæ subinde effectum aliquem præstant, cum internis coniungantur. Huc pertinent

1) *Spiritus vini camphoratus*, leniter crocatus: qui in sensibilibus dolores paucis momentis sæpius abigit.

2) *Vnguentum alabastrinum*.

3) *Radix rhodia*, quæ puluerisata, & epithematis forma fronti adligata, egregium præstat effectum.

3) *Remedium domesticum*, e pane secalino, pauco sale, baccis iuniperi, semine carui mixtum & fronti adplicatum, etiam vsu suum suppeditat.

5) *Pedilunia, ligatura, frictions.*

6. Denique in declinatione dolorum exhibeantur tonum partium roborantia MR. polychresta *Stahlii*, essent. succini.

7. In cephalalgia *symptomata* primarius morbus respiciendus est e. g.

a) Saburra primarum viarum euacuanda secundum methodum, suo loco commendatam.

b) Febres acutæ tractandæ, vti sub iisdem indicatum est. *vid. tab. de febre synocha.*

B. *Extra paroxysmum.*

1. *Quantitas* sanguinis imminuatur per venæ sectionem, circa æquinoctia institutam; cui ad meliorem deriuationem *pedlunia* præmittantur.

2. *Qualitas illius corrigatur*
 - 1) *Spiffior* per resoluentia, attenuantia & digestiua. e. g. fiat vinum medicatum e radicibus alexipharmacis, herbis antiscorbuticis, cum laxantibus sociatis.
 - 2) *Tenuior* per temperantia, præcipitantia, acidula.
3. *Æqualis humorum distributio promoueatur per mixturam tonico-neruinam Stahlii.*
4. *Præter ea hæmorrhagiarum suppressarum specialis ratio habeatur, e. g. mensium, hæmorrhoidum.*
5. *Diæta conueniens probe obseruetur, in primis circa motum corporis laboriosum & potum sufficientem.*

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Cautelæ & obseruationes, quæ tabula de congestionibus generatim traditæ sunt, ante omnia hic erunt notandæ & adplicandæ.*
2. *Borum consilium, optimum remedium:* exerceatur corpus laboribus continuis & placidis, diæta autem largior paululum ei subtrahatur: sic totum negotium felicius succedet, quam si ingens medicamentorum farrago propinabitur.
3. *Quando cephalalgia iam per plures dies inualuit, & dolores tam contumaces sunt, ut spiritui vini camphorato cedere recusent: unguentum alabastrinum, quod commendante Foresto insigniter lenit, adhuc tentari potest.*
4. *Modo optima e tot monstrosis eligatur compositio, nempe illa, quæ plus alabastris & aliquid albuminis ouorum continet. Vile remedium, pretiosus effectus. Conferuetur autem vitro, non capsula; quia facile siccescit.*
5. *Vnguentum pinguia, quibus veteres caput inungebant, plane non conducunt: poros enim obstruunt, & sic transpirationem, in hoc adfectu salutarem, præpediunt.*
6. *Recentiorum aliqui nucleos persicorum contundunt, & camphoram cum aqua rosarum admiscunt; id quod externo vsu non contemnendum est.*
7. *Odoramenta duplicis generis, nempe urinosa & spirituosissima, balsamica,*

samica, parum quidem auxilii adferunt; plus tamen ab viri-
nolis, moderate adhibitis, e. g. a spiritu C. C. falis am-
moniaci sperandum est, quam a spirituosis.

8. Præter ea *spirituoso-balsamica* immoderate adhibita cepha-
lalgiam acerbant, præcipue in feminis, maiorem etiam
humorum adpulsum, & hinc vasorum inflationem effi-
ciunt. Caute itaque cum aqua Hungarica & similibus
procedendum est.
9. *Cucupha*, quæ ad roborandum caput & memoriam frequen-
tius commendantur, nuda opinione fundatæ sunt, & in
dispositis ad commotionem sanguinis occasionem sup-
peditant. Absint in primis species earum calidæ apud
feminas, quæ in *bregmate* sensum illum frigidum per-
sentiscunt, ac si frustum glaciæ capiti impositum ef-
set.
10. Senescente & tepescente doloris impetu, immo etiam sub
insultu leuiter emicante, vsus *essentiæ succini* egregie con-
uenit. Habet enim succinum aliquid tonici, vnde tam
fluxionibus sanguinis, quam in eiusdem *commotionibus* ex-
itum non inuenientibus, bonum edit effectum. Est et-
iam diuretico-discutiens.
11. *Oleum autem succini*, vt & alia destillata, vsus cephalicum
non habent: humores enim ad modum exagitant, ardo-
rem & æstum inferunt, & non nisi forsan phlegmaticis
aliquem vsus præstant.
12. *Herba verbenæ* recentis *specificæ* efficacia, a *Foresto* recensita,
raro se commendat. Interea *Stablius* virginem hæmi-
craia & odontalgia ad insaniam vsque correptam hac
herba restituit.
13. Si quis narium hæmorrhagiam feliciter posset prouocare,
habet ille in cephalalgia, & multis aliis capitis congestio-
nibus remedium exoptatum. Multa quidem in hunc
finem commendantur, sed quo effectu, docet experien-
tia. *Michaelis* laudat radicem *crocodilii*; alii commen-
dant adplicationem *hirudinum* ad apicem nasi; alii *conos*
virides millefolii; alii *flores graminis* naribus intrusos, &
in iisdem agitados; alii ruditer & moleste ad *seas suillas*

- confugiunt. De *scarificatione narium Ægyptiaca* legatur *programmata Stahlii*; item *Prosper Alpinus libr. III. cap. 2. p. 70.*
14. *Conspiratio capitis cum ventriculo per par octauum nervorum* bene attendenda est: in sensibilibus enim dolores cephalalgici statim exoriuntur, quam primum digestionis vitia occurrunt, vel ventriculus flatibus distenditur, aut refrigeratur. Quamquam negandum non est, quod hic partium consensus vniuersum negotium non exhauriat, sed congestiones his ad caput, aliis ad alias partes, per meram *consuetudinem* contingant, quam primum cibo se. gr. ingratus, licet mollis, adsumtus est.
15. Causæ horum dolorum quando vel in acrimonia vellicante, irritante, pungente, vel in acido inspissato, vel in crassitie humorum, vel in specifica scorbutica intemperie quærantur, atque hinc per nuda *corrigenta*, & incongrua *discutientia*, item per *narcotica* & sopientia hic adfectus tractatur, omnia grauius peruertuntur: dolores enim non cedunt, sed contumacius durant, & frequentius recurrunt.
16. Speciatim ab *opiatis* & *narcoticis* frequentius adhibitis eius modi peruersus & plane contrarius effectus sæpillime expectandus est. Loco enim mitigationis dolorum in contumaciam paroxysmorum, vix credibilem, ægros coniciunt; vnde non raro audire contingit: Das gewöhnliche Medicament will nicht mehr helfen.
17. Insuper *opiata* sensum capitis obtusum & vertiginosum facile relinquunt, immo catarrhi suffocatiui, adfectus paralytici, cachectici, non raro inuitantur.
18. *Cinnabaris*, maiore dosi exhibita, & cum aliis convenientibus combinata, effectum edit antispasmodicum satis notabilem, tam in *fluxionibus*, quam *commotionibus* sanguinis, & hinc opiatorum vices sæpius supplere potest.
19. Falsissimum itaque quorundam Præticorum est adserutum, quasi vsus cinnabaris in fluxibus sanguinis & aliarum excretionum minus tutus existat: re enim vera cuius ætati & sexui maxime est adcommodatus.

20. *Specificum cephalicum Michaelis* satis quidem decantatum, sed effectu felici non æque confirmatum est; in maiori dosi adhibitum, ventriculo molestias inducit.
21. *Helleborina* cum aliis admixta, blande operantur; sola autem propinata, tormina excitant.
22. Semper in hoc adfectu fugienda sunt *fortiora emetica & cathartica*, nec non *calida alexipharmaca*.
23. Inter *laxantia* exsulent *aloëtica*: sanguinem enim turgidiorum reddunt, & sic cephalalgiam augent. Hinc pilularum cephalico effectu vulgo decantatarum ingredientia prius bene examinanda sunt, quam in usum trahantur.
24. *Embrocationes* veterum, præmissis vniuersalioribus, non plane reiiciendæ sunt: nam motum tonicum fremebundum & horridulum suscitant, hacque ratione sanguinis congesti depressionem promouent.
25. *Pedilunia* in omnibus congestionibus, quæ versus caput & pectus contingunt, multum leuaminis exhibent: sanguinis enim versus illa loca restrictionem relaxant, & ad pedes ducunt. Cauendum autem est, ne nimis *calida* adhibeantur, quia sanguis facile turgescit, & natura ad impetuosam commotionem excitatur: vnde febres nascuntur; præcipue si pedes altius immerguntur, nimis diu immergi detinentur, & alius insuper est adstricta. *Cæterum*
26. *Pedilunia* quando *nimis frequenter* adhibentur, speratum effectum minime præstant: si vero febrilis commotio concurrit, ab illis prorsus abstinendum est.
27. *Martialia* omnem bonum effectum hic eludunt, & heteroclitias varias aberandi species inuitant.
28. *Feminae* quidem nonnullæ effectum illorum *adstringentem* (alius enim martialibus, vtut optime paratis, non conceditur) tranquillius adhuc tolerant; successu tamen temporis in *tubem* vel *hydropem* deducuntur.
29. Quæ autem subiecta *sensibilia* sunt, his in parte adfecta varia molimina spastica, immo conuulsiva oriuntur; quæ tandem ad violentas eruptiones impetum faciunt, in partibus

- tibus autem remotis stricturae impetuosae, tensiones, imprimis alui pertinaces adstrictiones producuntur.
30. Quando autem motus illi spastici ad eruptiones non per-tingunt, grauiora adhuc pathemata, febres nempe, inflammationes, oedemata pertinacia aegri incurrunt.
31. *Salia volatilia*, exigua dosi propinata, loco speratae attenu-ationis, tonicam & neruinam efficaciam edunt; vnde fit, vt moderate adhibita haemorrhagias sistant, & sub initi-um congestionum, praecipue vero in declinatione, bo-num effectum praestent, in $\alpha\mu\mu$ autem dolorum propi-nata sensibilem illorum excitationem efficiant.
32. In *maiore* dosi propinata effectum edunt prorsus adstrin-gentem: vnde natura ad impetum excernendi commo-uetur, & violento motu percurrere intendit.
33. Vnicum & certissimum *artificiale* remedium est *vena sectio* in pede. Magna autem incisione & sufficiente quantita-te administranda est, vt eo maior alteratio obtineatur. Inter ea nimis frequenter repeti non debet, alias effectus alterationis non succedit. In grauidis, cephalalgia cor-reptis, in brachio quidem olim instituebatur, hodie autem in ipsis pedibus sine formidine venam secamus.
34. Sanguis quando minore quantitate emittitur, quam natu-ra desiderat, insolentius luxuriare incipit; id quod docet, *motus* hic magis considerandos esse, quam *qualitates* san-guinis *irritantes*.
35. *Vena sectio*, vti semper fere in aliis adfectibus, sic etiam in cephalalgia magis *praeseruandi* quam *curandi* scopo lauda-tur: hinc in paroxysmo ab hoc remedio abstinendum; nisi quidem summa necessitas, quae tamen hic raro con-tingit, illud efflagitet: alias enim facilius adfectus recur-rit, & *venae sectio* sensim minore immo tandem nullo ef-fectu instituitur.
36. *Scarificationes*, in primis *adsuetae*, in *paroxysmo* facilius pos-sunt tolerari, minoris autem sunt efficaciae, quam *venae se-ctiones*. In iuniore aetate infra annum vicesimum quin-tum adhuc constituta, *artificiales* euacuationes per *venae sectionem* & *scarificationem*, quantum fieri potest, o-

mittantur: vix vniquam enim tale damnum huic ætati a cephalalgia obtingit, quale in annosioribus timendum est, nempe: vertigo, apoplexia, lethargus, paralyfis; sed natura plurimum sponte sua hunc adfectum feliciter profligat.

TABVLA XXII.

DE

CEPHALALGIA ILIACO - HÆ-
MATITICA,

SEV

CLAVO HYSTERICO.

I. DEFINITIO.

Cephalalgia iliaco-hæmatitica est specialis capitis dolor, seu femineo proprius, a restrictione sanguinis menstrui versus caput originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. *Clavus hystericus*, a *Sydenhamo* ita nominatus, licet cum cephalalgia sanguinea plurimum conueniat, ob peculiare tamen circumstantias peculiari indiget evolutione.
2. Ab *ileo hæmatite Hippocratis* proprie non differt *clavus hystericus*, sed vnus idemque est adfectus; nisi quod *ileo hæmatites* sensu potius generaliore sumatur, & omnes turbas spasticas, a vitio sanguinis menstrui exortas, comprehendat, nempe cephalalgiam iliaco hæmatiticam, *seircolicam anotericam*, die Ober-Colic vulgo *Uebercolck*, & *colicam abdominis*.
3. *Clavus hic hystericus* differt gradu.
 - 1) In aliis enim *mitiores* sunt dolores, & circa tempus menstrui

struum per 3-4 dies plus vel minus ægras exercent. Hic gradus cephalalgiam, præcedente tabula exhibitam, non transcendit.

- 2) In aliis autem dolores sunt pertinaces & ita fere continui, ut ad cephalæam magis referendus sit adfectus: & quando inquinamentum venereum dictis causis superuenit & massam sanguineam conspurcat; quod hodie non ita rarum est, tum cephalæa atrocissima induitur.

III. SIGNA.

1. Præcedunt pathemata, quæ in malo hysterico obseruantur. *Vid. tabul. de malo hypochondriaco-hysterico.*
2. Dolor grauians, distendens, vellicans, lancinans, modo totum caput occupans, modo & præcipue circa tempora ita sensibiliter pungens, ac si *clauus* ibidem esset infixus; a quo doloris sensu nomen hic adfectus accepit.
3. Cum his doloribus sæpe numero concurrit pertinax *sensus frigoris* plane *gelidi* circa *suturam sagittalem*, als wenn ein Stück Eis oben auf dem Kopflage, vel *aqua* circa *vertex* fluctuantis,
4. Inflatio capitis peripheriæ, quasi erysipelacea, cum rubore faciei plerumque coniuncta.
5. In dorso sentitur dolor ad nucham ascendens, in qua nonnumquam nodi producuntur.
6. Tinnitus aurium, grauitas auditus.
7. Comitantur hunc adfectum non raro
 - 1) febricula aliqua,
 - 2) horripilatio quasi perpetua extremorum artuum,
 - 3) Lassitudo insignis,
 - 4) Adpetitus deiectus,
 - 5) nauſcabundus vomendi conatus & ructus,
 - 6) pertinax adstrictio alui.
8. Recurrit ordinarie circa menstruas periodos.
9. Quo tempore, si adhuc *leuioris gradus* existit, per aliquot tantum dies scenam suam ludit.
10. Quo magis autem in *consuetudinem* adactus est hic adfectus, vel

vel causſæ *venerei inquinamenti* accedunt, eo magis continuus, chronicus & perennans obſervatur.

IV. *SUBIECTA.*

1. Est quidem hic adfectus *feminino* ſexui, vitio menſium laboranti proprius; occurrit tamen etiam nonnumquam ſimile ſchema in *viris*, qui arthritico-hæmorrhoidalibus fluctuationibus & turbis obnoxii ſunt.
2. *Illa autem femina*, & vix unquam aliæ, hiſce doloribus ac incommodis ſubiacent, quæ
 - 1) Otioſæ & vitæ ſedentariæ addiſtæ ſunt,
 - 2) de diætâ plena & lauta gaudent,
 - 3) animi commotionibus expoſitæ ſunt.

V. *CAUSSAE.*

1. Cauſſa *generalior* huius adfectus convenit cum cauſſa cephalalgicæ, præcedente tabula exhibitæ: nimirum motus ſanguinis excretorius, verſus caput directus, utrorumque eſt fundamentum.
2. Cauſſa *ſpecialior* eſt menſium vitium qualecumque, rarius obſtructio hæmorrhoidum, per incongrua artificia inducta.
3. Hæ cauſſæ *materiales* naturæ anſam præbent, per varios motus ſpaſticos retenti ſanguinis expreſſionem tentare; & quidem
 - 1) Locis ſub initium proximis: unde motus hypochondriaco-hyſterici oriuntur.
 - 2) Deinde circa pectus, per varias tenſiones & compreſſiones.
 - 3) Denique in capite intentionem ſuam manifeſtat per incommoda ſub *ſignis* indicata.
4. Cauſſæ *externæ & occaſionales*, quæ præcedente tabula nominatæ ſunt, clauum etiam hyſtericum inuitare poſſunt; præcipue refrigeratio pedum, diætâ calida, & animi commotiones.
5. Conferatur tabula de hypochondriaco-hyſterico malô.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Quoniam hic adfectus ex congeſtionibus & vehementibus

spasmis in abdomine, pectore & capite complicatus est, præ aliis cephalalgicis dolore plenus & contumax observatur.

2. Et sane nihil magis vexat Medicos & opprobrio illos exponit, quam dolores capitis in sexu feminino.
3. Causa infelicis huius successus non querenda est in ipso adfectu, nec etiam semper in præpostera medicatione, sed potissimum in conditione subiectorum.
4. Quem ad modum enim illæ fere solæ huic incommôdo subiacent, quæ commodam, otiosam & victu abundantem vitam degunt, hoc vitæ genus autem ab omnibus personis, quarum fors illud tolerat, cum desiderio apprehenditur: ita etiam nulla alia, quam mitigans & deuo repetenda curatio in illis potest obtineri.
5. Ipse enim morbus *in se* consideratus, licet inueteratus & per multas reiterationes in consuetudinem perductus sit, admittit omnino, teste experientia, operatam sui runctionem, si peruersum vitæ genus mutatur, & congrua methodus adhibetur.
6. Ceterum quoniam hic adfectus in hypochondriaco-hystericis turbis radices suas habet fundatas, prius non tollitur, quam his eradicatis.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Methodus hic fere conuenit cum illa, quam in cephalalgia *precedente* tabula commendauimus, nimirum

A. In paroxysmo.

1. *Aluus* ante omnia est expedienda,
 - 1) vel per clysteres lenientes & emollientes, non autem stimulantés,
 - 2) vel per lenissima laxantia interna; vbi nempe impetus dolorum non ita vrget.
2. Deinde *orgasmus* sanguinis temperandus, & spastica fibrarum strictura demulcenda est per nitrosa, absorbentia, cinnabarina cum diaphoreticis fixis combinata, e. g. nitrum depurat. conch. præparat. ocul. cancri, cinnab. nativ. præparat. bezoard. mineral. antimon. diaphoret.

Quan-

Quando crasis sanguinis *spissior* est, addatur sal digestivum, quod etiam ad mucum in primis viis resolvendum & diuresin obtinendam necessarium est.

3. His interponantur æqualem sanguinis distributionem promouentia, e. g.

Rec. essent. alexipharm. *Stablii* drachm. II.

millefol. drachm. I,

Spirit. salis ammoniac. drachm. semis

M. dosis gutt. XXX.

4. His præmissis vtili sæpius effectu vsurpatur herb. millefol. in forma vel decocti vel essentia; item essent. cortic. casca-rill. cum essent. pimpinell. aib. coniuncta.

5. Hæc autem quando non sufficiunt, *lene anodynum* pulueribus temperantibus misceri & versus somnum propinari potest, e. g. M. P. de cynogloss gr. I. pro dosi; quo tempore successus alui obseruetur.

6. *Externa* remedia simul adhibeantur, quæ *precedente tabula* commendata sunt; in primis *spiritus camphoratus*, qui temporibus illitus, & vertici instillatus, egregie conducit; item *unguentum alabastrinum*, quod sanguinem notabiliter ad interiora restringit.

7. Denique sub *declinatione* dolorum propinentur *tonica*, e. gr. mixtura tonico-neruina *Stablii*; item essent. succin.

B. *Extra paroxysmum.*

1. Circa æquinoctia instaurantur venæ sectiones.
2. Mensium præ omnibus habeatur ratio, & versus illud tempus, quo expectantur, vel expectari debent, pilulæ *Stablii* aut *Becheri* per sex circiter dies exhibeantur, & sequentibus mensium periodis tam diu repetantur, donec in iustum ordinem redacti sunt.
3. Optimum autem & fundatissimum remedium, nempe sufficiens corporis motus, tanto magis ægrotis commendetur & inculcetur, quanto difficilius ad id eligendum & continuandum perducere possunt. Sunt enim fere semper teneræ & delicatulæ, quæ hoc morbo inficiuntur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ præcedente tabula sub *caustelis* annotata sunt, hoc loco plurimum possunt adplicari.
2. Cauendum in hoc adfectu congestorio- spastico, ne curatio *motuum* postponatur mitigationi *dolorum*. Hac enim ratione dolores maiore ferocia recurrunt, & breuem requiem male compensant.
3. Multæ sunt feminæ, quæ *camphora* odorem non possunt perferre; ne autem efficaci hoc remedio priuentur, nares illarum obturandæ sunt, donec natura, sentiens ab hac vnctione leuamen, remedium illud amore amplectatur. Hac ratione multarum auersatio a camphora feliciter sublata est.
4. *Calida* illa remedia neruina, castorina, carminatiua, elixiria vterina, male hic adplicantur.
5. Quouis etiam modo cauendum est, ne per calida, externe adplicata, sensum illum *frigidum* in vertice remouere animo sedeat. Es ist kein kalter Fluß, ob gleich das Gefühl kalt ist.
6. *Opiata*, præpostere adhibita, exacerbant symptomata, & inducunt adfectus soporosos, stupores paralytodeos, excretionum debitarum suppressiones, & interdum mentis plane alienationes.
7. *Odor salium volatilium* prius non admittatur, quam temperantibus præmissis tonus spasticus in abdomine relaxatus est; alias in capite motum tonicum augent & per hanc congestionem humores, hactenus diffusos, in angustum locum comprimunt; vnde acutissimi dolores exoriuntur.
8. Exsulent omnia *pinguia* externe adplicata: poris enim intimius sese insinuant, transpirationem perutilem impediunt & æstum augent.
9. Si *vena sectio* ob ægrotantis auersationem locum non habet, *pediluua* alternis diebus versus recursum mensium vesperi vsurpentur; quo tempore alius legitime succedat.

TABVLA XXIII.

DE

CEPHALAE A.

I. DEFINITIO.

Cephalæa est pertinacissimus & fere continuus capitis dolor a rheumatica congestione humorum versus caput originem ducens. Deriuatur a κεφαλή, caput.

II. DIFFERENTIA.

1. Cephalæa quo modo differat a cephalalgia tabula XXI. indicatum est.
2. Cephalæa differt etiam aliquo modo a cephalalgia continua: nam hæc simplicioribus sanguinis congestionibus innititur, & per consuetudinem tantum ita fit perennis; illa autem motibus congestoriis rheumaticis stipata est. Conf. tabula XXI. de cephalalgia.
3. Differentia cephalæa ab hemicrania e signis inter se collatis elucescit.
4. Ratione autem causarum quo modo cephalæa differat, infra sub causis indicabitur.
5. Cæterum cephalæa commode diuiditur in
 - 1) continuam, chronicam, valde pertinacem;
 - 2) periodicam, quæ certis temporibus paullulum remittit.
 - 3) vagam, quæ nullius exactæ periodi existit.

III. SIGNA.

Hæc secundum causas differunt.

1. Quæ cephalæa cum cephalalgia eandem causam generatorem fouet, illa etiam eadem habet signa, gradu licet vehementiora. Nam dolores non solum continuo fere durant, sed etiam pertinacissime adfligunt.
2. In feminis, quando cephalæa contingit, omnia illa signa conspirant, quæ tabula præcedente de clauo hysterico adlegata sunt.
3. Vbi ulceroso-ichorosa congestio & speciatim lues venerea in causis est, ibi dolor adest uni loco quasi infixus, falso ardore

dore rodens, acriter morsicans, terebrans, vix vniquam ex solido desinens, qui & nocturno tempore, incallescens sub lecto corpore, acerbatur, & sine manifestis congestionis signis obuenit.

4. Quando a *coagulatione sanguinis & inflammatione meningum* cephalæa exoritur, dolores satis acuti sunt, & calor insignis cum siti intolerabili accedit.
5. *Vertiginosa* capitis perturbatio per interualla & præcipue sub doloris declinatione occurrit.
6. Nullum corporis motum ægri possunt tolerare: a leui enim motu dolor capitis augetur & *arteriarum* pulsus æmularur.
7. In loco adfecto interdum adparet tumor duriusculus, qui sensim capit incrementum.
8. *Quamdiu* decumbunt, dolores obseruantur *mitiores*, dum autem caput attollere volunt, tam repentino insultu corripiuntur, vt sui immemores recumbere cogantur.
9. *Hæmorrhagia variæ* effrenis non ita raro *in scorbuticis* causis accedit. *Vid. tab. de scorbuto.*
10. Cæterum ægri cephalæa adfecti sunt *sensibilissimi*: a quouis enim clamore, strepitu, tumultu, gallicinio, tamquam rebus intolerabilibus perturbantur.
11. *Lacem* etiam non possunt perferre, hinc cameras amant obscuras, in quibus tranquilla quies & altum agitur silentium.
12. A quouis *potu* paullulum *fortiore* statim male se habent, nec nisi ad modum *dilutum* tolerant.

IV. SVBIECTA.

1. Cephalæa plerumque obnoxia sunt *femine*.
2. Rarius *viri*, nisi a turbulentis hæmorrhoidibus aut vlcerosa constitutione, (speciatim a *lue venerea*, originem sumserit.
3. Illæ autem feminae præcipue huic malo subiacent, quæ ob vitæ genus sedentarium, diætam plenam, & animi pathemata mensum perturbationem incurrunt.
4. Temperamentum melancholicum huic adfectui præ aliis est expositum, & sane in talibus subiectis pertinax *animi* indoles efficacæ non est postrema.

V. CAUSSAE.

Causas cephalæ ex illis, quæ sub *signis & subiectis* dicta sunt, in hunc ordinem colligimus.

1. *Causa generalior* in cephalæa eadem est, quæ in *cephalalgia*: nam sanguinis ad hæc loca congestiones ansam præbent omnibus specialioribus effectibus & productis in cephalæa obuenientibus; id quod & de ipsius luis venereæ capitis doloribus non potest negari. Ab impetuosa enim congestione contingit distensio partium, quæ relaxatæ repulsui humorum non sufficiunt. Vnde itagnationes, stases, corruptiones exoriuntur.
2. *Causæ specialiores*, quibus cephalæa inicitur, sunt constitutiones siue ulcerosæ, siue actu iam exulceratæ, quæ a sequentibus circumstantiis & causis originem sumere possunt: nempe
 - 1) a scorbuto.
 - 2) a luis venereæ inquinamentis.
 - 3) ab aliis scabioso impetiginosis corruptionibus, quæ intra eutem contingunt.
 - 4) A contusionibus, vulnerationibus & ulcerationibus præpostere tractatis.
3. *Veteres* materiam tenacem, cerebro impactam, vel plane *apostema* aliquod accusabant, & hinc pro diuerso respectu, modo *apoplegmatismos*, *setacea* & *vesicatoria*, modo *caustica*, modo ipsam capitis *terebrationem* commendabant.

VI. PROGNOSIS.

Diueritas *causarum* diuersam etiam prognosin inuoluit.

1. Vbi causæ cephalææ cum cephalalgia conueniunt, ibi eadem valet prognosis, quæ *tabula XXI. de cephalalgia* indicata est; modo attendatur, quod a *minori* ad *maius* hic præcipue valeat consequens.
2. *Ulcerosa* constitutio quando *simplicior* subest, difficultate quidem curatio omnino laborat, non omnem tamen dirimit spem restitutionis.
3. *Venerea* autem *ulcerosa* constitutio, vel quæcumque *alia*

cum ossium *carie* coniuncta est, multo maiores inuoluit difficultates: licet enim *caussa* per dextram medicationem sublata sit (quod negotium etiam non exigui est momenti) dolores tamen vix vniquam ita cedunt, vt futuro tempore non magis recrudescant.

4. Cephalæa illa, quæ per serosas excretiones facilem & frequentem exitum adeptæ est, multo pertinacior, quam alia minus talis, obseruatur.
5. Cephalæa per habitum obfirmata interdum degenerat in melancholiam.
6. Cephalæa cum insigni plethora coniuncta, apoplexiam futuram prælagit. *vid. Forestus.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Cephalæa, quæ adhuc *simplicior* est, non abluat a methodo, quam tabula XXI. de cephalalgia exhibuimus, nisi quod hic *mucose stases* fortius resolui debeant per anticatarrhalia alexipharmaco-diuretica, e. g.
 - 1) *Radices*: ari, pimp. alb. helen angelic. vincetox. imperator. gentian. rubr.
 - 2) *Herbas amaras & capillares*: scord. centaur. min. card. bened. capill. venter. cuscut.
 - 3) *Corticis & ligna odorata*: chacarill. fassaftr.
 - 4) *Gummi-resinas*: ammoniac. galban. sagapen.
 - 5) *Tincturas alcalinas*: salistartar. antimon.
 - 6) *Salia enixa*: tart. vitriolat. nitr. antimoniat. arcan. duplicat. item salia centaur. min. absinth. genist.
2. Facta resolutione & præparatione materiæ *purgans* aliquod ad illam exterminandam præscribendum est. Laudatur in hunc finem jalapp. extract. panchymagog. *Crollii*, M.P. de succino *Cratonis*, essent. hellebor. nigr. secundum methodum *Stahlîi*, nempe ex extracto resinoso per spiritum vini parata.
3. *Hirudines* temporibus vel auribus adplicatæ vsum etiam præstant.
4. Quo magis autem cephalæa ab inquinamentis *venereis* vel *scorbuticis*, aut ab aliis tam internis quam externis vlcerationibus fouetur, eo magis secundum diuersitatem *caussa-*

cauffarum diuerſæ etiam medicationes neceſſariæ ſunt, nempe

1) *Cephalæa venerea* tractanda eſt, vti lues venerea, *vid. tab. de lue venerea.*

2) *Scorbutica*, vti ſcorbutus. *vid. tab. de ſcorbuto.*

5. Quando incongrua *ſuppreſſio ulcerum* manantium, vel aliarum *feroſarum* excretionum præceſſit, manet quidem methodus num, 1. & 2. commendata; quoniam autem in illo caſu adfectus admodum rebellis eſt, externa nonnumquam in ſubſidium vocanda ſunt, nempe vel apophlegmatismi, vel fonticuli, vel ſetacea pro circumſtantiarum ratione.

6. In ſtatu *inueterato* colliquatio & euacuatio per *mercurium æqueac* in cauſa venerea tentanda eſt.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Omnes obſervationes & cautelæ, tabula XXI. de cephalalgia commendatæ, quam maxime & præcipue in cephalæa etiam commendantur.

2. *Topica* eo magis hic ſunt neceſſaria, quo magis continui & contumaces ſunt dolores. In hunc finem præter ſpiritum vini camphorat. præcipue adhuc laudatur *radix rhodia* puluerifata & epithematis forma capiti adplicata.

3. *Nephritica* doloribus circa lumbos, qui cephalæa prodromi ſunt, opponere, adfectum potius acerbare quam eundem mitigare poſſunt.

4. Abſint tamen acriora, in primis balſamica, quæ facile commotiones febriles prouocant: immo ipſe ſpiritus vini camphoratus, quem modo commendauimus, non niſi poſt debitas euacuationes ſatis tuto poteſt uſurpari.

5. Medici iudicio relinquitur, num initium curæ cum *purgantibus* quodam faciendum, vel prius ad *correctionem* humorum accedendum ſit.

6. Ad craſin humorum corrigendam *formule humide* aliis in hoc adfectu præferendæ ſunt, c. g. *medicatum vinum e rad. ari. eichor. caryophyllat. helen. angel. herb. meliſſ. betonic. verben. comiſ abſinth. cort. citr. aurant. & ſi*

- tempus ferat, cochlear. recent. Ex laxantibus solanæ, rad. rhabarb. & præcipue fibr. hellebor. nigr.
7. In *serosa* sanguinis dyscrasia conducit egregie *essentia succini* cum spiritu volatili C. C. & tinctura tartari maritata.
8. *Pediluvia* & *frictiones* pedum per pannos asperos etiam egregie conducunt.
9. Notum est, quod in cephalæa pertinaci sæpe ad *trepantionem* properetur, sed illa locum non habet, nisi in talibus circumstantiis, in quibus de humoribus sub *calvaria* extravasa locatis, certa indicia prostant. *Conf. tab. chirurg. de trepanatione.*
10. Continentia & corporis & animi sit tranquilla; diæta aromatica ac spirituosa euitetur, continuaque alui successio promoueat.
11. *Venesectio æquinoctialis* seu præseruans in hoc adfectu maiorem habet vsum, quam quæ incurandi scopum instituitur; & quoniam cephalæa rariora habet interualla, sedulo cauendum est, ne *vena* tempore acerbitatis secetur.

TABVLA XXIV.

DE

OPHTHALMIA.

I. DEFINITIO.

Ophthalmia est inflammatio *tunica adnata* oculorum, a congestione humorum versus caput originem ducens, & hæmorrhagiam narium e *longinquo* quasi respiciens. Deriuatur ab *ὀφθαλμὸς*, oculus.

II. DIFFERENTIA.

1. Ophthalmia est vel

- 1) *Vera*, quæ statim *sanguineam* pro causa habet, vnde etiam *sanguinea* dicitur; vel
- 2) *Notha*, quæ statim magis *serosam* inuoluit: vnde *serosa* vocatur.

2. *Notha* iterum duplex est:

- 1) *Leuioris* gradus, quae *ταραξίς* dici solet, a *ταράσσω*, turbo.
- 2) *Intensioris* gradus, ubi palpebrae simul adficiuntur & prurigo oculorum concurrit. Dicitur *Chemosis* a *χαίω*, debisco, quia tumor ita conspicuus adest, ut oculi nigrum concauum videatur.

3. Ophthalmia etiam diuiditur in

- 1) *simplicem* &
- 2) *habitualem*, seu pertinaciter aduersa factam.

4. Porro diuiditur in

- 1) *Statam*, quae contumaciter durare solet, &
- 2) *Periodicam*, quae per paroxysmos quasi adfligit.

5. Alia est *profundior*, alia *superficialis*, & tandem

6. Alia *unicum* tantum, alia *utrumque* adfligit oculum.

III. SIGNA.

1. Rubedo oculorum cum inflatione circa vasa *albuginis*.

2. Sensus modo ardoris, modo pruritus.

3. Dolor inflammatorius, urens, compungens, lancinans, non solum oculos, sed per consensum etiam totum caput adficiens. Praeter ea

4. Ager intolerans est lucis & obiectorum lucidorum.

5. Effusio lacrimarum, quae magis in ophthalmia *notha* seu *serosa* occurrit, quam in *sanguinea*, quae siccior esse solet.

IV. SVBIECTA.

1. *Infantes*, a crustae lacteae aliarumque capitis exulcerationum atque tumorum repulso.

2. *Pueri*, ab haemorrhagia narium emanente.

3. *Adulti*, a suppressione euacuationum naturalium & neglectione artificialium e. g. scarificationum aduetarum.

4. Qui baccho & veneri indulgent & diaeta aromatica abutuntur.

5. Qui oculos nimium fatigant & acriora atque coacta videntur intensione irritant, vel aeri frigido, aut etiam nimio calori illos exponunt.

6. Speciatim qui crebris lectionibus & lucubrationibus indulgent.

V. CAUSSAE.

1. *Interna.*

- 1) Causa antecedens remota est plethora, cum cacochymia, praecipue in adfectu seroso, plerumque coniuncta.
 - 2) Causa propior est decubitus sanguinis ad oculos, cuius transudans tenuior portio partes hasce sensibiles rodit; quae rosio vltiorem deinde humorum adfluxum inuitat.
 - 3) Causa proxima & immediata est stasis inflammatoria in tunica adnata oculorum.
2. Causae externa, occasionales & procatartica. Praeter illas, quae in *subjectis* iam uominatae sunt, sequentes adhuc notamus.
- 1) Consuetudo & frequens congestionum talium recursus.
 - 2) Frictiones & ploratus.
 - 3) Exhalationes acres, rodentes, salinae.
 - 4) Aer humidus, vel alia humectatio immodesta.
 - 5) Infecta seu animalia parua in oculos inuolantia.
 - 6) Percussiones oculi.

VI. PROGNOISIS.

1. Laesiones oculorum & visus, difficilis sunt restorationis.
2. Quo diutius oculorum adfectus tolerantur, eo grauius damnum in hisce teneris partibus inferunt: rubor enim facile in inflammationem, & haec in suppurationem, vlcerationem & erosionem transit.
3. Nisi stasis tempestiue discutatur, ex ophthalmia sanguinea hypopyum, & ex hypopyo pterygium seu unguis enalci potest; de quibus peculiaribus oculorum adfectibus tabula chirurgica de operationibus in oculis agitur.
4. Ex ophthalmia autem notha seu serosa contumax lippitudo, & inde emollitio & exesio tunicae corneae; ab hac autem proci-dentia uuea, immo demum, continuante inflammatione, visus plane amissio prouenire obseruatur.
5. Quando in corneam laesam cicatrix ducitur, clauus oculi emergit.

6. *Aserosis* quoque ophthalmiis *fistula lacrimales* plerumque initium habent.
7. Ophthalmia *diuturna* vel sæpius recurrens facile post se trahit visus hebetudinem vel cæcitatem.
8. Immo si in ophthalmia neque discussio neque suppuratio locum inuenit, sæpius perit oculus.
9. Alui profluuium & hæmorrhoidum suppressarum autocratica ruptio sæpius ophthalmiam tollunt, saltem imminuunt.
10. Grauiorem *suppurationem* vel cæcitas vel totius oculi corruptio sequitur.
11. Ophthalmia, quæ grauiores capitis contusiones excipit, periculosa est.
12. Ophthalmia quo magis hæreditariam labem, aut hæmorrhagiæ suppressionem causam agnoscit, eo sæpius solet reerudescere, & in adfuerudinem abire contumaciorum; nisi quidem causa suppressæ hæmorrhagiæ sublata prognosin reddat mitiorem.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Cruditates primarum viarum expurgentur.
 - 1) In *serosa* ophthalmia magis conducunt phlegmagoga, e. g. fennata, ialappina & mercurius dulcis.
 - 2) In *sanguinea* ophthalmia commendantur rhabarbarina & scamoneata.
 - 3) In *adultis* exhibeatur M. P. de succino *Crotonis* cum mercurio dulei, vel cum extract. hellebor. nigr. resinof. aut cum resina ialap. combinata.
2. Stasis a congestione orta discutiatur,
 - 1) *Interne*
 - a) in *sanguinea* ophthalmia per nitrosa, præcipitantia, grata acidula & diluentia.
 - b) in *serosa* autem, præter modo dicta, exhibeantur insuper lympham corrigentia & sic dicta anticatarthalia, e. g. essent. succin. ligni sassafr. *lignorum*, tinct. antim. tartarifat, essent. alexipharmaca *Stahlii*.

- 2) *Externe optime hoc impetratur per*
- a) *Camphorata* legitime adhibita, nempe vel linteis multiplicatis instillata, & post spiritus vini exhalationem palpebris adplicata; vel camphora cum amygdalis excorticatis subacta & tum cum modica portione aquæ rosarum in emulsionem redacta intraque oculum, si abest inflammatio, adplicata.
 - b) *Epithemata sicca*, e. g. ex rad. irid. Florentin. valerian. flor. sambuc. herb. hyllop. sem. cumin. fœnicul. croc. cum camphora.
 - c) Per *adflaturum halituosum* ex sem. anil. fœnicul. præcipue in infantibus.
 - d) Per *nistrum* pauca quantitate in aqua rosarum, cyani, calcatripp. solutum & adplicatum; id quod insignem effectum edit.
 - e) Per *lac croco* largius tinctum & tepide adplicatum.
- 3) *Adfluxus & vltior congestio* ad has partes reuellatur.
- 1) Interne huic indicationi satis faciunt laxantia repetita, quæ humores ad inferiores partes reuocant. Eadem hic conducunt, cum quibus curationis initium factum est.
 - 2) *Externe* conueniunt discutientia & tonica, quæ simul siccant & adstringunt:
 - a) *Vitriolum album*, in ovo cocto per deliquium resolutum, & cum aqua rosarum temperatum.
 - b) *Nistrum*, supra iam laudatum, maiore cum fructu adhibetur, quando *saccharum saturni* cum illo in crystallos redactum est.
 - c) In *sanguinea* ophthalmia sacrificatio, vel illius loco *Sennerti sinapisimus*, nempe farina *eruce* sacco inclusa, vino cocta & *nucha* adplicata.
 - d) In *serosa* locum etiam habent exsiccantia & lenia adstringentia, in forma *pulueris* adplicata. e. g. cutia, pomphol. nihilum alb. spodium, mater perl. lapis admirabilis *Crollii*, alumine & bolaribus ingredientibus imbutus.
 - e) Conducunt etiam *externæ*, quæ acrimoniam temperant,

rant, & sic adfluxum vltiorem præcauent, e.g. mucilagines semin. psyllii, cydoniorum cum aqua rosarum, vel aliis aquis ophthalmicis mixtæ.

f) Reliqua sub *causelis* quærantur,

B. *Extra paroxysmum.*

1. *Abundantia sanguinis imminuatur*
 - 1) Vel per venæ sectionem & scarificationem.
 - 2) vel per hæmorrhagiarum suppressarum reuocationem.
2. *Craasis humorum corrigatur per succinata & alexipharmacodiuretica, e.g. per essentiam succini cum tinct. antimon. maritatum, item per liquorem C. C. succinatum, essent. alexipharmacam Stahlii,*
3. *Motus congestorii præoccupentur per lenes purgationes, singulis mensibus, saltem vere & autumno repetendas.*

VIII. *CAVTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. Nihil familiarius est, quam vt in adfectibus oculorum ad *specialia* remedia statim confugiant, licet hæc ad summam rerum nihil constantis efficere possint.
2. Hinc *uniuersaliora* tanto magis commendantur, nempe ea, quæ abundantiam sanguinis imminuunt, illius dyscrasiam corrigunt, aut certos humorum motus & decubitus præoccupant.
3. *Venæ sectiones* enim statæ & scarificationes vsu suum plurimorum exemplis in dies confirmant, auguriumque illorum, qui hinc debilitatem visus, immo cæcitatem harriolantur, oppido incerta & fallâ opinione inniti, satis ostendunt.
4. Non minoris efficaciz sunt congruæ laxationes & pediluvia.
5. *Fonticuli & setacea* diuturno ac rebelli malo opem quidem ferre solent, sed facile constantem sui vsu exigunt, alias malum pertinacius recurrit. Ceterum non sunt applicanda, nisi supra memorata ordinaria remedia frustra fuerint adhibita.
6. *Vesicatoria*, crebrius exhibita, eodem incommodo stipantur. In dolore impetuoso, & quidem magis in *inferioribus*

bus partibus, illa adplicare conuenit; sed non in adeo tenera ætate. Si uero pone aures, ut vulgo moris est, adplicantur, malum sapius augent. *Reuulsio* enim princeps punctum in hoc negotio absoluit; cuius rei *casum notabilissimum* hic exhibemus. Puer quidam ophthalmia tam contumaci laborabat, ut medicamentis ordinariis, per aliquot menses adhibitis, cedere recusaret. Quum vero improuidus in pede ambustionem insignem acciperet, eodem die ab ophthalmia liberabatur, & inflammatio loco oculorum pedem ambustum occupabat.

7. Specificam adscribunt virtutem auctores *radix valeriana* cum interne, tum externe adhibita. Verum specifica certæ fidei vix nota sunt: complurium sane & inter hæc *euphrasia* laudibus non parum detrahit experientia.
8. De *amuleticis* idem sentiendum est.
9. *Crocus metallorum*, crude vsurpatus, irritat oculos, infusum autem iilius, nisi menstrua acris sumantur, ad modum debile est.
10. Quod ad *formulas* attinet, sequentia adhuc notanda sunt.
 - 1) *Puluerulenta* formulæ, quantumcumque denum alcoholifatis seu summe extenuatis materiis, sæpe irritationem in oculis excitant, præcipue si in illis submicidus quidam mador versetur, qui puluerulentam substantiam inæqualiter imbibat, & successu noui mucoris in vnum veluti angulum compingat, vnde pressio & irritatio exoritur.
 - 2) *Fluida* formulæ assiduo vsu etiam damnum oculis inferre possunt, nempe emolliendo, relaxando & sic nouo adfluxui viam sternendo.
 - 3) Hinc omnium consultissimum est & efficacissimum, adstringentia cum formulis humidis moderate miscere; vbi *vitriolum album* omnium facile coriphæus est; modo obseueretur, ut ante illius adplicationem æstus prius remperetur, & saccharum saturni, aqua rosarum solutum, mox subiungatur.

- 4) *Collyria* varia quidem, & subinde satis efficacia, descripta habentur, pro omnibus tamen illud experientia optime se commendat, quod *Weisbachius* ex ore *Stablii* in omnibus oculorum adfectibus, & ipsa adeo incipiente cataracta, commendat. In cæcitate cuiusdam puellæ, mensium emanatione laborantis, visum restituit; præmissis quidem generalioribus & ipsa etiam venæ sectione, sine *conspicuo* tamen effectu, donec hoc collyrium applicaretur. Est autem sequens:

Recip. butyr. maial. illot. vnc. IV.

tut. præparat. vnc. I.

corall. rubr.

camphor.

facchar. saturn. ana drachm. semis.

nihil. alb. drachm. II.

virid. æris gr. XII.

miscantur optime, & versus somnum cuiusvis oculorum angulo ad gr. II. immittantur.

11. *Camphorata* in plerisque oculorum vitiis resoluendi, discutendi, & ita quodam modo exsiccandi efficaciam habent.
- 1) *Camphora*, spiritu vini soluta, omnium penetrantissime agit, modo caueatur, ne quid eius intra oculum defluat: Licet enim non statim insigne damnum inde redundet, gravissima tamen ignei ardoris molestia ad momenta aliqua inde exspectanda est.
- 2) Quodsi vero incauta adplicatione ardor quidam per spiritum vini camphoratum illatus esset, *auram* oculo, siue per volam manus, siue per flatum oris admouere conduceret; sic enim cito exhalat spiritus vini, ardor remittit & camphora poris insinuata relinquitur.
12. *Dioptrica* illa adminicula non, nisi urgente necessitate vel magno adiumento ex illorum usu redundante, suadere oportet; excepto illo casu, ubi adfuerit forte continuationem huius subsidii efflagitat.

13. Vulgarem illam opinionem de *ceparum* & *allii* vsu interno, oculis noxio, satis refutant *Poloni, Hungari & Judai*, qui omnes ex familiari horum vsu nihil ophthalmicorum incommodorum præ aliis sentiunt: halitus tantum externus nocet.
14. Certiore experientia innititur illa cautio, ne fatigent, aut liberius vsurpent oculos, qui paullo ante, vel hæmorrhagiis largis, vel in morbo acuto inedia, vigiliis, largis sudoribus & aliis euacuationibus sunt exhausti.
15. Hoc unum omnium vero efficaciam vti insigniter promouet diæta temperata, diluta & commodum regimen, ita vel minimum leuamen succedit, vel malum recurrit, quando causæ occasionales, procatarticae & irritamenta oculorum non evitantur, e. g. venenis, vini & diætae aromaticæ abusus, multa lectio, lucubratio, cubitus in latere adfecto, vapores acres, aër frigidus pariter atque calidus nimis, lucis & candelarum splendor, præcipue fulguris sub noctem adspectus.

TABVLA XXV.

DE

ODONTALGIA.

I. DEFINITIO.

Odontalgia est periosteï & partium nervosarum, ad dentes tendentium, inflammatio, a congestione sanguinis incompleta, hæmorrhagiarum narium eminens respiciente, nullum autem exitum inueniente, originem trahens. Deriuatur ab *ὀδούς*, dens, & *ἀλγέω*, doleo.

II. DIFFERENTIA.

Odontalgia est vel

1. *Idiopathica*, quæ a carie vel erosione dentium dependet, & suos dentes occupat, vel
2. *Symptomatica*, quæ motibus humorum versus caput congesto-

gestoriis, præcipue hemicranicis, vestigia legit, & præter dentes non raro etiam confinia loca occupat.

III. SIGNA.

Signa per se satis sunt manifesta, nempe

1. Dolor dentes plerumque maxillares, rarius anteriores, occupans exquisitissimus.
2. In symptomatica odontalgia manifesta signa congestionum ad caput occurrunt, rubor scilicet faciei, cum insigni tensione & inflatione vasorum, non solum partium vicinarum, verum etiam totius capitis.
3. Hic dolor exferit se se præcipue in periosteo & fibrillis per dentium radicem medullarem substantiam disseminatis.
Conf. Stablii theoria medica p. 855.
4. Præter ea dolor hic specie variat: modo enim est tensiuus, strictorius, fremebundus, modo lancinaus, modo vibratiuus.
5. Non tantum per qualescumque gingiviarum regiones excurrit, sed & interdum ad interiorem aurium cavitatem se se extendit.
6. Quo modo caries sit dignoscenda, videri potest *tabula chirurgica de carie ossium.*

IV. SVBIECTA.

1. Sunt homines plethorici, temperamenti sanguineo phlegmatici, præcipue iuniores, quorum consuetæ narium hæmorrhagiæ emanferunt.
2. Feminæ quarum menses suppressi vel imminuti sunt.
3. Viri, quibus hæmorrhoides non legitime fluunt.
4. Feminæ pariter ac mares, qui consuetas venæ sectiones & scarificationes neglexerunt.
5. Qui nati sunt a parentibus eodem malo, vel arthritico-spasticis insultibus adfectis.
6. In cariem dentium sæpius incidunt, qui pulueribus dentifriciis ac ioribus abutuntur.
7. Item qui instrumenta metallica, vel alia, dentibus mundandis destinata improvide adhibent.
8. Quibus radices post euulsionem aut cariem dentium in ginguis remaneant.

V. CAUSSAE.

1. Causam odontalgiae *idiopathicae* sub *differentia* iam indicavimus, nempe cariem & erosionem dentium, propter quam lesionem adfluxus humorum & hinc stasis inflammatoria contingit.
2. Causas *occasionales* & *procatarticas* harum erosionum in *subiectis* num. 6. & 7. nominavimus.
3. Odontalgiae autem *symptomatisca* causa antecedens *remota* est plethora.
4. Causa antecedens *propior* est congestio humorum versus caput, euacuationem sanguinis per nares respiciens.
5. Causa *proxima* & *immediata* est stasis sanguinis inflammatoria in vasculis sanguiferis per radicem dentium substantiam medullarem disseminatis.
6. Causae *occasionales* & *procatarticae* in *subiectis* iam indicatae sunt, ad quas natiuitatem *uentium sapientia* adhuc referimus, qui ad annum vsque *vicefimum octauum* procre-scere solent.
7. *Vermiculos* dentium & materiam *salso-acrem* in pathologia odontalgiae aliis relinquimus.

VI. PROGNOSIS.

1. Odontalgia *idiopathica*, seu quae ab erosionem & carie dentium orta est, non nisi palliativam curationem admittit, nec etiam penitus cessat, nisi dente euulso.
2. Odontalgia *symptomatisca* facilius curatur. Quando autem saepius recurrit, erosioni dentium ansam praebet, & in *idiopathicam* transmutatur,
3. In *symptomatisca* interdum tumor inflammatorius insignis exoritur, qui nisi perite tractetur, facile corruptionem, exulcerationem & cariem cum excrefcentiis spongiosis producere potest.
4. *Symptomatisca*, quae per haereditatem inducta est, promptior quidem ad discussionem, quam illa, quae a *nuais* congestionibus dependet, contumacior autem ad malum funditus extirpandum obseruatur.
5. Si tumor in malis oboritur, odontalgiae solutionem indicat.

6. In febribus acutis & malignis odontalgia symptomatica, cum stridore dentium contingens, mortem præſagit.
7. Dantur feminæ quædam, quibus dolor dentium certum graviditatis ſignum præbet.
8. Ceterum quo frequentius congeſtiones verſus hæc loca contingunt, eo facilius dolor fit periodicus, & tandem hic adfectus ad Medic. rum ſcandala tranſit, ita ut patientia magis, quam medicamentis, ſuperetur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Odontalgia idiopathica.*

1. Caries ante omnia eſt removenda, id quod obtinetur
 - a) vel per cauteriſationem, ut dicunt, *actualem* cum clavo ignito;
 - b) Vel *potentialem* cum ſpiritu & oleo vitrioli, ſed minus ſecure, item per oleum caryophyl. cum camphora, per oleum ce. æ, rad. pyrethri, aristoloch. rotund. & long. eſſent. ſuccin.
 - c) Vel pro circumſtantiarum commoda ratione dens plane euellendus eſt, de qua re tabula chirurgica de *carie offium* fuſius dictum eſt,
 - 3) Ad dolores mitigandos exhibeantur ſpecifica ſympathetica & alia e. g.
 - a) Lignum fulmine tactum,
 - b) Lignum traxini in ſolſticio collectum. Dens cauus hoc vel illo ligno fricatur, & lignum poſt ea reponitur.
 - c) Pulvis ſympatheticus, in cuius ſolutionem lignum, denti adfrictum, immittitur.
 - d) Palliative dolorem ſedant narcotica, e. gr. philon. Rom. aqua hypnotica *Dorncrellii*, ſem hyoſcyami cum cera denti impoſitum; quæ omnia tamen non facile in auxilium vocanda ſunt, ob periculum inde metuedum.
 - e) Nitrum, denti immiſſum, egregie temperat.

2. *Symptomatica.*

- 1) Ad orgaſmum ſanguinis contemperandum & dolorum atrociam mitigandam exhibeantur ſingulis circiter

horis pulueres nitroso-temperantes, cum antimonio diaphoretico & cinnabari combinati; quibus sub regimine leniter diapnoico ter vel quater propinatis, dolores plerumque oedunt.

- 2) Quodsi vero cedere recusent, addatur MP. de cynoglossa, & quidem ea proportione, vt gr. i - ij. quælibet dosis contineat.
- 3) Sub horum vsu *externa* non negligantur, e. g. decoctum emolliens e rad. alth. flor. chamomill. rosar. nymphaeæ, papau. cum lacte paratum, & calide intra os sumtum.
- 4) Ad stasin resoluendam & discutiendam subiungantur
 - a) *Interne*: lenia catarrhalia, e. g. essent. succini cum essent. alexipharm. *Stahlii* maritata.
 - b) *Externe camphorata*, e. g. spiritus vini camphorat. gossypio applicatus, emplastr. *Barbette* largiter camphorat. camphora immediate applicata. Item *decoctum* e rad. irid. Florent. aristolochiæ vtriusque, summitat. origan. serpill. flor. sambuc. cum lacte paratum & dentibus sæpe calide adhibitum. Item epithema ex herb. hyssop. flor. chamomill. flor. sambuc. farina secalina, calide genis impositum.
- 5) *Resulsionem* adfluxus promouent
 - a) *Interne* purgantia, pro diuersitate temperamentorum aut caussarum ordinanda, e. g.
 - 1) *Cholericis* & biliosis rhabbarbarum.
 - 2) *Phlegmaticis* argaric. colocynth. mercur. dule.
 - 3) *Sanguineis* ialapp. & fol. fenn.
 - 4) *Melancholicis* helleb. nig.
 - 5) MP. de succin. *Craton.* ad quemlibet facile casum potest determinari.
 - b) *Externe.*
 - 1) *Venæ sectiones*, non facile tamen in $\alpha\chi\mu\tilde{\eta}$ doloris.
 - 2) *Scarificationes*, eæque repetendæ.
 - 3) *Vesicatoria* prope flexuram cubiti in latere adfecto applicata. Est *indæi* cuiusdam experimentum, cuius men-

mentio fit in Actis N. C. Vulgus *allium* huic flexuræ adplicat cum præsentaneo subinde leuamine.

- 4) Apophlegmatizantia stricte sic dicta, e. gr. rad. pyreth. imperat. angelic. herb. tabaci &c. mastica, & per aliquod tempus in ore detenta. Item sem. pedicular. in petia ligatum vino adusto immillum & dolenti denti impositum.
- 6) Tandem etiam *repellentia* in subsidium trahantur e. gr. tinct. iaccæ, quæ subadstringit, & hinc non statim in principio adplicanda est. Sic etiam tinctura odontalgica *Myrsichti* intra os sumta, quæ satis temperata, & egregii effectus obseruatur. Item rad. acaciæ, ceruicariæ, vuulariæ.
- 7) Aluus semper legitime succedat, cum primis si anodyna adhibentur.
- 8) In causâ scorbutica tractatur adfectus, uti scorbutus. *vid. tab. de scorbuto.*
- 9) *Præseruatiue* conducit frequens dentium a sordibus repurgatio & oris collutio.

Adfuetæ venæ sectiones & laxationes non negligendæ sunt.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Sympathetica*, quæ per vulgus in hoc adfectu commendantur, plerumque dubia & incerta sunt, e. gr. *os busonis* ab *Helmontio* commendatum, das mittlere Glied vom vordersten Fuß.
2. Nonnulla etiam plane periculosa existunt, v. g. *dens hominis* phtisi defuncti.
3. *Persicaria Paracelsi* vltterius experimentanda est.
4. *Transplantatio* in arbores e. g. in salices, est quidem satis efficax, probe autem obseruandum est, ne arbor extirpetur: alias enim dolores pari vehementia redeunt. Ad hoc euitandum tales eligere solent arbores, ad quas difficilis hominibus conceditur aditus. Facta operatione vulnus arboris consolidandum est, es muß wieder verwachsen.
5. *Olea destillata empyreumatica*, aliaque acriora, item alu-

men & acetum destillatum, sæpe quidem leuamen adferunt, sed altius dentem erodunt, & in illæfos etiam cariosam putredinem propagant.

6. Præter ea augent quoque *olea destillata sanguinis feruorem*, & in sanguineis adfectus erysipelaceos producant.
7. *Vfus tabaci fumantis* aduersus odontalgiam vulgo quidem commendant, cauendum autem, ne subiectis delicatulis, quæ ab hoc remedio vomitum accipiunt, obtrudatur. Hac enim ratione remedium grauius fit ipso morbo.
8. Ab *opiatis*, quæ doloribus odontalgicis mitigandis plerumque destinantur, abstinendum est, licet dolores adsint acutissimi. Leuamen enim, quod per exiguum tempus adferunt, grauioribus damnis compensant.
9. Quando *emulso* necessaria iudicatur, cauendum est, ne hæc præsentem aliquo tumore fiat, alias grauiora incommoda inducuntur.
10. Quando dens in maxillis inferioribus residet, & per cauterisationem vel actuaalem vel potentialem a carie expurgatus est, cavitata illa expleri potest frustulo quodam plumbeo, ad hoc spatium explendum aprato, & sic dolor non facile recrudescit.
11. Ceterum post cibum adsumptum purgentur dentes puluere quodam dentifricio, e coralliis, silicibus, pumice ad albedinem calcinat. parato. Item myrrha, rad. gentian. irid. Florent. mastich. sang. dracon. quæ a carie præseruant.
12. Aë: humido-frigidus, abusus sacchari & instrumenta metallica excludantur.
13. Ad apophlegmatismum cito valent oleum terebinthinæ, piper & caryophylli, si conuallantur, linteo immittuntur, oleo terebinth. immerguntur, & deinde adplicantur.
14. Quæ vero subiecta calida hæc non tolerant, sal Anglicanum in ore detinere possunt, quod successiuè liquet factum dolores sedat.

TABVLA XXVI.
DE
OTALGIA
ET
RELIQVIS AVRIVM ADFFE-
CTIBVS.

I. DEFINITIO.

Otalgia est dolor aurium acutissimus, a congestione humorum versus hæc loca & subsecuta stasi inflammatoria potissimum exorians, & per consensum vniuersum caput, immo non raro totum corpus adffigens. Deriuatur ab *ὄσσι* auris, & ἀλγέω, dolco.

II. DIFFERENTIA.

1. Otalgia ratione *impetus* est vel
 - 1) *vera*, quæ febriculam & inflammationem habet coniunctam; Vel
 - 2) *notha*, quæ leniore gradu adffigit, atque a febre & inflammatione libera est.
2. Præter *otalgiam* sequentes aurium adfectus adhuc occurrunt
 - 1) *Tinnitus*, qui ex deprauatione auditus in perceptione soni formatur, & cum notabili insuper aurium siccitate coniunctus est.
 - 2) *Susurrus & pulsatio*.
 - 3) *Fluxus* aurium, vbi materia plus minùs vlcerosa per aures excernitur.
 - 4) *Grauitas*, seu defectus auditus & *surditas*.

III. SIGNA.

1. *Otalgia*.
 - 1) Quando ab *inflammatione* prouenit, sentitur dolor in aure lancinans, pulsans, in concauo auris ardens, & fere

intolerabilis, ita vt nonnumquam delirium vel pathemata syncoptica inducat.

- 2) Calor, rubor & interdum tumor satis durus externe retro aures contingit.
- 3) Commotiones febriles in *vera* otalgia accedunt.
- 4) Stasis hæc inflammatoria, quando prioribus diebus non discutitur, abit in suppurationem, a qua fluxus aurium facile initium sumit.
- 5) *notia* otalgia, in qua notabilis inflammatio non adst, per plures hebdomadas adfligere, nihilo tamen minus discuti potest.
- 6) Quando a stagnatione sanguinis vel aliorum humorum exoritur, dolor plerumque acutus, pungens & cerebrans adfligit.
- 7) Reliquorum adfectuum signa per se constat, & ex ipso nomine facile dilucescunt.

IV. *SVBIECTA.*

1. Aurium adfectus eueniunt præcipue *sanguineis* & *sanguineo-phlegmaticis*.
2. Qui ad rheumata & catarrhos proclives sunt.
3. Speciatim quibus *coryza* vel aliæ *evacuationes* sanguinis & feri circa caput familiares antea fuerunt, iam autem ex qualicumque causa emanent.
4. Qui inter *aërem humido-frigidum* diutius versantur.
5. Quibus excretiones in *febre* ob malum regimen fuere impeditæ.
6. Feminae sanguineo-phlegmaticæ post suppressionem vel circa finem mensium otalgia corripitur nonnumquam obferuantur.
7. Viri hæmorrhoidum suppressione laborantes.

V. *CAVSSAE.*

A *Otalgia.*

1. Causa *antecedens* est plethora, cum dyscrasia humorum non raro coniuncta.
2. Causa *propior* est congestio humorum versus caput, hæmorrhagiam narium *eminus* respiciens.

3. Causa

3. *Causſa proxima* eſt inflammatio internæ membranæ meatus auditorii, necum auditorium ſimul adficiens.
4. *Cauſſæ externa, occaſionales & proca:artica* ſunt
 - 1) Lapius rerum modo ſimplicium modo acriorum, rodentium, vellicantium, vermium.
 - 2) Violenta capitis percuffio & vulneratio.
 - 3) Serofarum euacuationum conſuetarum ſuppreſſio.
 - 4) Hæmorrhagiæ naturales ſuppreſſæ, vel artificiales neglectæ.
 - 5) Metatſiſ materiæ febrilis ad aures, ob minus genuinum regimen circa excretionem ſudoris in febris acutis.

B. Tinnitus & ſuſurri.

1. *Cauſſa interna* generalis cum otalgia conſpirat.
2. Sic etiam ſpecialis congeſtio & reſtagnatio humorum verſus hæc loca contingit. Vnde ær, intra tympanum incluſus, ita agitatur, & ſenſum talem moleſtum producit.
3. *Cauſſæ externa & occaſionales.*
 - 1) Cerumen non ſatis expurgatum.
 - 2) Muſcæ & alia inſecta, quæ auribus ſeſe inſinuant.
 - 3) Ebrietas.
 - 4) Ventriculi cruditates.

C. Leſiones auditus ac ſurditatis.

1. Huius cauſſæ cum præcedentibus per omnia etiam conteniunt.
2. Specialiter autem notari adhuc meretur, quod infarctus circa hæc organa ſuſpicione veniat, tranſitum ſoni remorans & adfluxum humorum interne impediens. Dantur enim exempla, quæ capite inclinato & demiſſo poſſunt audire, erecto autem illo ſurda ſunt.
3. Tympani flacceſcentia, vel plane *leſio*, non raro etiam peccat.
4. Quibus auris externa eſt abſciſſa.
5. Qui frequenter a fortioribus ſonitibus perturbantur.
6. Qui abundantia ceruminis indurati laborant. Hoc enim euacuato omnis ſæpe auditus læſio eſt ſublata. Tandem

7. quibus meatus auditorius globulis, tumore vel tuberculo est obstructus.

VI. PROGNOSIS.

1. *Otalgia.*

- 1) *Otalgia* felix discussio raro obtinetur, sed plerumque ad suppurationem tendit, præcipue si tumor ille durus externe retro aurem occurrit.
- 2) Rumpitur hæc stasis inflammatoria potissimum *interius*. Quod si vero *exterius* rumpatur, maioris est momenti: tumor enim sæpius est pertundendus, & nisi efficacia mundificanti adhibeantur, metus est altioris ulcerationis.
- 3) *Otalgia* si neque feliciter discutitur, neque ad maturationem & ruptionem peruenit, cerebrum per consensum facile affligit, febres inflammatorias cum phreniticis quasi symptomatibus inducit, & tandem conuulsionibus accedentibus morte scenam terminat.
- 4) Nonnumquam autem hæc inflammatio per discussionem soluitur: atque a suppuratione libera manet.
- 5) Iuuenes periculosius decumbunt, quam senes: sæpius enim ante septimum diem succumbunt.
- 6) *Otalgia* grauitatem auditus non raro relinquit; præcipue quando suppuratio contingit.

2. *Susurri & hebetudinis.*

- 1) Hi adfectus expertes quidem sunt periculû, in tempore tamen illis occurrendum est, ne auditus læsiones, vel alia grauia incommoda succedant. Nam
- 2) si frequentius reuertuntur, cephalalgias, vertigines & in senioribus apoplexiam quandoque minantur.
- 3) Interdum etiam auditus læsionem post se trahunt.
- 4) Qui vero ab *externis* causis originem ducunt, illi his remotis facile tolluntur.

3. *Tinnitus.*

Vili quidem non est pependus hic adfectus, præcipue si nimis sæpe contingit, illas autem non inuoluit considerationes, quæ per vulgus de illo circumferuntur,

4. Fluxus aurium.

- 1) Læsionem auditus facile inducit.
- 2) Quo magis in consuetudinem degenerat, eo difficilius medicationi cedit, & adfectus per illum inducti ægrius remouentur.

5. Læsionis auditus.

- 1) Hæc quo magis radices egit, eo difficilius in integrum restituitur.
- 2) In iunioribus quidem ætate spes adhuc superest; in annosis autem, quibus virium energia deest, vix aliquid constantis sperare licet.
- 3) Multo minus, si læsio *tympani* vel aliorum organorum peccat.
- 4) Qui surdi nati sunt, rarissime curantur.
- 5) Surditas iuxta *Etmullerum* in acutis cum vrina quidem *cruda* delirium portendit; cum vrina autem *cocta* hæmorrhagiam criticam promittit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Otalgia.

- 1) Staleos inflammatoriæ *discussio* ante omnia est tentanda.
 - a) *Interne*: per essent. alexipharmac. *Stablii* cum essent. succinl, vel spiritu tartari mixtam, interpositis nitrosis & absorbentibus, cinnabarinis, antimonialibus fixis e. g.
 Mane propinetur mixtura ex essent. alexipharmac. succinl. ad gutt. XXX. Per diem autem pulueres nitroso temperantes, quibus pro moderamine doloris versus somnum gr. I. M. P. de cynoglossa immisceatur.
 - b) *Externe* per camphorata: nam nihil præsentius impedit suppurationem, quam camphora. Conuenit autem adplicare spiritum vim camphoratum, gossypio in aurem immittendum, vel epithema neruinum erad. irid. Florent. aristol. long. cyperi, herb. puleg. menth. flor. chamom. Roman. ferpill. semin. carminatiu. cum camphora.

2) *Ad-*

- 2) *Affluxus humorum ad caput simul reuellatur.*
- a) *Interne per laxationes, easque repetendas; in quem finem M. P. de succino Cratonis cum paucis granis resin. ialapp. mixta, laudatur, item infusa per episcrasin.*
 - b) *Externe per pediluua, frictions, hirudines ad hæmorrhoidalialia loca adplicatas, in iis, quibus suppressæ sunt hæmorrhoides; vel si necessitas exigit, venæ sectio.*
- 3) *Quam primum inflammatio & dolores paullulum remittunt, externe etiam locum habet adplicatio salis volatilis sicci cum castoreo, gossypio instituenda.*
- 4) *Vbi autem discussio non amplius est speranda, ibi suppurationi promoueatur per emollientia & maturantia. Huc faciunt*
- a) *Emplastra de melilot. camphor. de spermat. ceti, diaphoretic. Atysichti.*
 - b) *Cataplasmata vel forus ex rad. alth. herb. malu. chamom. branc. vrsin. flor. melilor. chamom. semin. psyll. fœnugræc. lini. ficubus, croco.*
- 5) *Deinde ad apostematis ruptionem adhibeantur vel emplastr. mellitum, vel succus cepearum frixatarum cum melle subactus, vel manus chirurgica.*
- 6) *Denique ad apostematis abstersionem & mundificationem adplicentur balsamica e. g. hæc mixtura,*
- Recip. essent. succin. drachm. III.
myrrh. drachm. II
spirit. terebinth. scrup. I. M.
- Item succus absinth. cyclam. marrub. alb. cum melle.*
2. *Susurri & fluxus aurium.*
- 1) *Primo loco adhibeantur laxantia e gummi-resinis, e. g. amoniac. galban. extract. panchymagog. Crollii, MP. de succino Cratonis, mercur. dulc. trochiscor. alhandal. &c.*
 - 2) *Deinde propinentur discutientia succinata, e. gr. essent succin. cum essent. alexipharmac. Stahlî remixta, ter per diem ad gutt. XXX. exhibenda,*

- 3) Cum his iungantur etiam *externa*, quæ decubitus ver-
sus caput discutunt & deriuant, ac laxitatem partium
roborant. Faciunt hoc
- a) Mixture balsamica, modo descripta, ex essent. succin.
myrrh. & spirit. terebinth. Loco spiritus terebinth.
sumi etiam potest oleum succini, sed paucis tan-
tum guttulis.
 - b) *Forestus* ambrae & moschum in aurem cum effectu
ingessit.
 - c) *Salia volatilia* vrinosa cum castoreo vel camphora gos-
sypio adplicata.
 - d) Conducunt etiam *suffimigia* e. gr. ex storace calamit.
mastich. ture, carbonibus iniiciendo, & vaporem ope
infundibuli auribus excipiendo.
 - e) Porro laudantur olea carminatiua, e. g. anisi, fœnicul.
chamomillæ, item etiam balsam. Indicum.
 - f) Pediluua ad reuellendum.

3. *Tinnitus.*

- 1) Quia in *tinnitu* notabilis aurium siccitas & calor circa ca-
put frequenter concurrit, *humectantia* non tantum par-
ticularia, verum & quam maxime etiam vniuersalia
commendantur.
- a) Pro humectatione *vniuersali* adhibeatur sufficiens &
dilutus potus, item herba veronicæ teucrii folio, vel
alia conueniens, in forma thée vsurpanda.
 - b) Pro *particulari* externa humectatione laudantur: o-
leum amygdal. amar. ouorum, ceræ; item decocta
neruina, e. g. ex florib. lauendul. spic. nard. &c.
cum vino vel lacte humano parata, & vapors for-
ma admissa. Denique etiam emulsionem cum cam-
phora.
- 2) Hisce humectantibus iungantur *deriuantia*.
- a) *Interne*: laxantia superius aliquoties iam nominata,
quibus helleborus niger præcipue adhuc adnumera-
tur.
 - b) *Externe* pediluua, & locolaxantium, interne su-
mendorum, clysteres interdum possunt adplicari.

3) Quo magis vrget hic adfectus, & in consuetudinem degenerauit, eo magis venæ sectio in pede necessaria est; quod etiam de *supurro* obseruandum.

4. *Grauitatis auditus*, siue *surditatis*.

1) Hic eadem methodus & remedia, quæ ad *supurro* superius commendata sunt, adhibeantur, & diu continentur.

2) Speciatim magis hic necessaria erit *massa* illa *Stahliana*, auribus adplicanda, nempe sal quoddam volatile cum castoreo maritatum, e. g.

Recip. sal. volatil. sicc. C. C. scrup. I.

Castor. medull. electiss. gr. V. VI.

M. f. *massa*, de qua ciceris magnitudo gossypio involuta versus somnum auri immittatur.

3) In sanguinico-phlegmaticis, minus sensibilibus, vnica guttula de oleo succini addatur; quo casu etiam hæc formula adhiberi potest.

Recip. essent. succin. scrup. IV.

Olei chamomill. destillat. scrup. semis.

Olei succin. gutt. I. Misc.

4) *Cerumen*, vbi peccat, per humectantia, modo non spirituosâ, beneficio syringæ iniecta, prius emolliatur, & deinde euacuetur.

B. *Extraparoxysmum*.

1. Quoniam *plethora* in hisce adfectibus tamquam causa antecedens consideranda est, illius per venæ sectionem in pede æquinoctialem imminutio ad præseruandum quam maxime commendatur.

2. Quando malum a *suppressis* hæmorrhagiis, e. g. narium; mensium, hæmorrhoidum, originem sumsit, restitutionem horum fluxuum per methodum, suo loco commendatam, conuenit respicere.

3. Ad congestiones humorum versus caput præoccupandas & reuelliendas commendantur

1) *Interne*: lenia purgantia, quæ quater circiter per annum repetenda sunt e. gr. extract. panchymagog. *Crollii* M. P.

de

de succino *Cratonis*, addito stimulo per resin. ialapp. trochisc. alhandal.

2) *Externe pediluua, & frictions.*

4. His iungantur, quæ æqualem humorum discussionem promouent, e. g. mixtura polychresta tonico-neruina *Stahlii*, item essent. succin. cum essent. pimpinell. alb. vel cum essent. alexipharmac. *Stahlii* remixta. Horum autem usus non debet esse continuus, sed laxantibus præmissis per octo circiter dies subiunctus.

VIII. CAUSELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Olea* destillata, nisi largiter diluta sint, nimium suscitant ardorem, immo in vehemente otalgia ad phrenesiam aliquando disponunt.
2. Speciatim *oleum succini* nimis feruidum est, hinc in copia nullo modo adhiberi debet; cum aliis autem parcius mixtum roborandi efficaciam habet non contemnendam.
3. *Olea destillata graueolenta*, e. gr. lauiendul. maioran. foenicul. anethi non nude, sed cum essent. succini conuenienter mixta, in his calibus usum suum exhibent; & quidem præ reliquis oleum chamomill. laudem meretur.
4. *Essentia succini*, quoties in his & aliis affectibus externe vsurpatur, non debet esse alcalifata, sed spiritu vini rectificatissimo simpliciter præparata.
5. Si inflammatio suppurascens rumpitur, cauendum est, ne *olea cocta* nimium vsurpentur, quia inferre hac ratione possent surditatem. Quod si vero infaustus eiusmodi effectus iam productus esset, securissima & efficacissima essentia *succini* habetur.
6. In *grammate auditus*, in qua nulla organi debilitas, sed materia tantum catarrhalis ad caput redundans reperitur, sola sæpius purgantia, mediocriter fortiora, negotium exhauriunt; in quo casu helleborus niger largius eum reliquis combinandus est.
7. Si in *sternitu* ardentes capitis dolores, immo erysipelacei affectus, ut sæpius fit, circa hanc regionem occurrunt, vsus habet vapor decocti *sabine*, auribus admissus: ca-

- vendo, ne in tinnitu calida neruina & exsiccantia adhibeantur.
8. *Vesicatoria* impetum doloris quidem placant, & humores reuellunt, non raro autem illorum vsum pruritus & fluxus aurium sequitur; vnde non temere adplicanda sunt. Quando autem, necessitate vrgente, in subsidium vocantur, discutientia statim debent coniungi.
 9. Quod de *venasectiõibus* magis præseruando, quam curando instituendis, *precedentibus tabulis* sæpe iam monuimus, illud etiam in *otalgia* obseruandum est; in reliquis autem tribus adfectibus, in quibus status paroxyszans & acutus non obseruatur, nullam adeo inuoluit considerationem.
 10. *Fonticuli* in læsione auditus non ita facile in auxilium vocandi sunt; in statu autem seniorum surdastro adplicatio illorum fere necessaria videtur, quia serum ibi abundat, & reliqua subsidia minus efficacia reperiuntur.
 11. In grauitate auditus a *metastasi* materiæ febrilis, vel alia congestione exorta, vulgus vititur *rina leporis*, calide instillata; item *pane cum aromatibus* nostratibus subacto, & cocto, quem dissectum & spiritu vini conspersum calide adplicat.
 12. In *otalgia*, quando tumor simul in faucibus occurrit, locum habent gargarismata ex subadstringentibus, abstergentibus, temperantibus nitrosis & albo græco, cuius peculiaris est efficacia, parata. Hoc nomine conducunt rad. bistort. herb. auric. muris, saluix, hyssop. (quæ vel sola stases sanguinis facis potenter resoluit) flor. chamomill. melilot.
 13. Absint ab aurium adfectibus *cataplasmata*, licet ex discutientibus speciebus parata, præsertim vbi tumor iam diudurauit: nam humida relaxant, & ita stasin augent. Saltim vino cocta sint, si omnino illa in vsum vocare placeat.
 14. *Sulphuris* vsus in læsione auditus, cum manatione materiæ tenuioris stipata, ad modum prouide admittendus est,

est, corpore nempe bene mundato, ne vlcerosum quidquam in teneris partibus ad interiora pellatur, & grauia paralytodea, aut ap. plectica mala producantur.

15. Senes, auditus grauitate laborantes, auxilium interdum impetrant a repetitis euacuationibus iusto tempore institutis, & temperatis discutientibus subiunctis.

TABVLA XXVII.

DE

VERTIGINE.

I. DEFINITIO. *Riedel's*

Vertigo est perturbatio phantasie seu imaginationis, quæ rotationem modo in ipsis ægris, modo in obiectis externis inuoluit, & a causis siue physicis, siue moralibus, siue exvtrisque mixtis originem ducit.

II. DIFFERENTIA.

1. Vertiginem quando in *sanguineam* & *phlegmaticam* diuidunt, differentiam potius subiectorum & temperamentorum, quam causarum putant.
2. Ratione autem causarum vertigo est
 - 1) vel *idiopathica*, quæ plerumque a plethora, eaque commota, rarius a sanguinis depletionem dependet:
 - 2) vel *symptomatica*, vbi vitium primarum viarum potissimum accusandum est.
3. Vertigo tres habet gradus.
 - 1) *Mitior* simplicem tantum *rotationem* oculis offert, id est, obiecta quæuis turbine quasi continuo repræsentat.
 - 2) *Elatior* est, qui obiecta oculis *nigra* & *tenebricosa* per gyrum mentitur. Græce dicitur *scotodinia*, a *σκότος*, tenebræ & *δίννα* aquarum vortex.
 - 3) *Summus* gradus graue illud symptoma addit, vt ægri in

terram procidere cogantur. Vnde vertigo *caduca* appellatur.

4. Ratione *durationis*.

- 1) Alia est quasi *continua*, per plures nempe dies, immo hebdomadas, adfligens, nec citra medicationem facile cedens. Huc referri potest vertigo *habitualis*.
- 2) Alia est *periodica*, quæ certis anni temporibus recurrit, & quia ultra consuetas horas & dies non adfligit, *temporaria* quoque vocatur.

III. *SIGNA*.

Hæc differentiæ graduum partim, partim e sequentibus patefcunt.

1. In causa *sanguinea* præceps sæpe & transitoria visus obnubilatio oritur; concurrente aurium susurru & obiectorum externorum gyratione.
2. Hoc quidem præcipue contingit, quando caput terram versus inclinatum erigere ægri intendunt; dantur autem, quibus sine capitis inclinatione hæc contingere solent.
3. Conspirant vasorum capitis inflationes & rubor faciei; nisi quidem a nimia sanguinis depletione vertigo orta fuerit.
4. In non nullis concurrunt punctiones quasi per transuersum caput adfligentes.
5. Hæc oculorum obnubilatio & reliqua symptomata in aliquibus ita inualescunt, vt pedes officii sui immemores vacillent, ægrique in terram prolabantur. Actum quidem apud plerosque vertigo facile transit. Qua de causa sedentibus iam aut decumbentibus nil harum molestarum euenire solet.
6. In illa autem vertigine, quæ e vitio *primarum viarum* per consensum provenit, insignes circa ventriculum alterationes obseruantur, nausea scilicet instante prandii hora, pathemata cardialgica & flatulenta.

IV. *SUBIECTA*.

Vertigini præaliis obnoxii sunt

1. Homines plethorici, de plena dixta gaudentes & a laboribus corporis alieni.

2. Litterati, qui phantasmam & memoriam nimium fatigant, cum primis, quando studia anxio quodam desiderio tractant.
3. Qui sunt temperamenti sanguineo-melancholici.
4. Seniores præ iunioribus.
5. Quibus euacuationes sanguinis naturales rite & sufficienter antea successerunt, iam vero quacumque de causa suppressæ sunt, aut parcius fluunt.
6. Qui euacuationes artificiales, tam sanguineas, e.c. venæ sectiones, scarificationes, hirudinum applicationem: quam ferofas, ut sunt sudores nocturni, & laxationes antea consuetas neglexerunt.
7. Qui hæmorrhagias narium, & hæmorrhoides nimias passi sunt: nec non feminæ hystericæ, quarum vires fluxus diuturnior exhaust.
8. Quibus vires per morbos admodum attritæ sunt. Raro enim æger a grauiori morbo restitutus, sine vertiginis molestia per hypocausta primis diebus, ambulare potest.
9. Qui tabaci fumo præter consuetudinem assuescere fatigunt.
10. Quiaiorum sermones aut querelas nimis diu & attente audiunt, animi vires eo ipso intendunt, & præmeditate respondent.
11. Qui olim in capite grauiter læsi sunt.
12. Qui cibum aliquando solito largius, præcipue post ieiunium infuetum adsumunt.
13. In primis *caco stomachi*: alii quidem ventriculo vacuo, alii autem, quando cibum vel potum sumserunt.

V. CAUSSAE.

1. In eruenda causa vertiginis multi quidem ingenii sui vires exercuerunt, neque tamen rem ita confecerunt, ac si aliis, in perscrutanda & explicanda vera vertiginis causa, nihil remanisset negotii.
2. Veterum opiniones, de *spiritibus flatuosis*; humoribus a calore in vapores resolutis; de *ataxia* & *distortis spirituum animalium viis*, de *descensu spiritus animalis ad oculum*, & *motu ante humorem crystallinum quasi saltatorio*; eo minus hic erunt at-

tendendæ, quo certius est, eas omnes infirmo niti fundamento, ac ne veri quidem habere similitudinem.

3. Longe feliciores hac in re fuerunt recentiores, qui plethoram & specialem sanguinis versus caput directionem, causam vertiginis esse tradiderunt, minime tamen omne negotium exhausserunt: cum vertigine affici videamus tales, qui minus plethorici, sed humoribus potius valde exhausti sunt. Cuius phænomeni ratio neutiquam reddi potest, nisi in subsidium vocetur tamquam hypothesi, illa sententia, quæ non ita pridem in Actis medicorum Berolinensium cum publico communicata est; quod *nerui* nimirum non *ex cerebro* sed meningibus suum trahant ortum. Nam cerebri ac medullæ spinalis substantia mollis ac humida ex sua natura ad aliquam tensionem inepta est: meningibus vero & nerui tamquam corpora duriora, sunt motus tonici perquam capaces. Quando enim e cerebro egrediuntur, formato prius ganglio, medullaris substantiæ amittunt consistentiam, ac in progressu firmi fiunt & duri, meningibus circumuestiti, ut functiones illas, quibus, tamquam sensus & motus instrumenta, dicati sunt, apte subire possint. Bene ergo suo iam tempore iudicauit *Iul. Cas. Claudinus*, scribens: *cerebrum sentit non ratione sui, sed ratione membranarum quibus inuoluitur. Ut dissensum*, qui inter principes anatomicos de *neruor. origine*, viget, nunc non attingamus. Huius sententiæ vberiore evolutionem vide in *dissertatione nostra, de vertigine*. Quibus præmissis ad ipsas tandem accedimus causas vertiginis & quidem

- 1) *idiopathica illius, ubi sanguinis urget abundantia.*
- a) *Causa materialis* antecedens remota plethora est, cum spissitudine sæpius coniuncta.
 - b) *Causa propior* est congestio sanguinis versus caput.
 - c) *Causa proxima & immediata* est infarctus seu stagnatio sanguinis, valvæ capitis moleste distendens.
 - d) *Causa instrumentalis* sunt ipsæ meningibus & inde exorientes nerui.

e) *Causſa formalis*

1. est tremulus neruorum motus, qui a ſpaſtico meningum reniſu exoritur. Wenn man an den Stamm ſchlägt, ſo zittern die Nefte. Sic etiam reniſus ille & tonico ſpaſtica coarctatio, in meningibus ſuſcepta, neruos tamquam ramuſculos e meningibus ortos, & in his neruum præcipue opticum in tremulum concitat motum, qui tunicis atque humoribus oculorum communicatus talem efficere poteſt motum, vt imago ſubiecti per gyrum moueri videatur, in primis cum obiecta in ſtatu vertiginis numquam in linea recta ſe repræſentare ſciamus.
2. Interea hoc formale mechanicum non ſimpliciter vt mechanicum, ſed ordinatum organicum conſideramus, & pro cauſſa efficiente horum motuum principium quoddam ſapiens & dirigens agnoſcimus; videlicet ipſa natura per hunc reniſum ſpaſticum humorum ſtaſin & moleſtam vaſorum diſtentionem auertere intendit.

2) *Idiopathica, ubi ſanguinis manifeſta eſt depletio vel defectus.*

- a) Humorū depletio & conſumptio fit vel per hæmorrhagias
 1. *naturales* e. g. per nares, pulmones, ventriculum, renes, hæmorrhoides, menſes, lochia, abortus.
 2. *artificiales*, per prodigam venæ ſectionem, quo etiam violentæ læſiones præcipue ſpectant.
 3. vel per ſanguinis in ſerum reſolutiones; quis enim nescit corporis per grauiores morbos conſumptionem?
- b) *Cauſſam instrumentalem & formalem* itidem hic agnoſcimus motum meningum & neruorum tremulum.
- c) Sic etiam *cauſſa efficiens* eadem hic conſideranda eſt. Iuſtiſſimam enim natura habet cauſſam, vt humoribus amillis, & motu tonico deficiente. per eiusmodi contractionem meningum, vaſorum collapsum præpedire & æqualem tonum reſtaurare nitatur.

d) *Causse occasionales.*

1. Refrigeratio pedum corpore calente.
2. Abusus vini & spirituosorum.
3. Commoratio ad mustum fermentans.
4. Halitus carbonum ardentium.
5. Odor suaueolentium in subiectis sensibilibus.
6. Motus gyratorius, in ducendis choreis.
7. Prospectus in præcipitia.
8. Adspectus rerum per gyrum motarum, aquarum vorticifarum.
9. Sessio in anteriori currus parte, wenn man rückwärts sitzend gefahren wird.
10. Strepitus fortior, vel instrumentis musicis, vel vociferationibus excitatus.
11. Commoratio in aura libera, in subiectis ultimæ sensibilitatis.
12. Sanguinis circa vasa venæ portæ impeditior circulatio, quæ occasionalis ratio certo sensu etiam ad symptomaticam referri potest. Quæ porro ad causas occasionales referendæ essent, opportune supra indicauimus in designatione subiectorum, quæ vertigini præcipue sunt obnoxia.

3) *Symptomaticæ.*

Huius causse sunt

- a) Cruditas primarum viarum, a concoctionis vitio inducta.
- b) Rigida partium membranifarum distensio circa ventriculum a flatibus incarceratis.
- c) Connexio & consensus capitis cum ventriculo, qui ob par octauum perquam notabilis est.
- d) Quamuis autem vertiginis causam in certis quibusdam materiis posuerimus e. g. in sanguinis abundantia, defectu, spissitudine circa venam portæ, & vitiis primarum viarum: docet tamen experientia, dari nonnumquam vertiginem sine causis hisce materialibus, vbi in

mo-

moralibus rationibus vnice est acquiescendum, præcipue autem in consuetudine & sensibilitate.

VI. PROGNOSIS.

1. Vertigo *symptomatica* a stomachi vitio proueniens, crebrius quidem occurrit, quam idiopathica, hæc tamen longe periculosior est illa.
2. Imperitiæ indicium est, quibuslibet vertiginosis, sine discrimine ætatis, apoplexiæ insecuturæ prognosin formare: iunioribus enim triginta annos nondum egressis, a *periculosa* quoque vertiginis specie nulla imminet apoplexia: nisi vita simul nimis sedentaria aut ingentes animi commotiones accedant.
3. His potius *valde plethoricis*, ex inualescente vertigine facilius conuulsiones exoriuntur: iidem etiam si subito & eum vehementia corripiantur vertiginosi, in epilepsiam plane incidere possunt.
4. Quo magis cephalalgia cum vertigine in senioribus complicata est, eo facilius febres inflammatoriæ, vel affectus arthritico - spastici in superioribus partibus; vel apoplexia sanguinea accidere possunt.
5. Symptomatica vertigo cum sensibili flatulentia, nausea & cardialgia coniuncta, maxime si tempore instantis cibi assumendi contingat, nullum quidem portendit periculum; senioribus tamen, progrediente tempore, causa occasionalis fieri potest adparatum apoplecticorum.
6. Vertigo consensualis hypochondriacorum aut hysteriarum, quarum menses iamdum cessarunt, fit ob defectum sufficientis motus, ab his subiectis non facile obtinendi, plerumque habitualis & difficile curabilis.
7. Vertigo solis topicis non curatur: facilius contra euanescit post hæmorrhagiam narium, hæmorrhoidum & menium eruptionem sufficientem, nec non repetitas venæ sectiones.
8. Vertiginosi plethorici, hæmophobi, si venæ sectionem pertinaciter auersantur, ob hoc morale impedimentum curari vix possunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

Vertigo, etiam idiopathica dicta, est tantum symptoma alterius affectus, quo sublato etiam ipsa cessat: vnde ventilatio sanguinis & euacuatio ventriculi vniuersum fere negotium absoluit.

1. In vertigine idiopathica, ubi sanguinis vrget abundantia,
 - a) exhibeantur primo loco blandiora laxantia ad reuclendos humores versus caput congestos. In hunc finem egregie conducunt
 1. Helleborina: nempe extractum hellebori nigri cum aliis conuenientibus mixtum, vel essentia illius methodo Stahlina parata.
 2. Gummi-resinæ: e. g. gummi ammoniacum cum aceto squillitico solutum.
 3. Extractum panchymagogum *Crollii*.
 4. MP. de succino *Cratonis*.
 - b) Quæ laxantia in progressu medicationis, si opus est, subinde repetantur, & alius quouis modo laxa seruetur.
 - c) Post laxationem pediluua conueniunt, quæ aliquoties repeti debent.
 - d) Subiungatur deinde venæ sectio in pede, quæ iteratis vicibus celebranda est, cum consueta æquinoctialis vel altera hic neutiquam sufficiat, vt nuper demonstrauit *Doctiss. D. Dan. Abrab. Hancke* in peculiari scripto, quod tamquam appendicem dissertationis inauguralis, de frequente venæ sectione in regionibus frigidis, germanice edidit Hafniæ 1732.
 - e) Interponantur nitrosa temperantia & cinnabarina.
 - f) Et simul in subsidium vocentur *externa* ad discussionem infarctus promouendam. In hunc finem laudantur
 1. Camphorata: e. g. spiritus vini camphoratus vertici & temporibus applicatus.
 2. Salia volatilia, odore adhibita, quæ blandam stricturem

cturam partibus membranosis inducunt, atque hac ratione discussionem promouent.

3. Ad reuulsionem conducunt frictions pedum cum sale & aceto; item ligaturæ partium extremarum.
 - g) Denique *tonica* subiungantur, ad partes affectas iterum roborandas, c. g. MR. polychresta tonico neruina *Stahlii*.
 - h) Diætā tenuis & eupepta; potus dilutus & temperatus.
 - i) Quæ vertigini velificare vllō modo possent, caueantur.
 - k) Affectus animi, sanitatis turbatores, coërceantur & remedia commendata superius, prout postulat necessitas, subinde repetantur.
2. *In vertigine idiopathica, vbi manifesta est depletio seu sanguinis defectus,*
- a) Propinentur bene nutriētia, gelatinosa, euchyala; interpositis analepticis temperatis.
 - b) Partium tonum restituētia.
 - c) Animus a curis & intensis meditationibus liber sit.
 - d) Ab ira, metu, solitudine æger abstineat, & quidquid animi ægritudine clam adficere potest, serio vitet.
3. *Vbi sola subest moralis causa seu falsa æstimatio, quæ opinionis errore facile sibi pericula fingere adeoque causam vertiginis constituere vnice potest, ibi æstimationem corrigentibus opus est:*
- a) habitus nempe contrarius inducendus.
 - b) obiecta hætenus reformidata sæpius vsurpanda oculis.
 - c) Occasiones, quæ alias ad vertiginem leui opera dispoſuerunt, crebro arripiendæ, vt iis adfueri vertiginosi aliter sentire discant, omnisque metus, qui turbæ imaginationis origo est, penitus euauescat.
4. *In vertigine symptomatica*
- a) Corrigantur cruditates primarum viarum per salia digestiua.

- b) preparata & correcta expurgentur
1. per vomitum, vbi nihil contra indicat, e. gr. Recipe tart. emet. gr. iij. tart. vitriolat. gr. X. misce.
 2. vel per laxationes eum epicrasi.
- c) deinde versus tempus ciborum assumendorum propinentur *stomachica* & intestinorum tonum roborantia. Commendantur in hanc finem
1. pulvis stomachicus Birckmanni & Quercetani.
 2. acorus, zingiber & condit.
 3. essentia cortic. aurantium.
 4. essentia absinthii composita cum TR. vitrioli maris Lud. maritata.
 5. essentia carminatiua amara e rad. ari, gentianæ rub. imperatorix, zedoariæ, herb. tanaceti, cent. min. parata.
 6. diata moderate aromatica & vinosa.
 7. præcipue etiam semen sinapi & coriandri aceto correctum, mane sumenda laudantur, quia fermentationi stomachi egregie succurrunt.

B. Extra paroxysmum.

- 1) *In vertigine idiopathica*
 - a) *plethora imminuatur*
 1. per venæ sectiones, non æquinoctiales solum, sed extra hos terminos sæpius eiterandas.
 2. per reuocationem suppressarum hæmorrhagiarum.
 3. per blandas laxationes.
 - b) nimia memoriæ fatigatio præcaueatur, motus autem voluntarius continetur; idque tanto magis, si ob hæmophobiam ægrotantes renuant venæ sectionem.
 - c) transpiratio quouis modo promoueatur.
- 2) *In vertigine symptomatica*
Qualitas sanguinis spissior corrigatur, per infusa ex herbis antiscorbuticis & radicibus alexipharmacodiureticis, cum laxantibus, præcipue helleboro nigro coniunctis; quibus salium digestiuorum
 conti-

continuatio accedat. Pedes ceterum recti & blando calore semper foueantur.

VIII. CAUSE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Vbi grauius malum metuendum est, non permittit tempus methodum *tardiores*, supra indicatam, obseruare, sed illo casu *chysma* stimulare exhibere, & statim deinde venæ sectionem in pede instituere.
2. Si flatulenta ventriculi distensio subsit, a vomitu abstrahendum est: facile enim flatulentia anoterica habitualis inducitur, & anxietates augentur.
3. Conuenit potius in tali casu materiam digerere, mobilem reddere & per laxantia euacuare. Ad materiam digerendam, præter salia digestiua, adhuc commendantur: rad. enulæ, irid. florent. aristoloch. long. raphani, herbæ amaræ, & incidentes, e. g. absinth. cent. min. & antiscorbuticæ, item gummata.
4. Formulæ *pilularum* in subiectis melancholicis non adeo commode operantur, præstat igitur *liquidus* in illis adhibere.
5. *Gummi ammoniacum* cum aceto squillitico solutum, ingrati quidem saporis, sed egregiæ virtutis est, ad sordes primarum viarum abstergendas.
6. Venæ sectio, si alio nondum aperta instituitur, præposterum edit effectum, nempe congestionem *particularem* facile in commotionem *uniuersalem* transmutat, id est, cephalalgia vertiginosa in febrem traducitur.
7. *Cucupha* in speciebus ita dictis cephalico-neruinis odoratio-ribus, quæ ad vertiginem arcendam, & ad memoriam confortandam vulgo solent applicari, plus perturbatio- nis, maxime plethoricis, adferunt, quam leuaminis exoptati.
8. In phlegmaticis autem frigidis vsui esse possunt, sed discretio vertiginis idiopathicæ a symptomatica valde necessaria est: in hunc finem conducunt rad. irid. florent. bryon. cyper. rotund. herb. hyssop. summitat. serpilli, sem. foenic. carv. camph.

9. Caute etiam adhibenda sunt aromatica, odorifera, balsamica, volatilia, ne per vsum illorum malum potius augeatur, quam minuatur.
10. Pediluua sub methodo laudauimus, magis tamen vsum habent, vbi vertigo e redundancia sanguinis versus caput contingit, quam in caussis vitii primarum viarum.
11. Cum vertigine conspirat familiariter memoriae debilitas, cui autem simul occurritur, si vertigo per methodum commendatam remouetur.
12. Ceterum quia nemo facile sanus *anxie* vomit, quin simul vertigine quadam corripitur, hæ circumstantiæ nullo modo cum genuinis vertiginolis affectibus confundendæ sunt.

TABVLA XXVIII.

DE

CORYZA, GRAVEDINE

ET

PHLEGMATORRHAGIA.

I. DEFINITIO.

1. *Coryza* est adfectus catarrhalis, qui excretionem seroso-mucida modo benigniore, modo aciore, per nares & sæpius etiam per fauces sese manifestans plerumque cum sternutatione coniunctus est, & a compressoria restrictione humorum versus caput maximam partem originem ducit. Deriuatur a *κορυζάω*, grauedine laboro.
2. *Grauedo*, secundum receptam distinctionem, est adfectus itidem catarrhalis, qui nulla quidem perruptione materiae serosæ, maiore autem illius congestione & stagnatione ad nares & partes vicinas manifestus, atque hinc maioribus etiam incommodis stipatus est.

3. *Phleg-*

3. *Phlegmatorrhagia* est verus continuus fluxus seu stillicidium limpidi phlegmatis e naribus, qui itidem a congestione humorum versus caput, haemorrhagiam narium respiciente, originem ducit.

H. DIFFERENTIA

1. Catarrhorum praecipuae species sunt coryza, grauedo, phlegmatorrhagia, raucedo, tussis & catarrhus suffocatiuus. De coryza, grauedine & phlegmatorrhagia haec, de reliquis autem speciebus aliis tabulis agemus.
2. Vulgus quidem aliam adhuc speciem adcurat, nempe catarrhi lapsus in stomachum, es sey ihnen ein Fluß in den Magen gefallen; est autem consensualis tantum molestia, a faucium catarrhali incommodo, seu veteribus dicto *brancho*, circa orificium oesophagi & ductum illius vna eueniens.
3. Liceat hic paucis indicare differentiam *catarrhi a rheumate*, ad evitandam vulgarem confusionem.
 - a) Rheuma plus sanguinis stricte dicti inuoluit, quam catarrhus, qui seroso-mucidae magis est crassos.
 - b) Rheuma febriculam qualemcumque semper habet comitem, quae tanto fortior & acrior est, quanto plus sanguinea substantia altius ad partes seriferas diffunditur, cui congestioni rheumaticae aliquando otalgia cum vel sine parotidum dura inflatione supernenit; catarrhus autem simplex nulla febre stipatus est, sed tum demum eandem habet eornitem, quando sanguineae portiones his stasibus accedunt, & corruptionis periculum minantur. *conf. tab. de febre catarrhali benigna.*
 - c) Rheuma ad exitum non peruenit, sed dolore premente, tendente, immo interdum lancinante ac fremebundo percellit; in catarrho autem materia seroso-mucida excernitur. *conf. etiam differentia tab. de rheumatismo.*
4. *Coryza*, est vel *recens* & *transitoria*, vel *habitualis*.
5. Vel *vaga*, vel *periodica*, circa certa anni tempora eueniens.
6. Differentia *coryzae, grauedinis* & *phlegmatorrhagiae* ex definitionibus elucescit.

III. SIGNA.

1. *Coryza.*

- 1) Præcedunt pruritus & sternutationes, quæ, ut hanc humiditatem immobiliorē reddant fluidam, inseruiunt.
- 2) Concurrunt corpora animi, somnolentia sensuum externorum, nempe gustus, visus, auditus & olfactus qualiscumque hebetior conditio.
- 3) Interdum ipsa grauedo coryzæ prodromus est.
- 4) Subsequitur excretio materiæ seroso-mucidæ, per nares, fauces, & subinde etiam per oculos.
- 5) Quo tenuior & acrior est hæc catarrhalis materia, eo magis adficit illa loca, per quæ excernitur, ita ut sæpius leviter illa arrodantur, & ardoris sensu infestentur.
- 6) Alius ordinariè est clausa, vrina pauca & sudor suppressus.
- 7) Aliquando tussis cum rauedine coniuncta est, præ primis si magna quantitas materiæ serosæ acris ad fauces pellitur.

2. *Grauedinis.*

- 1) Temulenta & adgrauans capitis afflictio.
- 2) Dolores prementes, tendentes, frementes, immo pungentes & vrentes, a summitate quasi capitis, quam occupant, ad occiput, & in primis ad ipsos vsque processus mastoideos se se extendentes.
- 3) Vasa notabiliter turgent.
- 4) Concurrit sitis cum oris siccitate.
- 5) Somnus est inquietus.
- 6) Pectus etiam in consensum trahitur, & oppletione quadam grauante occupatur.
- 7) Grauedo, quæ diutius durat, non solum sensibus externis, quod familiare est, verum etiam adpetitui incommoda quædam adfert.
- 8) Non nulli, si intensior est adfectus, modo horrores, modo æstus vagos, præsertim aère frigido-humido, persentiscunt.

3. *Phlegmasorrhagia.*

1) Præ-

- 1) Præcedunt congestiones ad caput, molestæ per sensum oppletionis, grauitatis & pressiois.
- 2) Succedit stillicidium limpidi phlegmatis per nares, quod post effluxum plurimum guttularum sponte sua iterum cessat.
- 3) Coniunctus etiam est sensus grauitatis circa oculos & radicem nasi.

IV. *SVBIECTA.*

1. Ætas infantilis, præcipue si transpiratio suppressa vel, secundum *Riuerii* obseruationem, vrinæ excretio in illis non succedit.
2. Puerilis ætas, multa lymphæ saliuæ abundans.
3. Præcipue etiam *proiectior* ætas, quæ, ob sanguinem inertio-rem, sinceris hæmorrhagiis non magis par est.
4. Temperamentum in primis phlegmaticum, vel sanguineo-phlegmaticum, plethorici.
5. Sexus sequior præ virili.
6. Homines otiosi, lautæ diætæ dediti, sommolenti.
7. Qui frequentiori eius modi euacuationi adueti sunt; præcipue ex *interna* dispositione. Hanc enim magis hic respicere conuenit, quam accidentales & externas occasio-nes, ab intemperie aëris humido-frigidi dependentes.
8. Adulti etiam & viri, qui congestionibus versus caput sine succedente hæmorrhagia adhuc obnoxii sunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Quæ scena in hæmorrhagia narium, illa etiam in coryza lu- ditur: huius enim causâ primaria etiam est congestio sanguinis versus caput, hæmorrhagiæ narium destinata.
2. Huic adserto non repugnat, quod coryza per aliquot dies duret: nam hæmorrhagiæ narium satis est familiare, vt non vnica semper eruptione absoluat, sed per aliquot sæpe dies repetitis successibus continet.
3. Hinc coryza pro *accidentali* tantum euentu hæmorrhagiæ, cui proprie destinata fuit congestio, habenda est. Quoni- am enim in talibus subiectis sanguis, strictè dictus, cum te- nuï abundante sero sufficienter non subactus est, atque ob hanc causam crassa rubicunda portio vterius progredi non valet: tum euenit, vt tenuior solum pars excernatur,

- & quidem satis subinde copiose; de qua re notabile exemplum apud *Salmuthum* reperitur.
4. *Arestagnatione passiva*, nempe detentione humorum seroso-lymphalium intra & circa glandulas, tamquam illorum colatoria, aliquando quidem coryzam prouenire posse, non negatur, sed hoc rarissime.
 5. *Causæ externa & occasionales*.
 - 1) Euacuationes catharticae, consuetæ, suppressæ, naturales.
 - 2) Artificiales, circa æquinodia celebrari solita, neglectæ.
 - 3) Aer humido-frigidus, immo etiam humido-caldus, cum repentina refrigeratione permutatus.
 - 4) Crebriores crapulae, secundum prouerbium: *Wüsse machen Sülisse*.
 - 5) Vltus herbae nicotianae, antea frequens, iam simul & semel abrogatus, & abusus pulneris sternutatorii.
 - 6) Omne illud, quod transpirationem naturalem impedire solet.
 7. Suppressio vrinae secundum *Rinerium*.
 - 8) Qui veneris abusu vigore sanguinis spoliati sunt.
 6. Tandem de *sternutationis* causa non nulla adijcienda sunt.
 - 1) *Hippocrates & Aristoteles* statuerunt, non tantum aerem, sed & serum illud viscidum, quod sternutando excutitur, prouenire ex *cerebro* per ossis ethmoidei poros ad nares. Quum vero ob viarum angustiam sponte sua id fieri non posse animaduertent, a *cerebri contractione* impetum hunc deriuabant.
 - 2) Recentiores hunc errorem detexerunt, & sternutationem pro actione *thoracis* ex principiis anatomicis & mechanicis iustius declararunt. Eo autem redit sententia, quod aer, qui per inspirationem ad pulmonum cellulas transmissus est, & ordinarie blande iterum emittitur, hic per violentum *thoracis* & in primis *diaphragmatis* motum vno actu impetuose explodatur, & ab hac forti explosione aeris, ex amplo pulmonum spatio in angustam tracheam & narium foramina protrusi & repercussi, *sonus* ille & *strepitus* inopportunos proueniat.
 - 3) Sic de formali mechaico & de causis *instrumentalibus*

bene

bene quidem iudicant; quando autem de causa *efficiente* huius impetuosi motus dicunt, solas materias acres, quæ fibras narium neruo-membranaceas vellunt, adcusant. Sed uti manca est hæc pathologia, ita motum hunc rationalem omni iure tribuimus principio cuidam rationali, quod *propter* materiam, siue *acrimonia*, siue *spissitudine*, siue alia ratione molestam, vehementissimum hunc laborem resolutionis, discussionis & expulsiōis suscipit.

VI. PROGNOSIS.

1. Simplex tam coryza, quam grauedo parum in recessu habent periculi, & quando certis temporibus, in primis circa æquinoctia, recurrunt, salutes sunt, & a multis serosis capitis adfectibus præseruant.
2. Immo ipsa etiam habitualis horum adfectuum sedes, si ætas & reliqua constitutio adhuc vegeta est, directum periculum non adfert. Interea tamen *chronica* hæc coryza *olfactum* facile lædit.
3. In *annosioribus* autem & *effætis* aliter se res habet: in illis enim perpetuus hic copiosus adpulsus ad caput & fauces vertiginosa, apoplectica, hemiplectica, paralytica consecraria tandem inducit; vel adfectus asthmatici & catarrhi suffocatiui oriuntur, si decubitus huius materiæ acris ad pulmones contingit; quo intuitu etiam in *iunioribus* phthistica exulceratio produci potest.
4. Coryzæ nonnumquam superuenit febris catarrhalis, quæ infantibus periculosior esse obseruatur. *Conf. tab. de febre catarrhali benigna.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Rarissime quidem contingit, ut ægri, coryza, grauedine aut phlegmatorrhagia laborantes, Medici consilium quærant; quod si tamen omnino hoc fieret, sequente modo incedendum est.

1. Iusta & necessaria *crachatio* in *grauedine* promoueatnr.
2. Euacuationi per hæc loca *alia* conuenientior substituatnr, & hac ratione coryza auertatur & intercipiatur.
3. Ad primam indicationem quod attinet, adhibeantnr in gra-

- vedine vel lenia *piarmico-errhina* e g. herb. maioran. betonic. thym. serpill. flor. lauendul. lilior. conuall. &c. vel odor *salium volatilium* vrinoforum naribus excipiatur: ita enim facile resoluitur, saltem ad fluxilitatem reducitur mucida illa substantia, quæ tensionem & infarctum pepererat.
4. *Secundæ* indicationi vt satis fiat, præscribantur circa æquinoctia laxantia, venæ sectiones in pede, & pro renata scarificationes.
 5. Subiungantur lenia diaphoretica & diuretica. Hic præcipue laudem merentur tinct. antimonii cum ess. succini & alexiph. *Stahlii* mixta, coniuncto moderato regimine.
 6. Medicatio *curatiua* non quidem requiritur, conueniunt autem lenes laxationes & lenia catarrhalia, ex quibus nominamus MP. de succino *Cratonis*, extract. helleb. nigr. mercur. dulc. essent. alexiph. succini, quorum vsus cum leni diaphoresi coniunctus esse debet.
 7. In *nimis copioso* autem effluxu catarrhali, præmissis laxantibus & diapnoicis, vna vel altera exigua dosis MP. de cynogl. cum puluere quodam tonico & cinnabarino mixta, exhibeatur. Pro scopo tonico conducit præcipue pulvis & essent. cascarillæ.
 8. In coryza *acriore*, in primis illa, quæ cum sensibili dolore capitis iuncta est, vsus camphoræ externus e. gr. mixtura ex spiritu vini camph. salis armoniac. lilior. conuall. rosar. & essent. croc. vertici & fronti applicata, multum leuaminis adfert.
 9. Denique *præseruatine* adhuc commendantur:
 - 1) Mixtura tonico-neruina *Stahlii*, quæ egregiæ hic est efficaciæ.
 - 2) Venæ sectiones & scarificationes versus æquinoctia præsertim in plethoricis & adsuetis, instituendas, superius iam nominauimus.
 - 3) Alui debitus successus.
 - 4) Modestus vsus pediluuiorum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Deckerus* in notis ad praxin *Barbette* insignem efficaciam *vapori turis, aceti* & similium adscribit; sed cauendum est.

est, ne ad repellendum potius, aut mucum illum restagnantem in altiorem carcerem detrudendum, talia remedia inseruiant, & hoc casu periculosa pathemata producantur.

2. Minime omnium nudi tales repulsus in *gravedine habituali*, sæpius recurrente, tolerantur,
3. In hac parum etiam efficiunt ipsa *volatilia & ptarmico-errhina*; immo frequens & quotidianus ptarmico-errhinorum vsus adfluxum copiosius inuitat, & homines habituales eius modi catarrhis obnoxios reddit.
4. Idem præstat *fumus tabaci* multum vsurpatus. Qui vero horum vtrorumque vsui adsueuerunt, non possunt, quin eadem, sed intra limites subsistendo, rursus se se submittant.
5. Sic etiam *salia volatilia urinosa* in coryza acriore & tenuiore adfluxum, saltem ruboris & pruritus passionem circa radicem narium intendunt, & grauedinis valde molestum sensum ibidem gignunt; cui potius *nitrosi collusionibus*, modeste vsurpandis, succurritur. In coryza autem *mucosa & grauedinosa* externe non reicienda sunt volatilia urinosa; si quidem, quod nimium est, quodque caput & memoriam debilitat, euitemus,
6. A remediis externis *subaciis & adstringentibus* in coryza abstinendum est.
7. In *coryza præcipue acriore*, & speciatiim *contagiosa*, præmissa leni laxatione, vsus alexipharmacorum temperatorum & nitrosorum egregie conuenit; in *simpliciore* vero, præsertim ad habitum iam propendente, eximii vsus est ess. succini, siue sola, siue cum essent. lignorum, & præcipue essent. ligni *salasfras*, combinata.
8. *Succini* circa collum gestatio cui vmquam vere profuerit, non constat: licet enim globuli pellucidi, ab eius modi catarrhosis gestati, obscuritatem, quem ad modum corallia pallorem aliquando præbeant, hoc tamen sine vlllo ægri leuamine vtrimque euenire obseruatur.
9. *Fonsculi & setacea* possunt quidem fluxus tales catarrhales
inter-

interdum intercipere, praesertim in iunioribus, plura autem incommoda hoc tentamen premunt.

- 1) Saepius sine villo effectu adhibentur.
- 2) Raro diu iuuant, licet fonticuli continuentur & setacea repetantur.
- 3) Non continuata antiquum incommodum grauius reuocant, immo grauiora alia pathemata introducunt.
- 4) Aetati iuniori debilitationes fonticuli plerumque conciliant.
- 5) Quibus pensitatis elucescit, quod remedium grauius & molestius sit ipso morbo.
10. *Thermarum* vsus si praegressis debitis euacuationibus proportionate instituitur, non quidem inefficax est, magis autem in praesens, quam pro vniuerso malo constanter auferendo conducit; nisi vitae genus otiosum in laboriosum mox mutetur.
11. *Venesectio* tempestiua & proportionata eximum vsum praestat. Hinc non audiendi sunt, qui per illam vires exhauriri, & sanguinem magis vappidum, mucidum, vel antiquorum vocabulo, frigidum reddi, ex falso spirituum principio statuunt; cui commento innumera fere exempla, hisce ventilationibus aduersa, quantumcumque seniores, alacriter contradicunt. Quibus autem totius sanguinis crasis mucida & phlegmatica est, iis venesectio non aequae conducit.
12. *Essentia succini*, praemissa methodo euacuante, in adfectibus catarrhalibus, non adeo acris, eximiae est efficaciae, & id praestat, quod ab aliis frustra expectatur: modo sine alcali parata sit.
13. *Lignum sassafras* in decocto quidem aliquem habet vsum, essentia autem eius nimis calida est.
14. *Massa pilularum de Succino Cratonis* reuocat decubicum excretionis mucidae a capite ad intestina, tamquam debita excretoria sed corrigenda est eo modo, vt minus aloës & plus succini eamdem ingrediatur.
15. *Extract. panchymagogum Crollii* satis bene & leniter purgat, quando conueniente dosi propinatur.

16. *Essentia hellebori nigri*, bene saturata & cum tinct. ialappæ mixta, egregium etiam præstat effectum, in primis quando circa æquinoctia & tempus adpropinquantis catarrhi exhibetur.
17. *Radix ars* ad euacuandam colluuiem serosam in nodulis seu infusis numquam contemnenda est.
18. *Motus corporis sufficiens* magis commendari meretur, quam vlla alia remedia. Per hunc enim abundantia seri dissipatur, & status humidus in siccum mutatur; cauendum autem est, ne calefactum corpus refrigeretur.
19. In phlegmaticis largus vsus *zingiberis*, in cibus egregie conducit.
20. *Puluis sternutatorius* ad grauedinem expediendam si non sufficit, grana VI. *euphorbi* puluerisati cum vna vel altera vncia vini coquantur, & modicum huius decocti in nares trahatur; sic has satis potenter stimulando humores discutit; quod *virriolum album* in aqua maioranæ solutum etiam præstat.
21. *Cortex mezeris* aliquo modo lenius operatur. Inter hæc remedia non nisi post alia conuenientiora adhiberi debent.
22. *Cucupha*, quas catarrhosis ex herbis aromaticis parare solent, vsum quidem aliquem in pure phlegmaticis exhibent, in sanguineis autem cauendum est, ne vertiginosi adfectus sequantur.
23. *Balsama apoplectica & cephalica* subiectis talibus magis nocent, quam conteniunt: quia caput valde grauant.
24. In *coryza acriore*, præmissis per tres circiter dies nitrosis & temperantibus, *MP. de cynoglossa* vsum habet. Præter ea in omnibus coryzæ speciebus, *cinnabaris* conuenit, præcipue in hac specie acriore, in qua etiam essent. alexiph. plus, quam essent. succini præstat.
25. Multi catarrhosi, quando aliquid cibi adsumserunt, insolitam ad vomitum habent proeliuitatem; cuius symptomaticis tractatio a reliqua methodo non differt, in primis si hæc emesis catarrhosam & cum coryza complicatam capitis oppletionem sequatur.

26. Veteres per *trageas* huic rei mederi veluerunt, e rad. helen. ari, galang. zedoar. cost. ver. cinnamom. &c. quæ vero, licet contemni non mereantur, effectum tamen non ita promptum edere solent.
27. *Costus verus* dentibus in ore contritus leuiores stases catarrhales satis cito discutit.
28. Melioris energiae est rad. *pimp. alb.* vel per se, vel in forma essentiae adhibita.
29. Radix *vincetoxicæ* in adfectibus serosis præ reliquis laudabilis est: radix *bardana* eidem intentioni optime inseruit; item radix *petasidis*, magis tamen in phlegmaticis subiectis.
30. Ex hisce radicibus extracta essentia sine vehiculo debet propinari, ita vt 6-8-10 guttulæ per se deglutiantur, & vsus illius per aliquot dies repetatur. Hac ratione vomitui optime consulitur, & fauces a serosa oppletionem liberantur.
31. Conuenit etiam cochleare vnam alterumne spiritus communis ardentis, bonæ notæ, post adsumtos cibos, & sub vsu essentiae in primis pimpinellæ albæ, adsumere.

TABVLA XXIX.

DE

BRANCHO & RAUCEDINE.

I. DEFINITIO. *Ronah Robeaise.*

Branchus est materiae seroso mucosæ intra fauces & asperam arteriam secessio, a congestione humorum versus has partes originem trahens.

Raucedo est tunicæ glandulosæ & partium glandulosarum, circa superiora asperæ arteriæ sitarum, constrictione, qua debitus prouentus lymphæ, asperam arteriam humectantis, intercipitur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Branchus* ordinarie cum raucedine solet confundi. Quæ de causa sequentes attendendæ sunt differentiae: 1) la

- 1) In *branco* sub initium adfunt molimina hæmoptica. Quando autem euacuatio sanguinis locum non inuenit, decubitus seu secessio fit humorum seroso-mucidorum; in *raucedine* autem hæc omnia defunt, contra *lympha*, ad irrigationem necessaria, est intercepta.
 - 2) Hinc in *branco* toni relaxatio, in *raucedine* autem constrictio adest.
 - 3) *Branchus* excipit ordinarie coryzam & grauedinem, *raucedo* autem sine his occurrit.
 - 4) *Raucedo vera* chronice & per multos interdum annos affligit, *branchus* breuioris est periodi.
2. Vterque adfectus est vel *lenior*, quæ a causis externis generatur, vel *pertinacior*, quæ a causis internis originem ducit.
 3. Præter ea, secundum reliquas diuersas causas, diuerso modo adhuc differunt, ut inferius sub *causis* dicitur.

III. SIGNA.

1. Coryza & tussis siue humida siue siccæ plerumque præcedunt, vel ad minimum accedunt *branchum*.
2. Quo acrior est decubitus, eo certius aspera arteria interne excoriata sentitur.
3. Superuenit difficilis respiratio, vox rauca & reliqua symptomata coryzam concomitantia.
4. Quando *lenior* est hic adfectus, tussis vel coniuncta obseruatur, vel eundem sequitur.
5. Cum *grauiore* vero facile conspirant adfectus catarrhales, scorbutici, immo subinde venerici.
6. *Raucedo* per se satis dignoscenda & non raro cum adfectibus phthisicis stipata est.
7. Hinc loco asperæ, profundæ & raucae vocis, quæ in *branco* adest, in *raucedine* potius vox suppressa seu aphoniam obseruatur.

IV. SVBIECTA.

Branchus euenit

1. Iuuenili & consistenti ætati, ubi adhuc vigent congestiones versus pectus.

2. Interdum quoque infantibus.
3. Phlegmaticis in primis senibus, & caussis infra nominatis expositis.
4. Raucedo evenit
 - 1) Tussi siccae adfectis.
 - 2) Phthisicis.
 - 3) Feminis obstructione mensium laborantibus.
 - 4) Diu multumque clamitantibus.

V. CAUSSAE.

1. Causa *proxima branchi* est congestio sanguinis ad fauces, sub qua in partes glandulosas materia seroso-mucida secedit.
2. Causa vero *proxima interna raucedinis* est interceptio lymphae, quae arteriam asperam humectat.
3. Causa *concomitans*, quae lymphae proventum impedit, est plerumque constrictio partium glandulosarum, circa superiora arteriae asperae.
4. In causa vero scorbutica & venerea erosio epiglottidis praesto est.
5. *Causa externa & occasionales.*
 - 1) Decubitus rei alicuius extrinsecus delatae, e.g. particularum puluerulentarum.
 - 2) Tussis vehemens.
 - 3) Frequens & diuturna sermocinatio, immo vociferatio.
 - 4) Cibi nimium pingues.
 - 5) Humores acres biliosi, circa haec loca stagnantes.

VI. PROGNOISIS.

1. *Branchus simplex* parum periculi portendit.
2. Quando autem iam *habitualis* factus est, nonnumquam, praesertim apud senes, in catarrhum suffocatum abit; apud iuniores vero plerumque tussim vel asthma relinquit.
3. *Raucedo*, a caussis *externis* producta, leuioris est considerationis.
4. Quae a caussis *internis* dependet, non, nisi his sublati, tollitur.
5. Quo grauiores sunt morbi complicati, eo difficilius raucedo

cedo tollitur : hinc in causa ventrea & scorbatica satis pertinax obseruatur.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *In bracho.*

1. In *bracho* ad humorum adfluxum a pectore deriuandum, præmissis lenioribus laxantibus, propinentur nitrosa, absorbentia cum cinnabarinis mixta.
2. Ad mucorem incidendum & resoluendum conducit aqua veronicæ vinos. essent. alexipharmac. *Stablii*, essent. succini.
3. Paucis: vti cum hæc mucida stasi coryza & tussis concurrunt, ita & eadem medicatio locum habet, quæ tabulis de coryza & tussi indicata est.

B. *In raucedine.*

1. Ad stricturam partium glandulosarum relaxandam & acrimoniam obtundendam exhibeantur lubricantia, e. g. oleum amygdal. dulc. syrup. liquirit. de erysimo *Lobelii*. capilli veneris, violar. iuscula mucilaginosæ raparum, avinæ, hordei, decocta ex herbis veronic. hyssopi, saluæ, hederæ terrestr. semin. anisi, fœniculi.
2. Quo magis humores acriores biliosi in hoc adfectu peccant, eo melius conducunt absorbentia cum nitro & antimoniato quodam fixo combinata, coniuncto leni regimine diapnoico.
3. In causa scorbatica, venerea, phthifica, primarii adfectus respiciendi sunt.
4. Alius subinde per lenia laxantia soluenda est.

VIII. *CAVTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. In vtroque casu fugienda sunt *expectorantia*.
2. *Relaxatio* arteriæ alperæ in raucedine vulgo quidem solet adulari, & hac ratione brachus cum raucedine confundi; qui vero omnes circumstantias in vera raucedine occurrentes, & præcipue relaxantia remedia, quæ ipsi salutariter opponuntur, penitius considerat, ille potius *constrictionem* subesse obseruabit.

3. *Halsigius* bene obseruauit, quod raucedo in sexu femi-
no contingens, mensium obstructionem interdum pro-
fundamento habeat, quo intuitu venæ sectionem com-
mendat.
4. De hac re notum est singulare exemplum, videlicet virgi-
nis duodeviginti annorum, cui mensium suppressio-
nis & raucedine laboranti, suasu quorundam *Batauicæ*
Medicorum, breui tempore vena septies secabatur.
Quam diu sanguis fluebat, virgo voce sonora naturali e-
loquebatur; quam primum autem, vena compressa, pro-
fluere cessabat, mox aderat vox ægerrime percipienda,
quæque aponia magis quam simplex raucedo dicenda
fuisse. Menses post ea per remedia conuenientia aliquo
modo reuocabantur, manebat autem aponia. Tandem
sub vsu decocti *veronica* naturalis loquela restituebatur.

TABVLA XXX.

DE

ANGINA.

I. DEFINITIO.

Angina est stasis sanguinis inflammatoria circa fauces & vi-
cinas illarum partes collecta, a tumultuaria humorum
congestione, medium quasi locum inter caput & pectus
occupante, & hinc modo hæmorrhagiam narium, mo-
do hæmoptysin respiciente, originem duceas. Deri-
vatur vel a Græcorum ἀγχω, præfoco, strangulo, vel
a Latinorum ango.

II. DIFFERENTIA.

1. Variæ & sollicitæ tam veterum quam recentiorum anginae
diuisiones vix quidem vllam in praxi habent vtilitatem,
quoniam tamen formanda prognosi quodam modo ser-
uatiunt, breuiter illas tangemus.

2. An-

2. Angina est vel *vera*, vel *spuria* seu *notha*.
- 1) *Vera* dicitur, quando tumor inflammatorius magis *interne* obseruatur; nempe in larynge, pharynge & partibus vicinis, insuper etiam cum febre acuta stipata est.
 - 2) *Notha* autem vocatur, vbi tumor *externus* magis se se manifestat, videlicet circa tonsillas & glandulas post aures sitas, sine concursu febris acutæ.
3. Angina a veteribus ratione partis adfectæ diuidebatur in *cynanchen*, *paracynanchen*, *synanchen* & *parasy-nanchen*.
- Synanche* dicitur, quando muscoli laryngis *interni* inflammati sunt, & tamen neque intus neque extus tumor adparet, & febris exquilita coniuncta est.
- 1) *Paracynanche* vocatur, quando tumor inflammatorius in musculis laryngis *externis* occurrit.
 - 2) *Synanche* est, quæ inflammationem musculorum *pharyngis internorum* format, & maiorem deglutiendi, minorem vero respirandi difficultatem coniunctam habet, & cuius tumor magis *extrorsum* vergit.
 - 3) *Parasy-nanche* inflammationem musculorum *pharyngis externorum*, cum febre coniunctam, veteribus denotat.
4. Sunt, qui quintam speciem his adiciunt, quam *prunellam* vocant, quando *lingua* intumescit, & in superficie *fissuras* dolore stipatas concipit, ac glutine quasi viscido oblitur. Quum vero plerumque symptonia febrilium malignarum sit, insuper etiam confinia faucium simul adficiat, non est, cur ab angina symptomatica eam separemus. Est enim
5. Angina vel
- 1) *Idiopathica*, quæ per se & sponte sua exoritur, & a sola plethora dependet; vel
 - 2) *Symptomistica*, quæ febribus acutis, præcipue circa statum, vel aliis morbis accedit. Vide *subiecta* & *causas*.

6. Hæc omnia differunt *gradu*; in aliis enim *mitior* est, in aliis autem cum tali impetu angina inuadit, vt paucis momentis omnia inualefcant.
7. Diuifio anginae in *sanguineam* & *mucosam* non differentiam cauffarum, fed temperamentorum inuoluit; illa magis ad *veram*, hæc autem ad *notham* referenda est.

III. SIGNA.

1. Manifestat fe sub initium *aliqua* deglutendi difficultas.
2. Quæ more confueto cum tumore & fenfu doloris pulfantis ac pungentis, modo in alterutro latere, modo in vtroque ad ceruicem vsque fe extendens, coniuncta est.
3. His accedit notabilis ardor in faucibus & inflammatio.
4. Paucis horis hæc ita increbescunt, vt vix deglutire quidquam valeant ægrotantes, immo deglutita, in primis potententa, sæpius per nares reddant.
5. Lingua insigniter tumefcit, & venæ quasi nigricantes *sub* illa adparent.
6. Facies turgēt & rubicunda exiftit.
7. Vafa circa tempora intumefcunt.
8. Vafcula in oculis fanguine ita repleta comparent, vt ipfi oculi e capite quasi prominentes, vt in strangulatis, confpiciantur.
9. Respiratio fit difficillima, & malo vltterius procedente orthopnoea fequitur, quæ ægros periculo fuffocationis exponit.
10. Vox clangofa & rauca, cum loquendi difficultate.
11. Animus valde anxius.
12. Manus funt pallidæ & tactu frigidæ.
13. Æger ipfe modo horrore leuiore, modo æftu volatilis percellitur.
14. Pulsus potiffimum frequens, durus & inaequalis.
15. Vrina variat: *Symptomatica* enim angina talem exhibet, qualem febres acutæ; *idiopathica* autem, præcipue notha, qualem ad fectus congestorio-inflammatorii offerunt.
16. Hæc vero omnia in angina notha multo mitiora deprehenduntur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Angina *idiopathica* potissimum euenit *iuuenibus*, vix tamen aliis quam insigniter plethoricis.
2. Quibus præcedentibus annis hæmorrhagiæ narium familiares fuerunt.
3. Qui ad hæmoptysin proni sunt.
4. Qui diata calida aromatica & vinosa vtuntur.
5. *Symptomata* vero angina, quæ acutis & aliis morbis accedit, reliquæ etiam ætati obtingere solet, præcipue sanguineo-cholericis subiectis.

V. *CAVSSAE.*1. *Idiopathica.*

- 1) Causa *materialis remota* est turgida sanguinis abundantis ebullitio.
- 2) Causa *propior* est tumultuaria humorum versus hæc loca congestio.
- 3) Causa *proxima* seu *continens* est stasis inflammatoria, circa caput laryngis aut pharyngis collecta.
- 4) Causa *efficiens* est naturæ intentio ad sanguinem exonerandum, fluctuans tamen & hæsitans, num per nares vel per pulmones excretio instituenda sit: hinc medio quasi loco humores detineantur.
- 5) Causæ *occasionales & procatartica* sunt
 - a) Hæmorrhagia narium per ætatis rationem suppressa.
 - b) Hæmorrhoidum tam in feminis quam in viris repetitiuæ cohibitiones.
 - c) Venæ sectiones & scarificationes consuetæ neglectæ.
 - d) Fluxus dysentericus male tractatus, auro cito suppressus.
 - e) Sensibiles faucium stimulationes & arrosiones per remedia valde acria, adstringentia, vehementiora vomitoria &c.
 - f) Refrigeratio corporis repentina post æstum.
 - g) Ebrietas.
 - h) Abusus pulueris sternutatorii acrioris ad fauces delatantis.

- i) Clamores & vociferationes.
 - k) Luxationes colli.
2. *Symptomatica.*
- 1) Incompleta sanguinis versus hæc loca congestio:
 - a) in febribus acutis præcipue epidemicis.
 - b) in adfectibus vagis arthriticis &c.
 - 2) *Causæ occasionales* in acutis sæpissime sunt
 - a) vel incongrua venæ sectio, quæ præcipue circa dies criticos anginam prouocat. Vel
 - b) quando ægri consiliis non obtemperant, sed impatientia & inquietudine resistunt. Vel
 - c) Quando per incongrua artificia & regimina calida, aut etiam refrigerantia peruersæ & anotericæ humorum commotiones excitantur.

VI. PROGNOSIS.

1. Angina quo maiore impetu inuadit, eo maius periculum minatur.
2. Angina *notha* mitior est quam *vera*.
3. Species mitissima est *paracynanche*.
4. *Cynanche* autem omnium est periculosissima; conf. *Hippocrat. Sect. IV. aphor. 34. 35.*
5. Quando *orthopnea* accedit, quo scilicet statim ægri non amplius iacere possunt, sed erecti hiantes ore, canum instar, aërem petunt: sæpius eodem, vel secundo aut tertio die suffocantur.
6. Qui *cynanche* pereunt, & quidem ita, ut spumas ante os agant, illi conuulsionibus magis, quam suffocatione moriuntur: magnum enim periculum sphacelosæ corruptionis ibi prostat, quod naturam in tales motus tremulos coniecit.
7. Angina *idiopathica* quando subiecta adultiora corripit, periculosior obseruatur, quam in iunioribus.
8. Angina in febribus *acutis* circa dies *criticos* contingens, est perniciosa. Nam per eiusmodi tumultuariam humorum congestionem intra fauces reliquus febrilis decursus peruertitur, dum ad febrem pertinentes necessarias excre-

excretionibus turbat, & ad secundariam magisque accidentalem sanguinis euacuationem collineat.

9. Angina luxationem vertebrarum colli secuta, lethalis. *Conf. tab. chirurg. de luxatione colli.*
10. Quando angina subito euanescit, recursum ad interiora denotat,
11. Quibus ex angina liberatis ad pulmonem fit conuersio, ii intra dies septem moriuntur, si vero hos eualerint, purulenti existunt. *Hippocrat. Sect. V. aphor. 10.*
12. Staseos discussio, quando non obtinetur, suppuratio contingit, & tum anceps valde est euentus.
13. Anginam interdum per narium hæmorrhagiam, interdum per hæmorrhoidum aut mensium fluxum solui, experientia testatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Ante omnia *clysma* applicetur, & quidem extemporale, ob periculum quod est in mora. In hunc finem conducit vrina calida, vel aqua calida salina. Si tempus conducit, stimuli loco *pulpa colocyntid.* in petia ligata & cocta, addatur, vel electuar. hier. picr.
2. Deinde in casu *urgente*, larga venæ sectio in brachio, vel adhuc melius in pede, instituatur, & si post aliquot horas mali vehementia non remittat, *tanina* etiam sectentur.
3. In *mitiore* autem adfectu venæ sectio in paroxysmo non æque necessaria est, sed sufficiunt plerumque remedia, quæ impetum sanguinis mitigant, e. g. nitrosa, absorbentia, leniter diaphoretica, cum grano *M.P. de cynogloss.* combinata, & sæpius adhibita; qui pulueres in malo etiam *urgente*, immo per vniuersum morbi decursum salutare essent, si modo deglutiendi difficultas non obstaret.
4. Facta sanguinis siue sola *contemperazione*, siue simul ipsius quantitatis per venæ sectionem *immixtione*, locum habent *gargarismata*. Remedia ad illa paranda triplicis sunt generis.

- 1) *Resoluentia & neruino-difcutientia.* e. g.
- Radices:* irid. Flor. figill. Salom. vincetox. caryophyllat. bryon, aristoloch. vtriusque, helen.
 - Herba:* hyffop. chærefol. falu. origin. centaur. min. comæ abrotan. fcabiofæ, licet infipidæ.
 - Flores:* chamomill. melilot. bellid.
 - Semina:* anifi, carui, dauci, foenugræci.
- 2) *Lenientia & demulcentia* ad ardorem & æftum, plus minus inflammatorium, temperandum. In hunc finem laudantur.
- Mucilaginofa:* e. g. femen cydonii, pffylli, lini, malua & althæa.
 - Aqua* rofar. rubr. cum fem. cydonii.
 - Syrupi:* rub. idæi, dianuc. & adhuc magis diamôr.
 - Specifica:* album græoum & quadantenus fungus fambuci.
 - Quorum omnium princeps eft *nitrum*.
- 3) *Adstringentia.* Huc pertinent
- Herba traumatica:* pyrolæ, prunell. fanicul. auricul. matris, ab *Hearnio* commendata.
 - Radices:* biftoxræ, tormentill. fymphyt. maior. pseudo-acoti.
 - Cort.* & fol. malipitnici.
 - Validiora:* tinct. terræ catechu, gallæ, alumen crudum.
5. Sub initium adplicentur aliquoties *gargarismata* fine adstringentibus, vel leniffimistantum, parata, deinde *leniora* ex illis, & de hora in horam fortiora addantur. Vid. *cautel.*
6. Eodem tempore, quo gargarismata in vsum vocantur, necessarium etiam est, extrinsecus adplicare *emplaftra* difcutientia & emollientia, e. g.
- 1) Emplastr. demelilot. camphor.
 - 2) Emplastr. diachylon simplex absente inflammatione.
 - 3) Emplastr. diachyl. cum gummatibus, si ardorem & inflammationes subesse adparet.
 - 4) Si insignis calor & ardor æstuosus vrget, loco emplaftri spiri-

spiritus vini camphorat. crocat. cum linteis multiplicatis adplicetur.

7. Quando autem stasis inflammatoria hanc methodum discussoriam adspernatur, & propria sua pertinacia ad supurationem tendit, ruptio *spontanea* expectanda est. Vid. *cautel.*
8. Ruptione vero facta, sponte quasi restituitur aeger, sine peculiari concursu medicamentorum. Potest tamen ad mundificationem loco gargarismatis adhiberi *vinum calidum* cum paucis *melle*, siue simplice, siue rosaceo. Item aliquid myrrhae, salviae & prunellae pro consolidatione.
9. Aluus semper aperta seruetur, siue per clysteres, siue per moderata laxantia.
10. Vbi suffocationis metus impendet, *bronchotomia* vltimum est refugium.

B. *Extraparoxysmus.*

1. Plethora imminuatur

- 1) Siue per euacuationes sanguinis *naturales*, iusta methodo renouandas.
- 2) Siue per *artificiales*, nempe venae sectiones æquinoctiales, in pede instituendas, & non facile prætermittendas.

2. Motus versus hæc loca congestorius præoccupetur

- 1) per laxationes subinde instituendas.
- 2) per essentiam alexipharmacam Stahlî cum mixtura tonico-neruina coniunctam & anniuersaria periodo recurrente exhibitam, cum regimine leniter diapnoico, per motum corporis voluntarium promouendo.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In angina *notha* & magis *mucosa* adhiberi possunt resoluentia *penetrantiora*, e. g. rad. ari, helen. pimpinell. alb. bardan. vincetox. Herbarum nonnihil aromaticarum, lign. sassapar. guaiac. gummi galban. sagapen. myrrh.
2. Aluus autem in illa mucosa constitutione non tam aperta seruanda, quam potius *purganda* est, e. g.

Recip. MP. de succin. Craton. ferup. I.

Resin. ialapp. gr. V - VI.

Extract. trochisc. alhandal. gr. II. III.

M. f. pilulæ.

Mercur. dulc. quoque locum habet.

3. Rob *dianuncum* in mucosa angina, in sanguinea autem magis rob *diamoron*; in utroque casu fungus sambuci conuenit.
4. *Vena sectio particularis*, sub lingua nempe instituta, si uniuersali nondum præmissa administratur, duo graua incommoda parit
 - 1) vel enim, quod sæpe contingit, sanguis sufficiente quantitate non emittitur, ob vasa minus capacia, & sic adfluxum vehementiorem adfert, omniaque deteriora reddit.
 - 2) Vel fluxus si satis procedit, vix villo remedio potest sedari, qua ratione ager viribus exhauritur, & febres facile lentescens subsequuntur.
5. *Vena sectionem generalem* in pede instituere, ad reuulsionem quidem maioris efficaciam deprehenditur, quam illa, quæ in brachio administratur; ob tenacem autem aliorum consuetudinem nonnumquam conueniendum est.
6. *Vena sectionem* quando *inquietudo* & crebra iactatio corporis excipit, *frictiones* fortiores in pedibus & *pedilunia* conueniunt.
7. Ne error in *gargarismatibus* committatur, duo simul coqui possunt: vnum e discutientibus & demulcentibus; alterum e solis adstringentibus paratum. Hac enim ratione sub initium vel nulla, vel tantum exigua portio decocti adstringentis alteri immisceri, sensim vero sensimque augeri potest, e. g.

Recip. rad. irid. Florent. drachm. III,

helen.

caryophyllat.

althæana vnc. semis.

herb. saluiz.

bellid. min.

hyssop.

flor.

flor. chamomill. ana man. semis.
 caricar. ping. num. IV.
 Coq. in aqua simplice q. s. colaturæ add.
 Rob diamoron.
 Alb. græc. ana drachm. III.
 Nitri crySTALLISAT. vnc. semis.
 Item

Recip. Rad. bistort.

tormentill. ana vnc. semis

herb. prunell.

pyrol. ana manip. I.

gallar. drachm. I.

coq. in aqua communi & colaturæ addatur pro re
 nata minus plus aluminis crudi.

8. Ratione *applicationis* sequentia obseruanda sunt.

- 1) Caueatur ne æger sub iniectione supinus iaceat, sed an-
 trorsum quodam modo caput inclinet, vt infusum ci-
 to possit resluere.
- 2) Chirurghi monendi sunt, ne gargarismata cum impetu,
 vt moris est, iniiciant, vt potè quo pruritus & ardorem
 faucibus inferunt. Modeste adhibita æque bene pe-
 netrant.
9. *Nitrum* sensum ardoris egregie demulcet, saliuam in confi-
 stentiam submucidam coagulat, & sic subitanæam illius
 siccitatem impedit, insuper leni sua acrimonia abstergen-
 di simul efficaciam præstat.
10. *Sal commune* ad morbos faucium etiam conducit, nam acri-
 monia sua insigni, in ore detenta, adfluxum saliuæ prouo-
 cat, & sic humectationem oris inducit.
11. *Album græcum* ad ardorem demulcendum specifica & egre-
 gia lane virtute præditum est. Hinc non solum hic præ-
 stat, quod vulgaria gargarismata præstare non possunt,
 sed etiam in internis ardoribus intestinorum, & inde in-
 ducto *ileo*, egregiam mitigationem adfert.
12. *Terra catechu* in repentino anginae casu, vbi ad coctionem,
 quæ pleraque vegetabilia indigent, tempus non concedi-
 tur

- tur eximium edit effectum adstringentem, aqua soluta & applicata.
13. Sicetiam *radix bistorta* adrepentinas stases dissipandas egregiam habet efficaciam.
 14. *Galenus* refert de quodam per insomnium edocto, ut in angina pertinaci vteretur succo *la-Zuce*, & quod illo vsurpato conualuerit.
 15. *Puluerulenta*, nisi tenerrima, & lactis instar liquoribus in-natent, non habent locum: faucibus enim adhærent, & titillando irritant.
 16. Ob exquisitum hunc sensum faucium abstinendum etiam est ab omnibus istis, quæ eas magis adfligere possunt: quo pertinent omnia acria, acida valde adstringentia, essentia feruidiores, aromatica, resinosa & peregrina balsamica, saturnina, terræ bolares, item cortex *calearillæ*, quæ ob acredinem suam adstrictas fauces magis adficiunt.
 17. Ad motus congestorio-dolorificos aliquo modo mitigandos remedia *sedativa* omnino, sed parca dosi & cum aliis tutis remediis adhibere licet, v. g. *M.P.* de cynoglossa sub pulueribus temperantibus; semen papaueris, semen cardui marie sub emulsionibus; syrupus papaueris rhzados & diacodyum *Montani* sub formulis lenientibus exhiberi possunt: *opiata* vero in tali casu plane excludenda sunt.
 18. Ab *emollientibus pure* adhibendis, abstinendum quoque est, strangulationem enim, secundum *Foresti* obseruationem, inducere valent, maiorem adfluxum inuitando. Hinc in gargarismatibus cum neruino - discutientibus hic copulari debent.
 19. In *epitibematibus*, extrorsum applicatis, maiorem usum præstant, relaxando poros, ut humores introrsum congesti, reuocentur.
 20. *Salia urinosa*, e. g. spiritus salis ammoniaci, exiguam hie adferunt opem: *maiore* enim copia adhibita, irritant remediunt effectum; *minore* autem dosi nihil notabile præstant.

21. *Suppuratio*, (quæ in angina *notha* frequentius contingit quam in *vera*) quo magis impediri potest, eo melior successus sperandus: illa enim ingentes inuoluit dolores, & tumorem ita auget, vt intra 4 - 5. dies ne potulenta quidem deglutire queant; quo tempore miseri ineffabili siti anguntur, quam tamen ob deglutiendi impotentiam, restinguere non possunt.
22. Si italeus discussio post quartum, ad summum, diem non contingit, & hinc illius resolutio non magis expectanda est, tum adstringentia e gargarismatibus sunt segreganda & lenientibus tantum ac emollientibus vtendum est.
23. Ad ruptionem apostematis promouendam nihil tentandum est: per se enim intra 4 - 6. dies, cum effusione materiæ albicantis, subsequitur. Cauendum proinde est ab ambiguo, immo subinde temerario illo consilio, quod per *vomitoria* ruptionem promouere commendat. Immissio candelæ cereæ, quam nonnulli suadent, est quidem tolerabilior, non caret tamen difficultate.
24. In angina febribus acutis superueniente non negligenda est genuina febrium methodus, vbi simul pulueribus antifebribus *camphora* immisceri potest ad gr. III. pro dosi, quæ inter deglutiendum aliquid opis adfert partibus inflammatis.
25. Præcipue videndum est, ne diaphoresis deficiat, alia enim ratione humores per impetuolam congestionem ad fauces copiosius feruntur. Hinc decocta dilutiora, resoluentia & diuresin adiuuantia ordinari possunt ex rad. cichor. scorzoner. leuist. herb. veron. scord. chærefol. flor. sambuc. rasur. C. C. & hordeo excorticat.
26. Cauendum autem est a capitali illo errore, hunc morbum symptomaticum in febribus, cum *sudoriferis* tractare.
27. *Buso* in vino adusto ad putredinem quasi maceratus, & euaporato spiritu, residuum aqueum magna cum linteo vertici calide adplicatum, in angina febribus petechialibus accedente, leuamen præsentaneum adferre dicitur.

28. In *Holsatia* bufonem *vinum* in ore detinent, qui ibidem moritur, agro postea conualescente.
29. Quæ circa *bronchotomiam* obseruanda sint, ex tabula chirurgica de operationibus in collo edisci possunt.
30. Denique prophylaxis, sub *methodo* commendata, quam maxime obseruetur: solet enim hoc malum vel anno revertente, vel alia occasione, facile recrudescere,

TABVLA XXXI.

DE

TVSSI.

I. DEFINITIO.

Tussis est exspiratio vehemens & sonora, cum partium musculosarum exspirationi potissimum destinatarum, thoracis, laryngis, lumbarium & abdominis motu spastico facta, quo motu disculforio & elisorio principium vitale materiam aliquam molestam euacuare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. *Tussis* est vel *humida* vel *sicca*.
2. Vtraque vel vere *pectoralis* existit, vel per *consensuæ* tantum pectus adficit; illa *idiopathica*, hæc autem *symptomatica* seu *consensualis* dici meretur.
3. *Consensualis* hæc ipsi tandem pectori incumbere solet, vt *complicatus* denique adfectus inde oriatur.
4. *Tussis symptomatica*, seu *consensualis*, est
 - 1) vel *catarrhalis*, quæ *coryzam* habet sociam, strictiore sensu, grauedinem, maxime *branchum*, aliquando etiam tonsillarum tumores. In hac *tussis* specie nulla fit insignis euacuatio, præter ea ad modum vehemens seu *ferina* est, & falsum infert saporem, iunctæ sunt sternutationes, horripitationes; & non raro febris catarrhalis

lis accedit. Sentitur titillatio in larynge, & descensus materiae cuiusdam in fauces : tempore nocturno sæpius exacerbatur : Gustus læditur & appetitus proster-nitur.

2) Vel *hypochondriaca*, quæ exoritur

a) Aliquando a *stomachi* vitiis : vnde tussis *stomachalis sicca* vocatur, quæ tamen *humida* euadit, quando duratione sua pulmones in consensum trahit.

b) Aliquando ab *hepatis* scirrho, vnde tam hecicis quam hydropticis familiariter euenit.

5. Tussis ab *internis* causis pendens, bene distinguenda est ab illa, quæ ab *externis* concitatur, *vid. causse.*

6. Tussis *humida* & *sicca* differunt

1) Subiectorum & causarum diuersitate. *conf. subiecta & causse.*

2) *Sicca* diuturnior, & coniuncta est cum dolore capitis, pectoris & dorsi. Præter ea facilius quam *humida* recurrit.

3) Nulla humiditas conspicua est, nisi vel incalescentia febrilis, vel saniosa materia; vel aëris constitutio catarrhalis concurrat.

7. Tussis *stomachalis* per consensum orta, dignoscitur e copioso lento sputo, post pastum se se exserente, & vomitionem prouocante, dolore, vel ad minimum titillatione, in scrobiculo cordis. Hæc *stomachalis humida* differt a *stomachali sicca*, de qua superius dictum est.

8. Tussis reliqua *hypochondriaca* ab aliis discernitur

1) siccitate eifera & vehemente, vocem satis illibatam relinquente, vel ad summum sicca quadam rauedine adficiente.

2) Augmento illius post pastum & motum, præcipue adscensorium, item post potum largiorem vel frigidum.

3) Maiore tolerantia aëris frigidi, per quem ita non exacerbatur, vti tussis *pectoralis*.

4) Sensu concussionis hypochondriorum sub tussi vehemente, & dolore grauatiuo in regione iliaca.

9. Tussis *habitualis a phthifica sicca* dignoscitur
- 1) ex insigni humiditate.
 - 2) Ex materia non saniosa, nec sanguineis striis mixta, sed pulposa, viridescente, & per plures interdum dies prodeunte. Præter ea
 - 3) In *habituali* nulla tabida consumptio occurrit;
 - 4) Neque tam in ignis exacerbatio ab opiatis, phthificæ tussi inimicissimis, sentitur.
 - 5) *Habitualis* notabile leuamen a mediocriter purgantibus nanciscitur, phthifica nullo modo.
10. Denique tussis plurimum etiam differt ratione *ætatis & temperamenti*.

III. SIGNA.

1. Signa tussis generaliora satis sunt manifesta.
2. Iungitur plerumque rauco, & occurrit vel cum vel sine copiosa mucæ excretionē.
3. Signa specialia diagnostica sub *differentia* iam indicata sunt.

IV. SVBIECTA.

1. Tussis non cuilibet ætati & subiecto communis, sed infrequentior & rarior est quam prima perpendione iudicamus. Ex multis enim, qui eisdem iniuriis aeris expositi sunt, paucissimi tussientes observantur. Huic accedit, quod non ita pauci reperiantur, qui tussim re vera per totam vitam numquam experiuntur.
2. Tussis *simplex idiopathica*, ab *internis* & quasi domesticis causis exorta, non solum *humida*, sed etiam *sicca*, nec non *ferina*, ætati iuuenili, & constitutioni plethoricæ propria est.
3. Tussis *catarrhalis symptomatica*, & ab *externis* causis orta omnibus fere ætatibus, maxime tamen senili, impendet.
4. In specie tussi *sicca* succumbunt:
 - 1) Iuuenes floridæ constitutionis, habitus corporis ficcioris & striatæ texturæ.
 - 2) Ætas virilis & senilis e prægressa ad suefecta dispositione, item

item ex hæmorrhoidum vel mensium regeſtione & ventilationum ſanguinis adſuetarum neglectu.

- 3) Male conformati, gibboſi, ſcrofuloſi.
 - 4) Calculis bronchialibus vel nodis pulmonum ſcirrhoſis obſeſſi.
 - 5) Quibus ſcabies repulſa vel variolæ male tractatæ fuerunt.
5. *Humida* autem tuffi magis obnoxii ſunt homines phlegmatici, ſanguinei, qui
- 1) Habitus corporis ſucculenti, catarrhoſi.
 - 2) Otioſi præcipue, & ſenſibiles delicatuli, qui ab aëre humido-frigido autumnali refrigerationem colli & peſtoris incurrun.
 - 3) Qui conſuetas venæ ſectiões vel ſcarificationes neglexerunt,
 - 4) Qui ſpiritu vini vel acidis abutuntur.
 - 5) *infantes* maxime quidem obnoxii ſunt tuffi *ſtomachali humida*, quando autem dentitionis labor diu continuat, tuffis *ſicca* iſtis familiarior eſt.

V. CAUſſÆ.

1. Cauſſa tuffis *peſtoralis idiopathica* eſt ſtagnatoria congeſtio humorum circa peſtus, modo hæmoptycam excretionem reſpiciens, modo ſcirrhoſis collectionibus veſtigia legens; prior ſpecies, quia ſanguis ad exitum non peruenit, ſimplici oppleſione anguſtiam inducit, & per vices ægrotum exercet; poſterior magis continuo adſigit, inſarctum enim, intra veſiculas pulmonales collectum, reſolueret & diſcutere intendit.
2. Nonnumquam ſub hac congeſtione, in primis in tuffi *ſerina, tenuis & acris* portio humorum arripit teneras pulmonum membranas & neruos, eoque ipſo vehementiorem tuſſim prouocat.
3. Cauſſæ *concurrentes externe*, quæ in deſcriptione *ſubiectorum* nominatæ ſunt, ſymbolam ſuam etiam contribuent, & partim lapſu irritante vltiorem adpulſum verſus peſtus prouocant, partim ſpasmotica ſtrictura, quam vicinis partibus inferunt, reſluxum ſanguinis impediunt,

unt, & hoc modo secessionem materiae mucidae promovent, e. g. acida, potus frigidus, pectoris & capitis refrigeratio.

4. His concurrentibus causis omni iure etiam adconsentur remedia *expectorantia*, praecipue *iuiuba* & *sebesten*, quae humores versus pectus propellunt.
5. Causa tussis *hypochondriaca* est vel obstructio aut induratio hepatis vel vitium stomachi.

VI. PROGNOSIS.

1. Tussis *idiopathica* pectoralis, quando adhuc *recens* est, frequentissime sine medicamentis, solo motu discussorio vel ventilationibus sanguinis, perite institutis profigatur.
2. Quando autem iam *habitu* facta est, pertinacissime se gerit: Licet enim imperitum sit, illam pro phthiſica statim tussi pronunciare, periculum tamen subest, ne tandem erosionem pulmonum inducat.
3. Tussis sicca iuuenum diuturna merito suspecta est, fomenta enim haemoptysicos & phthysicos inuoluit, & in haec etiam non raro transmigrat.
4. Abit interdum sicca haec in tussim *ferinam*, quae vix ad se redire, vel spiritum recipere possunt ægri.
5. Tussis vernalis mitior est, & facilius etiam tollitur, quam autumnalis.
6. Tussis *periodica*, quae statis temporum mutationibus repullulare consuevit, quando iam emanet, nec alia euacuatio siue a natura, siue ab arte substituitur, varios incommodos habet successores e. g. adpetitus & digestionis vitia, catarrhos suffocatiuos, paralyticorū adfectus.
7. Tussis antea humida, quando in siccam repente commutatur, nihil boni portendit.
8. Tussis *hypochondriaca sicca* vehemens, frequenter cedens & recurrens, aut noctu exacerbari solita, merito suspectam reddit scirrhosam, in primis in hepate, siccescente tamen constitutionem; & quo magis certis horis se se exlerit, eo certius obfirmatam visceris alicuius obstructionem indi-

indicat. Hinc prognosis ipsius non est dissimulanda.

9. Hoc periculum augetur, si viscerum abdominalium labi superuenit vitium pulmonum, & ita morbus fit complicatus.
10. Tussis stomachalis, grauis & diuturna infantum, atrophiam vel præsentem vel futuram indicat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Tussis pectoralis.

1. Humida.

- 1) Ad humorum adfluxum a pectore deriuandum exhibeatur purgans aliquod, satis quidem sensibile, a vehementia tamen alienum : in hunc finem laudantur MP. de succino *Cratonis*, de ammoniaco *Quercetani*, extractum panchymagog. *Crollii*, mercur. dulcis, resina ialappæ, trochisci alhandal.
- 2) Deinde materia catarrhalis ad euacuationem præparetur.
 - a) Quando *simpliciter* est mucosa, cum exhibeantur resoluentia & discutientia catarrhalia, e. g.
 - α) Radices vincetox. pimpinell. alb. helen. ari. irid. Florentin. aristoloch. vtriusque, gentian. rubr.
 - β) Herbe, hyssop. marrub. alb. centaur. min. capill. vener. epithym. cuscut. rusfilag. scabios. roris solis, veronicæ.
 - γ) Gummi-resina e. g. ammoniac. galban. sagapen. benz.
 - δ) Semina anisi, foeniculi, cumin.
 - 2) Ex *compositis* huc faciunt essent. alexipharmaca *Stahlii*, essent. lign. sassafras, syrup. de crysimo *Lobellii*, de prasio, capilli veneris, tincturæ alcalinæ e. gr. antim. tartari.
- b) Quando autem *viscida tenacitate* peccat, incrassetur potius, & in pulposam volubilem consistentiam redigatur; id quod præstant rad. liquiritiæ & illius succus, gumm. Arabic. tragacanth. cerasor. passulæ, ficus,

cus, amyllum, flor, sulphur. balsam. sulphur. cum oleo amygd. dulc. parat.

- c) Si vero materia *tenuis & acrimonia* irritante prædita est, obtundentia in usum veniant, e. gr. emulsiones, decocta hordei, auenæ, cum rad. polypod. vel althææ parata. Item mucilag. femin. psyllii, cydoniorum, gelatinæ, pinguis & oleosa, oleum amygdalar. dulce, sperma ceti, absorbentia marina.
 - 3) Vsi horum resoluentium & præparantium *laxantia* subinde interponantur, vel, in tussi præcipue habituali, iisdem coniungatur.
 - 4) *Motus consuetudinis* si, sublata materia, cedere recusat, sopiatur anodynis correctis, præcipue MP. de cynoglossa.
 - 5) Denique, ad tonum in pulmonibus restaurandum, propinetur mixtura tonico-neruina *Stahlî*: conducit etiam essent. succini, & specificæ aqua veronicæ vinosæ.
2. *Sicca.*
- 1) Hic lenissimæ tantum laxationes, præcipue rhabbarinæ, præmittantur.
 - 2) Deinde, ad sanguinem stagnantem a pectore discutendum, propinentur infusa seu decocta ex herbis veronic. tusilag. heder. terrestr. scabios. succis betonic. capill. vener. consolid. saracen.
 - 3) Sub horum internorum vsu *pediluua* subinde adhibeantur.
 - 4) Denique mixtura tonico-neruina *Stahlî*, & aqua veronicæ vinosæ continuata egregium usum præstant.
 - 5) Si suppressio mensium vel hæmorrhoidum in causa est, iusta methodo in ordinem redigantur.
 - 6) Si scirrhus pulmonum, vel ipsorum cum pleura concretio, hanc tussim sicam prouocat, confert solum methodus priuatiua.
3. Tussis *phthisica* quomodo tractanda sit, videatur tabula de *phthisi.*

B. *Tussis hypochondriaca.*

1. Quando vitium *hepatis* subest, nisi illi consulatur, tussis numquam tollitur. Hinc adfectum primarium, non vero adeo symptomaticum, respicere conuenit: methodum & remedia exhibet *tabula de infarctu hepatis*, qua simul difficultates, quæ hoc negotium circumstant, adnotatæ sunt.
2. Si vero tussis hypochondriaca a vitio *ventriculi* dependet, consideretur, num sicca vel humida existat.
 - 1) *Sicca* quando adparet, non tam in ventriculo, quam circa eundem vitium hæret, & hinc motus sanguinis congestorii in vena portæ respiciantur, & conueniente methodo tractentur. *Conf. tabul. de malo hypochondriaco.*
 - 2) *Stomachalis humida* pectus per consensum adficit & hinc *stomachico-pectoralis* dici meretur: mucus enim, qui in faucibus hæret, & screatu magis quam tussi per diem excutitur, secundum veri similitudinem ex ipso œsophago ascendit, & leuem talem tussim suscitatur; nocturno autem tempore, quo hæc excretio cessat, facile aliquid in asperam arteriam defluit, quod mane iterum eliditur. Hæc sequente methodo tractetur.
 - a) Laxationes leniores cum rhabarbaro, sale Anglicano, magnesia alba præmittantur, & interponantur.
 - b) Deinde adhibeantur remedia, quæ viscosas impuritates a prima coctione pullulantes resoluunt; quo intuitu egregie se gerit essent. pimpinellæ albæ, gentianæ rubr. vel in phlegmaticis essent. helenii, item costus verus parua quantitate masticatus & deglutitus: in eibis conducunt piper, zingiber, sinapi, coriandrum, armoracia, haustus spiritus vini, cubitum eundo, *vid. causel.*
 - c) Mitescente notabiliter adfectu essentia succini, vel in feminis liquor. C. C. succinatus propinetur: Commodum etiam effectum exserit mixtura polychresta *Stablii.*

VIII. CAUTEŁAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Vena sectiones* in plethorica corporis constitutione, quando tempestiue instituuntur, impetum morbi magnopere frangunt; immo ipsam phthisin arcere, & corruptorium illius vlcerosum effectum diu sane retardare valent: Largius autem instituendæ sunt, ne parciore emissio, in primis in brachio celebrata, maiorem sanguinis adpulsum & oppressionem pectoris inuiter.
2. Magis autem necessaria est venæ sectio in tussi *secca* quam *humida*; nisi hanc suppressiones hæmorrhagiarum naturalium vel artificialium præcesserint.
3. Tanto certius requiruntur in tussi venæ sectiones, quando recursus post aliquam remissionem cum impetu quodam pectus & pulmones obruit.
4. *Scarificationes* antea adiuuatae, postea autem neglectae, repetantur.
5. *Purgantia*, uti in tussi *humida* præsentioris sunt effectus, ita in *secca* minus tuto adhibentur; talis enim materia, quæ *fortiter* educenda esset, in illa non reperitur; sufficiunt lenes laxationes.
6. *Sudationes* & *regimina sudorifera* in tussi nullum habent vsum, nisi vltimo loco, sublata nempe materia & placato motu, quæ temporis puncto, ad humores per vniuersum corpus aequaliter distribuendos, & materiæ serosæ ventilationem, adhiberi possunt.
7. In *simpliciore tussi* paucis medicamentis opus est: incidentia enim & materia ad euacuationem præparantia cum laxantibus, vniuersum sæpe negotium absoluunt.
8. Neque conuenit commotiones tusis humidæ non adeo vehementes, sopire, quia non sunt periculosæ: Quando autem motus tales contumaces sunt, & adfluxus vel nimius, vel paucior *acris* adest, sopientia, præmissis præmittendis, locum habent, e. g. MP. de cynoglossa, diacodium Montani recte præparatum, quod vehementius est, quam MP. de cynoglossa.
9. Ad discussionem expediendam minime conueniunt elixiria calida, olea destillata, balsam. sulphur. anifat. salia vola-

volatilia oleosa, tincturæ bezoardicæ, infusum *Isëlis* e zedoar. sale ammoniac. flor. sulphuris, croco, &c.

10. In chronicis pectoris adfectibus *simplicia absorbentia* & terrea tenacem inucum magis augent quam resoluunt; *marina* autem, cum *acido* saturata, vsum præstant.
11. *Squilla* prudenter & modeste vsurpata, in chronicis mucosis malis humores ad euacuationem egregie præparat, *Conf. Stablii dissert. de pectoris adfectibus.*
12. *Expectorantia* vulgato abusui obnoxia, adfluxum humorum ad locum adfectum augent, congestionem seu decubum maiorem reddunt, & potius *per* pectus, quam *ex* pectore (non secus ac purgantia per intestina) euacuant. Hinc in tussi humida, præcipue habiuali, nisi vsus illorum breui abrumpatur, & resoluentia vel interponantur, vel statim subiungantur, phthiseos periculum faciunt, in *sicca* autem tussi certius & citius eandem inducunt. De *glycyrrhiza* in specie notandum, quod spissitudinem non tenacem, sed mollem & pulposam faciat, & hinc præ aliis dulcibus expectorantibus eligenda sit, abstinendum autem a nimio & diuturno illius vsu, alias materia augetur: in præsens tantum vsurpanda, & tunc discussio iuvanda est.
13. *Nitri* moderatus vsus ad expectorationem illius portionis, quæ in pulmonibus iam hæret, plus sane valet, quam vulgus crediderit. Vnde salutariter ad modum iunioribus calidis, in primis tussi sicca laborantibus, ad eundem scopum & orgasmum sanguinis temperandum, exhibetur.
14. *Febricula* quando tussi accedit, vel qualiscunque inquietudo, & appetitus decrementum, tum absorbentia cum acido subtili saturata & nitro remixta vsum habent.
15. Quando tussis a *scabiæ* *retropulsa* dependet, interne sulphur & mercurius dulcis moderato vsu laudari merentur.
16. *Aqua veronice vinosæ*, quæ post digestionem per 8-10-12, dies destillando ita parata est, vt spiritum vini dilutissimum exhibeat, egregiam habet efficaciam discutientem,

- & in recentiori tum hectica, hypochondriaca, tum pectorali phthifica tusi mirificas subinde virtutes exferit, si mane & versus somnum ad uncias II. sumitur, & vsus illius per aliquod tempus continuatur.
17. Ad irrationes placandas *opium* merito damnatur: *cortex* autem *cascailla* vt egregium pectorale discutiens pariter ac sedatiuum se ecommendat, si reliquis iusto tempore subordinetur, *Conf. num. 8.*
18. *Extractum sabaci*, per diurnam coctionem præparatum, tusim pectoralem, non æque autem hypochondriacam, citius sæpe, quam expedit, sedat. Hinc circumspecte exhibendum est: materiam enim circa pulmones hærentem resoluit quidem, & motum corrigit, adfluxum autem humorum non cohibet, vnde periculum suffocationis in vehemente pectoris infarctu adfert; dextre autem propinatum, vnica sæpe dosi ad grana tria vel quatuor exhibita, admirandum edit effectum, & ipsam adeo *chronicam* tusim profligat.
19. *Sulphuris* vsus in adfectibus pectoris catarrhalibus præmissis præmittendis, non reiiciendus est: interne satis efficaciter exhibetur in forma pulueris, florum, aut in oleo amygdalarum dulcium solutum, in forma autem balsami dicti, cum quocumque oleo destillato, ambiguus est effectus. *Vid. num. 9.*
20. *Externe vapor florum sulphuris* halitu attrahi solet, sed longe commodior, & satis euidente efficacia huic par est *fumus antimonii* in cucubulo, sufficiente ignis impetu, fusi; cuius effectus in cohibenda non solum simpliciore, verum etiam suspecta, vlcerosa pectoris tusi, plus semel confirmatus est.
21. *Humida* tusses non promiscue & æqualiter totos pulmones occupant, sed satis frequenter & sensibiliter ex vno saltem latere ascendunt: in tali tusi intemperantia conatus excussorii ab ipsis ægris sæpius fouetur, & hae ratione tusis magis excitatur: hinc a voluntaria tali intemperante tusi serio dehortandi sunt.

22. *Tussis stomachalis*, immo *stomachico-pectoralis humida*, licet vehemens sit, non raro tamen feliciter intra aliquot dies profligata est per vsum spiritus vini, propinando versus somnum 2 - 3. cochlearia: tanto certior autem est effectus, si homines tales potui spirituum ardentium non sunt addicti, & tussis pure stomachica existit.
23. *Oleum anisi*, licet ad pectoris adfectus multis elogiis commendetur, referendum tamen est ad calida illa, quorum num. 9. mentio facta est. Hinc, nisi summa circumspicione adhibeatur, phthisicis, hæcticis, febrilibus accidentibus viam sternere potest.
24. *Incrassantium* vsus in hisce adfectibus semper sit moderatus & rationalis: ante omnia distinguatur *incrassatio volubilis, pulposa* ab altera *tenaci mucosa*; hæc multo peior est & excretionem impedit, qualem effectum edunt *saccharata*, immo etiam *mellita*; illa autem mobiliorem consistentiam conciliat, & interdum necessario requiritur; remedia quæ hoc præstant præcipue sunt *emulsiones* satis saccharatæ, & præ omnibus aliis *glycyrrhiza*, cui *ficus* subiungere conuenit. *Conf. num. 12. & methodus.*
25. *Essentia alexipharmaca Stahlii* successum expectorationis ad modum præsentem sæpissime exhibet; quam proinde & *nitrum*, pro optimis & securis expectorantibus habemus. *Vid. num. 12. & 13.*
26. *Pectus externe unguinosi* illinere, non omni quidem caret efficacia, præcipue in teneris & succulentis; quando autem febrile quid concurrit, minus tuto peragitur, ob pororum obstructionem; & inflammatorio-suppuratorias congestiones hinc metuendas.
27. In tussi *habituali* minime omnium expectorantia conducunt: In hac enim sana ratio dicitur, quod tantum materiae, quantum quotidie excernitur, diu in pulmonibus haerere non potuerit: conuenit potius ventilationes sanguinis iusto tempore instituere, euacuationes serosomucidas catharticas tolerabili quantitate & motu administrare, & pro circumstantiarum ratione repetere; tandem

vero alexipharmaca, diaphoretico-diuretica subiungere, & de reliquo tempus aliquod respirandi naturæ subinde concedere, ne medicationibus adsuescat.

28. Ante omnia ex vfu erit, in eiusmodi casibus habitualibus languentem admonere, vt notabili subleuatione contentus sit, nec plenam restitutionem impatienter adfectet.
29. Tussis etiam *infantum & puerorum* euacuantibus cathartice expugnare, non sine fundamento *Sydenham* commendauit; melius autem est aliquoties tantum euacuationes instituere, quam in crebris purgationibus *curationis neruum* collocare,
30. *Traumatica* licet modice tantum adstringant, viscera & præcipue pulmones stringunt, materiam profundius infarciunt, & hinc malum notabiliter augment.
31. *Frigida & potus frigidus* materiam inspissant & illius excretionem opprimunt: potus vero calidus ad materiæ resolutionem & discussionem commode adhibetur.
32. *Cibi* condiantur antiscurbuticis e. gr. armoracia, nasturtio, sinapi; *acidi* fugiantur, & in pectoris morbis cautus *sic salium* vsus, tam medicus quam diætericus.
33. Sensibiles sedulo sibi caueant a *refrigeratione* capitis, pectoris, & pedum; item a subita permutatione aeris calidi & frigidi, & denique ab *alui obstructione*.

TABVLA XXXII.

DE

ASTHMATE.

Alexander Le Halle's

I. DEFINITIO.

Asthma est liberæ respirationis præclusio; modo ab atonia partium, modo ab humorum tenacitate aut scirrhi pulmonalis concursu, modo a spastica, rigida & actiua contractione

tione originem ducens. Deriuatur ab ἀσθμαζω, an-
helo.

II. DIFFERENTIA.

1. Asthma est
 - 1) vel *defectiuum*, quod a nervorum labefactionibus de-
pendet, & multum cognationis habet cum adfectu illo
catarrhali seniorum, qui circa caput & fauces obringit,
cumque raucedine ac difficili respiracione coniunctus
& in habitum deductus est.
 - 2) Vel *actiuum* seu *spasticum*, hodie *convulsiuum* dictum, ubi
rigida & spastica contentione libera respiratio impe-
ditur.
 - 3) De asthma *defectiuo* hac tabula, de *actiuo* infra age-
mus.
2. Asthma *defectiuum* est
 - 1) vel *humidum*, quod cum humorum tenacium, in primis
bronchiis inhærentium, notabili concursu se se mani-
festat.
 - 2) vel *siccum*, ubi nulla excretio mucosa contingit.
3. Asthma in genere non est adfectus soli *pectori* proprius, sed
etiam aliquando in *hypochondriis* sedem suam habet, & *dys-
pnœa hypochondriaca* vocari solet, quæ modo ante, modo
post partum, post motum corporis & nocturno tempo-
re augetur; effectus tamen ipse in partes pectoris redun-
dat, ob necuorum *recurrentium* cum negotio respiracionis
connexionem, de qua re notabile est *Galenii* de cane, his
nervis interceptis, asthmatico facto, experimentum per
Louuerum in actis Anglicanis repetitum.
4. Asthma raro *idiopathicum*, sed plerumque *symptomaticum*,
nempe tussi valde humidæ, scirrhis collectionibus &
pulmonum læsioni accedens, reperitur.
5. Differt tamen asthma a *tussi*: datur enim asthmatica adfe-
ctio sine notabili tussi, præcipue in statu *sicco*.
6. Asthma ratione recursus paroxysmorum est
 - 1) vel *periodicum*, quod certo per interualla tempore e. gr.
circa æquinoclia,

2) vel

- 2) vel *vagium*, quod incerto tempore,
 - 3) vel *diurnum*, quod die,
 - 4) vel *nocturnum*, quod noctu,
 - 5) vel *continuum*, quod absque intermissione affligit.
7. Asthma differt etiam *gradu*: quo respectu id, quod mitius est asthma, vocatur *dyspnœa*; summus autem gradus, quo ægri non nisi in lecto erecti decumbere possunt, *orthopnœa* appellatur.
8. De asthma *spastico* seu *convulsivo* adhuc notandum est, quod quidem symptoma interdum reperitur asthmatis *defectiui*, ab hoc autem differat
- 1) repentina inuasionem,
 - 2) frequente paroxyzante recursum,
 - 3) exitu breuiore, sæpius funesto.

III. SIGNA.

1. Humidi.

- 1) Sibilus vehementior & sonus spumidæ quasi ebullitionis.
- 2) Laboriosa, difficilis & brevis respiratio.
- 3) Anxietas præcordiorum, ut, quo se vertant afflicti, sæpius nesciant.
- 4) Insignis raucedo, vel ad minimum asperitas vocis.
- 5) Concurret plurimum tussis, quæ aliquid mucii quidem excutit, sed sine leuamine, nisi asthma plane temporarium & ipsius tussis symptoma existat, aut ab hac originem ducat.
- 6) Tempore autumnali frigido & pluuioso hæc respirandi difficultas augetur.
- 7) Aluus magis magisque exsiccat.

2. Sicci.

- 1) Humidus sereatus abest.
- 2) Respiratio est quidem difficilis, sed non brevis, ærem enim haustum diutius retinent.
- 3) Sibilus & sonus acutus, quando inspirant, auditur.
- 4) Tussis non iugiter coniuncta est, bene vero in adfectu inueterato & quando scirrhi pulmonum ad exulcerationem tendunt, aut vera corruptio iam adest.

5) Ma-

- 5) Matutino & vespertino tempore magis affligit.
- 6) Ab inspiratione aëris frigidi & a vaporibus acris facile irritatur.

IV. *SVBIECTA.*1. *Humidi.*

- 1) Phlegmatici, otiosi & obesi facile hunc adfectum incur-
runt.
- 2) Senili ætati, præcipue quando aliæ congestionum spe-
cies incommode cessarunt, plus quam omnibus aliis
obtingere solet asthma.
- 3) Iuniori ad modum ætati minus familiare est, nisi ab ex-
traneis causis inducatur, e. gr. vaporum, puluerum
corresiuorum, aëris frigidi, humidi &c. admissione
scabiei, in primis sicca, ferinae vel aliorum capitis im-
petiginosorum inquinamentorum retropulsione, a va-
riolarum aut morbillorum reliquiis in veram phthisin
abeuntibus: item a causis violentis externis, vitio hæ-
reditario, morbo venereo, male curato, &c.
- 4) Qui consuetas sanguinis emissiones neglexerunt.

2. *Sicci.*

- 1) Homines strictioris habitus magis, quam quibus is laxior
est, hoc malo corripuntur. In primis
- 2) Iuvenes floridae & plethorice constitutionis, qui ordi-
narie quidem otiosi sunt, nonnumquam autem vehe-
mentes corporis motus subeunt.
- 3) Hypochondriaci sinistre curati & scirrhus viscerum alia-
que laborantes.
- 4) Qui fodiendis & repurgandis metallis manus admo-
vent.
- 5) Præcipue, qui ab euacuationum sanguinis consuetarum
intermissione prægranati sunt.

V. *CAYSSAE.*

1. Causa asthmatis defectiui cum tussis causa plurimum con-
veniunt & ex iis, quæ sub *differencia* diximus, illustran-
tur.
2. Nempe asthmatis causa *continens* est materia mucido-vi-
scida circa pectus copiosius collecta.
3. Causa *antecedens & concomitans* est flacciditas texturæ pul-
mo-

monalismembranaceæ ex prægressis pectoris congestio-
nibus & neruulorum, non tam intercostalium, quam pul-
monalium; vnde paucis momentis talis humorum ad-
fluxus contingit; quod fieri non posset, si nerui illi in de-
bito tono seruarietur,

4. In grauiore autem & insolito asthma nervi etiam interco-
stales, pulmonibus propinquiores in consensum trahun-
tur.
5. Cum his omnibus in asthma præcipue *siccò*, tamquam
caussa *primaria* conspirat plurimum actiua humorum
versus pectus congestio, euacuationi hæmoptycæ desti-
nata.
6. Causse *occasionales & aduentitia* sunt:
 - 1) Euacuationes sanguinis naturales suppressæ, vel artifici-
ales neglectæ.
 - 2) Tussis humida deprauata.
 - 3) Flatulentia anoterica.
 - 4) Mutatio vitæ generis laboriosi in otiosum.
 - 5) Mala pectoris conformatio & gibbosa.
 - 6) Concretio pulmonum cum pleura.
 - 7) Puluerulenta per respirationem intra pulmones hausta,
a quibus collectio scirrhusa, immo tophacea induci
potest.
 - 8) Halitus mercuriales, arsenicales, saturnini & subtiles
orgastici.
 - 9) Diurnæ refrigerationes.
 - 10) Oedemata retro pulsa,
 - 11) Abusus opiatorum in tussi præmature consopita.
 - 12) Abusus spirituosorum.
 - 13) Hydrops ascites.

VI. PROGNOSIS.

1. Asthma generatim est adfectus valde pertinax, præcipue in
annosis, gibbosis & polyposis, vbi immedicabilem sæpe
contumaciam induit.
2. Inualecens iunioribus minatur scirrhus, suffocationes pe-
ctorales, immo si materia in bronchiis hærens acrimo-
niam concipit, pulmonum exulcerationem & phthisin indu-

inducit; quo casu ne seuiores quidem a phtifica hac exulceratione liberi sunt.

3. Asthma in corpore stricto peripneumoniam, in laxo & humido facile cachexiam aut hydropem inducit.
4. Mitigatum asthma ob diætæ errores facile recrudescit.
5. Difficilius curatur asthma absente, quam concurrente tussi: hæc enim quando non adeo enormis est, excretionem materiæ aliquo modo promouet.
6. Hæmorrhoides asthmatici superuenientes malum notabiliter sæpius mitigant; id quod eo certius contingit, si adfectus ab earum suppressione ortum traxit.
7. Vbi materia valde tenax & pauca existit, ibi pertinacissimum est asthma cum concurrente phtisi.
8. Iuniores asthmatici, qui vel a retropulsione scabiei & impetiginis, vel a variolarum reliquiis in hoc malum coniecti sunt, certo tandem in phtisin transmigrant.
9. Asthma *siccum* inueteratum raro funditus tollitur, si autem in tussim siccam mutatur, spes melior curationis adfulget.
10. Asthmatici *siccis* diuturno cachexia, oedemata & hydrops succedunt, in primis quando asthma hocce nocturno potissimum tempore adfligit.
11. Scirrhus hepatis, vel etiam alia viscerum labeles quando cum asthma coniunctum est, malum vel insanabile, vel curatu difficillimum reddit.
12. Asthma hæreditarium numquam fere curatur.
13. Asthmaticus status, febribus acutis superueniens, omnino suspectus est.
14. Orthopnoea quando accedit, plerumque breui tempore funesta fit.
15. Asthma venereum non nisi sublato morbo primario, curationem admittit.
16. Qui gibbosi ex asthma aut tussi fiunt, ante pubertatem pereunt.
17. Quo magis attollitur pectus eum scapulis in asthmaticis, eo periculosior est status.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *Humidi.*

1. Huius medicatio partim congruit cum tussi humida, partim ab illa differt.

1) Conuenit

a) materia copiosa vappida, hic etiam præsentè;

b) resolutione materiæ.

c) discussione materiæ, seu potius motus illius, ne decubitus ad locum adfectum perpetuo contingat.

2) Differt aliquo modo *euacuatione*: materia enim non solum resolucenda, sed & euacuanda atque excutienda est.

2. Hinc, præmissa laxatione, ad infarctus mucosi resolutionem exhibeantur remedia illa resoluentia, quæ præcedente tabula indicata sunt.

3. His per aliquod tempus continuatis, ad materiæ præparata euacuationem respiciatur.

1) In robustis ac bene dispositis natura ipsa huic excussioni sufficit.

2) In aliis puluis nitrosus, versus somnum exhibitus tussim vehementem excitat, cuius ope materia soluta intra aliquos dies feliciter euacuatur, quo factò tussis sponte iterum euanescit.

3) In aliis materia resoluta per laxantia commodius eliminatur. *Conf. ubique methodus tab. præced.*

4. Denique mitescente adfectu, *tonica* propinentur & congruum regimen prophylacticum præscribitur.

1) Scopo tonico inseruiunt mixtura ex spiritu C. C. & tinctura antimonii tartaritata, ess. succin. & lign. sassaf. decoct. ex rad. gent. rubr. & herb. veron. heder. terrest. hepatic. nob. scord. sem. foenic. cort. citr. & cinnam. It. succi harum herb. cum tantillo balsam. Peruu. aut de Copaina &c.

2) Dieta sit moderata, animus quietus, motus corporis sufficiens. In primis respiciatur causa illa, ex qua asthma natum est, e. gr. suppressiones hæmorrhagiarum

rum naturalium, vel omissiones artificialium. Aer frigidus & humidus fugiatur.

B. Sicci.

1. Huius tractatio cum tussis siccae methodo in genere prorsus conuenit, modo per plures dies medicatio continetur, & venæ sectio æquinoctialis instituat. In specie sequentia notentur.
2. Quando asthma siccum a retropulsis superficialibus inquinamentis aut tumoribus dependet,
 - 1) Lenia laxantia ex mercurio dulci, extr. panchym. *Croliit* & MP. de succin. *Cratonis* ordinanda sunt.
 - 2) Materia retropulsa *corrigitur* per absorbentia siue simplicia siue acidulata. *Expellitur* per decoct. ex rad. chin. sassaparill. scorzonera, vincetox. herb. scord. fumar. lign. sassaf. aut ess. alexiph. sigillatim per modestum sulphuris usum, cuius aliquot grana, absorbenti cuidam mixta, & ter per diem repetita, bene se gerunt.
3. Asthma siccum ex *flatulentia* ortum per clysteres & temperata stomachica tractatur.
4. Quando autem scirrhi hepatis vel lienis hoc malum suscitant, methodo, in tab. horum adfectuum proposita, utendum est.
5. Si atonia pectoris in asthma sicco potissimum peccat, decocta ex speciebus roborantibus profunt.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ cautelæ *precedente* tabula traditæ sunt, illæ etiam in adfectibus asthmaticis obseruandæ commendantur.
2. In primis *expectorantia* in asthma, tanto magis sicco, quovis modo fugiantur, quia ad pulsus humorum, qui per illa ad pectus inuitatur, nihil certius, quam ulcerosofanosam corruptionem eius modi scirrhis collectionibus inducit.
3. *Emitoria* non promiscue, sed tantum in asthma stomachali præmissis incidentibus & resoluentibus sunt usurpanda.
4. Ab *adstringentibus, acris* & vulgaribus *opiatis* abstinendum est.

5. Quo magis adfectus est *chronicus*, eo potentiora resolutio requiruntur, e. g.
- 1) *Rad. imperat. angelicæ*, petasit. aristol. vtriusque, zedoar. leuist. bardan. apii, dracunc. præcipue commendari meretur in asthma humido rad. ari, in maiori etiam dosi & repetitis vicibus exhibita,
 - 2) *Herb. antiscorb. trifol. fibr. fumar. nasturt. beccabung.*
 - 3) *Ligna antiueneræ, quaiaci, fallasfr. iuniper.*
 - 4) *Sem. ammios, dauci.*
 - 5) *Baccæ iuniperi.*
 - 6) *Gummata penetrantiora, nominatim gummi ammoniac. quod non solum resoluit, sed etiam per pulmones & alium materiæ euacuationem quodam modo promouet.*
 - 7) *Ex compos. spir. sal. ammoniac. vrinof. liqu. c. c. succ. in phlegmaticis, potiuncula Brunneri e gum. ammoniac. vnc. semis, in acet. squillit. vnc. I. solut. add. aquæ veronic. vnc. II. ol. tart. per deliqu. gr. X. XII. sacch. vnc. semis.*
6. Extra paroxysmum optima est medicatio: si autem suffocationis periculum vrget, blanda incidentia & expectorantia, inprimis vero sperma ceti in iusculo calido ægrotis exhiberi possunt.
7. *Vena sectio* in asthma sicco, nisi statim in principio paroxysmi instituat, vel post octo dies *secunda* subiungatur, nil iuuat.
8. In asthma senili & flaccida præsertim paralytode pulmonum læsione, atque aliis humidis pectoris constitutionibus chronicis egregie conuenit diuturnior vsus *aque veronica vinosæ* destillatæ, it. *aquæ hyssopi*: porro dicta vinosæ, leniter aromatizata resoluentibus & balsamicis iungeada.
9. *Cinnabaris antimonii*, in aqua quadam asthmatica propinata, ab *Oswaldo Kremser* ad modum extollitur, & eius ope ægrum talem intra mensis spatium restitutum esse adieuerat.
10. In subiectis humidis, *asthma humido* laborantibus, adflus discutitur & pectus quodam modo roboratur per

modestam inspirationem *fumæ ex antimonio* fuso adscendens.

11. *Baglinus* particulas *nitrosas* inter *arandum* respiratione attrahendas, asthmaticis commendat; quod remedium politicum, ad placidum & continuum motum corporis impetrandum, non reiiciendum est.
12. Dantur exempla asthmatica, in quibus constrictio humorum non solum versus pulmones, sed totum etiam caput contingit, ubi *sabaci usus* mediocris, & quidem mane ieiuno stomacho adhibitus, subleuationem adfert.
13. *Segmenta pinæ*, fornaci calefactæ imposita, fundunt resinam, cuius vapor, naribus attractus, in adfectibus asthmaticis tussiculosis sensibile leuamen aliquando attulit.
14. *Vrtica urens* specificè solet laudari, ita quidem ut vel in forma decocti vel quod melius, in substantia nempe radix, herba & semen ad scrup. I. luna decrescente sumatur. Solum semen est *D. Michaelis* specificum.
15. *Fonticuli & vesicatoria*, suris adplicata, num aliquod leuamen asthmaticis adferant, ulteriori experientie relinquimus.
16. Conferatur *Horlacheri* scriptum germanicum de catarrhis, quo fabulis anilibus contradicit, ac si in asthmaticis talibus catarrhis aliquid ex capite in cavitatem arterie *asperæ* defluat.
17. Quo magis *asthma siccum* existit, eo consultius curæ initium cum *venæ sectione* in pede faciendum est.
18. *Scarificationes & hirudines*, locis hæmorrhoidalibus adplicatæ, etiam commendari merentur.
19. Ultimo loco adicimus *casum notabilissimum* in puero quodam 14. annorum, qui, quum asthmate per integrum annum adfectus fuisset, insigni hæmoptysi tandem corripiebatur. Hæc sanguinis reiectio, quæ frustra coagulata continebar, per aliquot hebdomadam interualla aliquoties & tanto quidem imperu repetebatur, ut mortem singulis horis expectaremus, præcipue quum uersum corpus summe extenuatum esset, & facies *Hippocrata-*

postratica conspiceretur. Verum enim vero mox surgebat hic tabidus, edebat, dormiebat & intra mensis circiter spatium, vniuersi corporis incrementa, non turgida, sed solida & genuina capiebat. Quum vero exiguo hoc tempore corpus vere saginatum recuperasset, atque, præter asthmatis consueta incommoda non haberet, de qua re conquereretur, subito incipiebat lugere, atque ab omni cibo abstinere, donec septimo die exspiraret. Facta cadaveris sectione ne minima quidem pulmonum vestigia reperiebantur, vasa autem sanguinea, in congoriem quasi furculorum colligata, cum pleura concreta erant, & cor in suspenso tenebant.

TABVLA XXXIII.

DE

PALPITATIONE CORDIS.

I. DEFINITIO.

Palpitatio cordis est spastica cordis contractio, per intervalla insulcans: quo vehemente, licet orroneo motu principium vitale vel abundantiam sanguinis per sinceram euacuationem imminuere, & simul crassa illius corrigere, vel collectionem scirrhosam aut concretionem polyposam abstergere & remouere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Palpitatio cordis est
 - 1) vel *idiopathica*, quæ rarius occurrit,
 - 2) vel *symptomata*, quæ aliis morbosis adfectibus supervenit.
2. Palpitatio cordis *vera* distingui debet a nudis fortioribus cordis commotionibus & sanguinis orgasmo; quæ incommoda ab improvise terrore & ira, vel a vehementibus

bus prægressis motibus corporis oriuntur & subito plerumque transeunt.

III. SIGNA.

1. Vehemens pulsatio cordis ad partes solidas thoracis, ita vta circumstantibus sæpe videri, immo audiri possit.
2. Arteriarum quoque, præcipue carotidum in collo, fortior conspicitur pulsatio.
3. Præcedunt nonnumquam vel coniuncta sunt
 - 1) Anxietas præcordiorum ad sudorem vsque.
 - 2) Languor artuum.
 - 3) Pallor faciei.
 - 4) Respiratio anxiosa, cardialgica, cum intercepto libero vocis vsu.
 - 5) Lipothymia.
4. Adstrictio alui sæpius complicata est.
5. Flatulentia itidem in abdomine detenta.
6. Quando remittit palpitatio, multum animi & corporis languorem atque virium defectum post se relinquit.

IV. SVBIECTA.

1. Hic adfectus frequentius euenit plethoricis, specularibus & vitæ sedentariæ deditis.
2. Specialiter hypochondriacis, scorbuticis & hysteriis, vitio mensium laborantibus.
3. Plerumque obtingit iuuentuti, & ex hac in adultiorem ætatem transcendere solet.
4. Spontaneis euacuationibus sanguinis adsuetis, quæ vero iterum cessarunt.
5. Qui adsuetas sanguinis ventilationes statis temporibus non continuarunt.
6. Qui animi pathematibus, iisque suppressendis, facile mouentur, præcipue qui terrore conturbantur: vnde nonnumquam *idiopathicus* adfectus induci observatur; de qua re notabile exemplum sub *cautelis* legendum est.
7. Qui diutius sub cælo frigido quiescunt.
8. Temperamentum melancholicum præ aliis huic adfectui obnoxium deprehenditur.
9. Præcipue virgines pallidæ chloroticæ iuniores, quarum

menses vel nondum eruperunt, vel suppressi sunt, & tamen laboriosa molimina ad eorum productionem conspirant.

10. Qui febres acutas vel intermittentes partu riunt.
11. Plethorici quidam nonnumquam sub somno palpitationibus cordis corripiuntur, & quando terrore alicuius insomnii excitantur, palpitationem talem vigiles aliquamdiu adhuc persentiscunt.
12. Qui polypos cordis habent, palpitatione hac cum difficili continua respiratione corripiuntur.
13. Deprehenditur etiam superuenire subiectis hæmoptycis, & quando in pulmonibus scirrhosa quædam labes est.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est
 - 1) vel plethora & spissitudo sanguinis.
 - 2) vel polypus cordis aut scirrhus pulmonum, aut tubercula cordis.
2. Hæc natura tamquam causa *efficiens* imminuere, corrigere & abstergere intendit, ac proinde, licet ex errore, humores versus pectus copiosius restringit. Falsa itaque est illa pathologia, quæ hunc motum auctiorem a stimulatione & irritatione cordis derivare vult.
3. Causæ *occasionales & præcæretica* sunt:
 - 1) Animi pathemata, e. g. improvisus terror, timor, tacita & suppressa indignatio; quibus omnibus restrictio humorum versus interiora contingit: licet enim palpitationes cordis, ab hisce animi pathematibus dependentes, rariores sint, quam quæ a materialibus causis oriuntur, vix vllum tamen exemplum contingit, in cuius palpitatione non aliqua animi anxietas conspiret.
 - 2) Euacuationum, præcipue sanguinearum, adsuetarum suppressio vel neglectio, e. g. obstructio mensium, hæmorrhoidum, neglectæ venæ sectiones, purgationes, obstructio alui &c.
 - 3) Diæta lauta.
 - 4) Vitæ genus sedentarium, speculabundum.

5) Pal-

- 5) Palpitationes cordis in adolescentibus, & puellis menses nondum expertis, non raro a *vermibus* fouentur.
- 6) Reliquæ causæ occasionales præcedente membro indicatæ sunt.

VI. *IRROGNOSIS.*

1. Initium huius adfectus non adeo fonticum est; quo magis autem inualefcit, & in consuetudinem degenerat, eo maioris fit periculi.
2. Quo plures causæ concurrentes conspirant, eo maior est metus, & familiarior palpitatio recidiva, cum primis quia leui etiam occasione hic adfectus solet reuadescere.
3. Varia deinde mala pectoris emergere possunt nempe inflammationes, hæmoptyses in iunioribus, polypi cordis, infarctus viscerum.
4. Frequentius febres post se relinquit, quæ periculo non vacant, transeunt enim facile in statariam, diurnam, pessimam sanguinis commotionem.
5. Immo morbi conuulsiui, vel aliquando desertiones tonica & adfectus paralytici inde prouenire solent.
6. Qui polypos in corde gerunt, ex improviso sæpe moriuntur.
7. In hypochondriacis & hystericis plerumque sine periculo occurrit.
8. Si in his hæmorrhoides & menses ordinatim fluant, malum mitigatur, quandoque etiam tollitur.
9. Palpitatio cordis, quando a *nudo* terrore exoritur, quod tamen raro contingit, malum curatu est difficillimum.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. Præmittitur *euacuatio* primarum viarum per rhabarbarinam, sennam, melanagoga.
2. Deinde, ad *plethoram* imminuendam, venæ sectio in pede instituat, sed sufficiente quantitate & magna incisione, alias directe ad palpitationem cordis nulla datur medicatio.
3. Post venæ sectionem, ad *orgasimum* sanguinis temperandum, exhibeantur temperantia, nitrosa, cinnabarina, acidulata, e. g. nitrum depuratum, conch. præparat.

rat ocul. cancr. mat. perlar. cinnab. antimon. tinctur. bellid.

4. His per duos vel tres dies continuatis, *spissa* sanguinis *crassis* respiciatur. Hanc corrigunt
 - 1) Præ omnibus aliis motus corporis *placidus & diuturnus*, cum potu sufficiente ac diluto.
 - 2) Alexipharmaco - diuretica, e. g. essent. alexipharm. *Stahlii*.
 - 3) Antiscorbutica temperatiora, nempe nasturtium, beccabung. cochlear. trifolium fibrinum.
 - 4) Anticatarrhalia.
5. Denique ad motum erroneum sedandum, & æqualem sanguinis distributionem promouendam subiungantur
 - 1) *Interne*.
 - a) Mixtura tonico-neruina *Stahlii*, ex spiritu quodam volatili vrinoso & tinctura alcalina acri parata; item essent. succin. crocus exigua dosi exhibitus.
 - b) Gemmata analeptica: tinctura coralliorum, confect. de hyacinth. alkermes, vinum rubi idæi, condit. citr. &c.
 - c) Anodyna correctæ: M. P. de cynoglossa, pilulæ *Wildgansii* genuinæ.
 - 2) *Externe*
 - a) clysteres reuulsorii.
 - b) Pediluuiæ.
 - c) Adpensio camphoræ.
 - d) Epithema cordiale ex aqua carbunculi, Anhaltina, essentia croci, castorei, balsam. vitæ.
 - e) Epithema *Foresti* ex herb. meliss. borrag. cum aceto & aqua rosarum.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Vena sectio* in hoc adfectu numquam prætermittatur, absque enim illa omnis medicatio minus efficax erit.
2. Extra paroxysmum instituta efficacior quidem deprehenditur, præcipue si adiuuata fuerit neglecta, sed circumstantiæ hanc moram non semper tolerant: hinc eo tantum respiciatur, ut sub paroxysmo, non adeo exacerbato,

- to, administratur, ne commotiones febriles exoriantur.
3. *Malum hypochondriacum* quo magis conspirat, eo magis salia media digestiua cum pulueribus nitroso - temperantibus remiscenda sunt.
 4. In *chlorotica virginum* constitutione pilulæ *Stahlina*, *Becheriana*, vel amara cum laxantibus & martialibus per 8 - 14. dies præscribantur.
 5. Quando *mensium* vel *hemorrhoidum* adfuetus fluxus suppressus est, tum extra paroxysmum conueniente methodo reuocetur.
 6. Quando alii adfectus, vt vitia pulmonum, polypus cordis &c. ad palpitationem cordis ansam præbent, eorum cura est respicienda.
 7. Vbi *vermes* in suspensionem veniunt, ibi anthelmintica propinentur.
 8. Concurrente *scorbuto* antiscorbutica, sub methodo commendata, cum alexipharmaco - diureticis combinentur.
 9. Vulgaris ordinatio cordialium acriorum neruorum & spiritibus dicorum, nihil ad hunc adfectum confert.
 10. Cauendum a sanguinis, in mobilitate sua impediti, subita fortiore commotione: item a remediis valde calefacientibus.
 11. Vomitoria & purgantia fortiora exsulent, adfectum enim peiorem reddunt.
 12. Numquam ad *motus sopitionem* properetur, nisi causa materialis, nempe plethora & spissitudo sanguinis, prius remota sit: exceptis illis rarioribus casibus, vbi *sola* animi pathemata, e, g. mœrores, terrores, anxietates, metus in culpa sunt, in quibus gemmata cum M. P. de cynoglossa sufficiunt.
 13. Præ aliis gemmatis laudatur *hyacinthus vera*, quæ sane, placando trepidantem naturam, ad pauidos tales adfectus notabilem efficaciam præstat.
 14. Deinde etiam *smaragdus vera*, exiguis dosibus, nempe gr. ʒ. ʒ. exhibenda.

15. Hæc gemmata, tonica analeptica cum nitrosis, cinnabarinis, longo interuallo post se relinquunt *opiata*, quæ recidiuas inducere obseruantur.
16. *Martialia* & *salia volatilia*, præmature exhibita, malum in grauius mutant.
17. *Pedilunia*, præmissis generalioribus, cum effectu versus somnum vsurpantur, præsertim si palpitatio cordis magis nocturno, quam diurno tempore exacerbetur.
18. *Thermarum* & *acidularum* vsus ad spissitudinem sanguinis resoluendam, non penitus est reprobandus; vti balnea *domestica*, cum moderamine vsurpata, proficiunt.
19. Methodus prophylactica, per venæ sectiones æquinoctiales & pulueres nitroso-temperantes, nunquam ommittatur, vt pote quæ interdum plus facit, quam curatoria.
20. Diæta conueniens, & causas occasionales excludens, vbi que iniungatur.
21. Præcipue animus modeste & tolerabiliter exhilaretur; quod vinum modice & medice vsurpatum, præ aliis præstat, nisi scorbutus vel orgasmus sanguinis, in primis autem febres acutæ, ardentes, immo intermittentes, contra indicent.
22. Mutatio vitæ otiosæ, speculabundæ, sedentariæ, in mobilem & laboriosam plus sane ad sanguinem attenuandum confert, quam vniuersus medicamentorum adparatus.
23. Coronidis loco subnectere placet eminent exemplum, quod egregie confirmat, in palpitatione cordis *quantitatem* sanguinis, & illius *spissitudinem*, magis esse respiciendam, quam fictam acrimoniam scorbuticam. Vir quidam ad annos quinquaginta natus, plethoricus & vitæ sedentariæ magis quam laboriosæ deditus, temperamenti sanguinei, leuiter cholericæ, animi commotionibus, in primis terrore, facile obnoxius, quum annum ægeret tricessimum tertium, arcessibatur, vt coniuges quosdam, contentionebus distractos, in pristinam reduceret concordiam. Gembundus citato pede aduolabat, quumque scalam veloci hoc

hoc cursu adscenderet, vehementissima cordis palpitatione cum præcluso sermonis vsu corripiebatur, & totam horam inter summas præcordiorum angustationes absumebat. Post ea hic adfectus innumeros fere habuit recursus, atque per multos annos & Patientem & Medicos multum vexauit. Simul ac enim, commotiones animi accesserunt, vel corpus celeri cursu, scansione montium, scalarum &c. vehementer commotum, aut caput versus terram præceps incuruatum fuit, malum hoc cum tanta vehementia Patientem infestauit, vt non adstantes solum, sed alii in altero hypocausto horrendos illos pulsus, qui per quinque interdum horas durarunt, audirent. Huic afflictioni multi Medici multa quidem remedia opposuerunt, quoniam autem, vt plerumque moris est, plethoram & spissitudinem sanguinis non respiciebant, sed acrimoniam tantum illius corrigere intendebant, radicem huius mali extirpare non potuerunt. Tandem patiens, quoniam leuamen ægritudinis suæ in hominibus hætenus viderat nullum, animum erigebat, atque supremi Numinis auxilium precibus quærebat. Post preces somno placido utebatur, atque per insomnium videbat *lanceolam*, qua venam in brachio secare, & ter multum sanguinis emittere cohortabatur: er solte die Alder drey mahl sein hoch springen lassen, so würde er gesund werden. Experrectus nouum Medicum vocabat, atque huic, quid ea nocte in somno sibi euenisset, enarrabat: quumque & Medicus & æger hoc insomnium non a lusu phantasiæ, sed ab altiori principio deriuarent, venæ sectionem instituendam decernebant. Hac peracta Patiens intra quatuor hebdomades a malo suo, quod per sedecim annos durauerat, ita restitutus est, vt grato in Deum animo hæc verba sæpius repeteret: *ex periculo ereptus sum.*

TABVLA XXXIV.

DE

P H T H I S I.

I. DEFINITIO.

Phthisis est ulcerosus pulmonum adfectus, a stasi sanguinis ibidem collecta, & in corruptionem deducta oriundus, atque lenta corporis extenuatione maxime conspicuus. Deriuatur a φθῆσι, consumo, tabesco.

II. DIFFERENTIA.

1. Phthisis differt *gradu*: in læsione enim pulmonum est vel ulcerosa tantum dispositio, vel vera iam & consummata ulceratio.
 - 1) *Vlcerosa dispositio* nihil aliud est, quam collectio & infarctus scirrhusus materiæ tenacis & viscosæ, seu etiam mucidæ portionis sanguinis; quæ materia lentescens, disculis repente partibus fluidis, in duritiem, & calcaream consistentiam abit, atque *nodos* seu *tophos* format, & hinc in actum corruptionis non ita promte deducitur. Hæc est ratio, quod tabidi in hoc statu per plures annos vivere possint, & vix aliqua phthiseos suspicio in plures cadat.
 - 2) *Vera exulceratio* dicitur, quando ulcerosa hætenus, ad corruptionem disposita, scirrhusa collectio altiores radices egit, & vlcus iam erumpens vel plane consummatum constituit; sub qua constitutione febris *hæctica* cum reliquis symptomatibus exacerbatur, & æger intra breue tempus consumitur.
2. Cum hoc tophaceo & ulceroso statu nonnumquam etiam coniuncta est *concretio pulmonum cum pleura*; quamquam nonnulli recentiorum ex obseruationibus anatomicis adstruere volunt, hanc concretionem in plurimis subiectis reperiri, & ita ad statum naturalem pertinere.

3. Phthiſeos differentiam ab *hectica abdominali* anxie quæ-
rere, vix vllam in praxi habet vtilitatem. Sicut enim
remedia placide reſoluentia & diſcutientia, ac, ſine omni
acredine, baſamica phthiſicorum vnica ſunt ſolatia, ſic
etiam iisdem, & eadem quidem methodo, hecticis ſtri-
cte dictis ſubuenitur. Sequentes tamen obſervationes
hanc differentiam & diagnoſin præcipue docent.
- 1) Hectica abdominalis ſemper inuoluit febrem, phthi-
ſis autem aliquando ſine febre, ad minimum notabili,
obſeruatur.
 - 2) Si a profunda æris attractione tuſſis augetur, & angu-
ſtia ſeu reniſus in pectore ſentitur, tum eſt læſio pul-
monum.
 - 3) Tuſſis pulmonalis, niſi grauiffimæ commotiones ſuppu-
raſcentes iam adſint, cedit extracto *sabaci*, abdomi-
nalis non item.
4. Sic etiam phthiſis ab *atrophia* infantum non niſi loco & ætate
differt; nempe atrophia eſt læſio glandularum meſente-
rii, pancreatis, vel ipſius quoque hepatis, infantili ætati
communis; phthiſis autem læſionem pulmonum inuol-
uit & iuuenili ætati familiaris eſt. De reliquo quoad cauſ-
ſam continentem prorfus conueniunt.
5. Differt etiam phthiſis a *marafmo* ſenili, ſeu illa corporis
extenuatione, quæ annofioribus e quacumque cauſſa ob-
tingit
6. Phthiſis differt quam maxime a *vomica pulmonum*, nam
- 1) in *phthiſi* eſt *vlcus* ſtrictè dictum, in *vomica* autem *abſces-
ſus* ſeu *apoftema*. Falfum enim eſt axioma; *vbi pus, ibi
vlcus*, nam in *puris* efformatione tota differentia apo-
ſtematis ab vlcere fundatur.
 - 2) Vlcus phthiſeos in partibus *exſanguibus*, humidis tamen
& mollibus, reſidet, apoſtema autem in *ſanguiferis* re-
peritur.
 - 3) Hinc *vomica*, tam breuioris & præcipitis eſt ſucceſſus,
vlcus autem phthiſicum longioris periodi.
 - 4) Phthiſis licet ex *vomica*, non lethaliter rupta, ortum ſume-
re poſſit, euidens tamen manet differentia rei *ſucceden-
tis a præcedente*.
- P p 5) Im-

- 5) Immo licet vicissim ex vlcerosa pulmonum constitutione vomica tandem erumpere possit, per accidens tamen hoc tantum contingit, nempe quando vasa eroduntur, & præceps inflammatio vlceri *segniori* phthifico superuenit; rara autem huius successione vomicæ sunt exempla.

II. SIGNA.

1. Phthisis *lenius* incipiens vix vlla habet signa, nam eo tempore exigua solum *tussis* sese manifestat.
2. Tussunt autem omnes tere phthifici, plerique *acrius*.
 - 1) Alii cum multa *excretionē*,
 - 2) Alii cum pauca,
 - 3) Alii cum nulla, & hoc quidem vel sub initium, vel in fine.
Conferatur Hippocrat. aphor. 16. Sect. III.
3. Tussim autem quamcumque, etiam diurnam & notabili excretionē conspicuam, pro certo phthiferos signo declarare, error est satis communis: nam vitia primæ concoctionis tussim prouocant, phthifica interdum maiorem.
4. Hinc in phthiferos diagnosi signa *facia* semper sunt coniungenda, nempe
 - 1) *Ætas* infra sub *subiectis* adnotata.
 - 2) Tussis diurnitas, & illius exacerbatio ab aëre frigido, halitibus acerbis, acidis adsumtis, & profunda respiratione.
 - 3) Materia profundius excussa, sanguineis striis infecta, odorata, saniosa aut puris æmula, sæpius etiam coloris cineritii & subnigri.
 - 4) Pectoris angustia cum sensu rei cuiusdam illud comprimentis.
 - 5) Virium lapsus.
 - 6) Deiectio adpetitus, vel frigidorum tantum cupido.
 - 7) Somnus non reficiens sed magis delatans.
 - 8) Siccitas oris & saliuæ glutinosa
 - 9) Calor hecicus post prandium in partibus exterioribus, in prunis vero in manuum volis se exferens.
 - 10) Facies rubicunda & turgida, præcipue crescente hecico calore.

- 11) Pulsus pro gradus præcipue diuersitate variat: modo enim paruus & debilis, modo febrilis, modo serratus ac inæqualis deprehenditur.
 - 12) Sensibilitas & impatientia *animi* subiracundi.
 - 13) Sensibilitas etiam *corporis*, præcipue circa mutationem aeris.
5. Si his signis accedant prægressæ violationes pulmonum, & dispositio hæreditaria, tum certitudinem phthiseos fere indubiam reddunt. Tales violationes pulmonum contingunt
- 1) in hæmoptysi.
 - 2) in peripneumonia.
 - 3) per violentas externas contusiones & vulnerationes.
 - 4) per diuturniorem inter corrosiuos minerales, sulphureos vapores obuersationem.
6. Quando autem his omnibus conspicua extenuatio totius corporis, & ultimo etiam faciei, quæ *Hippocratica* adpellari solet, cum notabili *febre hæctica* accessit, de phthisi *confirmata* non magis est dubitandum.
7. Sputum *purulentum* est quidem phthiseos *consummata* certissimum signum, sed non vnicum: datur enim phthisis ad *ἀκμὴν* deducta, sine tali sputo; nempe in iis, quibus vlcus bronchiorum, aut membranaceæ pulmonis portio- nis, citra sanguinis concursum adhuc perstitit.
8. Pro sputo autem purulento non debet reputari materia illa crassa, pultacea, e flauo viridescens, quæ in tussi quoque simplice innoxia solet excerni.
9. Urinæ phthisicorum sanis frequenter sunt simillimæ, nisi quod spumam diutius seruent: hoc tamen in simplice etiam tussi, & habitu phlegmatico contingit.
10. Interdum vero etiam intense rubræ, interdum colorem urinae febrium intermittentium æmulantes & sedimentum farinaceum album, aliquando etiam subrubrum deponentes.
11. Si *vomica* pulmonum phthisi superuenit, febris, alias lentescens, acutam indolem induit, & tussis antea dolore

obtusio incommoda, iam interlancinante adfligit, & respiratio maiore difficultate laborat.

12. *Diarrhæa* & *sudores colliquatiui*, defluuium capillorum & aphthæ, quando proueniunt, de malo *consummato* restantur.
13. *Tophi* pulmonum admodum latent, & vix aliqua signa diagnostica manifesta præbent, nisi quod
 - 1) Iussis sicca sonora & quasi clangens cum respirandi difficultate & sensu doloris in pectore interdum eos prodatur.
 - 2) In quibusdam post motum aut tussim fortio rem eiusmodi globuli, pus vel materiam viscidam continentes, excernuntur,
14. Neque etiam *concretio pulmonum cum pleura* in viuis ex certis & indubiis signis cognosci potest, nisi quod in quibusdam insolita pectoris angustia occurrat.

IV. SVBIECTA.

1. Phthisis in pauciora subiecta cadit, nempe quamplurimum in iuuenes ab anno XVIII. ad XXXV. *Conf. Hippocr. aphor. 29. sect. III. aphor 7. sect. VIII.*
2. Ex his autem homines plethorici, sani, floridi, otiosi, cholero-sanguinei, magis in phthisin prolabuntur, quam mucosi, scorbutici, phlegmatici, laboriosi.
3. Seu, quod idem est, longe maiore numero phthisici fiunt, qui hæmorrhægis frequentioribus, capitis doloribus æstuosis & lancinantibus, hemicranis acutis, respirationis difficultati a motu corporis citatiore, & veræ hæmoptysi expositi fuerunt, quam qui obnoxii sunt catarrhalibus defluxionibus, coryzæ, tussis simplici, diarrhœis, scabiei serosiori & vlceribus externis.
4. Sexus femininus phthisi magis expositus est quam virilis; quod sequente fundamento innititur: euacuationes sanguinis *suppresse* vtrumque sexum disponunt ad phthisin, & quoniam *pauciores* in virili sexu hæmorrhagiarum sunt, in feminino autem ordinariè *omnes*, sic inde, vt numero longe maiore suppressio sanguinis, & hinc etiam phthisis, sexu: sequiori, quam virili, obtingat.

5. Quum

5. Quum autem alii de hac sententia in partes contrarias abeant, & infrequentiam phthiſeos in sexu ſequiore præ virili ex ipſo beneficio negotii menſtrui deriuare volunt, pauca ad ſententiam noſtram roborandam adponemus :

1) Si in eiusmodi loco, vbi magna iuuentutis cohors tam in ſcholis quam in academia reperitur, obſeruaciones practicas inſtituimus, plures phthiſicos in sexu masculino quam feminino deprehendemus. Si quis autem alibi, vbi vterque ſexus in æquali fere numero, & a ſtudiis litterarum remotus viuit, in praxi conſtitutus eſt, is ſi paullo attentius rem obſeruabit, deprehendet, quod ſexus femininus phthiſi & hæmoptyi ob menſium turbas & anomalias magis obnoxius ſit quam virilis.

2) Phthiſis differt gradu: alia eſt incipiens, alia confirmata, illa facilius poteſt curari, hæc autem non. Hinc negari non poteſt, quod in sexu ſequiore natura ſibi magis proſpicere & phthiſin completam auertere poſſit quam in virili. *vid. prognofis.*

6. Seniores non facile fiunt phthiſici, niſi a manifeſtis cauſſis externis: neque *pueri*, exceptis illis, quibus hæmorrhagia narium largior familiaris fuit, & repente ſuppreſſa eſt.

V. CAUſſAE.

1. Cauſſa phthiſeos antecedens *remota* eſt ſtatus plethoricus.
2. Cauſſa *propior* eſt ſpecialis congeſtio ſanguinis ad pectus, præcipue floridioris, ſeroſi rariuſ.
3. Congeſtio floridi ſanguinis deſtinata eſt ad euacuationem hæmoptycam, ſeroſioris autem ad *becchicam*.
4. *Hæmoptycæ*, ſi propter difficultatem non perumpit, vel poſt perruptionem portio mucida relinquitur, ſtaſin & hinc corruptionem, ſive vlcerofam ſive ſuppuraſcentem infert.
5. *Becchicæ* euacuatio quando non ſuccedit, materia illa tenax, mucoſa, ſeroſa, affatim congeſta, corruptionem falſo-acrem ſubit, & hinc etiam vel abceſſum vel vlcus producit. Eiuſdem indolis eſt materia illa acris, quæ in

coryzi per nares excernenda fuisset, si ad pulmones defluit.

6. *Causæ externa, occasionales & procatarticae sunt:*
- 1) Lapsus aut ictus violentus in pectoris regionem factus.
 - 2) Nimis vehemens tussis.
 - 3) Aër autumnalis, qui tabidis in primis noxius est; *conf. Hippocr. aphor. 10. Sect. III.*
 - 4) Fumi corrosivi.
 - 5) Scabies retropulsa, vlcera antiqua manantia imprudenter consolidata.
 - 6) Potus frigidus corpore insigniter æstuante.
 - 7) Quando pulmones a pleuritide, peripneumonia, tophis, vomica, aut etiam a miasmate post variolas vel morbillos relicto, exulcerati sunt.
 - 8) Abusus veneris & potuum spirituosorum.
 - 9) Suppressio hæmorrhoidum & mensium.
 - 10) Mala artificia, e. gr. expectorantia, quibus non modo copiosior sanguinis adfluxus inuitatur, sed etiam pulmonum oppletio augetur, & ordinaria tensio relaxatur,
 - 11) Peruersa curatio morborum prægressorum, in primis febrium & hæmorrhagarum per adstringentia suppressarum.
 - 12) Dispositio hæreditaria ad phthisin plurimum etiam confert.
7. *Causa tussis est intentio naturæ stasin discutiendi, vel subnatam ex illius corruptione materiam acrem excernendi.*
8. *Topici pulmonum orientur vel*
- 1) ex congestione sanguinis ad pectus, nulla subsecuta cruoris excretionem aut eiusdem plenaria discussione.
Vel
 - 2) a tussi humida laboriosa, vbi pars materiæ illius tenacis in pulmonibus remansit. Vel
 - 3) ab impulsu humorum intra pulmones, per qualemcumque pectoris motum concitato, quo pertinent cantationes

tiones, intentiores clamores, nec non qualiacumque exercitia, pectoris motum requirentia.

9. Cóncretio pulmonum cum pleura vel ad vitia-formatio- nis in vtero materno referenda est, vel etiam per acci- dens & ob certas causas occasionales contingere potest, e. gr. quando infantes tenelluli semper in vno eodem- que latere portantur.

VI. PROGNOISIS.

1. Frequentia phthiseos tanta non est, quanta quidem vulgo ex- istimatur vel metuitur: quoniam frequenter tussis humi- da pectoralis & expectoratio materiæ mucidæ, quoad colorem non satis ingenuæ, cum vera phthisi confun- ditur.
2. Corruptio, quæ in pulmonibus adest, non ita præcep- sifit, hinc natura corpus suum tam diu conservare adlaborat, quam diu fieri potest; inter ea tamen illud nutrire cessat, quia periculum læsionis auertere & vl- cери præsentis prospicere, ne citius se expandat, inten- dit; & hoc modo corpus sub vitalium motuum conti- nuatione consumitur & paulatim marcescit.
3. Corruptio autem illa, quæ pulmones obruit, est vlcerosa, non autem sphacelosa, cum sanguis continuo per pul- monum texturam refluit.
4. *Incipiens phthisis ancipitis est prognoseos, consummata lethalis.*
5. Ratio hæc est: nullum vlcus curatur, nisi tota eius super- ficiès absterfa sit, aut abscesserit, (daß die Wunde fris- schen Grund bekomme,) sed hæc *mundificatio* in partibus internis vix habet locum; insuper *consolidatio* vulneris in pulmonibus ægre succedit, quia perpetuo aëris con- cursui, motui & vehementi tussis concussioni obnoxii sunt.
6. Prostant tamen exempla phthiseos incipientis curatæ, in quibus vestigia autocraticæ restitutionis & cicatricula- rum detecta sunt.
7. Subiecta sicciora longe citius humidis, agilia languidis, iuniora senilibus consumuntur.

8. Sexus femininus, sicut, ob faciles mensium turbas, præ virili phthisi magis expositus est, ita etiam facilius ab illa liberatur, quia fluxus sanguinis suppressus iusta methodo potest reuocari, negotium autem sanguinis in viris non ita feliciter succedit.
9. Phthisis non accelerat mortem, sed febris hæctica, phthisi superueniens: hinc quo frequentius hæcticæ tales exacerbationes recurrunt, eo celerius æger opprimitur; & quo magis phthisis sine febre hæctica sibi quasi sola constat, (quod in subiectis non ita sensibilibus & incuriosis obseruare licet) eo diutius patiens viuere potest.
10. Sputum vere purulentum, diarrhœæ & sudores colliquatiui prognosin funestam non fallunt.
11. Tumores tam præcordiorum quam pedum œdematosi, quando phthisi superueniunt, lethale signum est.
12. A phthiseos periculo liberati facile iterum eidem ob leuissimas etiam causas subiiciuntur.
13. Ceterum quidquid vulgo de phthisi *curata* circumfertur, his fere innititur fundamentis.
 - 1) Vel sola fuit tussis catarrhalis in habitum deducta, & in primis crassum, pulposum, viridem mucum proferens.
 - 2) Vel febris lenta cum largis sudoribus & repentina corporis extenuatione coniuncta.
 - 3) Vel recens hæctica, ex febre lenta pullulans.
 - 4) Vel asthmatica solum pectoris adfectio.
 - 5) Vel æger euasit cum ancipiti periculo; tum vegeta suppuratio, seu vomica, scirrhus alicui minori superuenit.
 - 6) Vel hæmoptysis pro phthisi venditata est.
 - 7) Vel plane singulare robur naturæ cum specialibus circumstantiis, a millesimo vix expectandis, concurrat.
14. Tophi, ex sanguine nati, peioris semper sunt euentus, quam qui ex pituita generantur, nam facile in suppurationem abeunt, & vomicam pulmonum ac phthisin post se trahunt.

15. Quando autem hi nodi peculiari folliculo inclulsi sunt, vita, adcurata obseruata diæta & prudenti medicamentorum vsu, diu prorahi potest: valetudinarii tamen sunt, & facile in febrem putridam incidunt tales ægrotañtes.
16. Ex tuberculi ruptione vomitus & animi deliquium fit.
17. Tuberculum, siquam citissime maturuerit, & eruperit, & pus totum exspuatur, & cauitas, in quo delituerat, contrahatur & resiccerur, penitus sanus euadet.
18. Si vero penitus resiccati non poterit, & ipsum tuberculum a se ipso pus produxerit, & pituita a reliquo corpore ad tuberculum defluens putrescit, & pus exspuitur, accedente ventre fluente, opprimitur.
19. Quod si multo tempore rumpi non possit, neque sua sponte neque a medicamentis, consumitur debilitatus a doloribus vehementibus, rursi & febribus, & sæpius perimitur. *conferatur Hippocr. lib. I. de morbis XIV. 5. 6. 7. 8. 9. 10*
20. Si pus per vomitum eiectum fuerit album, & fibræ in ipso subcruentæ, effugit, si vero liuidum & cum virore pallidum ac graueolens, moritur. *Hippocras. l. II. de morbis LV. 20. 21. 22.*
21. Phthisis hæreditaria & a mala pectoris conformatione oriunda insanabilis & funesta est.
22. Concretio pulmonum cum pleura non exiguum incommodum liberiori pulmonum motui & respirationi adfert.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A Methodus generalis.

1. Adfluxus sanguinis ad pectus copiosior deriuandus est per venæ sectiones, scarificationes, pediluua, laxantia lenia.
2. Materia vlcerosa est resoluenda, abstergenda, discutienda.
3. Facta vlceris mundificatione consolidatio ipsius respicienda.

4. Analepsis necessaria præstanda.
5. Tonica roboratio perficienda.
6. Symptomata febris, ruffis &c. decente ratione mitiganda sunt.

B. Methodus specialis.

1. *Tempore exacerbationis*

1) Curationis initium fiat per lenissimam *laxationem*.
Conueniunt hic blandiora laxantia, e. g. rhabarb. elect.
passulæ minores, manna, tamarindi.

In subiectis cacochymicis conducit etiam senna, agari-
cus, resina ialappæ, mercurius dulcis, sed hic raro
adhibeatur, ne saluationem particularem pulmonibus inducat.

2) Deinde per aliquot dies, immo hebdomadas propin-
centur resoluentia, abstergentia & discutientia. In hunc
finem laudantur:

- a) *Radices*: pimpinell. alb. vincetox. helen. irid. Florent.
aristoloch. vtriusque, maxime ari. &c.
- b) *Herbae*: capill. veneris, cuscut. epithym. marrub. alb.
hyssop. bellid. min. &c.
- c) *Gummi-resina*: ammoniac. sagapen. galban.
- d) *Abstergentia salina, & absorbentia* cum acido tartari vel
citri saturata, e. gr.

Recip. tartar. vitriolat.

Ocul. cancr. acido citr. saturat. ana vnc. se-
mis.

aquæ scord.

scabios.

chærefol. ana vnc. III.

M. dos. cochl. I. bis per diem, interposito subinde
nitro ad æstum febrilem mitigandum.

- e) Formulæ nonnumquam mutantur, quia æger medica-
mina diu debet continuare. Hinc aliquando vsus de-
cocti alicuius ex ante dictis resoluentibus & discutien-
tibus substituatur, e. gr.

Recip. rad. ari.

pimpinell. alb. ana vnc. semis.

herb. veronic. tussilag. chærefol.

bellid. ana man. I.

capill. veneris, pyrol. sanicul. ana manip.
semis.

Fiat decoctum cum paucis melle dulcificandum.

- f) Aqua veronicæ vinosæ, bis de die ad cochl. III. sumta, etiam laudatur.
- 3) Post ea ad *consolidationem* ex balsamicis temperatiora sunt eligenda, e. gr. terebinthina cocta, mastix, olibanum, balsam. Peruvian. de Copaiua, *Locatelli*, rubinus sulphuris, e. gr.
- a) Recip. balsam. Peruvian. scrup. I.
gumm. iuniper. subtiliss. puluerisat. masich.
elect. ana drachm. I.
amygdal. excorticat. num. XXX.
Contusis adde aquæ scord. hyssop. scabios. tussilag. ana vnc. II.
Misc. edulcorentur saccharo q. s. ad gratum saporem.
Dof. cochl. I. singulis binis horis repetenda.
- b) Pulvis sympatheticus, sputo purulento iniectus, & leni calori impositus, bonum sæpius effectum edidit, & hinc, ubi sputum purulentum adest, potest probari.
- c) Quid valeat encheiresis a *Weishachio* p. 132. edit. nou. commendata, ad balsamica sub forma vaporis pulmonibus adplicanda, vterius inquirendum est.
- 4) Semper coniungatur moderata nutritio ex emulsionibus amygdalatis & gelatinis cum conferua rosarum.
- 5) Paroxysmo denique remittente, propinetur mixtura tonico-neruina *Stahlii*.
- 6) Denique adfluxus & tussis, si non remittunt, cohibeantur per M. P. de cynoglossa vel extractum tabaci.
e. gr.
Recip. Ocul. cancr. acido citri saturat. drachm. I.
M. P. de cynoglossa gr. VI.

M. d. in .j. partes.

Vel.

Recip. extract. tabac. gr. III. IV.

Solvantur aqua cichor. vel alia conveniente, mane in lecto propinentur, & quando nausea succedit vomibunda, haustus vini calidi cum saccharo & cinnamomo dulcificati sumatur.

2. *Tempore remissionis.*

1) Circa æquinoctia venæ sectio largior in pede instituat, & pediluvia subiungantur.

2) Vel suppressæ sanguinis euacuationes, iusta methodo reuocentur, e. g. hæmorrhoidum, mensium.

3) Si ætas & reliqua indicent, *hirudines* ad hæmorrhoidalia loca possunt applicari.

4) Ceterum non opus est tempore eustadias medicamentis obruere languentem: sufficit aluum seruate laxam, & essentiam alexipharmacam *Stablii* cum essentia succini maritatum subinde vsurpare.

5. Diæta sit mollis & euchyla, & motus corporis placidus.

Vid. castel. & tab. de hæctica.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Phthisis cum non solum generatim, quoad causam continentem, & pleraque symptomata, cum hæctica aliarum partium nobiliorum conueniat, verum etiam viscus tenerioris texturæ occupet, tanto magis sollicitè omnia sunt obseruanda, quæ tabula de febre hæctica monuimus.

2. Sic adstringentia vulneraria & balsamica acriora vulneratis pulmonibus destinare, nemo sanæ mentis vtile iudicabit; quia aliorum viscerum constrictionem, necessariæ secretionis suppressionem, respirationis maiorem angustiam, materiæ vlcerosæ conclusionem, inflammationis & febris augmentum, certissime inferunt; quod adeo verum est, vt etiam in externis vlceribus, tali incongruente modo tractatis, hoc obseruare liceat.

3. Balsami *Locatelli*, &, qui correctior est, *Meibomii* pectoralis quantulacunque efficacia, *cere* imputanda esset, quid reliqua ingredientia valeant, notum est.

4. *Martem* pectori cum primis inimicum esse, vel eius patrōni inficiari non audent.
5. Hinc *tinctura antiphthisica Grammanni* multa damna infert, quia nihil aliud est, quam solutio quædam vitrioli martis; & si quid forte de saccharo saturni in ea remanserit, etiam huius vsum nemo peritus adprobare sustinebit.
6. Non minore damno adhibetur famosum illud *antihæcticum Poterii*. vid. tab. de febre hæctica.
7. Absorbentia *terrea* concoctionem debilitant, excretiones retardant & supprimunt.
8. Hinc etiam *antimonium diaphoreticum* nihil prærogatiuæ ad hunc adfectum habet, licet a *Sylsio* ad ulcerationes internas admodum commendetur.
9. Omnia *expectorantia* dulcia motum congestorium adhuc magis versus pectus inuitant, & crassos humores non tam *ex pectore*, quam potius *per pectus* cum maiore exacerbatione expurgant. Hinc caute in phthisi vsurpanda.
10. *Nitrum*, quando *vera* exulceratio suspecta est, non ita larga manu, assidue & perenniter exhibendum; si vero *scirrhusa* tantum constitutio, & impendens collectio maturatoria seu apostematodes præsto esse iudicatur, tum nitrum omni modo locum habet.
11. Si post copiosam *nitri* propinquationem tussis augetur, cum multa materiæ expectoratione, tum vera ulceratio adest; sin minus expectoratur, & tussis potius mitescit, de ulceroſa tantum collectione testatur, & ita cum nitro pergendum est.
12. Immo etiam in ipsa exulceratione, vrgente febre hæctica non *plane* a nitro abstrahendum est, sed intrepide illud interponere licet, altero aut tertio quouis die.
13. *Sulphur* nullum vlcus, immo ne pustulam villam de fœcunda scabie curat, sed motum tantum humorum immutat & hoc præsentissime, pauca etiam dosi; crasin vel plane non, vel languide demum corrigit. Non quadrat itaque eius applicatio ad vlcus phthisicum, tanto minus, quia æqualitatem liberæ excretionis turbat.

14. Plus autem sperandum de sulphure, flammam non adepto, florum exhalantium forma extrinsecus per inspirationem attracto, protusli nempe sedanda. Hinc *sulphuris & antimonii fumus* tutior erit, quam realgaris seu sandaracæ Græcorum secundum Riverium.
15. *Rubinus sulphuris* nihil aliud est quam sulphur oleo destillato coniunctum & subtilius agiliusque redditum, tenax, amarum & nauseabundum, hinc modo adlegatur, non autem admodum extollitur.
16. *Paracelsus*, licet in aliis morbis promptus fuerit, ad medicamenta specialissimæ efficaciz promittenda, in phthisi tamen ad modum temperans observatur. *Murem* quidem *campestrem* laudat, sed modeste.
17. Ad declæ autem illius tanto audacius hoc fecerunt, & medicamina commendarunt, quæ pulmones, hepar, renes &c. *regenerarent*, etiam si iam ad iuglandis magnitudinem absumpta forent, scilicet restante tantum eorum seminio.
18. Ceterum optandum esset, vt *traditio Paracelsi* de vlcerum expurgatione & mundificatione spontanea *ab intra*, per circumspectam experientiam melius tentata & explorata haberetur; si enim in vlla, certe in hac adhuc aliquid solidi subsidii pro phthifico vlcere superest. *Conf. illius tractat. von Epital-Kranckheiten.*
19. Reliqua *specificæ*, quæ passim commendantur, obiter attingere placet:
- 1) De *numularia* circumfertur, quod vlcerationibus pulmonum in *hominibus* salutaris sit, in *ouibus* autem vlcerationem iisdem inducat.
 - 2) De radice *trifolii fibrini* prædicant, illam hominibus phthificis & ouibus esse salutarem.
 - 3) *Bonetus* refert phthificum per *nasturtii aquatici* adsiduum vsum esse restitutum. *Vid. lib. II. Sect. VII. c. 23.*
 - 4) *Pulmones vulpis* & aliorum animalium, *ranae* pulmones & hepar, *sperniola Crollii* & alia magnam haud dubie fiduciam a medico & ægroto mutuari necesse habent, pro laudato effectu obrinendo.

20. De *equisitionis* efficacia in phthisi, quam indubiam fere facit *Sydenham*, ipse legi potest. Conf. etiam *Programm. D. D. Stahlis* de hac materia. Qui placidum & continuum corporis motum poterit instituere, ille his sumptibus facile supersedebit, & eandem vtilitatem, immo maiorem, experietur.
21. *Acidularum* vsum nemo phtthificis, quocumque etiam gradu constitutis, facile suadebit,
22. De *thermis* dissident practici: alii omnes, alii peculiare tantum commendant; alii internum vsum reiiciunt, alii moderatum laudant. Feruidiores improbantur, temperata post venæ sectionem facilius tolerabuntur, ad summam autem rei nihil faciunt.
23. Decantata *lactis* cura nihil aliud est, quam modice vivere, & negotium naturæ commendare. Laudatur tamen ideo in *drata*, quod continuationem eius per multos menses æger non facile fastidiat. Certum enim est, vlcus phtthicum breuem & sinceram sanationem non recipere.
24. *Vena sectio* tempestiua quam salutariter phtthificis succedit, tam certo noxiæ est, si in exacerbatione febrili instituat.
25. Omnia *salsa & acida* nocent; inter quæ acida mineralia, maxime *salis communis*, immanem tussim cum doloribus & morbi exacerbationibus prouocant.
26. In emulsionibus exsulent semina *frigida*, e. gr. cucum. melon. quia ventriculum refrigerant, & cardialgias flatulentas inducunt
27. Nec *amygdala* per se adhibeantur in emulsione, quia facile in austerum acorem degenerant. Semper aliquid de sale digestiuo adiiciatur.
28. Ceterum *emulsiones* omni modo commendantur; temperant enim *salsam*, feri acrimoniam, & præoccupant omnem asperitatem, quæ tussim solet exacerbare.
29. *Bellis minor* non reiicula est in hoc adfectu, leniter enim adstringit & discutit.

30. Nec *charesfolium*, præsertim recens adhibitum, est contemnendum.
31. Plantæ, quæ colliquationem promouent, egregie hic conducunt, e. g. *sanicula*, &, si ardor maior concurrat, *pyrola*, quales herbæ in formula mellita, seu cum glycyrrhiza vsurpatæ, effectum sæpe edunt spe maiorem.
32. Radix *ari* in primis commendatur, nam resoluendo & abstergendo omnibus palmam præripit.
33. Moderato harum radicum vsui addi potest herba *capilli veneris*, quæ ad resoluendas stase, materiæ mucidæ & catarrhalis egregium vsum præstat.
34. Specialem ad modum efficaciam aperiendo & abstergendo in materia resoluenda attribuit *Forestus marrubio albo*, cum primis in hepatis adfectibus. Etiam in pectore vim eius laudat, sed monet, ne æger in renibus vitium habeat; quod si adsit, notabiliter damnum augeat. Unde conuenientia inter renum & pulmonum læsiones adparet, quæ viscera inuicem sibi prodesse & nocere possunt.
35. In recentibus apostematibus pectoris, peritus *mellis* vsus non contemnendus est ad mundificandum & consolidandum, cauendo, ne imperito vsu latentes adhuc dispositiones apostematodes exacerbentur. Plura vide *tabula de vomica pulmonum*.
36. *Tussis* quoniam vel stasi discutiendæ, vel, si hoc non magis integrum fuerit, vlcerosæ materiæ abstergendæ & excernendæ a natura destinata est, caueatur ne per in tempestiua *anodyna opiata* sopiatur, ob graua detrimenta, quæ hac ratione importantur.

TABVLA XXXV.

DE

VOMICA PVLMONVM.

Sagadis.

I. DEFINITIO.

Vomica est collectio saniosa, seu apostema quoddam in pulmonibus propria sua tunica inclusum, modo in superficie, modo in medullio huius vel istius lobi, occurrens, & facta ruptione, purulentæ materiae reiectionem exhibens.

II. DIFFERENTIA.

1. Differentiam vomicæ pulmonum a *phthisi*, præcedente tabula satis indicauimus.
2. Vomica differt ab *empyemate*, in hoc enim materia purulenta in cauitatem thoracis effusa est, & hinc *paracentesin* requirit, in illa autem abscessus intra tunicam suam adhuc inclusus est. Quando autem vomica in superficie pulmonum rumpitur, & materia illa corrupta in cauitatem thoracis effunditur, tum *empyematis* nomine venit.
3. Ex eodem fundamento vomica etiam differt a *suppuratione stasos* inflammatoriæ, quæ in pleuritide & peripneumonia nonnunquam contingit.
4. Porro vomica pulmonum a *rophis*, qui sæpius in pulmonibus reperiuntur, ut consequens ab antecedente distinguenda est. *Conf. tab. de phthisi.*

III. SIGNA.

1. Vomica pulmonum non facile prius dignoscitur, quam data occasione rumpatur.
2. Sub initium æque ac in phthisi plerumque paruus tantum scirrhusus nodus in vesicula quadam pulmonum exoritur, qui deinde crescendo vesiculam illam expandit, & denique si ad maturitatem deductus est, perumpit.
3. Nonnunquam, sed rarius, vomica a stali impetuosa & repentina collatione exoritur.

4. Febris hectica est comes indiuidua, cum tussi sicca, sed tolerabili, quæ postea fit humida.
5. Quam vel statim, vel successu temporis sequitur difficultas respirandi.
6. Aegri dolorem obtusum, & interdum lancinantem in certo pectoris loco adstant.
7. Facies inæqualiter rubet.
8. Per reliquum autem corpus languor, magis magisque crescens, sentitur; & motus toniei strictura cum pallore in peripheria occurrit.
9. Adpetitus inconstans reperitur.
10. Ægrotus variis anxietatibus conflictatur.
11. Sudoribus copiosis alii, alii lipothymis corripuntur.
12. Tandem, sub febre satis aucta conclusum apostema rumpitur, & ingens puris quantitas cum periculo suffocationis reiicitur.

IV. SVBIECTA.

Periculosissimi morbi vti omnium sunt rarissimi; ita etiam *vomica* pulmonum satis infrequens est, & in pauciora cadit subiecta.

V. CAVSSAE.

1. Causa antecedens *remota* est plethora, quæ cum cacochymia interdum coniuncta reperitur.
2. Causa *propior* est congestio siue *sanguinea* siue *becchica* ad pectus.
3. Causa *proxima immediata* & *continens* est stasis intra vesiculas pulmonum facta, quæ pro circumstantiarum ratione tardius vel celerius abit in corruptionem.
4. Causæ *externa occasionales* & *procatartica* sunt:
 - 1) suppressæ euacuationes sanguinis naturales, præcipue per adstringentia.
 - 2) Neglectio euacuationum artificialium adfuetarum.
 - 3) Lapsus, ictus, aut alia violenta pectoris vulneratio.
 - 4) Celerior cursus ad respirationis fere interceptionem.
 - 5) Refrigeratio thoracis corpore calente.
5. Causæ *rupturam* vomicæ promouentes sunt:
 - 1) Succillio corporis valida.

- 2) Vehemens risus & clamor.
- 3) Tussis ad modum enormis.
- 4) Sternutatio impetuosa.
- 5) Illapsus materiæ, licet non semper acris, in asperam arteriam.

VI. IROGNOSIS.

1. Vomica quo lenius incipit, eo diutius antelaticare potest, quam erumpit: materia enim in peculiari folliculo clausa detinetur, qui cum reliqua pulmonum substantia non multum commercii habet, unde corrupta licet materia, ulterius rodendo serpere non potest.
2. Quæ autem cum *stasi impetuosa & repentina collectione* contingit, illa breuioris est periodi.
3. Quando vomica in *superficie* pulmonum hæret, minore quidem periculo in *præsens* ruptio succedit, quam si profundam sedem in iisdem habuerit.
4. In *futurum* tamen euentus valde anceps est: materia enim purulenta in concavum thoracis effunditur: & sic *empyema* constituit; quod malum æque calamitosum est, nisi per tempestiuam paracentesin illi occurratur.
5. Quo magis autem vomica in *profundo* pulmonum latitat, eo grauiore periculo ruptura illius contingit.
6. Vel enim æger sub ipsa eruptione suffocatur, præcipue si febris acuta hectica suppurationem præcesserit,
7. Vel breui post iugulatur, si ipsa suppuratio copiosior fuerit.
8. Vel si absque vitæ periculo vomica rupta est, degenerat facile in *vicus*, (omnibus apostematibus, recedente inflammatione, familiare,) quod est initium phthiseos pulmonalis. In vniuersum sequentia adhuc notanda sunt.
9. Quando sub ruptura *pus tantum* euacuatur, & quidem in quantitate non ita enormi, tum promptior restauratio speranda; vbi autem copiosa quantitas eicitur, ibi consolidatio maiorem inuoluit difficultatem, quia in tali casu insignis sinus in pulmonibus excauatus est.

10. Status antecedens semper respiciendus est: in corporibus enim ubi segniter talia procedunt, id est, ubi adfluxus sanguinis vel plane exclusus est, vel tamen parcius concurrit, ibi difficulter fit restauratio.
11. Ubi autem copiosior sanguinis adfluxus & inflammatio reperitur, ibi promptior est reparatio; nam sulphureæ sanguinis particulæ maiorem siccitatem parti conciliant, ad consolidationem necessariam.
12. Ex hoc fundamento in vomica reparatio est facilius, quam in alio ulcere segniore falso seroso.
13. Item: quo magis temperamentum sanguineum præsto est, eo facilius reparatio contingit. Contrarium est in temperamento phlegmatico.
14. Quando post ruptionem vomicæ febris cum respiratione difficili continuat, & corpus magis magisque exenuatur, coniuncta virium debilitate, prælagium est funestum.
15. Sic etiam vomica diu in pectore sine ruptione persistens, & sudore frigido, frigore extremorum ac lipothymsis coniuncta, lethalis est.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

Eadem hic tere, quæ in phthisi, valet medicatio, sed alio ordine collocanda, nempe

1. Apostema abstergendum & mundificandum est; quod obtinetur per sic dicta *expectorantia* cum *discutientibus* copulata.
 - 1) *Expectorantia* sunt: passul. maior & minor, sebesten, iu-
iub. ficus, rad. liquirit. mellita, & syrupi varii officinales.
 - 2) *Discutientia*, præter ea, quæ præcedente tabula indicata sunt, particulatim adhuc laudantur:
 - a) *Aqua* discutientes diapnoicæ; e. gr. scabios. card. benedict. plantag. hyssop. scord. chærefol. bellid. min.
 - b) *Semina*: hyperic. sophiæ chirurgorum, in primis card. mariæ, quod pectoris inflammationibus & suppurationibus efficaciter succurrit.

2. Solutio continui est consolidanda. Faciunt hoc
- 1) *Balsamica* temperatiora, e. g. terebinth. cocta, mastix, olibanum, balsam. Peruvian. de Copaua, galban. farcolla & myrrha, quæ autem, quia humores insigniter commouet, tum quidem locum non habet, quando metus est sanguinis eruptionis.
 - 2) *Traumatica* leniora, e. g. lymphyt. hyperic. plantag.
 - a) *Etmullerus* commendat heder. terrestr.
 - b) Alii veronicam.
 - c) Sed efficacior est, in hoc genere, virga aurea *Gesneri*.
 - d) Item: consolida Saraceniæ.
 - e) Conyza communis vulneraria satis etiam efficax est.
 - f) Specialiter adhuc ad vulnera pectoris commendantur: pyrola, fanicula, alchimilla, auricula muris maior. rad. perasitidis.
3. Metuenda symptomata præoccupanda sunt.
- 1) *Affluxus* humorum auertitur per venæ sectionem in pede.
 - 2) *Commotiones febriles* occupantur per pulueres e nitro, antimon. diaphoret. ocul. cancr. osteocoll. item per essent. alexipharm. *Stahl*i cum multa scordii portione parata, quæ effectum habet discutientem, balsamicum, leniter diureticum, & hinc acrimoniam e sanguine per vias vrinarias eliminantem.
 - 3) Ferociam *suffis* sedat MP. de cynoglossa pulueribus absorbentibus & nitrosis admixta & vesperi adhibita.
 - 4) *Sitis*, quæ fere cum febre hæctica coniuncta est, mitigatur, præter nitrosa, succis acidulis, in primis succo citri, qui præ ceteris pectori amicus est.

B. *Methodus specialis.*

1. *Alius* primum aperienda & per totam curam expedita seruanda est,
 - 1) Siue per clysteres carminatiuo emollientes.
 - 2) Siue per lenia laxantia e. g.

Recip. herb. veronic.
hyssop. ana f. decoctum.

Recip. huius decocti vnc. III.

mannæ calabrin. vnc. 1. & semis.
sirup. violar. vnc. 1. m. d. pro dosi.

2. Quando notabilis *plethora* præsto est, subiungatur venæ sectio reuulsoria in pede.
3. Deinde adhibeantur ad mundificationem expectorantia cum discutientibus maritata e. g.

Recip. rad. ari, petasitid, pimpinell. alb. vincetox, ana drachmas III.

herb. capill. vener. cusc. hyssop. bellid. ana manip. I.

femin. anisi, card. mariæ, sophiæ chirurgorum ana drachm. II.

liquirit. vnc. semis.

incis. coq. cum q. s. aquæ simpl. vt circiter duæ libræ remaneant. His adde sirup. de althæa vnc. I. & ter de die vitrum propinetur. Vel præparentur emulsiones ex aquis card. bened. plantag. hyssop. scordii, cum feminibus card. mariæ, sophiæ chirurg. &c.

4. His subiungantur vel statim coniungantur balsamica temperata, & leniter traumatica, ad consolidationem promovendam. *Vid. method. special. tabul. præcedentis.*
5. Denique, ad symptomata febrilia præoccupanda, & mitiganda, aliquoties per diem pulueres nitroso temperantes cum antimonio diaphoretico permisti; mane autem essent. alexipharm. *Stablii* ad gutt. XXX. propinentur.
6. *Tussis* quando nimium adffigit, addatur his pulueribus MP. de cynogloil. gr. I. pro dosi.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In vomica pulmonum præcipue cauendum est, ne ægri, qui iam per se in magno periculo versantur, inepta & tumultuaria medicatione in maiora damna præcipitentur.
2. Hinc abstinendum est, tam a fortioribus *purgantibus* quam a reliquis *commouentibus* & præprimis *volatilibus*.

3. *Foreſtus* obſeruauit, quod iuuenis, vomica pulmonum laborans, per tuſſim reiecerit particulam quamdam, quaſi veſiculam pure repletam, & deinde hæmoptycus factus ſit.
4. *Præctici*, & in primis Chirurghi, in febribus vâlueratiis, ad quas vomica referenda, ita neceſſariam iudicant venæ ſectiõnem, vt *Schelhammerus* ſtatuert, illam ſine læſione conſcientiæ prætermitti non poſſe.
- 5 In primis *alui* legitimus ſucceſſus per totum morbum maxime neceſſarius eſt: hac enim ratione bilioſæ partes excernuntur.
6. Sic etiam reliquæ excretiones bene reſpondeant, præcipue *urina* & *transpiratio* naturalis, ad quas promouendas egregium habet uſum eſſent. alexipharm. *Stahlis*, quæ præter effectum, quem edit, diaphoretico diureticum, peſtorali & baſamica virtute, ad conſolidationem promouendam, prædita eſt.
7. Quando nimius *adfluxus* mucidorum humorum ad peſtus uiget, & moderata anodynorum interpoſitio neceſſaria iudicatur, tum *diſcodium Montani* locum etiam habet. Veteres utebantur electuariis opiatís, e. gr. *Philonio Romano*. Conſerua roſarum, in primis antiqua ſeu ſaccharum roſarum, alius interpoſitum, etiam præſtat effectum.
8. A *terris ſigillatis* & *hamatite* abſtinendum eſt.
9. *Nitrum* quidem egregie æſtum febrilem temperat, ſed dum tuſſim auget prudenter & paruis doſibus eſt uſurpandum. *Conf. tab. de phthiſi & hectica.*
10. Expectoſantium dulcium abuſus uitandus eſt, quia cõrruptionem & adfluxum ad peſtus auget.
11. *Alchimilla* externo uſu egregium quidem & potens eſt baſamicum, interne autem morum ſanguinis inteſtinum & inflammationem cum febre exacerbat; quod etiam de *myrrha* obſeruandum eſt.
12. Ad diætã ſufficiens tenuis potus commendatur, cum animi tranquillitate.

TABVLA XXXVL
DE
EMPYEMATE.

I. DEFINITIO.

Empyema est effusio materiæ purulentæ in concavum thoracis, cum variis incommodis circa diaphragma, mediastinum, pleuram, & pulmones coniunctum. Deriuatur ab ἐν, intus, & πύον, pus.

II. DIFFERENTIA.

1. *Empyema* quantum differat a *vomica* pulmonum, præcedente tabula demonstratum est.
2. Differt ab *hydrope thoracis*, quæ quidem etiam paracentesi admittere solet, empyematis autem nomine venire nequit, quia nullo pure sed sola aqua conspicua est.
3. Differt porro empyema ratione *originis*; de qua re sub *caussis* mentionem faciemus.
4. Differt denique ab *ulcere pulmonum*. Hoc enim materiam suam ichoroso-saniosam vel in asperam arteriam infundit, vel si in cavitatem pectoris hiat, empyema demum producit, atque hoc posteriore euentu uti antecedens a consequente differt.

III. SIGNA.

1. Repentina cessatio doloris, qui antea in pectore erat continuus.
2. Sensus ponderis alicuius in diaphragmate, & materiæ fluctuantis, passim versantis & non raro etiam tantum sonum excitantis, ut ab adstantibus audiri possit.
3. Transitus febris acuta in hecticam, versus noctem se se exacerbantem.
4. Tussis sicca continua, molesta.
5. Respiratio summe difficilis, ob impotentiam expansionis pulmonum.

6. In illo latere, in quod effusio apostematis facta est, commodius adhuc iacere potest æger quam in latere opposito. In hoc enim si recumbit, materia purulenta mediastino incumbit & incommoda adfert.
7. Quo magis calor hecticus augetur, eo magis corpus extenuatur & vires labuntur.
8. Euenit nonnullis, vt declinato corpore suffocationis periculum incurrant; quod vero mutato hoc situ euanescit.
9. Sputum in nonnullis purulentum obseruatur.
10. Accedunt anxietates, palpitationes cordis, & lipothymia.
11. Interdum adcusant ægroti sensum vaporis calidi, e pectoris canitate ad os adscendentis.
12. Alii in malo grauiore percipiunt saporem putridum in ore.
13. Sudores nocturni copiosi corpus extenuant & vires prosternunt.
14. Facies rubet in primis eo in latere, in quo abscessus ruptus fuit, nonnumquam vero phlogoses tantum adsunt.
15. Tandem facies *Hippocratica* accedit, & oculi fiunt concaui.
16. Pulsus, in primis in latere adfecto, est celer, sed sæpius intermittens.
17. Nonnumquam vngues curui, & pustulæ in thorace adparent.
18. Sæpius, obseruante Hippocrate, pedes fiunt tumidi, & in pectoris latere adfecto obseruatur cutis inflatio ac tumor.

IV. *SVBIECTA.*

Empyema æque ac vomica pulmonum, in pauciora subiecta cadit, nempe in illa tantum, quæ causis specialibus mox adlegandis, implicantur.

V. *CAVSSAE.*

Empyema oritur

1. Vel a vomica in superficie pulmonum rupta.
2. Vel a suppuratione staseos inflammatoriae in *pleuritide* & *peripneumonia*.

2. Vel nonnumquam a suppuratione staseos in *angina*, quando nempe inflammatio ad arteriam vsque asperam se extendit, & hæmoptycam quasi excretionem molitur: vnde ægri nisi septimo die moriantur, empyici euadunt. *Conf. Hypocrat. Aphor. X. Sect. V.*
4. Vel a *violentis causis* e. g. a vulnere thoracis, quando sanguis extravasatus, & inflammatione correptus, in suppurationem transit.

VI. PROGNOISIS.

1. Paucissimi empyici a morte liberantur, cum primis si tempestiua paracentesis neglecta fuit.
2. Paracentesi peracta, si *magna puris* quantitas, subruenti terti coloris & foetoris, emittitur, febris continuat, & materia purulenta, pallida, spumescens, liuida, viridis expuitur, & vires labuntur, res est conclamata.
3. Quando autem *exigua* puris quantitas, albi coloris, & minoris foetoris excernitur, febris & sitis mox cessant, appetitus redit, excrementa aluina compacta excernuntur, vires etiam aliquo modo sibi constant, tum spes est restitutionis.
4. Si materia post septem circiter hebdomades nondum siccescit, sed fluxus adhuc continuat, tum facile exoritur fistula, quæ deinde per longum tempus Chirurghi patientiam exercet.
5. Suppuratio periculosior est, quæ utramque thoracis partem, quam quæ vnicam, occupat.
6. Suppurationes, quas *pulmonum* morbi excitarunt, facilius *senes*, reliquorum autem viscerum frequentius iuuenes trucidant.

II. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. *Materia purulenta* in cavitatem thoracis effusa, quanto cyus enacuanda est; id quod optime fit per *paracentesin*, seu sectionem thoracis, certo instrumento, ad hanc operationem adaptato, intra quintam & sextam costam institutam. *Conf. causel.*

2. *Vlcus* residuum abstergendum & consolidandum est. Faciunt hoc decocta ex resoluentibus vulnerariis & balsamicis parata, & per syringam injecta. *Vid. tabul. de Phthisi, item de febre hectica.*
3. *Symptomata* vel præsentia, vel in futurum metuenda, sunt respicienda.
- 1) *Æstus* febrilem mitigant pulveres ex antimonio diaphoretico & absorbente quodam parati.
 - 2) *Vires* reficiunt analeptica & alexipharmaca e. g. emulsiones amygdalatarum, sed non saccharatarum, essent, alexipharmac. *Stablii.*
 - 3) *Aluum* adstrictam solvunt clysteres.
 - 4) *Adfluxus* quo modo per tempestivam venæ sectionem præoccupandus sit, *vid. sub cautelis.*
 - 5) *Externe* applicatio spiritus vini camphorati leniter crocati, aut sacculorum, ex nervinis & discutientibus paratorum, usum habere potest, ut humorum adfluxus & stagnationes aueriantur, ne aliqua suspecta stagnatio remaneat.

B. Methodus specialis.

1. Facta per Chirurgum incisione, materia non uno impetu, sed paulatim euacuetur, ne nimia naturæ eneruatio, vel partium sphacelatio succedat.
2. Deinde decoctum aliquod vinosum, ex balsamicis & traumaticis paratum, per syringam bis de die iniicitur e. gr.

Recip rad. symphyt.
 angelic. ana vnc. j.
 Herb. scordii
 hyperici.
 agrimon.
 fanicul. ana manip. l.
 Myrrhæ drachm. ij.
 Mellis rosat. vnc. j.

Fiat cum vino decoctum.

3. *Interne* exhibeantur

- 1) ante meridiem semel vel bis gtt. XXV-XXX. de essent. alexipharm. *Stablii.*

2) Post meridiem autem duæ doses sequentis pulueris propinentur.

Recip. Ocul. cancr. acido citri saturat.

Antimon. diaphoret. ana drach. I.

M. dof. scrup. j.

4. Emulsio analeptica subinde interponatur.

5. Totocurationis tempore alius aperta seruetur per clysteres emollientes.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Vena sectio*, quando vrgentibus ante eruptionem symptomatibus, vel etiam statim post eruptionem instituitur, vsu suo caret, sed tunc discutientia & repellentia debent subiungi.
2. Absint ab hoc adfectu *anodyna* premature adhibenda, quia sphacelum, vel ad minimum vlcus pessimi moris inducunt.
3. Decoctis traumaticis addatur *myrrha*, ouo soluta, seu, vt vocatur, oleum myrrhæ per deliquium.
4. Conducit etiam *nitrum* sed non sæpius repetendum, quia salsa in ulcerationibus adhibita, maiorem vellicationem & pruritum concitant.
5. *Nitri* autem *internus* vsus, vrgente febre hectica, non est reformidandus, sed audacter pulueri, supra descripto, subinde miscendus.
6. *Bontius* libro de medicina Indorum refert, quod empyema per paracentesin feliciter sublaturum sit.
7. *Petrus Dionis* non numerat costas, sed quatuor digitis ab angulo scapulæ, & toridem e latere spinæ dorsi incisionem facere docet. Ceterum adnotat, in suppuratione pleuridis naturam ipsam sæpius indicare locum incidendum, videlicet per tuberculum aliquod, in ea regione proueniens, in qua apostema sedem habuerit. *Conf. tab. chirurg. de paracentesi.*
8. *Externe* superimponi potest vulnere vel spiritus camph. vel sacculus sub methodo indicatus, vel emplastrum de sperm. ranarum camphoratum.
9. *Aegyptii*, teste *Alpino*, non secant, sed inurunt locum, per quem materia purulenta euacuari debet.

10. Sub vsu essentia alexipharm. *Stablii* obseruari potest, num vestigium aliquod inueniri queat illius adfert, quod materia empyematis per vrinam possit euacuari. Neque modus, neque etiam via patent, quo modo pus e pectore ad illa loca perduci queat, sed potius renum vel vesicae latio adculatur, si pus cum vrina excernitur. Inter ea tamen multi probati auctores ex hoc fundamento diuretica in empyemate praescribunt.
11. *Aer* frigidus in hoc adfectu semper noxius est, siue per asperam arteriam in pulmones, siue per apertum pectus, in eius cavitatem ingrediatur.
12. Fugienda quoque sunt in dieta omnia calida & animi pathemata grauiora, quae febrem, aliaque symptomata exacerbant,

TABVLA XXXVII.

DE

MALO HYPOCHONDRIACO-
HYSTERICO.

I. DEFINITIO.

Malum hypochondriaco hysterico est complexus moliminum spasticorum circa venam portae & viscera huic adnexa, ad imminutionem sanguinis *abundantis*, & resolutionem *spissioris* collineantium: quo motuum concursu tam positivae actiones, nimirum spasticae tractiones, pressionem, congestiones, quam *passiones* oppletoriae, inflatoriae, distensoriae, restagnatoriae obseruantur.

II. DIFFERENTIA.

1. Quod malum hypochondriacum cum *scorbuto* non sit confundendum, tabula de *scorbuto* monuimus.
2. *Malum hypochondriacum a passione hysterica* non differre, ab

auctoribus, quorum primus fuit *Highmerus*, satis iam confirmatum est.

Conueniunt enim

- 1) ratione *locorum*, quæ adficiuntur. Sunt hæc hypochondria, præcordia, intestina, meditullium mesenterii, & reliqua viscera cum vena portæ connexa. Immo non raro partes remotæ pectoris & capitis.
- 2) ratione *causarum* generaliorum: vbique enim plethora & spissitudo sanguinis peccant.

Differunt autem quodam modo

- 1) ratione *grauum*: Sicut enim feminae a morbis frequentius & grauius exercentur, quam viri, sic etiam malum hystericum illas acerbius adfligit, quam viros malum hypochondriacum.
- 2) ratione *causarum* & intentionum *specialiorum*: in feminis enim ad negotium mensium, in viris autem ad hæmorrhoides respicitur.
3. Ceterum ipsum malum hystericum, secundum quorundam auctorum distinctionem est
 - 1) vel *late* sumtum, quod vniuersum adparatum motuum in hoc morbo occurrentium complectitur.
 - 2) Vel *stricte* dictum, quo *exacerbationem* huius mali designant.

III. SIGNA.

1. Mali hypochondriaci.

- 1) Dolores tendentes, prementes, angustantes, angentes sub costis, maxime in latere sinistro.
- 2) Qui interdum exacerbantur, vt pungentes, ardentes, & interlancinantes euadant.
- 3) Familiare symptoma est *inflatio* sinistri hypochondrii; quæ interdum stataria fit, vt figuram oblongam & fastigiatam, *costis* instar exhibeat: hunc adfectum *Hippocrates magnorum lienum* nomine indicasse videtur.
- 4) Si in *dextro* hypochondrio hæc pathemata magis sentiuntur, accedunt sæpe adfectus colici, ardores volatici, præcipue in capite, cum fugitiuo faciei rubore.
- 5) Molestiæ circa *scrobiculum* cordis, cardialgiæ.

6) Ali-

- 6) Aliquando enim *ieiuno* ventriculo, præsertim in edacioribus, aliquando *sub pastu*, vt repentina satietas oritur, aliquando vna vel altera hora *post cibum* angustia occurrat.
- 7) *Appetitus* de cetero satis bonus, immo avidus, nonnumquam autem vagus est: frigida magis quam calida desiderant, & parcius bibunt.
- 8) *Ructibus* expositi sunt anxiiis, in primis sub pastu, aut sero post eundem; multo frequentius autem *flatibus* stricte dictis.
- 9) Ante autem, quam ructus erumpunt, infestant plerumque præcordia angustando, tendendo, premendo, murmurando; post eruptionem autem multo melius se habent.
- 10) *Palpitatio cordis* essentialia hic est symptoma, & in nonnullis, præcipue feminis, tam euidente gradu excedit, vt motus hic tremulus in circumstantium oculos incurrat. *Conf. tab. de palpitacione cordis.*
- 11) *Adstrictio alui* huic adfectui familiarissima, & ita sæpe pertinax est, vt purgantibus stimulantibus non obediat. Aluus autem laxa hypochondriacis non est propria, exceptis illis, qui, cibus durioribus antea adsueta, iam molliores elegerunt, a quibus intestinorum laxitatem experiuntur, & sensim ad hypochondriacum malum accedunt.
- 12) Hypochondriaci sunt *sputatores*, alii magis ieiuno, alii repleto ventriculo.
- 13) *Nares* fere habent sicciore.
- 14) Satis profunde dormiunt, & si quid a somno illis detrahitur, statim incommode habent.
- 15) *Urina* in malo exacerbato est limpida, ob maiorem in illa regione stricturam; mitescens vero impetu nihil peculiare offert; crystalli enim tartareæ, quæ lateribus vasorum adfiguntur, in statu etiam sano non raro obseruantur.
- 16) *Dolores capitis* si concurrunt, sunt illi prementes, tenden-

dentes, conuulsorii, grauantēs & vertiginosi, rarius pungentes & lancinantes.

- 17) Exacerbatio horum pathematum non raro ad *animi* vsque perturbationes progreditur: sunt enim ægroti anxii, solliciti, mœsti, suspicaces, solitudinis amantes, suspiciosi, immo nonnumquam ipsa melancholia hypochondriaca accedit.

2. *Passionis hystericae.*

- 1) Hic eadem quidem pathemata, modo recensita, sed *acerbiora* obseruantur, occurrunt enim
- 2) Circa *præcordia* vehementissimæ anxietates, oppressiones, suffocationes, conatus vomendi pertinaces, cum perpetua fere inadpetentia, immo nausea, aut adpetitu vago, frequenter absurdo.
- 3) *Meliso ventre* contingunt repentinæ & violentæ compressiones, quasi duabus manibus illa regio corripitur; ubi præcipue *umbilici* profunda retractio obseruanda venit.
- 4) In *intestinis* flatulentia vel stataria vel oberrans sentitur, es wälset sich wie eine Kugel im Lube herum.
- 5) In pectore insignis difficultas respirationis contingit cum vehementibus sæpe cordis palpitationibus.
- 6) Nonnumquam spasticæ motus tonici exacerbationes in conuulsiones, quas vulgo *epilepsiam vsericam* vocant, excurrunt.
- 7) In *faucibus* vitia deglutiendi, & tam vehementem sensum non raro percipiunt, ac si nucleus, vel res dura œsophago inclusa esset; ac tum quidem præcedunt plurimum pandiculationes, oscitationes & respirationis temporaria interceptio, aut strangulatio ac si laqueus collo iniectus esset, quem sensum nonnumquam insignis suffocatio excipit, ita vt per longum aliquando tempus sine pulsu & respiratione instar mortuarum iaceant.
- 8) In *capite* dolores adfligunt velut immanes, magis tamen hemieranici, quam vniuersum caput occupantes. *conf. tab. de clauo hysterico, sub signis.*

- 9) In emissione *urine* exquisitissimi dolores sub exacerbatione huius mali interdum se se manifestant, & adnotante *Sydenhamo calculum mentiuntur*; quod symptoma multis medicis imponit, ut verum subesse adfectum calculosum iudicent.
- 10) *Mentis adfectiones grauiiores*, quam in viris, obseruantur.

IV. *SVBIECTA.*

Huic malo quam maxime expositi sunt homines

1. Vix vnumquam alii, quam insigniter plethorici.
2. Vitæ sedentiariæ & otiosæ addicti; atque huc ante omnia litterati referendi sunt.
3. Qui ad petitiui largiter indulgent, sicciore dapes eligunt, & parum bibere solent.
4. Temperamentum melancholicum, ob crasin sanguinis spissiore, præcipue hoc malum incurrit.
5. Sanguineum autem temperamentum quando illi obnoxium fit, ratio in vitio diætæ & abusu rerum non-naturalium quærenda est.
6. Ludit hic adfectus tragediam suam in terminis *iuventutis* ab anno circiter XVIII. ad XXX.
7. *Ætas* autem *puerilis* quam minime ab hoc malo corripitur.
8. Nec etiam adeo frequenter *ætatis annosior* sexus *virilis*, nisi vel continuationem pristini mali vel palindromen sentiunt, vel lautiori admodum diætæ & vitæ otiosæ dediti, vel suppressionem hæmorrhoidum experti sint.
9. In feminis autem hoc malum magis occurrit *ætate iuuenili prouectiore*, nempe ab anno circiter XXX ad XL & L. Immo cessatio mensium proprium quasi tempus est, quo sexus hic potissimum huic adfectui exponitur.
10. Familiarius etiam malum hypochondriacum in sexu hoc sequiore, quam in virili obseruatur: quam primum enim vitia vterina, e. g. mensium, lochiorum, molarum incurunt, statim ab hoc malo infestantur.

V. CAUSSAE.

1. *Causſa materialis antecedens* eſt plethora cum ſpiffitudine coniuncta.
2. *Causſa proxima* eſt impeditus ſanguinis progreſſus circa venam portæ & viſcera illi adnexa.
3. *Causſa efficiens* horum motuum eſt ipſa natura, quæ hic plethora imminuere, & impeditum ſanguinis progreſſum ſubleuare adlaborat.
4. *Causſæ in hunc finem instrumentales* ſunt motus illi ſpaſtici, tenſorii & preſſorii; immo ipſa adeo profunda ſuſpiria hypochondriacorum eo collineant.
5. *Causſæ occaſionales, præcatartica & aduentitia* permultæ ſunt:
 - 1) *Suppreſſæ euacuationes ſanguinis, præcipue menſium & hæmorrhoidum.*
 - 2) *Dietæ plena & lauta; potus autem parcus.*
 - 3) *Vitæ genus ſedentarium.*
 - 4) *Abdominis inconueniens compreſſio.*
 - 5) *Excretionum quarumlibet, præcipue alui, ſuppreſſio.*
 - 6) *Conſuetudo horum motuum & hæreditaria diſpoſitio.*
 - 7) *Flatulenta inteſtinorum atonia.*
 - 8) *Animi pathemata, e. g. ira, terror, deſideria veneris &c.*
 - 9) *Speciatim vero nauſea & ſenſibilitas; quo pertinet odor moſchi, ambræ, zibethi, roſarum &c.*
 - 10) *Peculiaris ſtructura venæ portæ omni iure ad numerum cauſarum refertur, quæ præ omnibus aliis in corpore humano partibus apta eſt, ad hoc malum fouendum.*
 - 11) *Diſtenſio vaſorum oppletorum tamquam cauſa coniuncta, præuocans & acerbans* conſideranda eſt.
6. *Exſulent itaque cauſæ pure paſſiue obſtructionum, venenofitate ſanguinis menſtrui retenti, ſalium ſtimulantium &c. vnicæ enim animi commotio plus hic valet, quam ſexcenti Hippocratis ſapores.*
7. *Exſulent etiam craſſæ illæ vulgi opiniones de uteri locali translatione, adſenſione, volutatione.*

VI. PROGNOSIS.

1. Malum hypochondriacum *sibi relictum*, nec præposteris medicamentibus tractatum, plus incommodi quam periculi portendit.
2. Quando autem quocumque modo turbatur, grauiora mala inducuntur:
 - 1) Scirrhusæ indurationes.
 - 2) Tumores vel œdematosi, vel rubro-liuidi in pedibus.
 - 3) Melancholia hypochondriaca, timida, taciturna, speculabunda, anxia, desperabunda.
 - 4) Vomitus cruentus, mictus cruentus, nephritis.
 - 5) Febres intermittentes, lentæ, hæticæ, vel acutæ inflammatoriæ.
 - 6) Vniuersa scena adfectuum arthriticorum.
 - 7) Icterus simplex in iunioribus, niger in annosis.
 - 8) Catarrhus suffocatiuus.
 - 9) Vertigo, paralysis, apoplexia.
3. Quo magis motus circa præcordia & lienem vrgent, eo magis ad vomitum cruentum respiciunt; qui tamen in viris non ita facile, quam in feminis metuendus est.
4. Vbi vero motus ad inferiora tendunt, ibi fluxus hæmorrhoidalis prouocationem respiciant.
5. Hæmorrhoides quando proueniunt, & legitime continuant, malum hypochondriacum soluant.
6. Quando autem per illarum suppressionem hoc malum inductum est: contumacissime se gerit.
7. Malum hoc sicut annosos rarius infestat, quam iuniores, ita grauius illos adfligit, & ægrius in iisdem profligatur.
8. Iuniores autem successu annorum sponte sæpius ab his pathematibus liberantur, si vitæ genus mediocriter tantum mutetur.
9. Sicut hæmorrhoidum fluxus hypochondriacos insigniter subleuat, ita mensim fluxus ordinatus ad hystericum malum imminuendum, multum contribuit.
10. Quo magis in sequiori sexu circa lienis confinia pathematata vrgent, eo maior de vomitus cruenti eruptione suspicio habenda est.

11. Quando vero in inferioribus abdominis partibus incommoda magis sentiuntur, negotium pro sexus diuersitate vel ad hæmorrhoidum vel ad mensium promotionem tendit.
12. Vomitus *vacuus* maiorem metum eruptionis sanguinis incutit, quam *repletus*.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. *Quantitas* sanguinis est imminuenda
- 1) per *vene sectionem*, sed non aliam quam in *pede*, circa æquinoctia, & quidem luna decrescente, quo tempore natura ad dimittendos humores magis inclinatur: magna incisione, ut spissior sanguis breui tempore satis & libere effluere possit.
 - 2) per *hirudines* ad hæmorrhoidalialia loca applicatas. *Vid. dissertat. Stahlii de sanguisugarum utilitate, & tab. chirurg. de hirudinum applicatione.*
 - 3) per reuocationem mensium suppressorum. *Conf. tab. de suppressione mensium.*
2. *Craus* spissior est corrigenda & attenuanda
- 1) per conuenientem potissimum *diætã*, nempe per duo illa adminicula, satis efficacia, *motum & potum*. Potus diluit, & motus subagitat diluens cum diluendo.
 - 2) Per medicamenta sanguinem incidentia & attenuantia, quæ autem ad efficaciam commendatæ iam diætæ non accedunt. Laudantur in hunc finem
 - a) *Rudices*: ari, vincetoxici, he'era, pimpin. alb. cichor. tarax. caryophyllat. rub. tinctor. dictamn. &c.
 - b) *Herba*: scord. fumar. scolopendr. capill. vener. cent. min. card. bened. cuscut. epithym.
 - c) *Salia digestiua*: tartarus vitriolatus, tartar. tartarifat. arcan. duplicat. nitr. antimoniât. liquor terræ foliat. tartari, sal tartari.
 - d) *Gummi-resine*: ammoniac. galban. sagapen. item gum. heder. iuniper.
 - e) *Antiscorbutica* quantum hic valeant, illucescet ex num. 23 *cautelar.*

f) *La-*

- f) *Laxantia* cum resolventibus distis coniuncta, e. g. hellebor. nigr. polypod. rhabarbar. fol. fennæ &c.
- g) *Composita*: ex his vsum habere possunt pilul. *Beckeri*, *Stablii*, sal Anglicanum, tinct. salis tart. antimon. essent. alexipharm.
3. *Commotiones* spasticæ exacerbatae sunt mitigandæ. Præstant hoc
- 1) Nitrosa cum sale quodam digestiuo, & cionabari sociata, quibus etiam absorbens aliquod exigua dosi addendum est
 - 2) Vbi valde anomalæ commotiones circa venam portæ occurrunt, ibi conducunt
 - a) Decoct. *millesol.* vel eius essentia cum spiritu C. C. moderate interdum maritanda.
 - b) Vel essent. *adianthi albi*, quæ herba eundem effectum ac *millesolium* in turbis circa venam portæ habere dicitur.
 - c) *Cortex cascarilla* eximium etiam præstat vsum, ad commotiones tales impetuosas mitigandas.
4. *Excretiones* ordinariæ sunt promouendæ.
- 1) *Aluum* adstrictam solvunt
 - a) *Diluentia*: e. g. potus calidus coffée, qui plus valet aluo expediendæ, quam thée, hic enim valde saturatus subadstringit.
 - b) Solutio *nitri* per potum ordinarium.
 - c) *Rhabarbarina* cum speciebus resolventibus & forma infusi vsurpata.
 - d) *Extracta* resoluentia & abstergentia cum gummatibus & moderatissime aloeticis coniuncta.
 - e) *Clysteres* emollientes eximiam hic semper habent utilitatem.
 - 2) *Transpirationem* naturalem & lenem *diuresin* promouet essent. alexipharm. *Stablii*, sub placido corporis motu vsurpata.
5. *Tonus* partium nimis distentiarum est roborandus. Faciunt hoc
- 1) *Martialia*, legitimo tempore adhibenda e. gr. crocus

martis antimoniat. aperitiuus *Stablii*, tinctur. martis aperitiu. *Ludowici*, & eiusdem crocus martis sulphuratus, &c.

- 2) *Salta volatilia* cum tincturis alcalicis mixta, e. gr. tinctura tonico-neruina *Stablii*.

B. *Methodus specialis.*

1. *In paroxysmo.*

- 1) Ante omnia *aluus* aperiatur, & semper aperta seruetur, per clysteres emollientes, & spasticos rigores demulcentes; eius modi sunt bene pingues, ex oleo amygdal. dulc. oliuar. recent. chamomill. aneth. sesam. parati.
- 2) Deinde temperantia nitrosa, & incidentia salina cum cinnabarinis exhibeantur, & ter per diem repetantur. e. gr. nitrum depurat. nitrum antimoniat. cinnabar. antimon. ocul. canc. cum acido tartari saturat.
- 3) Impetus si hisce cedere recusat, essentia vel decoctum millefolii parce & moderate propinetur, vel alia superius adlegata adhibeantur.

2. *Extra paroxysmum.*

- 1) Remittente impetu sanguis imminuatur per venæ sectionem, circa æquinoctia repetendam.
- 2) Et tum ad sanguinem diluendum & attenuandum, superius commendata remedia, præcipue diætetica, adplicentur.
- 3) Mensium etiam & hæmorrhoidum ratio habeatur, per methodum suo loco commendatam.
- 4) Denique ad tonum restituendum martialia, vel volatilia salia cum alcalicis tincturis mixta, propinentur, vel crocus martis antimoniat. cum *MP. Stablii* sociatus.

VIII. *CAVTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. Si unquam, certe in decantato hoc adfectu, cautelis opus est; ubi multæ quidem prædicationes variorum remediorum, sed exigua auxilia reperiuntur.
2. Sufficiens labor & humidatio corporis plus valent, quam
vni-

vniuersus medicationis adparatus, optima licet methodo institutus.

3. Quam diu sanguis abundat, omnia resoluentia, & tonum roborantia, sunt frustranea.
4. Si tentamen medendi insuper *impetuose* in talibus circumstantiis instituitur, facile hæmoptysis, asthma conuulsuum, catarrhus suffocatiuus, adfectus arthritico rheumatici, siue vagi, siue fixi, inducuntur.
5. Item repentinæ anxietates præcordiorum, infarctus viscerum, vel febres inflammatoriæ. *Vid. prognosis.*
6. Non imminuta sanguinis quantitate *symptomata* statim adgredi multo adhuc periculosius est tentamen.
7. *Vena sectio* curatiue, aut in brachio, instituta, magis nocet quam prodest: facile enim pathemata ad superiores partes prouocat, & contumaciora reddit; iusto autem tempore & loco administrata durabilem sæpe subleuationem adfert, & reliquæ medicationi viam sternit. Si pressiones magis *in dextro* latere sentiuntur, & nullum vitium in pectore vel dispositio vertiginosa subest, tum in brachio etiam locum haber.
8. *Scarificatio* vix talem effectum infert, qualis huic malo conducit.
9. *Hirudines* nec opportuno tempore nec iusto ordine adplicatæ, maioribus anomaliis ansam præbent; dextre autem adhibitæ ad molimina hæmorrhoidalia mitiganda; & motus congestorios a superioribus visceribus reuocandos, vsum habent eximium, tanto magis, si venæ sectio præmissa est. *Vid. tab. de suppressione hæmorrhoidum.*
10. *Emetica* hypochondriaco-hystericis, iuxta hodiernos mores, præscribere, infelix est tentamen: pathemata exacerbantur, in habitum obfirmantur & facile vomitus eruentus, præcipue in feminis, metuendus est.
11. Vbi autem malum adhuc recens, & conspicuum diætæ vitium subest, subiectum insuper euemetum & robustum, ibi *moderatum emeticum* conceditur.
12. *Purgantia fortiora*, frequentius adhibita, hypochondriacis etiam non conueniunt: motus spasticos magis augent

& sanguinem adhuc spiffiorem reddunt : vnde a frequentibus purgantibus malum hypochondriacum nonnumquam inducitur.

13. Accufata enim *faburra* in primis viis hypochondriacorum, ad quam eliminandam vomitoria & purgantia primario præfcribuntur, plurimum nulla eft.
14. Fruftaneus etiam eft metus, quafi *acida pungentia*, malum hypochondriacum fouentia, in primis viis generarentur; quæ proinde expurganda effent.
15. De *polypodio* in fpecie adhuc dubitandum, num hoc loco tantos effectus præftet, quanti per meram sæpe credulitatem de illo prædicantur.
16. *Mercurialia* non poffunt admitti, nedum deteftanda hic *salinatio*; quæ contracturas, paralyfes, apoplexiam, aſthmata conuulſiua, immo mortem inducere valet.
17. *Diaphoretica* calida etiam nocent, fanguinem enim vel in orgaſmum deducunt, vel humiditatem ei ſubtrahunt : abſint itaque alexipharmaca calida, carminatiua, olea deſtillata, myrrhata, camphorata, ſalia oleoſa & omnia ſulphurea acria, quæ infarctibus & phlogofiſibus occaſionem præbent.
18. Methodus, quæ per *alterantia*, edulcorantia, acrimoniam corrigentia, ſalibus ſuſpectis ſubuenire docet, ſalutaris non deprehenditur; inducit potius adfectus aſthmaticos, ſcirrhoſos, cedematoſos, ictericos, aſciticos, colicos, iliacos, podagricos, vertiginoſos, inflammatorios, paralyticos, apoplecticos.
19. Neniæ illæ, de efficacia *martialium abſorbente*, *fundente* & *colliquante*, experientiaæ practicaæ non reſpondent, neque etiam chymiaæ experimentali; conſpicuus potius effectus adſtringens, ſolo gradu differens, in omnibus *martialibus* deprehenditur.
20. Hinc *martialia*, in *vigore* paroxyſmi uſurpata, maiores anxietates, infarctus viſcerum & adſtrictiones alui inferunt; *remittente* autem impetu & præmiſſa venæ ſectiõne adhibita & continuata, leni adſtrictione venarum diſtendarum iuſtum tonum reſtituunt; & hoc tanto efficacius, ſi cum

si cum essentia millefolii miscentur. Cæterum a crudo Marte abstrahendum est.

21. *Salia volatilia* mirifice quidem hodie extolluntur, & virtus illorum resoluens & attenuans ad nauseam prædicatur, sed pauca grana, quæ pro dosi adhibentur, satis demonstrant, quod non in *humores*, sed in *vias* agant, iisque stimulum ad constrictionem organorum incutiant; quæ strictura, quando sanguis minus mobilis, & viæ nimium repletæ sunt, male cedit. Hinc intemptius & liberalis illorum vsus cum martialibus eadem damna inducit.
22. Neque *absorbentia* ad summam medelæ peculiare quid conferunt, licet id vulgò credatur; largius enim & frequentius vsurpata, humores magis inspissant, & tenaciores reddunt, in primis etiam viis turbas & molestias procreant.
23. *Antiscorbutica*, plenis buccis commendata, fundamentum huius mali non attingunt, *acriora* potius illud exasperant; præmissa tamen venæ sectione, *temperata* cum reliquis incidentibus, superius commendatis, possunt coniungi.
24. Idem de *antiueneris* sentiendum est.
25. Vsus *acidularum* asylum hypochondriacorum vulgò reputatur, sed propter exiguum re vera effectum, & propter iacturam temporis ac sumtuum censemus, quod *remedium grauius sit morbo ipso*. Præter ea, ubi sufficiens motus, siue per virium defectum, siue per sumtuum ad vecturam destitutionem, obtineri non potest, ab vsu illarum prorsus abstinendum est. *Conf. dissert. Stahlî de fortium salutarium vsu & abusu.*
26. *Nitrum*, in adfectibus hypochondriacis prudenter adhibitur, egregium præstat effectum: spasticam enim partium fibrosarum stricturam relaxat, & qualemcumque ardoris sensum in visceribus obrundit.
27. *Nitrum* cum sale digestivo & pauca absorbentis cuiusdam quantitate mistum, flatulentiam hypochondriacam, post

- cibos præcipue emergentem, promptius subigit, quam vllum aliud medicamentum.
28. *Aloëticorum* vsus in malo hypochondriaco cautissimus & parcissimus esse debet: quando enim hic adfectus eo iam peruenit, vt euacuationes respiciat, tum incongruens illorum vsus grauissimas exacerbationes inducit, quia aloë sanguinem quidem commouet, sed non ad exitum perducit.
 29. Vsus *clysterum* emollientium, vti huic malo efficaciter occurrit, ita in *feminis* præcipue laudatur. Parantur ex herbis emollientibus, lubricantibus, mucilaginosi, olcosi & temperatissimis carminatiuis.
 30. *Veronica* cocta, & adiecto oleo ac sale, in clystere adhibita, ad hypochondriaco hystericos lumbares & ischiadicos spasmos, egregium præstat effectum.
 31. *Laxantia*, licet mitissima sint, ad commodum tamen clysterum vsum non accedunt: ipsa *rhabarbarina* relinquunt aliquam adstrictionem, & hinc sui repetitionem efflagitant.
 32. *Manna* & folia *fenna* flatulentiam excitant & naturam sensim in consuetudinem deducunt, vt nihil deponat, nisi adhibitis hisce stimulis: vsus itaque eorum sit moderatus.
 33. *Pruna Damascena* ad expediendam aluum vtiliter adhibentur in iis, qui a dulcibus alias non lædantur; modo non statim bibatur cereuisia fermentescens, sed haustus vini, vel alius conueniens spirituosus.
 34. Exsulent in hystericeis tot decantata *uterina*, e. gr. elixiria, essentia, tinctura, aquæ destillatæ aromaticæ, die hisse Mutter-Wasser.
 35. Speciatim reiiicitur *castoreum*, licet tot laudibus exaltatum; internus enim illius vsus ad pauca quidem momenta leuamen adfert, deinde autem grauiora incommoda inducit, præcipue vero caput obnubilat, & angustias præcordiorum auget. Ante omnia ab illo abstinendum est, quando pathemata hypochondriaco - hysterica nauseabunda & vomibunda occurrunt.

36. *Millefolii* vsus debet esse prouidus, præcipue in viris; in feminis maiori securitate adhibetur; vbi essentia, cum croco mixta, impetum commotionum & anxia molimina, ad menses tendentia, egregie mitigat. In viris quando adhibetur, essent. millefol. p. 1. cum essent. pimpinell. alb. p. III. & spirit. salis ammoniac. p. semis miscetur.
37. Vsus *marinorum animalium*, e. g. dent. hypopot. lap. manat. priap. cet. prorsus improbat: licet enim motus per illa in præsens supprimantur, in futurum tamen vel maiore impetu reuertuntur, vel infarctus & scirrhi viscerum, aut plane hydrops succedunt.
38. Quid de *cucuphis*, quæ in capitis doloribus hysteriarum adhibentur, censendum sit, tabula de *cephalalgia*, & altera de *clauo hysterico* indicauimus.
39. Quibus locis etiam cautelæ de *duplicis generis odoramentis*, in suffocatione hysterica admodum vsitatus, adiectæ sunt.
40. Occurrunt nonnumquam hystericae, quæ nullum plane odorem sub tali constitutione persentiscunt: in his præstat ab odoramentis plane abstinere, quam grauius danorum inferre.
41. *Camphora* vsus in capitis doloribus hysteriarum citatis locis euoluatur, vbi simul consilium datur, qua ratione etiam in illis feminis vtiliter adhiberi possit, quæ alias illius odorem fastidiunt.
42. Vsus *carnis lupinae*, decollo suspensæ, in malo præcipue feminarum, loco secreti a quibusdam habetur; id quod experientia relinquendum est.
43. *Narcotica* sedant quidem promptius exacerbationes hypochondriaco-hystericas, sed vehementius illæ recrudescunt; & deinde etiam hæc remedia a natura adspernantur.
44. Denique *dieta*, non quidem scrupulosa, conueniens tamen commendatur; cauendo a cibus acidis, crassioribus, frigidis, placentis butyraceis. Qui segnitie alui laborant,

certo tempore huic negotio indulgeant , & paullo ante cibum exiguum panem largo butyro illicitum præmittant.

TABVLA XXXVIII.

DE

INFARCTV LIENIS.

I. DEFINITIO.

Infarctus lienis est inflatio visceris huius laxi & cellulosi, a restrictione sanguinis versus ramum splenicum orta, & eruptionem per vasa brevia respiciens.

II. DIFFERENTIA.

1. Infarctus lienis a recentioribus pathologicis *obstructionis* nomine venit; sed hæc, vi vocis, plenariam sanguinis interceptionem designat, & multas confusiones inducit; de qua materia legi meretur *dissertat. Stahlii de obstructione vasorum sanguiferorum.*
2. Infarctus lienis quidem non differt a *malo hypochondriaco*, specialem autem sanguinis directionem & determinationem versus viscus lienis inuoluit.
3. Non confundendus est lienis infarctus cum *doloribus nephriticis*, versus sinistrum latus sese extendentibus, & profundius adfligentibus. *Conf. signa nephritidis,*

III. SIGNA.

1. Inflatio in latere sinistro sub costis spuris.
2. Cum doloribus prementibus & tendentibus, raro autem interlancinantibus.
3. Durant hæc incommoda per vnum vel alterum diem, & dehinc remittunt.
4. Sub afflictione laborant difficultate respirationis.

5. Anxietate etiam præcordiorum & animi mœrore adficiuntur.
6. Concurrit tussis sicca periodica.
7. Ingens diminutio virium, torpor ad actiones & morositas.
8. Appetitus plerimum languet.
9. Manifestat sese ventriculi inflatio, quæ a ructibus magis, quam a flatibus stricte sic dictis tollitur.
10. Palpitatio cordis, & sæpius etiam motus palpitatorius in ipso liene observari solet.

IV. *SUBIECTA.*

Huic adfectui sæpius obnoxii sunt homines

1. Mediæ & consistentis ætatis, sexus feminini præ virili.
2. Temperamenti præcipue melancholici, vel sanguineo-melancholici.
3. Qui pathemata generaliora hypochondriaca, præcipue autem suppressiones hæmorrhagiarum diu perpessi, & sub his incongruenter, in primis adstringentibus tractati sunt.
4. Qui vitæ sedentiæ, speculabundæ, variis curis & sollicitudinibus obnoxii existunt.
5. Verbo: omnia fere illa subiecta, quæ præcedente tabula descripta sunt.

V. *CAUSSAE.*

1. Causa antecedens est plethora cum spissitudine coniuncta.
2. Causa continens & proxima est infarctus & restrictio sanguinis versus ramum splenicum, sub quo impedito & perplexo negotio natura eruptionem stagnantis sanguinis per vasa brevia respicit.
3. Causæ occasionales & præcatartice sunt:
 - 1) otiosum vitæ genus.
 - 2) Cibi crassiores & parcior potus.
 - 3) Neglectio adfuetarum euacuationum sanguinis.
 - 4) Inepta medicatio in febribus *intermittentibus* per adstringentia, & in *acutis* per refrigerantia.
 - 5) Neglectio alui expediendæ.
 - 6) Refrigerationes partium corporis extremarum.
 - 7) Dispositio hæreditaria & animi pathemata.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Infarctus lienis non est præsentis periculi, & quo recentior est, eo facilius adhuc cedit congruæ medicationi.
2. Quando sibi relinquitur per aliquot annos sine vitæ iactura durare potest.
3. Progrediente autem tempore, & accedente in primis medicatione improuida, facile in febrem quartanam transmigrat.
4. Vel in scirrhum abit, quem tamen per plures etiam annos gestare possunt lienosi. *Conf. tab. sequens de scirrho lienis.*
5. Tandem febres lentæ, hecticodes.
6. Vel œdematosi, cachectici, ascitici adfectus hanc scenam claudunt.
7. In feminis vomitus cruentus, in viris autem hæmorrhoides hoc malum nonnumquam soluere solent.
8. Nonnumquam stasis inflammatoria suppurasces, sed rarissime, exoritur, & materia purulenta coloris teterrimi, per vomitum vel aluum reicitur.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *Methodus generalis.*

1. *Quantitas* sanguinis est imminuenda; id quod obtinetur
 - 1) per venæ sectionem in dextro pede circa æquinoctia instituendam & numquam omittendam.
 - 2) per reuocationem hæmorrhagiarum suppressarum.
 - 3) per hirudines in negotio hæmorrhoidali.
2. *Qualitas* sanguinis spissior est corrigenda. In hunc finem commendantur
 - 1) *Radices*: cichorii, tarax. helen. vincetox. pimpinell. alb. ari, bardan. apii, petroselini, graminis.
 - 2) *Herba*: absinth. card. bened. centaur. min. fumar. hyllop.
 - 3) *Antiscorbutica temperata*: nasturt. beccabung. cochlear. acetosell.
 - 4) *Salia enixa*: tartar. vitriolat. arcan. duplicat. nitrum antimoniat. in primis tartarus tartarifat.

5) *Gum-*

- 5) *Gummi-resina* : ammoniac. sagapen. sarcocoll. galban. bdell. myrrh. succin.
 - 6) *Diluentia* per sufficientem potum cum labore corporis coniunctum.
 - 7) *Laxantia* cum resoluentibus modo commendatis, nupta e. g. hellebor. nigr. fenn. i habarbar.
 - 8) *Composita* : pilul. *Becherianæ*, *Stahlina*, tartaræ *Bontii*, extract. panchymagog. *Crollii*, magnes. alb. sal. Anglican. essent. alexipharm. *Stahlii*, essent. absinthii composita.
 - 9) *Externa resoluentia & roborantia* : emplastr. de ammoniac. saponat. *Barbette*, diaphoret. *Mynsichtii*, de spermat. ceti, de cicuta. Item *emollientia* : emplastr. diachylon, de meliloto, *linimenta* ex unguent. de althæa, ol. cappar. chamomill. irin. camphor. alternatim regioni lienis adplicata.
3. *Motus* tonicus in liene relaxatus est roborandus, ad congestoriam sanguinis stagnationem discutiendam, & novum infarctum præoccupandum. Huic indicationi satis faciunt
- 1) *Martialia teneriora* : croc. martis antimoniæ. *Stahlii*, essent. vitrioli martis *Zwvelferi*, vel *Ludowici*.
 - 2) *Salia volatilia* cum tincturis alcalinis maritata, e. gr. MR. tonico nervina *Stahlii*.
 - 3) *Specifica antisplenetica*, qualia creduntur esse
 - a) Rad. rub. tinctor. caryophyll. capparum.
 - b) Herb. cuscut. epith. scolopend. ceterach. millefol. adianth. nigr. præcipue vero *alb*.
 - c) Cortex & lignum traxini, circa solsticia cæsum, item cort. & lign. tamarisci.
- B. Methodus specialis.**
1. Ante omnia *alvus* aperiatur, & aperta feruetur, siue
 - 1) per *chyleres* nervino-carminatiuos, reuulsioni & roborationi discussoriæ aptos, e. g.
 - a) *R. lices* : maluæ, althææ.
 - b) *Flores* : chamomill. verbasc. melilot. stœchad. citrin. summit. origani.
 - c) *Se-*

c) *semina*: anisi, foenicul. foenugraeci; siue

2) perblandiora *laxantia*, e. g.

a) Infusa helleborina.

b) Pilul. *Becheri, Stahlii*.

2. His laxantibus subiungantur resoluentia, diluentia, & sanguinem spissum attenuantia, superius commendata.
3. Et quando symptomata febrilia vrgent, pulueres nitrofo-temperantes simul adhibeantur. *Vid. cautel.*
4. Post paroxysmum obseruetur iustum tempus *vena sectionis* circa æquinoctia repetendæ; coniunctis iterum resoluentibus & leniter laxantibus.
5. Mensium vel hæmorrhoidum specialis ratio habeatur.
6. Denique tonica martialia legitime propinentur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Obseruationes, quas præcedente tabula de malo hypochondriaco commendauimus, etiam in hoc adfectu notandæ sunt.
2. *Vena sectio* præsentè paroxysmo non necessaria est, quia per aliquot tantum dies impetus durat, & medicatione commendata profigari potest. Ad præcautionem itaque instituat.
3. Februm intermittentium incongruens tractatio, quando huic adfectui ansam dedit, & suppressæ febres sub vii medicamentorum reuocantur, tum methodus eis conueniens adhibenda, & eo facilior huius mali eradicatio speranda est.
4. *Martialia* prius non concedantur, quam sufficiens obtenta est referatio; quæ ex vrina largiore & crassa (non tamen aurantii coloris, hæcticam indicantis) cognoscenda est.
5. Quando autem *martialia* cum aliis coniuncta propinantur, tum methodus satis secuta est, e. g. si mane resoluentia, & vesperi *laxantia* leniora adhibentur, *martialia* versus meridiem sunt concedenda; quo casu hæc MR. commendari potest.

Rec. tinct. aperitiu. *Ludouici* vnc. I.

essent. adianth. alb. vnc. semis.

M. dof. XL. guttæ, versus tempus prandii sumendæ.

6. Si

6. Si vero hecticæ vera indicia iam adfunt, tum *martialia* locum non habent, sed methodus tabula *de hectica* commendata.
7. Auctores obseruarunt, quod lienis infarctus resoluti indicium sit, si superueniat febris acuta, cum petechiis complicata, & excretio sanguinis coagulati nigri & foetentis per aluum.
8. Quid de radice *polypodii*, quæ in splenetico adfectu præ aliis effertur, sentiendum sit, præcedente tabula sub *cantelis* indicatum est.
9. Alii laudant radicem *asaræ*: quod experientiæ relinquitur.
10. *Opiata*, ad dolores placandos adhibita, infarctum augent, & aluum adstringunt.
11. Quod lignum *fraxini* lienem consumat, fabula est.
12. Neque resoluentia *acriora*, e. g. rad. bryoniæ, teneris & sanguineis improvide præscribenda sunt, quia metum exulcerationis inferunt.
13. *Lumbrici* terrestres, resolvente & diuretico effectû præditi, quid in hoc morbo præstent, experientia quemuis docebit.
14. Semper iniungenda est ægris continuatio vsus remediorum ad minimum per aliquot hebdomades, præcipue, quando malum diu iam persistit & inualuit, alias irrita sunt omnia, etiam si optima fuerint remedia; nullæ enim viscerum obstipationes præcipitem curationem admittunt. Absit itaque omnis *heroica* medicatio, tum *euacuans*, tum *alterans*, effectus enim funestos accelerat.
15. *Nuda* vero *inflatio* lienis, quæ vel in feminis a mensium regectione, vel in febribus intermittentibus contingit, facilius & citius profligatur per methodum & remedia, superius commendata.
16. Infarctus lienis quando in *ulcerationem* transit, (id quod reiectio purulentæ & foetidæ materiæ per vomitum vel aluum manifestat,) tum consolidatio promouenda est. In hunc finem laudantur
 - 1) Cortex *fraxini* in decocto vel cum melle exhibitus.
 - 2) Conferua *rosarum*.

- 3) Terebinthina cocta, cum ovo forbili vel cereuisia calida propinata.
- 4) Balsamum Peruvianum cum emulsione amygdalarum vsurpatum.
- 5) Interpositis pilulis laxantibus ex gummi ammoniaco, sagapen. extract. panchymagog. *Crollii*, mercur. dulci, aloë &c.
17. *Succi* recenter expressi ex radicibus & herbis, sub methodo generali commendatis, e. g. ex radice cichorii, taraxaci, herbis antiscorbuticis, efficaciores deprehenduntur, quam si hæc remedia sub alia forma exhibentur.
18. *Acidula* minorem adhuc locum hinc habent, quam in malo hypochondriaco, in quo materia peccans ad specialia loca nondum determinata est: augent enim obstipationes, inducunt cachexiam, hydropem, vel hecticam, immo mortem maturius aduocant.
19. *Therma*, nisi venæ sectio, leniora resoluentia & euacuantia præmittuntur, faciliori lienis exulcerationi ansam præbent.
20. Diæta mollis, lubrica, potulenta medelam egregie promouet, sed tanto efficacior est, quo magis corporis motus, primo placidus, & deinde libe. assilatorius coniungitur.
21. Cibi moderate aromatizati & vitum bonum, modice sumtum, vti salutaria sunt remedia, ita immodicus eorum usus quam maxime nocet.
22. Præ cæteris laudantur cibi capparibus conditi; num vero potus specialem efficaciam adquirat, quando ex *poculis ligni tamarisci* hauritur, experientiæ relinquendum est.
23. Animi pathemata, vti ad concitandum hunc adfectum præsentis sunt efficaciz, ita & mentis tranquillitas multum confert ad malum feliciter profligandum.
24. Ceterum notari meretur, quod *Estmullerus* hunc adfectum non lieni, sed intestino *colo* , a flatibus vel induratis scybalis distento, adscripsit; quam autem opinionem tres præcipue circumstantiæ refutant;
- 1) Infarctus lienis *periodice* recurrit.
 - 2) Per aliquot dies *constanter* durat.

- 3) Clysteribus emollientibus confestim non cedit, quorum omnium in adfectibus flatulentis contrarium obseruatur.

TABVLA XXXIX.

DE

SCIRRHO LIENIS.

I. DEFINITIO.

Scirrhus lienis est tumor huius visceris induratus a restagnatione humorum sensim spissescentium, & exhalantibus tenuissimis portionibus, siccescentium, originem ducens. Derinatur a σκίρρῶν, induro.

II. DIFFERENTIA.

1. Scirrhi sunt vel *seroso-gelatinosa*, vel *sanguinea* indolis.
2. Scirrhus lienis constitutio differt a simplice illius *infarctu*; Hic enim facilius adhuc felicem consequitur discussionem: Scirrhus autem vix unquam. *Vid. prognosis.*
3. Scirrhus lienis differt *gradu*; in aliis enim lien in *totum*, in aliis in *tantum* induratus est.

III. SIGNA.

1. Obuia tactui durities sub costis versus latus sinistrum & lumbos retrorsum, cum sensu ponderis cuiusdam, huic lateri ineumbentis, & hinc decubitus in latus dextrum molestus reddentis.
2. Color faciei, immo reliqui corporis, luridus, ad fuscum nigricantem subviridem tendens.
3. Cum oculorum altiore quasi retroessione, & circa orbitam liuente ambitu.
4. Angustia pectoris est fere perpetua, cum difficultate respirandi, & tussi sicca pertinaci coniuncta.
5. Appetitus crebro audivus est, interdum tamen sine causa manifesta fit nauseabundus.

6. Repletio, aut potius inflatio ventriculi post sumtos cibos, & sensus pressiois.
7. *Aluus* est valde segnis, vel tamen inconstans.
8. *Vrina* tenuis, parca, subliuida, viridescens, immo dilute nigricans.
9. Quando inueteratus est scirrhus, in pede *sinistro* inflatio turgida, liuida & dura occurrit, donec tandem tumor ulterius se extendat.
10. Languor corporis insignis.
11. *Animus* præ se fert torporem, tardiosam morositatem, taciturnitatem, anxietatem, & hæc omnia sine causis manifestis.

IV. *SVBIECTA.*

1. Uterque sexus obnoxius quidem est huic labi, sed ea non ita frequenter occurrit.
2. *Viri*, qui diu hypochondriaci fuerunt, & *femina* a malo hysterico frequentius vexatæ.
3. *Ætas* virilis & prouectior.
4. *Personæ*, quæ in febribus intermittentibus, præcipue in quartana, adstringentibus, vel in acutis inconueniente ratione tractatæ sunt. *Conf. caus.*
5. *Otiosa*, *sedentariæ*, & *speculabundæ*.

V. *CAVSSAE.*

1. *Causa antecedens* est congestio sanguinis restagnatoria in ramo splenico.
2. *Causa proxima* est repentina dissipatio partium fluidarum, & *tenuiorum*, relictis solis *spissioribus*, in talem duritiem abeuntibus.
3. *Causæ occasionales, procatartica & aduentitia* sunt :
 - 1) *Peruersæ medicationes*, quæ præ aliis scirrhus inducere valent, e. gr. adstringentia in febribus intermittentibus, refrigerantia & salia volatilia in acutis, topicorum frigidorum adplicationes in simplice adhuc *infarctu*; vulgo kühlend Pflaster auf die Miß legen.
 - 2) *Vehementes contusiones & vellicationes.*

- 3) Diæta crassa, mucida, lentescens, e. gr. nimius usus piscium, carnis infumatae, lacticiniorum.
- 4) Insignia animi pathemata.

VI. PROGNOSIS.

1. Discussio scirrhi *veri*, vel plane nulla expectari potest, vel certe difficillimi, & summe ancipitis eventus est; id quod contra vanas pollicitationes, a multis iactatas, probe tenendum est.
2. In scirrho quidem *recentiore* aliqua discussionis spes adhuc adfulget. Quippe nonnumquam per vomitum cruentum in feminis soluitur.
3. Econtra quando scirrhum symptomata hectica & ascitica sequuntur, pessimum est malum.
4. Scirrhus *sibi relictus*, per multos annos sine corruptione & vitæ periculo durare potest.
5. Quando autem sola *emollientia* adhibentur, quæ cum *maturantibus* inseparabilem nexum habent, eventus præceps & periculosus acceleratur: laudabilis enim huius staseos suppuratio vix unquam speranda est.
6. Scirrhus perpetuo proclivis est ad corruptionem, sed magis sphacelofam, quam inflammatorio-suppuratoriam, aut ulcerofam.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Scirrhus lienis *incipiens* tractatur, uti infarctus. *Vid. methodus tabula precedentis.*
2. Sigillatim autem adhuc notandum, quod *resolventia* paululum *fortiora*, hic magis locum habeant, quam in lienis infarctu, e. gr. rad. gentian. bryon. ari. squillæ, radices quinque aperientes, item rad. chinæ, sarsaparillæ, herb. capillares, antiscorbuticæ, & gummi-resinosa: bdell. sagapen. ladan. galban. ammoniæ.
3. Item: quod venæ sectio statim post absterfionem primarum viarum possit institui.
4. *Externe* eadem emplastra, sub infarctu commendata, adhibeantur, quibus *emolliens* aliquod linimentum per vices substituatur, e. g. unguent. l. h. cum medulla crur. vitulin. & camphora mixtum.

5. Vbi autem scirrhus iam obfirmatus est, in primis quando plus de sanguinea substantia participat, ibi præstat artis inopiam profiteri, quam vanis pollicitationibus ægrum laetare & frustrari.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quem ad modum iam Hippocrates consilium dedit, ut *cancer occultus*, qui nihil aliud est, quam *scirrhus sanguineus*, intactus relinquatur, sic etiam præstat, in veriore scirrhum manum detrahere, quam per emollientium continuum usum statim hanc ad maturationem perducere.
2. Sectio venæ *saluatellæ* (inter annularem & minimum digitorum) quam veteres hic commendant, ad summam quidem rei nihil facit, præmissa tamen venæ sectione generaliore, specialior hæc, cuiuscumque demum efficaciam, potest subiungi.
3. Illud pro axiomate habendum est, quod in vitiis viscerum *scirrhosis* æque ac *ulcerosis*, neque autocrata naturæ, neque artis ministerium ad solidam curationem sæpe aut multum quid proficiant.

TABVLA XL.

DE

INFARCTV HEPATIS.

I. DEFINITIO.

Infarctus hepatis est stagnatoria sanguinis in hoc viscere congestio, siue a spastica hepatis contractione, siue a nimia motu tonici remissione, originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. Quomodo *infarctus a scirrhus* hepatis differat, sequente tabula indicatum est.
2. Vitium hepatis hic duplici modo considerandum est:

1) Vel

- 1) Vel enim hepar motu spastico nimium *contractum* est; id quod ordinarie in adultioribus contingit.
- 2) Veinimum *expansum*, & hoc sæpius in iunioribus reperitur; qui vterque status motum sanguinis per hoc viscus liberiolem impedit, & infarctum efficit. De hoc materia legi meretur *dissertatio Stablii de hydrope.*

III. SIGNA.

1. Angustia præcordiorum, præsertim circa hypochondrium dextrum, cum respiratione difficili.
2. Dolor grauens & obtusus, interdum etiam pulsui respondens.
3. Æstus volaticus, & phlogoses repentinæ, cum rubore faciei, & colore insigni in volis manuum.
4. Sitis vaga.
5. Oris siccitas & amaritudo.
6. Saliva glutinosa.
7. Tussis sicca hypochondriaca.
8. Prostratio adpetitus.
9. Cardialgia inliguis.
10. Lassitudo & grauitas artuum.
11. Somnus inquietus & iactatione corporis turbatus.
12. Habitus corporis flaccidus, immo, ob impeditam liberiolem lymphæ separationem, contabescens.
13. Urinæ sub initium sunt tenuiores; quo magis autem hectica accedit, eo magis saturati aurantii coloris existunt, & deinde rubicundum sedimentum exhibent.
14. Augmentum doloris, quando hypochondrium digitis tangitur.
15. In statu nimie hepatis expansionis, tumor dextri hypochondrii notabilior visu & tactu discernendus sentitur.
16. Aluus plerumque adstricta, & reliquarum actionum tardior successus obseruatur.

IV. SVBIECTA.

1. Sunt hic fere eadem, quæ tabula de infarctu lienis indicata sunt.

2. Præ-

2. Præcipue tamen temperamentum melancholico-cholericum huic malo magis subiacer.
3. Hypochondriaci & hysterica, congestione versus venam portæ laborantes.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens remota* est plethora cum spissitudine sanguinis coniuncta,
2. Causa *antecedens propior* est vniuersus motuum hypochondriacorum adparatus.
3. Causa *immediata & proxima* est vel
 - 1) spastica hepatis contractio, vel
 - 2) motus illius tonicus remissior.
4. Causæ *occasionales, præcatartica & aduentitia* sunt:
 - 1) Suppressio hæmorrhagarum in primis hæmorrhoidum & mensium.
 - 2) Neglectio artificialium adfuetarum.
 - 3) Impeditus sanguinis progressus per hypochondria.
 - 4) Peruersa febrium medicatio, intermittentium quidem per adstringentia, acutarum autem per salia volatilia vel refrigerantia topica.
 - 5) Peruersi vsus vomitoriorum, maxime in plethoricis puellulum adultis & spontaneis sanguinis euacuationibus adfuetis.
 - 6) Iracundia, præcipue inter cibum, vel statim post eundem.
 - 7) Diæta crassa & potus parcior.
 - 8) Frequentissime haustus frigidus, corpore calente.
 - 9) Abusus acidulorum adstringentium in morbis chronicis.

VI. PROGNOSIS.

1. Infarctus hepatis legitime tractatus, admittit quidem curationem, præsertim in statu recente; si autem ineptis medicaminibus tractatur, inflammatio cum febre acuta, immo suspecti vomitus & alui fluxus accedunt.
2. Quando mature non tollitur, facile transit in scirrhum, & denique in hydropem, cachexiam ictericam, hepaticam.

3. Infarctus hepatis, *expansione* visceris conspicuus, facilius tollitur, quam qui cum nimia hepatis *contractione* coniunctus est; cuius etiam vestigia hectica sæpius legit.
4. Hæmorrhoides vel menses quando hepatis infarctui, a sanguine congesto oriundo, superueniunt, sæpius malum solvunt.
5. Ira, vti morbum grauiorem, ita etiam difficiliorem reddit medicationem.
6. Infarctus *hepatis* maioris est momenti, quam infarctus *lienis*, tam ratione periculi, quam difficultatis medendi.
7. Rarius infarctus hepatis subit corruptionem.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

Methodus differt secundum causas.

1. In spastica *contractione*, sequente modo procedendum est:
 - 1) Primæ viæ abstergendæ & euacuandæ sunt per lenia laxantia, sennata, rhabarbarina &c.
 - 2) Deinde, ad causam antecedentem auferendam, instituitur venæ sectio in pede, in hæmorrhoidibus vero suppressis, hirudinum ad anum applicatio.
 - 3) Postea materia, in hepate impacta, incidatur, resolua- tur & abstergatur. In hunc finem præ aliis commendantur:
 - a) *Radices*: cichorii, taraxaci, graminis, vincetoxici, pimpinellæ albæ, ononid. apii, polypod. squillæ, quæ autem modeste adhibenda est.
 - b) *Herba*: hepat. nobil. capill. veneris, cuscuta, acetos.
 - c) *Flores*: bellid. min. borrag. bugloss.
 - d) *Semina*: anisi, fœniculi, carui, baccaë lauri & iuniperi
 - e) *Cortices*: winteran. citr. cinnamom. aurantior.
 - f) *Gummata*: ex quibus præcipue ammoniacum ab *Ettmüllero* laudatur. *Vid. cautel.*
 - g) *Salia digestiua*: nitrum antimoniac. tartar. vitriolar. arcan. duplicatum, sal Anglican. mirabile *Glauberi*, qui-

quibus nitrum & modicum absorbentis adiiendum est.

- h) *Composita*: pilulæ *Stahlî*, *Becheri*, quæ tanto magis commendantur, quia febres suppressas facile reuocant, & hinc medelam reddunt faciliorem.
- i) *Laxantia cum epicrasi*; ubi resoluentia, iam commendata, cum lenioribus euacuantibus, præcipue chologogis maritanda sunt.
- 4) Ad relaxandam hepatis *stricturam* conducunt
- a) *Interne*: laxantia modo indicata.
- b) *Externe*: Emplastra emollientia, non continenter, sed per vices regioni hepatis imponenda, ne suppurationem inducant, & cum tonico-neruinis alternanda e. gr. imponatur emplastr. emolliens, siue sit diachyl. cum vel sine gummatibus, siue de meliloto, & post 24 horas emplastr. tonico-neruinum substituat, v. gr. diaphoret. *Mynsichti*, de spermat. ceti eiusdem.

2. In nimia hepatis *relaxatione* ea ipsa methodus adhibenda est, quam *tabula de infarctu lienis* commendauimus.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Cautelæ, quæ tab. de infarctu lienis traditæ sunt, etiam hic obseruari debent.
2. *Gummi ammoniacum* egregiam sane resoluendi habet efficaciam, quando autem, secundum *Ettmüllerum*, vel in vino, vel in aqua destillata soluitur, & in tali fluida forma propinatur, ad modum nauseosum exhibet saporem. Commodius itaque in forma pilularum sumitur, e. g.
 Recip. Gummi ammoniac. depurat. drachm. I.
 Extract. panchymag. *Crollii* drachm. II.
 centaure. minor.
 card. bened. ana drachm. semis.
 Mf. pilulæ dos. scrup. I.
3. Quo magis *volaticus estus* vrget, eo sæpius nitrosa cum absorbentibus & salibus digestiuis maritata, propinanda sunt.
4. *Cichorium* hic specificè laudatur, a cuius radicis conditæ solo v-

- lo vsu ægrum eius modi restitutum esse, *Stahlius* meminit.
5. *Millepedes* in obstipationibus glandularum a plerisque quidem commendantur, sed quia fortius resoluunt, partium autem veræ obstipationes præcipitem medicationem ægre tolerant, caute hinc adhibeantur.
 6. *Tuffis*, si non adeo vrget, speciali non indiget medicatione; quando autem exasperatur, tractanda est, uti tabula de tussi indicauimus.
 7. Si *commotiones febriles* superueniunt, nitrosa & absorbentia, cum acidis saturata, profunt.
 8. *Potus* sufficiens, humectans, iniungendus est, non solum sub therapia, verum etiam post eandem. Item *mosus* corporis placide succussatorius, abstinendo a venere, diætâ calida, aromatica, vinosa.
 9. *Causse occasionales* quidem omnes euitandæ sunt, maxime tamen peruerse *februm intermittentium suppressiones*: nam infarctus hepatis & lienis tam certe inde proueniunt, ut etiam vulgus causam horum infarctuum per denominationem *Fieber-Ruchen* manifeste designet.
 10. *Venesectiões* in superioribus corporis partibus administratæ, non solum nullum vsu, sed & sæpius damnum adferunt.
 11. Ad *alui obstructiões* & incommoda flatulenta conducunt clysteres emollientes, roborantes; cauendo, ne stimulantia addantur: aluo enim adstricta reliqua remedia parum profunt.
 12. *Discutiētia acriora* & *volatilia* hepatis structuram augent.
 13. *Purgantia acriora* noxia existunt.
 14. *Exsedatiuis*, optima virtute prædita sunt, cinnabaris, & cortex cascarillæ.
 15. *Specificæ* ad spasmos hypochondriacos coercendos conducit *millefolium*.
 16. Absorbentia terrea, acida & alia incrassantia sunt euitanda.

TABVLA XLI.
DE
SCIRRHO HEPATIS.

I. **D**EFINITIO.

Scirrhus hepatis est tumor huius visceris induratus, a restagnatione humorum, sensim spissescentium, &, exhalantibus tenuissimis sanguinis portionibus, siccescentium, prognatus. Deriuatur a σκίρσις, induro.

II. **D**IFFERENTIA.

1. Scirrhus hepatis differt *gradu* : alius enim totum viscus, alius vero partem eius obsidet.
2. Differt ab *infarctu* eiusdem visceris non solum gradu *lesionis*, sed & *symptomatum* ; scirrhus enim semper affectus œdematoso - hydropicos, vel hecticam pro comite habet.
3. A *scirrho lienis* hic scirrhus hepatis differt *tatione loci & symptomatum*.

III. **S**IGNA.

1. Tumor & durities in hypochondrio dextro, ceu regione hepatis; quæ pathemata constanter & durabiliter sentienda, immo tactu sæpe externo percipienda sunt.
2. Dolores obtusi, tendentes & grauantes.
3. Iunguntur velut ordinariæ & indiuiduæ comites tussis & affectio asthmatica, vtraque sicca.
4. Decubitus incommodus in latere opposito.
5. Adpetitus ad modum languet, & post sumtos in minore quantitate cibos subitanea satietas, cum pressione circa ventriculum, & difficultate respirationis, accedit.
6. Concurrit sensibilis hectica, quæ tabem in partibus superioribus, in inferioribus vero tumorem pedum, primum leuiorem, deinde vero asciticum contumacem comites habet.

7. Urina coloris est aurantii, & consistentiæ crassæ, pauca prodit cum sedimento submucido, interdum graui & spisso, rosei coloris.

8. Adspectus est pallidus, cachecticus, ictericus.

IV. SUBIECTA.

1. Subiecta conueniunt cum illis, quæ præcedentibus tabulis indicata sunt.

2. Inprimis autem huic malo subiiciuntur personæ, quæ in febribus *intermittentibus*, præcipue quartanis, cum *china china*, in *acutis* cum *solibus volatilibus, refrigerantibus* topicis in regione hepatis, in *lentis* & *hæcticodeis* cum *decoctis vulnerariis* & *sincturis antiphthisicis* vulgaribus tractatæ sunt.

3. Item, quibus in hæmorrhagiis valida sistentia adhibita sunt, vel in *chronicis* adfectibus inconsideratus acidularum vsus male cessit.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens* est congestio sanguinis restagnatoria in hepate.

2. Causa *proxima* est repentina partium fluidarum & tenuiorum dissipatio, relictis solis spissioribus, in talem duriciem abeuntibus.

3. Causæ *occasionales, procatartica & aduentitia* sunt:

1) suppressiones euacuationum sanguinis naturalium.

2) Neglectiones artificialium adfuerarum.

3) Peruersæ medicationes, e. g.

a) Februm intermittentium, per adstringentia.

b) Februm acutarum, per refrigerantia & salia volatilia.

c) Infarctus adhuc simplicis, per topica frigida.

d) Hæmorrhagarum, per positue sistentia. *Vid. subiecta.*

4) Vehementes contusiones & vellicationes.

5) Insignes animi commotiones.

6) Diæta crassa, mucida, lentescens.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Quæ de scirrho *lienis* sub *prognosi* dicta sunt, illa valent etiam de scirrho hepatis, nempe
2. In casu recentiore aliqua adhuc discussionis spes est.
3. De reliquo euentus salutaris vel plane nullus, vel certe difficillimus, & summe anceps, obtinetur.
4. Scirrhus semper pronus est ad corruptionem subeundam, siue inflammatorio-suppuratoriam, siue sphacelofam.
5. Neutra harum corruptionum salutariter euenit : sphacelosa enim paucis horis mortem, suppuratoria autem exulcerationes & hæcticam lethalem inducit.
6. Induratio hepatis quando in subiectis cholericis aut siccis contingit, hæcticam, in humidioribus vero hydropem inducit.
7. Quo lentiore progressu generatur scirrhus, eo magis medicationem eludit.
8. Scirrhus hepatis, uti sequitur, sic etiam sæpe præcedit icterum, præsertim nigrum, interdum hydropicos & asciticos tumores, Comitatur nonnumquam cachexiam, maxime icteroidem, febres lentas, ex iracundia natas, quartanas suppressas.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. In scirrho hepatis adhuc *incipiente*, discussio sequente methodo tentetur.
 - 1) Aluus aperiatur per clysterem neruino-carminativum, reuulsionem & roborationem discutioriam promouentem. In hunc finem laudatur rad. alch. malux, flor. millefol. chamomill. verbasc. anil. fœnicul. &c.
 - 2) Deinde venæ sectio in pede instituasur, cum adplicatione hirudinum ad anum, in primis in subiectis hæmorrhoidariis; coniunctis pulueribus nitroso-temperantibus.
 - 3) Post ea resoluentia & discutientia cum laxantibus subiungantur. c. g.

Recip.

Recip. rad. gentian. rubr.
 bryon. ana drachm. II.
 pimpinell. alb.
 ari ana vnc. semis.
 herb. centaur. min.
 card. benedict.
 fumar. ana manip. I.
 hyssop.
 capill. vener. ana manip. semis.
 lign. sassafr. drachm. III.
 fol. fenn. vnc. I.
 fibr. hellebor. nigr. vnc. semis.
 rhabarbar. drachm. III.
 cremor. tartar. drachm. II.

Intif. contuf. Mf. nodulus, vino immergendus, dôf.
 Ein Wein-Gläßgen morgens nüchtern.

- 4) *Externe emplastra resolutentia & roborantia regioni hepatis imponantur. Conf. methodus præcedentium tabularum & cautela sequentes.*
- 5) *Tonica martialia nõn prius, quam facta discussione propinentur.*
2. In scirrho hepatis *obfirmato* irritus est omnis conatus, ne tamen nihil agere videamur, dicto modo medicatio instituat.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ tabula XXXVIII, XXXIX & XL. sub *cautelis* dicta sunt, omnia hic obseruanda commendantur.
2. *Mercurius dulcis* in adfectibus scirrhosis non reiiciendus est, egregie enim resoluit, e. g.

Recip. tartar. vitriolar.
 ocul. cancr. acido citri saturat. ana
 drachm. I.

mercur. dulc. gr. XII. m. f. puluis.
 divid. in sex partes æquales, & versus vesperam
 vna dosis sumatur.

3. *Topica* alternis diebus permutentur, e. gr. si hodie emplastrum de ammoniaco, aut de cicuta *Foresti* adplicatum fuerit, cras emplastrum diachylon vel de melilot. imponatur, vel emplastrum emolliens cum resolvente coniungatur, & sic quotidie continuetur.
4. Quod si vero exacerbationes hecticae frequenter & acriter his scirrhis constitutionibus superueniant, aut in *spongiosis*, praecipue eneruatis aut annosis, stases hydropicae accedant, & impetus talis typum seruet æquinoctialem aut solstitialem, tum prognosin magis lethalem formare, quam therapia sollicita ægrum defatigare praestat: reuertente enim æquinoctio vel solstitio periodus clauditur.

TABVLA XLII.

DE

ATROPHIA.

I. DEFINITIO.

Est Utrialis

Atrophia est defectus debitæ corporis nutritionis, a chylo, qui ob varia primarum regionum vitia, praecipue autem ob infarctum glandularum meseraicarum, ad massam sanguineam sufficientem quantitate non potest deferri, originem ducens, & lenta partium externarum consumptione potissimum sese manifestans. Deriuatur ab α priuat. & $\tau\rho\acute{\iota}\phi\omega$, nutritio.

II. DIFFERENTIA.

1. *Atrophiae* differentiam ab *infarctibus lienis & hepatis*, collatio praecedentium tabularum docet.
2. Differt atrophia, *strictè* sumpta, a tabida *hectica* consumptione
 - 1) ratione *causarum*: in atrophia enim *infarctus* tantum, vel ad summum durities glandularum meseraicarum, in *hectica* autem vera plerumque exulceratio cum febre aliisque symptomatibus subest.

- 2) *Gradu symptomatum*: in *hectica* enim omnia sunt acerbiora, quod ex *signis* inter se collatis, illucescit
- 3) *Ratione ætatis*: *hectica vera* potissimum pubertatem supergressos, *atrophia* vero iuniores magis adfligit.
3. *Aphthisi*, quod ex adfecta parte ipsisque causis, pulmone scilicet & exulceratione eiusdem patet.
4. Ab *aridura partium*, quæ aliqua tantum membra infestat, *atrophia* autem uniuersum corpus occupat.
5. *Amacie*, ubi tantum pinguedo consumitur: in *atrophia* autem ipsæ quoque partes musculosæ contabescunt.
6. *Arhachitide*, quæ consecrarium potius ac productum est *atrophiæ*.
7. Differentia tandem ipsius *atrophiæ* ex infra dictis *signis* atque *causis* patebit.

III. SIGNA.

- A. In *atrophia*, ex obstructione *glandularum mesenterii* proveniente, sequentia signa adparent:
 1. Languor & flaccida constitutio totius corporis in dies inualelscens.
 2. Remissio animi, fastidium omnium rerum, & summa sensibilitas.
 3. Color faciei deprauatus cum aliqua eiusdem inflatione & labiorum pallore.
 4. Oculi fulgore pristino destituti sunt, palpebræ interdum post somnum tument, & reliquæ corporis partes externæ contabescunt.
 5. Somnus est leuis & inconstans.
 6. Appetitus vagus, frigida magis desiderans.
 7. Angustia & maior molestia post cibum.
 8. Calores interni cum siti multa ac siccitate oris.
 9. Abdomen turgidum, durum, & in progressionem huius mali flaccescente nonnihil abdominis tensione, nodis tactu sentiendis obfessum deprehenditur, *Conf. obseruat. Ludouici in A. N. C. dec. I. an. III. p. 453.*
 10. Aluus plerumque iusto siccior est & adstricta.
 11. Vrina crassa, interdum plane chylosa adparet.
 12. Corpus sensim extenuatur, concurrente febricula & maiore siti per noctem potissimum adfligente.

13. Quæ symptomata nonnumquam ita exacerbantur, ut æstus fere hecticus cum virium notabili decremento ægri certo tempore incurrant.
- B. Quando autem, secundum quorundam auctorum observationes, ab *obstructione tunica villosa* intestinorum atrophiam nascitur, sequentia præcipue signa sese manifestant.
1. Nulli nodi sunt sentiendi.
 2. Aluus quæ alias siccior, quam maxime est fluxilis cum reiectione ciborum semidigestorum.
 3. Febris quando occurrit, longe lenior obseruatur.
- C. A *vermibus* tandem atrophiam dependens, in adultis signa admodum habet dubia, in iunioribus vero satis manifesta, nempe
1. Conqueruntur de variis abdominis doloribus *spasticis*, & maxime *morsicantibus* circa umbilicum.
 2. Experiuntur varia tormina tenesmodæ, ut sæpius desiderare conentur, in primis ieiuno stomacho.
 3. Vexantur crebrioribus vomendi conatibus, sub quibus copiosus liquor in os effunditur; id quod *lumbrico* sic dicto *cordialis*, dem *Sterc. Wurm*, vulgus adscribit.
 4. Nares perpetuo mucoso adfluxu, immo excoriatione adfectæ sunt, ob perpetuam titillationem ac frictionem.
 5. Fœtor oris, ut & fœcum alvinarum est teterrimus.
 6. Quibus omnibus frequentissimæ sternutationes interdum iunguntur. *Conf. tabul. de vermibus.*
- D. Malo diutius in *teneris* persistenti, non raro succedit *rachitis*, vulgo die *Englische Krankheit*, cum tumoribus & superadcretionibus artuum, mit gedoppelten Gliedern, vel incuruatione tibiarum, spinæ dorsi, gibbosa deformatione, coxis excrescentibus, daß die Hüfte auswachsen; quæ atrophiam quidem solvunt, sed tristi spectaculo sæpe per ætatem corpus deturpant.
- IV. *SVBIECTA*
1. Atrophiam est morbus *potissimum infantilis*, quem tenera hæc ætas facile incurrit post diaphnoen subito repressam, item post præmaturam exhibitionem cibi nimii crassioris & ecrevitiæ fœculentiæ, acidæ, lac coagulantis, in primis si potus .

porus frigidus noctu, sudante corpore, exhibetur, vel spontaneæ diarrhoeæ adstringentibus supprimuntur.

2. Non raro etiam *pueri & adolescentes* ad modum voraces, diæta cruda, obstruente, vel spiritu vini abutentes, vermibus infestati, vel in febribus male tractati, ab hoc malo infestantur.
3. Hunc quoque morbum incurrunt homines, qui grauibus morbis, reliquias in visceribus relinquentibus, exhausti, vel nimis hæmorrhagiis debilitati sunt.
4. Qui scrofulis vel glandularum externarum infarctibus obfessi sunt, sæpe etiam glandulas mesenterii habent obstitatas.
5. Item insignibus internarum partium concretionibus laborantes.
6. Tandem etiam effascinati, vel incantati, in quibus vitale negotium naturæ perturbatur, & sic actus etiam nutritionis confunditur.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *antecedens* est maxime infarctus glandularum meseraicarum, quibus chylus retardatur.
2. Obseruarunt etiam nonnulli auctores, quod *obstructio tunica villosa* huic malo ansam præbere possit: quando enim *oscula vasorum lacteorum*, in tunicam nerueam & crustam sic diætam villosam intestinorum hiantium, obstructa sunt & obdurata, aliter fieri non potest, quin chylo aditus ad massam sanguinis præcludatur.
3. *Vermes* quoque non raro hunc adfectum inuicant.
4. Causa *continens* est impeditus vel chyli vel lymphæ motus, a dictis causis antecedentibus inductus. Vnde tumor abdominis dependet. *Conf. causa tab. de hydropæ.*
5. Causæ *occasionales*, procatarticiæ & aduentitiæ in subiectis modo indicatæ sunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Quem ad modum atrophia in adultis & annosioribus raro prius dignoscitur, quam asciticos vel hæcticos effectus

iam attraxerit, ita prælagium, horum malorum genio consonum, exinde redundat.

2. *Recentior* atrophia non difficulter tollitur, præcipue, quæ ab usu mucidorum, viscidorum, glutinosorum ortum traxit, & obstructionem tunicæ villosæ intestinorum effecit.
3. Quando vero ab *infarctu glandularum* orta est, difficilis ad modum est curatio. Nam
 - 1) altas facile agit radices.
 - 2) Febris accedens illa remedia, quæ ad resolutionem scirrhi efficacia sunt, non permittit.
 - 3) Huic difficultati adnumeranda est infantum pertinacia, quæ usum remediorum chronicum sæpe respuit.
4. *Dolor* quando adhuc adest in scirrho, bene nos sperare iubet, testatur enim, quod materia infarctæ aliquo modo adhuc mobilis, & facilius resolutioni obsecundatura sit.
5. *Inueterata* contumax quidem est, longe autem felicioris curationis, & mitioris euentus obseruatur quam *hectica*.
6. Quo magis vero hæc complicatur, eo periculosior & intrastabilior atrophia existit; id quod fere fit in adultioribus.
7. Atrophia, quæ a morbis prægressis, e. gr. nimis hæmorrhagiis, febribus male tractatis, originem duxit, longe difficilius perfanatur, quam quæ ex diætæ vitis exorta est.
8. Quo magis vrget *diarrhæa* in atrophia, eo citius succumbunt patientes.
9. Vrina quando flammea redditur & rubicunda, cum frequente æstu ac phlogosibus post cibum, præsentiam hecticæ indicat.
10. Atrophia inueterata interdum degenerat in *rhachitidem*, quæ plurimum omnem respuit curationem.
11. Eiusdem quoque fortis est atrophia illa, quæ ab incantationibus prouenit.
12. Quæ vero inducta est a vermibus, his enecatis & sublatis, atrophia, non nimium inueterata, feliciter tollitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Ante omnia ratio habenda est caussarum, quæ atrophiam produxerunt. Sic

1. Quando *glandula meseraica* obstructa sunt, vel *tanica villosa* intestinorum in caussis est, primo loco sordes primarum viarum educendæ sunt per lenia *laxantia & abstergentia*. Huc faciunt: mercur. dulc. legitime præparatus, sal cathart. amar. arcan. duplicat. sal polychrest. vel syrupus de cichorio cum rhabarb. item sal Anglican. manna, syrupus de spina cerui, domesticus dictus. Hæc laxantia in progressionem curæ aliquoties repetenda, vel sequentibus subinde interponenda sunt.

2. Deinde ad infarctum glandularum meseraicarum quantum expediendum, & debitum chyli ac lymphæ progressum restituendum, exhibenda sunt incidentia, resolutentia & attenuantia, cum tonicis martialibus sociata. In hunc finem laudantur

1) *Rauices*: ari, vincetox. pimpin. alb. zedoar. leuist. imperat. galang petasit.

2) *Ex herbis* hederæ terrestr. in succo & iusculis.

3) *Salia enixa digestina*: tart. vitriolat. arcan. duplicat. sal abfinth. centaur. min. card. bened.

4) *Composita*: tinct. antimon. tartarisat. tinct. falis tartar. essent. succin. essent. alexipharmac. *Stahlii*.

5) *Tonica martialia* huc facientia sunt: crocus martis antimoniæ. aperitiuus *Stahlii*, tinct. vitriol. mart. *Ludovici* e. gr.

Recip. tartar. vitriolat. draehm. I.

croc. mart. antimoniæ. subtiliss. scrup. I.

Misc. dosis pro ætatis ratione differt, a gr. 6. 8. 10. 20. qui pulvis bis quotidie fumendus, & per duas vel tres hebdomades, subiuncto post octauum circiter diem aliquo semper laxante, continuandus est.

3. Si quid *febrilis*, uti fere fit, concurrat, pulveri modo descripto antimon. diaphoreticum, & vrgente æstu, nitrum immisceri potest in infantibus, pueris insuper essent. a-

lexipharmac. multa essent. scordii saturata propinetur; infantibus autem adhuc *sugentibus* talia non æque conueniunt, sed nutricibus potius exhibenda sunt.

4. Cum hisce internis coniungantur simul *externa*. Laudantur præ aliis
 - 1) *Emplastrum* saponat. *Barbette*, quod abdomini late impositum probe resoluit & aluum relaxat, vnde nonnullis das Purgiet. Pflaster audit. Item emplastr. de ammoniac.
 - 2) *Linimenta*, quæ præcedentibus tabulis ad infarctus viscerum commendata sunt, e. g. ex oleo laurin. lumbricor. terrestr. vnguent. de althæa & oleo ceræ.
 - 3) *Balnea* ex aqua dulci parata, *vid. cautel.*
 - 4) *Contactus manus* illius hominis, qui *tabe mortuus* est. Hoc enim remedium quoniam scrofulas discutit, multo magis infarctus restituere ab illis creditur, qui ad propriam experientiam prouocant.
5. Quando autem adfectus a *vermibus* originem ducit, illæ necandæ sunt ac eliminandæ. *Confer. tabul. de vermibus, & infra cautel. 2.*
6. Remotis impedimentis *nutrientia*, & alimenta, laudabilem chylum largientia, porrigantur, v. g. iuscula hordeacea, lacticia, emulsiones, gelatinæ cum amygdalis &c.
7. De cura specialioribus causis destinata sub cautelis dicemus.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Quum* morbos curare, sit causas eorum tollere; hinc in atrophia semper ad causas specialiores, huic malo ansam præbentes, respicere, easque conuenienti modo remouere decet Medicum.
2. *Quando* itaque *vermes* hoc malum induxerunt, non cedit atrophia, nisi colluies ista anthelminticis amaris, e. gr. myrrha, sem. fantonici cum pane mellito, vel insipidis, v. gr. corallina, C. C. vsto, mercurialibus, enecetur, & extra corporis fines proscribatur. *Conf. tab. de vermibus.*

3. Si a nimia *sanguinis profusione* nata sit atrophía, gelatinis nutritibus vires reficiantur.
4. Quod si vero magicas *incantationes* subesse certum sit, res est calamitosa. Commendantur autem in tali casu *balnea* ex antimagicis parata, e. g. sideritide, conyza flore violaceo, stochad. citrin. antirrhia. aruens. hyperico, abrotano &c. cum formicis.
5. *Balnea* in omni tabe, tanto magis in infantibus, egregie conveniunt, non opus autem est, peculiaría additamenta herbarum adhibere, nisi incantationis suspicio præsto sit, sed aqua dulcis sola sufficere potest.
6. *Vsus acidularum* internus, cum *vsu thermarum* externo effectum sæpius haud contemnendum edit in infarctu nondum inueterato.
7. *Sensibilitas* subiectorum ubique attendenda est, ne per vehementiora remedia, vel maiores doses iuniores & tenellos exagitemus & obruamus.
8. Adultioribus & non adeo sensibilibus *gummata* profunt. Gummi *ammonicum* sane temperatissimum, *galbanum* autem iam nimis acre observatur.
9. *Mercurius dulcis* non repetitis & magnis dosibus propinandus est, vomitus enim in sensibilibus excitat, qui quidem non adeo reformidandi sunt, respiciendum autem est, ne plus iusto contingant.
10. Remedia *volatilia* vt & *marsialia*, absque præmissa conueniente resolutione & euacuatione adhibita, materiam profundius in glandulas impellunt, & febrem augent, vt adeo facilius hecticici fiant.
11. Circa *vsu topicorum* euitetur partim *nimia emolitio*, partim *nimia tonica roboratio*; priora enim *abscessum*, posteriora vero maiorem *indurationem* inducunt.
12. A multis *lacticiis* pueris & infantibus cauendum est; quando autem adhuc sugunt, nutritibus ad lac corrigendum exhibeantur remedia absorbentia, salina digestiua, diuretica, immo anticatarrhalia e. g. oculi cancri, arcan. duplic. essent. succin. pimper. alb.
13. In *rachitide* succedente eadem tractatio tutissima est, maxime

xime per tincturam antimon. acrem, & martialia cum radice ari, & salibus digestiuis. *Externe* linimenta, vel spiritus neruini, item balnea ex neruinis coronariis, in primis serpillo, frictiones, varia machinamenta, ad partes corporis in debitam molem, situm & ordinem reducendas, simul in auxilium trahantur.

14. Intermittentes suppressæ, reuocandæ & curandæ sunt per laxantia & digestiua. *conf. tab. de febre tertiana*: reuocata enim febres vtilem atrophicis exhibent medicinam.
15. In diæta euitentur refrigerium, spiritus vini, potus noctu & ieiuno ventriculo concessus, saculentus, cibi crudi, azymi, acidi: eligantur ex aduerso iuscula aromatizata, decoct. C. C. passulatum, vel cum radic. polypodii, decoct. hordei, cum aniso, foeniculo, aliisque leniter resolventibus, quæ felicem curationis successum non parum promouent.

TABVLA XLIII.

DE

NEPHRITIDE.

I. DEFINITIO.

Vese Fijidama.

Nephritis est adfectus renum inflammatorio-erysipelaceus, a congestione sanguinis stagnatoria, hæmorrhoides externas eminus respiciente, natus. Deriuatur a νεφρός, ren.

II. DIFFERENTIA.

1. Nephritis *simplex*, seu *pura*, differt a *calculosa* sequente ratione.

1) Nephritis *simplex* per longum tempus sine vilo calculo, & calculus ex aduerso sine vlla vera nephritide ægrum potest adfligere.

2) In nephritide *simplice* occurrit dolor & ardor lumborum

rum profundus, premens & tendens; in *calculosa* autem dolor acutissimus adfligit, *conf. signa* subsequencia.

- 3) In *simplice*, vrina post sui demum refrigerationem, vti in omnibus arthriticis adfectibus, *crystallos* pellucidas & rubicundas lateribus vitri adfigit; in *calculosa* vero sabulum non adeo rubrum statim post emissionem, vel pauciore mora, in fundo subidet.
 - 4) *Simplex* placido corporis motu, præcipue ambulatorio, subleuatur; *calculosa* autem per illam exasperatur, & quæta continentia potius mitescit.
 - 5) Tandem *calculosa* vix vniquam curatur, *simplex* autem quando tempestiue & legitime ei succurritur, omnino curari potest & solet.
2. Nephritis *vera* differt a *nephritide spuria*, quæ dolore spastico, tensiuo & lancinante, in externis potissimum dorsi & lumborum musculorum partibus se se manifestat.
 3. Differt quidem *profundus nephriticus* dolor a doloribus *ischiadiciis*, qui magis externas musculosas partes adficiunt, ob conspirationem autem caussarum & vasorum, quam nephritis cum malo ischiadico fouet, hi dolores ita interdum collidunt, vt dubium videatur, num magis rheumatico-ischiadici, an vero nephritici habendi sint.
 4. Differentiam doloris *colici* in regione lumbari a nephritico docent diuersitates subiectorum & antecedentium caussarum.

III. SIGNA.

1. Dolores in regione lumborum, non ita frequenter *utrumque*, sed potius *alterutrum*, præcipue vero *sinistrum* latus occupantes.
2. Sunt illi sub initium magis tendentes & prementes;
3. Sensim autem fiunt acutiores, lancinantes & inflammatoriæ acerbitatis, cum anxia inquietudine.
4. Occupat hic dolor ægrotos sæpe numero cum commotionibus febrilibus, horrore nempe, vel ad minimum cum horridula vaga percussatione;

5. Cui succedit calor acri ardore molestissimus.
6. Querela de imminutione aut plane cessatione appetitus, virium summa deiectione & siticulositate.
7. Somnus vel plane nullus, vel tamen ad modum inquietus est.
8. Concurrit capitis dolor obtusus, aut ad minimum perturbatio & vertiginosa debilitas.
9. Interdum molestiæ circa primas vias, nempe tormina intestinorum colica, & vomitoriæ ventriculi subuersiones, siue concurrunt, siue nouum insultum præcedunt.
10. Nonnunquam dolor per totum femur excurrit, vel tamen illud stupore & rigore adficitur.
11. Impetus non per multos dies, sed per paroxysmos sævit, interpositis longis, præcipue ægro cautius viuentem, interuallis.
12. Sub impetu alius potissimum adstricta obseruatur.
13. Adest conatus mingendi crebrior, vrina parciore, tenuis, vel, si obtusi solum dolores adsint, crassior, & filamentis quasi mucidis imbuta procedit.
14. Nonnunquam vasa spermatica, quæ ad testes procedunt, tumore & dolore simul adficiuntur; de qua re legi meretur *theoria Stahlî pag. 1126. seqq.*

IV. SVBIECTA.

Nephritidi præ aliis obnoxii sunt homines

1. Temperamenti *sanguinei*; aut dominante sanguineo præditi, qui sunt habitus corporis laxi, spongiosi, succulenti.
2. *Hippocrates* nephritidem non nisi *senioribus* familiarem obseruauit, sed in nostris *regionibus* & *moribus* etiam *consistenti* ætati euenit.
3. Iunior autem & infantilis ætas ab hoc morbo non corrumpitur, nisi hæreditaria dispositio, vel violentæ causæ externæ concurrant.
4. Sexus virilis longe frequentius a nephritide exercetur quam femininus, utpote a moribus hæmorrhoidalibus magis immunis existens.

5. Qui post aduetae sanguinis euacuationis neglectum motibus corporis concussoribus fortioribus se exponunt.
6. Vel causis occasionalibus subsequenter subiacent.
7. Podagrici & ischiadici plurimum sunt nephritici, ob connexionem caussarum & vasorum.
8. Nephritidi *spuria* praecipue subiacent illi, qui haemorrhoidum fluxum vel iam sunt experti, vel ad eundem proclives.
9. Idem qui a vita agili ad otiosam transeunt, & diata calida, venere & fortioribus motibus succussoribus gaudent.

V. CAUSSAE.

1. Causa antecedens *remota* est status plethoricus.
2. Causa antecedens *propinqua* est rheumatica congestio sanguinis versus renes, haemorrhoides *eminus* respiciens.
3. Causa *immediata* & *proxima* est stasis sanguinis congesti in renibus, propter quam motus inflammatorius accedit.
4. Causae *occasionales* & *procatarticae* sunt:
 - 1) Euacuationes sanguinis naturales neglectae.
 - 2) Artificiales aduetae praetermissae.
 - 3) Abusus diureticorum calidorum & acrium e. g. oleorum destillat. terebinthin. iuniper. succini, balsam. sulphur. spirit. acris empyreumat. tartari &c.
 - 4) Abusus veneris & aphrodisiacorum, e. g. stinc. marin.
 - 5) Violentae corporis & animi commotiones per vecturam, equitationem & iracundiam.
 - 6) Violentae laesiones per ictum, lapsum &c. in regionem lumbarem.
 - 7) Diata calida, aromatica, vinosa.

VI. PROGNOSIS.

1. Nephritis *simplex*, si mature & recte illi consulitur, potest curari, *calculosa* autem vix unquam.
2. Licet enim quauis internae inflammationes grauioris momenti aestimandae sint, nephritis tamen omnibus aliis leuior habetur, ob perpetuam absterisionem, & corruptionis inhibitionem per vrinam praeterlabentem.
3. Inter ea metum facit subsequenter exulcerationis, quae pro-

ximam viam munit ad calculum generandum & hecticam renalem inuitandam.

4. Quo frequentius & acrius paroxysmi redeunt, eo maius periculum minantur, & eo grauius exulceratio praualescit.
5. Rarissime fit, vt ren vterque corrumpatur, sed plerumque tantum sinister.
6. Quo maior ebullitio sanguinis adest, eo peior est stasis inflammatoria. Hinc in iunioribus longe vehementius nephritis exacerbatur, & difficilias tollitur, quam in senioribus, vbi minor orgasmus occurrit.
7. Quo copiosius calidiora diuretica in vsum trahuntur, eo pertinacius adfectus persistit, & eo certius calculus renalis & hectica sese adlociant.
8. Hippocrates aphor. XI. sect. VI. iam obseruauit, quod hæmorrhoides, nephriticis superuenientes, pathemata huius adfectus soluant.
9. Aluus adstricta dolores exacerbatur.
10. Nephritis spuria non raro in senibus marasimum post se relinquit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Ante omnia aluus expediatur per clysterem, non stimulantem, sed emollientem, cum lacte vel iure carniū parandum. Simon Pauli, experientia duce, commendat herbam veronica costam, & cum oleo quodam atque paucissimo sale adplicatam.
2. Deinde ad *orgasimum* sanguinis & ardorem temperandum, exhibeantur
 - 1) Pulueres nitrosi, cum sale quodam digestiuo & cinnabari optima coniuncti, ac intra tertiæ horæ spatium repetendi; immo nitrosa ipsa in potu.
 - 2) His pulueribus versus vesperam antimon. diaphoreticum cum absorbente quodam immisceatur e.g. antimonii diaphoret. gr.VIII. ocul.cancr. gr.IV. pro dosi.
 - 3) Huic indicationi etiam fauent *emulsiões*, cum aquis diapnoicis & temperantibus. e.g. Re-

Recip. femin. card. Mariæ drachm. III.

papau. alb. drachm. II. contus. adfund.

Aquæ scord. veronic. scabios. card. bened.
 sambuc. chærefol. ana vnc. I. aquæ rosarum,
 cinnamom. ana vnc. semis, fiat s.a. emulsio,
 cui adiiciantur antimon. diaphor. drachm.
 I. ocul. cancr. scrup. II. & edulcoretur cum
 saccharo.

- 4) It. serum lactis, decoct. ex scorzoner. hordeo, C.C. ebo-
 re, gelatina C. C. ol. amygdal. dulc. cum spermate
 ceti vel manna, decoct. *Foresti* ex femin. althææ, malu.
 cicer. rub. IV. frigid. maior. hord. caric. pingui. sebest.
 rad. liquirit.
3. His temperantibus interponatur semel vel bis ante meri-
 diem essent. alexipharmaca acidulata, sed sine regimine,
 ad æqualem tantum distributionem humorum obtinen-
 dam.
4. *Externe* conducunt ad *discussionem*
 - 1) sacculi sicci ex floribus chamomill. melilot. femin. fœ-
 nu græc. &c. lumbis imponendi.
 - 2) Spiritus serpilli abstractius, dolenti regioni adpli-
 candus, item spiritus formicarum.
 - 3) Emplastrum saponat. *Barbette*, quod tamen non ultra
 10. 12. horas in lumbis relinquendum, alias facile
 euenit, quod sub *signis* num. 12. indicatum est; vel
 loco dolenti applicetur vnguentum Comitissæ, aut
 refrigerans *Galenii*, it dialth. cerussæ.
5. Ad *reulsionem* autem congestionis inflammatoriæ, præ-
 ter clysteres superius commendatos, aliquid etiam con-
 tribuunt
 - 1) *Frictiones & ligatura* partium oppositarum.
 - 2) Quando nimium increbescit, applicatio *hirudinum*;
 quæ omnia quoque *ischurie* accedenti subueniunt.
6. Remittente autem insultu, vsum laudabilem præstat MR.
 polychresta *Stahlis*, ad tonum in renibus restaurandum.
7. Toto medicationis tempore sufficiens humectatio necessa-

ria est, in quem finem potus tepidus, dilutus, leuiter acidulatus & potus thée laudatur.

B. *Extra paroxysmum.*

1. *Vena sectio æquinoctialis* in pede numquam negligatur, vel *sacrificatio* menstrua.
2. *Dyscrasia* humorum interdum per lenia *laxantia*, e.g. rhabarb. sennam, passulas educatur.
3. Negotium hæmorrhoidale prudenter respiciatur.
4. Alui siccitas, huic adfectui familiaris, corrigatur diæta molli, lubrica, temperata & diluente: vitando diætã calidam, vinosam, aromaticam, venerem & iracundiam.

VIII. *CAVTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. Nephritis *simplex* a *calculosa* distinguenda quidem est, ad *prognosin* tanto certius formandam, ad *vsũ* autem *practicũ* hæc distinctio non adeo insignis est vtilitatis: vni-formis enim horum malorum tractatio tutissima censenda.
2. *Sanguinis ventilationes*, vti semper ad anteuertendum morbum maioris efficaciam sunt, quam ad curandum, ita etiam præstat, in paroxysmo nephritidis ab illis abstinere.
3. Vbi autem insignis *plethora* concurrit, ibi *vena sectio in pede* vix poterit omitti; quæ in vrgente tali casu statim post clysteris adplicationem instituenda est.
4. *Extra paroxysmum* tempestiuæ *vena sectiones* & *hirudines* non solum multum leuaminis adferunt, sed etiam futuræ medicationi viam præparant, vt longe æriorem efficaciam exhibeat.
5. A medicatione *calida* & *acriore*, sanguinem feruidius commouente, quam maxime hic cauendum est.
6. Inprimis pessimi sunt effectus *vsitata* hodie *diuretica*, præcipue oleosa, e.g. ol. destillat. cerebinth. iuniper. succin. pic. spiritus acris empyreumat. tartari, spiritus nitri simplex & clysteriformis, immo, largiore vsu, etiam dulcificatus; millepedes, raphanus rusticanus, bacca alkekeng. arill. cynosbat. amygdalæ rancidæ & amaræ; in sensibilibus etiam aqua fragorum, petroselini &c. quæ aucta vlceratione, calculum citius progenerant.

7. Ipsa *salia volatilia*, tanto magis *oleosa*, sanguinis orgasmum, & congestionem ad renes augent: Vnde hæc quidem nullius, illa autem, declinante paroxysmo, alicuius adhuc vsus sunt.
8. Externe *foris* calidus egregium doloribus adfert solamen.
9. Nimia *refrigerantia* inflammatoriam stasim magis coagulant, *leniora* autem, antea laudata, eandem mitigant.
10. *Sacculi* ex speciebus paregoricis, siue *ficci*, siue cum *vino* cocti, inter discutientia fere ceteris sunt præferendi.
11. *Therma* externe aliquam vtilitatem præstant. *Acidularum* temperatarum vsus internus non esset contemnendus, nisi labis internæ suspicio dehortaretur.
12. *Emplastica* obstruunt poros, & sic discussionem staseos remorantur; emplastrum autem *Barbette*, cum prædicta cautione vsurpatum, egregii & præsentis est effectus.
13. *Camphora*, licet alias externo vsu satis potenter succurras inflammationibus, in nephritide tamen cautiùs adhibenda est, ob diureticam, quam efficit, stimulationem: vnde vel plane omitti, vel cum refrigerantibus mixta applicari debet.
14. *Millefolii* vsus in hoc malo haud sincerus est & probatus.
15. Nephritici ab operatione *primarum viarum* ad modum sibi caueant: ob singularem enim consensum huius mali cum ventriculo & intestinis omnia edulia flatulenta, leguminosa, concoctu difficilia e. g. carnes fumo indurata, pisces duriores, oleracea nimia, caseus macrior &c. nephritidem præsentissime exacerbare sentiuntur.
16. *Purgantibus* autem *acrioribus* sordes primarum viarum eliminare velle, infelix est tentamen: *blandiora* conceduntur.
17. Excretionem *urina* legitimam conuenit respicere, quam, vti diuretica acriora disturbant, ita pulueres, sub methodo commendati, placide promouent.
18. Diuretica *culinaria*, e. g. petroselin. asparag. apium, ciceres rubri, cepæ, allium, raphanacea &c. nephriticis non concedantur.

19. In refractaria alui obstructione clysteribus commode M. P. *Beccheri* vel *Stablii* misceri potest. e. g. drach. semis ad drachm. j.
20. *Vinum*, licet adluetum, parcissime tamen sumendum: tantum eius proderit, quantum cibis parandis admisceri potest.
21. Mutatio potus spirituosus in aqueum calidum, optime nephriticis solatur.
22. Quæcumque in *pectoris* vitiis solamen adferre solent, ea *renalibus* quoque læsionibus commode subueniunt. *Conf. tab. de phthisi caut.*
23. Quam ob causam & vulneraria, pectus consolidantia, renum vlceribus & calculorum prouentui, maxime nephriticis recursibus, obuiam eunt, e. g. consolid. *Saracen. heder. terrestr.* in forma thée vsurpara.



TABVLA XLIV.

DE

CALCVLO RENVV ET
VESICAE.

I. DEFINITIO.

1. Calculus *renum* est concrementum quoddam mucido-salinum a congestoria sanguinis itali, & hinc subnata huius visceris corruptione, siue vlcerosa, siue apostematode oriundum.
2. Calculus *vesicae*, qua talis, est concrementum mucido-salinum, ex hæreditaria parentum labe plerumque transmissum & prognatum.

II. DIFFERENTIA.

1. Calculus *renum* a calculo *vesicae* differt sequentibus.
 - 1) *Magnitudine*: *renalis* enim pisi mensuram raro excedit, *vesicae*.

vesicalis autem ita sæpe excrefcit, vt ab oui columbini mole vsque ad anatini magnitudinem accedat.

- 2) *Textura: renalis* frequentiffime afperitatem in fuperficie exhibet, *vesicalis* autem glaber & læuigatus quafi adparet, infuper ex pluribus lamellis, cepearum fimilitudine fibi inuicem fuperinductis, ac ætatem circiter huius concrementi defignantibus, conftat, in meditullio autem fui fubftantiam plerumque fabulofam fouet.
 - 3) *Firmitate: renalis* ante, quam ficcior euadit, fragilis, immo friabilis, *vesicalis* autem durus eft.
 - 4) *Numero: in renibus* multi ordinarie calculi reperiuntur, in vefica autem pauci, immo sæpe vnicus tantum deprehenditur.
 - 5) *Colore: renalis* ordinarie rufefcit.
 - 6) *Calculus renum* frequentius occurrit, quam calculus veficæ.
 - 7) *Reliquam differentiam figna, fubiefta & cauffa* docebunt.
2. Calculi *renalis* differentiam a *nephritide*, & conuenientiam pariter cum illa, præcedente tabula exhibuimus.
 3. Calculus *renum* non confundendus eft cum *tartarea* illa *concretione*, quæ in vrinis arthritico - rheumaticorum obferuatur, & vulgo hominibus pro fabulo imponit: nam verum fabulum, & calculi, ftatim post vrinæ miffionem in confiftentia folida fundum petunt, concretum autem tartareum arthriticorum poft refrigerium demum vrinæ coalefcit.
 4. Calculus *vesicae* eft vel
 - 1) *indigena*, qui in ipfa vefica natus, aut educatus eft; vel
 - 2) *aduena*, qui ex renibus per vreteres in veficam prolabitur, & vltcrius dehinc promouetur.
 5. *Motus* calculofi ab ipfa calculi præfentia bene funt diftinguendi: sæpe enim ingentes fpaflico - dolorifici motus adfunt, vbi tamen vel nullus, vel tantum exiguus calculus, præcipue in vefica gellatur, fine in fignibus doloribus & vitiis vrinæ.

6. Diuisio calculi *in dolentem & non-dolentem* fundata potissimum est *in subiectis*: Phlegmatici enim, ob laxiorem partium texturam tam exquisitos dolores & cruciatus numquam incurrunt, quos sanguinei experiuntur. *Conf. signa calculi renalis.*
7. Ceterum in aliis quoque corporis partibus, e. g. hepate, pulmonibus, concrementa eius modi occurrunt, quæ cum adfectu nostro, qui καλὴ ἐξοχην calculus dicitur, quod ad causas præcipuas attinet, conueniunt.

III. SIGNA.

I. Calculi renalis.

- 1) Dolor in lumbis vel vtrimque vel in alterutro tantum latere.
- 2) Isque profundus, constrictorius, tensiuus, pressorius & talem sensum exhibens, ac si palus ibidem infixus esset: ad minimum a suspitione suppurationis aut ulcerationis non alienus est.
- 3) In pure sanguineis hic dolor ad exquisitissimos cruciatus, & inflammatorios ardores excedit.
- 4) In phlegmaticis autem stupor solum, languor & flatulentia obseruatur.
- 5) Quieto corpore dolor notabiliter mitescit, a leui autem occasione paroxysmus denuo prouocatur.
- 6) Tempore huius exacerbationis ægri, præcipue sanguinei, multa & diurna horripilatione, vel frigore plane percelluntur, cum phlogosis intercurrentibus, & tonici motus alternis mutationibus, donec tandem calculi excretio subsequatur.
- 7) In paroxysmo autem curuati incedere coguntur calculosi.
- 8) Ipsi motus conuulsui in grauiore paroxysmo eodem interdum occupant.
- 9) Alius ordinarie adstringitur.
- 10) Interdum dolor quidam in glande penis sentitur, & paruuli calculi seu granula quædam *fastigiata*, quæ faciem crystallorum salinarum repræsentant, in illa reperiuntur.

- 11) Quando calculus per vreterem descensum tentat, ad regionem oslis *ilii* vsque dolor excurrit.
 - 12) Qui in vno magis latere calculum gerunt, illi tempore exacerbationis stuporem femoris & restrictionem testiculi in illo latere perferunt.
 - 13) Vomitus, tormina colica & defectus adpetitus saepe paroxysmum antecedunt, sicuti *mictus cruentus* ipsius calculi genesin.
 - 14) Vrinae vitia frequenter concurrunt: modo enim ischuria, modo dysuria, modo, & saepissime quidem, adfectus ex his duobus mixtus, nempe stranguria, adfligit.
 - 15) Præter ea interdum sabulo, interdum paruulis calculis, interdum muco viscido, ab ordinario vesicæ muco distinguendo, vrina imbuta est.
 - 16) Renes calculosi, facta sectione, ordinarie flaccidi, semi consumti, cum purulentis & fistulosis tractibus reperiuntur.
2. Calculi *vesicalis*.
- 1) Calculus *vesicæ* magis ad quietem compositus est, quam *renalis*, cuius elidendi conatus fere indomiti existunt.
 - 2) Quando autem concrementum illud in vesica commouetur, tum atrocissimi dolores inducuntur.
 - 3) Hic vitia vrinae æque ac in renum calculo occurrunt, nempe frequens stranguria aut plenaria huius excretionis suppressio.
 - 4) Quando patientes desident, sensum alicuius ponderis in perinæo obseruant.
 - 5) Qui sensus post vrinae missionem facile exacerbatur.
 - 6) Vrina, quando omnino procedit, fursuraceum quasi mucum exhibet, interdum etiam aliquid arenæ.
 - 7) Speciale signum est, huiusmodi ægros varia spastica incommoda circa anum & genitalia perferunt.
 - 8) Specialissimum & omnium certissimum sumitur a contactu calculi per cateterem.

IV. SVBIECTA.

1. Calculi *renalis*.

- 1) Eadem fere subiecta , quæ a nephritide corripiuntur, calculo etiam obnoxia euadunt, nempe
- 2) Homines temperamenti *sanguinei* dominantis, habitus corporis laxi, porosi, & spongiosi, in quem sanguis altius penetrare potest.
- 3) *Graciliores* rarissime a calculo infestantur, nisi vel hæreditaria dispositio vel causa violenta, externa, vel peruersa empirica aliorum adfectuum tractatio, vel euacuationum sanguinis adfuetarum suppressio, aut neglectio, accedat.
- 4) *Ætas* iuuenilis, frequentius autem virilis, & sæpe etiam senilis huic malo ordinarie exposita est.
- 5) *Hæmorrhoidarii*, si hunc fluxum sæpe, diu & copiose habuerint, post ea autem illius suppressionem incurrant, valde præcipites sunt in mictum cruentum, nephritidem & calculum renalem.
- 6) Vel quibus hæmorrhoides parce & impeditæ succedunt.
- 7) *Podagrici*, multum & grauiter a suo malo vexati, sæpe etiam a calculo adfliguntur.
- 8) *Sexus virilis* longe magis calculo *renum* expositus est, quam *femininus*.

2. Calculi *vesicalis*.

Calculus vesicæ euenit

- 1) *Ætati* puerili, immo infantili, si vel parentes, vel proximi agnati, calculosi aut arthritici fuerunt; ad quod negotium *salsæ nutricum* diæta multum etiam contribuere potest.
- 2) *Ætati* autem adultiori & senili, quando calculus euenit, is ordinarie *natales* suos renibus, & *incrementum* tantum vesicæ debet.

V. CAUSSAE.

1. Calculi *renalis*.

- 1) *Causa antecedens remota* est congestio seu restrictio sanguinis versus renes.
- 2) *Causa antecedens propinqua* est inflammatoria stasis, & deinde corruptio, siue purulenta, siue falso-ulcerosa
- 3) *Causa*

- 13) *Causſa proxima & continens* eſt lymphæ γλοιχρὰ ſeu glutinoſa, quæ ex ulcere renali exſudat, & accedente ſaluſugine vrinæ, primum in lentum mucorem, mox in tophaceam cruſtam, & ſenſim in duritiem conuertitur, quod concrementum tam diu augetur, donec aliqua occaſione auulſum conſtrictione peluis atque vrerum, in veſicam detrudatur.
- 4) Calculum enim non conſtare ex ſola materia lapidea & terrea, adparet primo exinde, quod neque totus, neque breui in menſtris ſalinis ſoluatur, deinde, ſi excretus libero aëri exponitur, pondere notabiliter imminuitur, tertio igni commiſſus non ita parum ſalis volatilis, olei empyreumatici & humiditatis exſpiret, & quarto, recens eiectus friabilis ſit.
- 5) *Cauſſæ procatarctica* ſunt vel phyſicæ, e. g.
- 1 a) Concuſſio corporis per nimiam equitationem aut vecturam.
 - b) Lapius aut ietus in lumbos.
 - c) Abuſus vini & veneris.
 - d) Abuſus diureticorum calidorum; vel
- 6) *morales*, eæque omnium efficaciffimæ e. g.
- a) Iracundia.
 - b) Terror etiam, licet ἀνομαλῶς.
 - c) Quibus hæreditaria diſpoſitio omni iure adnumeratur.
2. *Calculi veſicalis.*
- Huius cauſſæ eruendæ diu exercuerunt Medicos, quorum alii fundamentum in exſiccatione mucis per exhalationem quaſiuerunt, alii autem certos ſpiritus petriſficos & entia lapidiſca finxerunt; ſed genuina ratio calculi *veſicæ* non multum diſpar eſt rationi calculi *renum*, nempe
- 1) *Cauſſa formalis* conſiſtit in erroribus motuum excretoriorum, per hæreditatem communicatis.
 - 2) *Cauſſa materialis* eſt materia mucido-ſalina, quæ per motum talem erroneum nimis copioſe in hac ætate ad vias vrinarias propellitur.
- 3) *Cauſſæ*

- 3) *Causſæ occaſionales & procatartica ſunt*
 - a) *diæta craſſa in tenera ætate.*
 - b) *Potus fæculenti & acidi.*
 - c) *Vehementes abdominis concuſſiones.*
 - d) *Situs infantum in vtero etiam aliquid ad hunc cenſum poteſt contribuere.*

VI. PROGNOSIS.

I. Generatim

- 1) *Verus calculus eiſmodi malum eſt, quod rariffime extirpatur, adeo, vt iactatæ huius morbi heroicæ curationes omni iure in dubium vocandæ ſint: ſæpiſſime enim in talibus caſibus error ſubefit diagnoſeos, & tartarus vrinæ cryſtallinus pro ſabulo vero diiudicatur.*
- 2) *Calculoſi pereunt ſæpiſſime hecticis conſumptionibus; quando autem grandior calculus præſto eſt, præcipue in veſicam prolapſus, tum exacerbationibus, immo conuulſionibus, febris facile acuta ſuperuenit, & mortem accelerat.*

II. Calculi renalis ſpeciatiim

- 1) *Conſtans perſanatio non ſperanda eſt, ſed*
 - a) *vel fruſtra tantum, & quidem ad breue tempus, ſopitur*
 - b) *Vel in hæmorrhoides aut podagram fit tranſitus; quo tamen caſu vix vñquam impetus aut ſolidus proventus calculi tollitur.*
 - c) *Vel tranſit denique in magnam vlcerationem renum, quam non inepte phthiſin renalem quidam adpellant.*
- 2) *Non deſunt quidem exempla, quæ ſemel iterumque calculo renum laborarunt, & liberata ſunt, ſed id bonitate magis vegetæ naturæ, quam medicamentis factum eſt.*
- 3) *In ſubiectis autem annofis, & præſente virium iactura, nihil integrum eſt ſperare.*
- 4) *Conſtitutionem autem vlceroſo-calculoſam in renibus æque ac in phthiſi pulmonali, per plures annos ab euentu lethali defendi poſſe, experientia docet.*
- 5) *Non-*

- 5) Nennulli calculosi cum quotidie materiam vlceroso-ichorosam emiserint, a calculis post ea immunes vixerunt.
- 6) Mictus cruentus, vt calculum renalem saepe antecedit, *vid. signa*, sic etiam eidem frequenter superuenit, rarissime tamen illis; qui magnorum calculorum vel multorum tenuiorum, prouentu laborant. Hinc quo copiosius in talibus constitutionibus calculosis sanguis per mictum cruentum excernitur, tanto minor vel dolor vel calculi prouentus, aut concursus apprehenditur.
- 7) Calculus maioris molis minores & perraras excernendi molestias facessit.
- 8) Quo magis autem asper est, eo acutiores infert dolores.
3. Calculi *vesicalis* in *specie*.
 - 1) Vesicæ calculus, præcipue maior, toti pharmacie hucusque non obedit, sed chirurgica plerumque subsidia efflagitat.
 - 2) Licet autem chirurgica operatione semel sublatus sit calculus vesicæ, nouæ tamen concretionis periculum semper impendet.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Calculus renum & vesicæ vna eademque pharmaceutica methodo commode tractantur.

1. In *paroxysmo*.

- 1) Præ omnibus alius per clysteres expediatur, & si etiam aperta sit, aliquoties tamen adhibeantur: hi enim anxietates syncopticas, & tormina colica, eximie levare solent, præcipue ex veronica parati.
- 2) His protinus iungantur pulueres nitroso-temperantes cum sale digestiuo & cinnabari combinati, e. g.

Rec. Nitr. depurat.

tartar. vitriolat. ana drach. II.

ocul. cancr. acido citri saturat.

sang. hirci præparat. ana drach. I.

cinabar. opt. scrup. II. M. dof. scrup. I.
Singularis binis horis repetatur, donec do-
lores mitefcant.

- 3) Loco huius pulveris *semibus*, falia minus tolerantibus;
exhiberi poffunt diluentia, lubricantia & emulfiva.
Huc pertinent
 - a) Diluentia calida ex infufis thée, coffée, decoctis ape-
ritivis ex cichor. asparag. &c.
 - b) Lubricantia pingua & emollientia, e. g. oleum a-
mygdalar. dulc. emulfiones dulciores, & abunde
faccharatæ, ne vel in mucorem, vel in acerbam au-
fteritatem degenerent, mucilago hordei, auenæ,
infuf. lini.
 - c) Pectoralia fere omnia.
 - d) Decoctum nephriticum *Forefti*.
 - e) Conferua rofarum.
 - f) Decoctum & succus rad. altheæ, glycyrrhizæ.
- 4) In dolorum nimia exacerbatione anodynorum refra-
ctæ dofes interponantur. Huc pertinent
 - a) Theriaca cæleftis.
 - b) Maffa pilularum de cynogloffâ.
 - c) Pilulæ *Wildeganſii* genuinæ.
 - d) Tinctura opii *Langelotti*.
 - e) Cum hiſce anodynis alexipharmaca coniungantur.
- 5) *Externe*, præter clyfteres ſuperius commendatos, ſimul
in auxilium vocentur relaxantia.
 - a) Balnea ex furfuribus cum ſemine lini, fœnugræci, &c.
 - b) *Fotus* aut calidi ſacculi ex herbis & radicibus emolli-
entibus, e. g. rad. altheæ, maluæ, herb. violar. parie-
tar. chamomill. melilot. branc. vrfin. adiectis ſemi-
nibus modo dictis.
 - c) *Vnguenta* emollientia ex pinguedine human. medull.
ceruin. in calculo *veſicæ*.
 - d) *Olea* in eadem calculi ſpecie, e. g. ol. lumbric. terreſtr.
camphoræ.
- 6) Vbi minorum calculorum præſentia fatiſ conſtat, ibi
pro

- 6) Vbi minorum calculorum praesentia satis constat, ibi pro subiectorum conditione *pellentia* subiungere, vel potius cum usu *relaxantium* coniungere consultum est. Huc pertinent *diuretica* & sic dicta *lithontriptica* temperata, e. g.
- a) Fraga, praecipue infusum illorum, cum spiritu vini.
 - b) Fructus alkekengi.
 - c) Fructus cynosbati.
 - d) Nuclei persicorum.
 - e) Rad. & herb. petroselin.
 - f) Semen milii folis, violarum, vrticæ, dauci.
 - g) Ciceres rubri in decocto.
 - h) Succus raphani, qui egregie pellit, & tamen æstum non auget.
 - i) Præ ceteris amygdalæ amaræ, quotidie 6-8. comestæ.
 - k) Item semen bardanæ ad scrup. I.
 - l) In infantibus aquæ fragor. petroselin. vrticæ minoris.
 - m) Tincturæ alcalinæ. e. g. tinct. antimon. tartarisat. tinct. salis tartari.
 - n) Diuresin etiam promouet puluis ille salinus num. 2) descriptus.
- 7) Et quoniam febriles commotiones ordinarie accedere solent, opponi illis statim possunt alexipharmaca & æqualem humorum distributionem promouentia. Huc pertinent
- a) Ess. alexipharmaca *Stahlii*, mane exhibita.
 - b) Antimon. diaphoret. pulueris sub num. 2) immiscendum.
 - c) Diluentia calida, e. g. potus thée, coffée
 - d) regimen leniter diaphoreticum.
- 8) Tandem remittente exacerbatione neruino-stomachica adhibeantur.
- 9) Calculus *renalis* quando in vesicam demissus est, con-
ducit infusum quoddam, in primis sem. lini, in loco subfrigido ad impletionem vesicæ haustum, quo multa demum vrina eiiciatur.

2. *Extra paroxysmum.*

- 1) *Quantitas sanguinis imminuatur*
 - a) vel per reuocationem euacuationum naturalium, e. g. hæmorrhoidum, mensium.
 - b) Vel per substitutionem artificialium, e. g. venæ sect. æquinoctial. sacrificat. quæ maxime repetendæ sunt, si forte æger eas neglexerit.
- 2) *Laxationes quater per annum instituantur per rhabarbar. fol. senn. cum cinnamom. anis. tartar. solub. in vin. infus.*
- 3) *Mundificatio & consolidatio tentetur per balsamica & traumatica, ex quibus primum locum hic habere creduntur*
 - a) *Virga aurea Gesneri, & reliquæ consolidarum species,*
 - b) *Chærefolium.*
 - c) *Heder. terrestr. pyrol. sanicul. auricul. muris, in succo, vel melius cum melle in decocto, aut electuario, exhibita.*
 - d) *Conserua rosarum.*
 - e) *Succinata temperatiora; reliqua videantur sub cautelis.*
3. *Diætâ cruda, flatulenta, venus, corporis & animi insignes commotiones euitentur. Potus sit aqueus, calidus, ex infus. thée, veronic. heder. terrestr. virg. aur. emulsius cum pectoralibus; cereuisia bene defæcata, vel, more Anglicano, cum succo betulæ, vel femine dauci fermentata.*

VIII. *CAVTELAË ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. *In adfectibus calculosis per ancipitem prognosin fama artis semper tuenda est; præcipue in statu iam inueterato.*
2. *In calculo vesicæ grandiore, viarum proportionem excedente, pharmacia moderamen tantum ad aliquod tempus præstare, solidum autem auxilium adferre non potest. Magnitudo vero calculi explorari potest in viris per digitum intestino recto immissum.*
3. *Confugiendum ergo erit in vegetioribus ad chirurgica præ-*

præsidia, extractionem nempe, vel extractionem; nisi intolerandos fere dolores interdum experiri, perpetuo catteris vsu ischuriam soluere, maiorem calculi epigenesin, convulsiones, & tabem corporis, præstolari malint.


4. *Extractio* calculi magis locum habet in feminis, ob breviorē & ampliorem vrethram, quam apud viros; quamquam Ægyptii in his quoque extractionem, & quidem hac encheiresi tentare soleant, vt flatu immisso vrethram dilatent, & sic egressum calculi commodiorem promoveant.
5. *Excisio* seu *lithotomia* nostro tempore vnicum & vltimum fere est consilium.
6. Quamvis autem calculus vel pharmacia, vel chirurgica manu, exclusus fuerit, restat tamen periculum *noui* illius proventus; cum iteratam genesin intereipere non semper sit in Medici potestate.
7. *Lithonriptica*, seu calculum resoluentia & comminuentia per *tria regna* a Practicis decantata, veritatis vix vñquam testimonium merentur: calculus enim non est indolis pure terreæ, soluentibus menstruis auscultantis; vti quidem multi fingunt, & hinc modo *spiritum tartari* ex symbolismo ad concreciones tartareas dissoluendas, modo *spiritum nitri*, quod nitrum lapides in pollinem reducere videatur &c. laudant. Multa talia vel præbent materiam, vt sabulosa vrina mox excernatur, vel ad minimum adfluxum materiæ, in corpore iam hærentis, ad renes augent, cuius census etiam sunt *lapis iudaicus*, lycis, & similia.
8. Efficaciæ *asellorum* præparatorum nemo peritus subscribet, licet a *Dygbao* valde extollatur.
9. Neque efficacia *gryllorum*, in actis N. C. adlegata, experientia satis confirmata est.
10. Idem sentiendum est de experimento illo, quod eodem loco de *vesica leporis* combusta enarratur, ac si calculus per eandem in limum sit resolutus.
11. Sic etiam *stupenda* efficacia *virga aurea Gesneri*, ad resoluendum

- dum calculum, nondum innotuit, licet a multis commendetur.
12. *Petroselinum, fraga, bacca alkekengi* satis quidem efficaciter urinam & calculum pellunt, sed non resolvunt.
 13. Quidquid in hoc genere sperare integrum est, magis in iniectione per *syringam*, quam adsumptione per os quaerendum, licet de mensuris acrioribus, hodie praesentibus, non immerito metuendum sit, ne vesicam citius quam calculum arrodant.
 14. Dictorum omnium manifestissimum specimen cernere possumus, si remedium tale lithontripticum, etiam optimum, sufficiente satis quantitate, calculo cuidam humano adiciatur, & ex effectu deinde consideretur, quid in corpore humano exiguae illae guttulae effectura sint, de quibus, quantum ad locum adfectum pertingat, non facile potest colligi & exacte declarari.
 15. *Pellentia* cautissime adhibenda sunt; praecipue si vel maiores sint calculi, vel acutiores: nam expulsio requirit spasmodicam constrictionem renum & vreteris, unde transitus calculi potius impeditur, dolores exacerbantur, vias laeduntur, adfluxus augetur, & inflammatio, praecipue in sanguineis, prouocatur.
 16. Ante igitur, quam ad talia *pellentia* progrediamur, probe inquirendum est, num spasmi dolorifici remiserint, & moles calculorum viarum amplitudine respondeat; praeter ea, ad spasticam constrictionem mitigandam, *pellentibus* hisce semper emollientia externa, sub *methodo* commendata, coniungenda sunt.
 17. Quae *tabula de nephritide* monuimus ratione *calidorum oleorum* & aliorum acrium *pellentium*, ea hoc etiam loco repetenda sunt. Absint itaque inter *pellentia olea destillata* & *diuretica acria*, cuius census sunt raphanacea, de allio, cepis, salia acria alcalina, spiritus nitri dulcis, spiritus salis armoniaci, salis communis &c. quae humorum ad renes maiorem decubitum incitant, & ulcerationem augent.
 18. *Herba vulneraria* a Practicis contra calculum varia quidem com-

commendatur, sed si quantumcunque adstringentes fuerint, notabilem exacerbationem inferunt, præcipue si calculus iam increbuerit, & manifestior adfit vlceratio, cum continuis dorsi doloribus.

19. Speciatim *millefolium* & *marrubium album* in calculo renum nimium irritare, & exulcerationem augere obseruantur. *Conf. tabula de phthisi.*
20. Pro scopo *balsamico* non conueniunt aloëtica, myrrhata, ol. terebinth. balsam. sulphuris, & alia acriora balsamica, quæ orgasmum sanguinis promouent. Hinc ne balsamum quidem Peruvianum aut copaiuæ citra sensibilem ardorem, calorem, sitim & siccitatem oris propinatur.
21. Mitigatio insultuum minus commode per *opiata* tentatur. Quod si vero pro obnubilando dolore aliquid opiatum adhibere placeat, M P. de cynoglossa hoc nomine erit tutissima: modo sollicitè coniungantur alexipharmaca, & regimen mediocriter diaphoreticum. Sin secus, per abusum opiatorum mors acceleratur, vel ad minimum chronici periculosi adfectus inducuntur.
22. *Puluis Volkammeri* calculum quidem ipsum non tollit, quoniam autem ab omni narcosi alienus, & ob gemarum ingredientia antispasticam habet efficaciam, ad placandas commotiones, calculum comitantes, egregium edit effectum.
23. *Balnea* non omnibus proficua sunt: in nonnullis enim adfectus asthmatici vel febres synochæ per illa prouocantur.
24. *Acidula* temperant quidem diluendo generaliores nephriticos orgasmos, sed quia motum humorum ad renes magis augent, impediunt consolidationem.
25. Quæcunque in *pectoris* vitiis solamen adferunt, illa in *renum* quoque læsionibus cum effectu adhibentur. *Conf. tabula de phthisi.*
26. Quem ad modum sal digestium *Syluii*, & alia ex sale communi præparata, cuius vlcerationi inimica reperiuntur, ita mucidis præcipue phlegmaticis non interdicens

est vsus ciborum modice salitorum, ex quibus multi potius leuamen, quam damnum ceperunt. Prima vero laus sali marino, de nitro participanti, competit.



TABVLA XLV.

DE

SPASMIS IN GENERE.

I. DEFINITIO. *Lozes*

1. Spasmus est rigida tensio & attractio vnus vel plurium musculorum, in vno aut altero corporis membro, præcipue vero in artubus: vnde non solum particularia illa membra, quibus mouendis muscoli tales inseruiunt, in situ rigido detinentur, sed etiam in musculo, adfecto, rigida durities percipitur: ita ut membra non sint in potestate ægroti, donec illa rigida & sensibilis tensio remittat. Deriuatur a *σπᾶν* trahere.

2. Vel breuius: Spasmus est exacerbatio motus tonici, in partibus præcipue musculosis, ad talem sensibilem gradum, vt ægri acerbis plerumque doloribus exercentur, & pars vere in præsens adfecta rumpi quasi videatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Spasmus est

1) vel *uniuersalis*, qui latius per totum corpus se diffundit & rarior est;

2) vel *particularis*, qui singulares partes, a capite fere ad calcem, occupat, & frequenter occurrit.

2. Ad spasmum *uniuersalem* sequentes species pertinent.

1) *Tetanus*, quo vniuersum corpus obrigescit, vt in situ recto immotum iaceat.

2) *Emprosthotonus* antrorsum incuruat corpus, vt genua capiti adducantur.

3) *Opisthotonus* retrorsum inclinatur corpus, daß man unter dem Rücken hintriechen könnte.

4) *Ca:*

- 4) *Catalepsis* vniuersum corpus repente in tali situ, quo illudprehendit, firmissime rigidum detinet, vt gestus oris, oculorum ac membrorum, plane eosdem seruet; rarissimus est adfectus.
3. Ad spasmos *particulares* pertinent sequentes species in variis corporis locis occurrentes.
- 1) *In capite:*
- a) *Spasmus cynicus*, qui est torsio & tractio quædam oris, instar canis ringentis, formata & per plures horas continuans, cum euentu sæpe lethali; siquidem vel in apoplecticos vel conuulsiuos exitus; vel utrosque coniunctim hic rictus terminatur.
- b) *Rifus sardonius*, qui a *spasmo cynico* non differt, nisi quod absolute veluti *cum delirio* coniungatur; quale quid in *spasmo cynico* obseruare non contingit.
- 2) *In occipite* notandus est *spasticus* ille adfectus, qui *feminino* præcipue sexui vltatior, cum aliis *rheumaticis* atque *hemicranico arthriticis* pathematibus, infimum *occiput*, nempe *musculos* illos, qui capitis erectioni, & in vtrumque latus *conuersioni* succurrunt,prehendit; cum tanta subinde vehementia, vt non solum *rigidam, spasticam*, caput circumflectendi impotentiam inde experiantur sed etiam *contentionem* illam *spasticam* tensam atque rigidam, ita secundum situm horum musculorum exquisite persentiscant: vt ex illis partim versus vtrumque *latus* ceruicis, partim secundum *longitudinem* eius sitis musculis, tamquam *animalculi* cuiusdam, *muris*, ideam sibi concipiant, & veluti expansis atque defixis eius *pedibus*, ita caput, seu potius ceruicem, correptam detineri pronuncient.
- 3) *In collo* adfectus ille tensiuus ex incommodo situ aut decubitu inter dormiendum, in spasinis etiam numerandus est, & vulgo sensum hunc ita exprimunt: sie haben übel gelegen, es sey ihnen der Hals davon ganz steiff, daß sie sich nicht wohl umsehen können.
- 4) *In œsophago* æque ac *ventriculo* occurrunt spastici velut

rigores, qui *deglutitionem* partim impediunt, partim id, quod *ægre* adsumtum est, *nauseabunda* contentione ferunt, & *vehementes* anxietates *ægotantibus* inferunt, vt *magnis* querimoniis detestentur, es seye nicht anders, als wolte es ihnen das Herze abdrücken.

- 5) In *intestinis* *spasticæ* atque *rigidæ* tensiones, sub adfectu, qui *colica flatulenta* audit, sæpissime contingunt, per quas *intestinum* colon præcipue adficitur, vt *ægri* non tantum *constringentem* & *tendentem* illum sensum *exquisite* percipiant, (dum aiunt: es drücke sie wie ein Stein im Leibe, als wenn alles darinn zerpringen, oder der Leib ihnen ausplätzen wolte) sed & sæpius post mortem *rigidissimas* *intestini coli* *stricturas* distincte, exhibeant. Maxime vero *conspicua* est huius modi *strictura spastica* in *altioribus* colicis doloribus, in ipso *intestino recto*, vt ne *cannulam* quidem *clysticam*, nedum *altius* ipsum *clysterem* admittat.
6. In *pene priapismus* denotat *grauissimam* & *anxio* dolore *stipatam* *membri virilis* tensionem, a *satyriasi* differentem, quæ in *procaci* *magis* *erectione* consistit.
- 7) In *vesica* & præcipue eius *sphinctere* occurrunt etiam *spasticæ* *stricturæ*, quæ in *stranguria*, item in *calculi* *renum* & *vesicæ* *paroxysmis* *vehementer* sæuiunt. Tandem etiam *tensismus* *spasmis* potius, quam *conuulsionibus* *adnumerandus* est.
4. Ad *spasmos particulares* ulterius referendi sunt
- 1) Adfectus *arthritici*, de quibus sequente *tabula* *speciatim* agetur.
 - 2) *Incubus* seu *ephaltes*, *thoracis* *spasmus*; videatur *tabula de incubo*. Occurrunt autem alii adhuc *thoracis spasmi* *fatis* *vehementes*, qui per *plures* *horas* immo *aliquot* *dies* *ægros* *anxie* *adfligunt*, & *summa* *sui* *energia*, *respirationem* *intercipiendo* *dubiam* *reddunt* *apoplexia* & *catarrhi suffocatiui* *indolem*: nec mirum, si a *vehementi* *tali* *regurgitatione* *humorum* *versus* *caput*, partim *cruentæ*, partim *serosæ* *effusiones* *circa* *ambi-*

ambitum cerebri, diuersa phænomena exhibentes, nonnumquam eueniunt. *Conf. theor. med. Stahl.*

pag. 883 884.

- 3) *Asthma spasticum seu conuulsuum*: vid. tabula de *asthmate conuulsiuo*.
 - 4) *Spasmus fixus Paracelsi* hic etiam nominandus est; licet ipsi auctori nondum adeo *fixus* fuisse videatur: mox enim ad arthriticos & podagricos adfectus, mox ad contracturas &c. eundem refert.
 - 5) Sic etiam huc adnumerandus venit repentinus ille spasmus, *flatulentus* alias dictus, qui musculum celeriter contrahit, eumque per aliquod tempus in rigore detinet.
 - 6) Ad spasmos denique referendus est rigidus ille adfectus membrorum, e. g. quando manus illud, quod comprehendere debent, non satis complecti valent, aut nimis vehementer complexæ sunt.
6. Spasmus porro diuiditur in
- 1) *repentinum*, qui musculum celeriter contrahit, & eundem per aliquam moram rigidum seruat. Hæc species spasmi vulgo κατ' ἐξῆν der Krampf vocatur; &
 - 2) *lentum*, qui iterum duplex est:
 - a) *Muscularis seu tendinalis*, vbi totus musculus adfici-
tur cum doloribus tensiuis & grauatiuis & in contracturas membrorum denique terminat.
 - b) *fibrillaris*, qui pauca & singulares tantum fibras in musculo quodam corripit; qualis in omnibus arthriticis adfectibus agnoscitur. Hic in totum tandem musculum se expandit, eoque ipso dolorum impetum mitigat.
6. *Spasmus* licet plerumque cum *conuulsione* confundatur & ambiguo ac confuso sensu vocabulum hoc latine per *conuulsionem* vertatur, differt tamen ab hac duabus præcipue rationibus.
- 1) In spasmis rigidum, statarium & immanens quid reperitur, conuulsiones autem sunt vagæ, reciprocæ, instabiles,

biles, latius vagantes, & gradu vehementiores.

- 2) spasmus minoris, conuulsiones autem maioris sunt periculi.
7. Quoniam autem vehementes illi spasmus, e. g. spasmus cynicus, risus sardonius, asthma spasticum &c. cum veris conuulsionibus facile conspirant, & *interscena* quasi illarum plerumque obseruantur, ex contrario in *arthriticis* adfectibus spasmus multo mitiores & a conuulsionibus alieni sunt; vocant hinc priores adfectus *spastico-conuulsiuos*, posteriores autem *spastico-arthriticos*.

III. SIGNA.

Hæc ex iis, quæ sub *definitione* & *differentia* dicta sunt, elucet.

IV. SVBIECTA.

1. Spasmis præ aliis obnoxii sunt homines temperamenti sanguinei, & habitus corporis porosioris atque laxioris.
2. Illi, qui a parentibus, doloribus arthriticis adfectis, prognati sunt & hæreditariam dispositionem possident.
3. Adulti & ætatis proejectioris homines præ iunioribus.
4. Spasmis etiam adfliguntur grauiter vulnerati, nec non, qui febribus acutis periculose decumbunt.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis generalior* est abundantia sanguinis in corpore spongioso & vasis angustis.
2. Causa *efficiens* horum spasmodorum est principium vitale, quod per illos plethoram imminueret & materiam incongruam corrigere intendit: licet enim spasmus motus sint *erronei*, non tamen sunt motus *irrationales*, sed propter certum finem semper instituuntur; nempe vt per stricturam partibus ita inductam, atque porosa textura illarum, instar spongiæ compressa, humores in illis contenti exprimantur.
3. Causæ *occasionales* sunt:
 - 1) Dispositio hæreditaria.
 - 2) Animi pathemata, in primis iracundia & terror.

3) Im-

- 3) Immoderati nimisque vehementes corporis motus voluntarii.
- 4) Abusus veneris, vini & aromatum, item intempeſtiva atque intemperans adſumptio medicaminum calidorum & volatilium, nec non improuidus vomitori-orum & purgantium draſticorum uſus.
- 5) Tempeſtas humido-frigida, quæ rheumatismos inducendo, ſpaſticos tales motus concitat.
- 6) Euacuationum ſanguinis conſuetarum neglectus. e. g. ſcarificationis, de qua re exemplum notatu digniſſimum *conf. Stahlis theor. med. pag. 33-37.*

VI. PROGNOſIS.

1. Spasmi *uniuerſales* repentina tali congeſtione humorum & ſtagnatione hinc ſubſequenti, inflammationes internas plurimum inducere valent.
2. *Particulares* autem ſpasmi in conuulſiones facile transmigrant, & hoc eo certius, quo partes, quas occupant, ſunt nobiliores. Dum nimis diuturnis & ſimul ad modum fortibus contentionibus inſiſtunt.
3. Omnes ſpasmi *particulares* teſtantur quidem de conatu aliquo naturæ, ſed incompleto, & ad effectum obtinendum, irriti: vnde ad maiora tantum & grauiora mala inducenda capaces exiſtunt.
4. Iunioribus ſi ſpasmi, ſimplices etiam, frequentius obueniunt, & conſuetudine in illis obfirmantur, augeſcente ætate adfectus ſpaſtico-arthritici exſpectandi ſunt.
5. Senioribus, minus adſuetis, ſpasmi, fortiter oborientes, apoplexiam, paralyſes, catarrhos ſuffocatiuos minantur.
6. Spasmi acutis morbis & vulneribus, præcipue cerebri, ſuperuenientes, ſunt omnes periculoſi, & propenſi ad lethales conuulſionum euentus.
7. Spasmi autem ſimplices, plethoricis ſanis rarius euenientes, plerumque ſunt innoxii.
8. *Spasmus cynicus* degenerat facile in conuulſiones, & lethales plerumque inducit euentus.

9. *Priapismus* veneris vsum tollit, & hoc etiam respectu a *satyriasi* differt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Motibus spasticis occurritur.

A. *Extra paroxysmum.*

1. Per sinceras euacuationes sanguinis, nempe
 - 1) Venæsectiones, iusto tempore & quantitate, iusto etiam loco, tam parti adfectæ, quam ætati ægroti respondente, institutas.
 - 2) Scarificationes.
 - 3) Hirudines, quarum efficacia in spasticis pathematibus, hypochondriacis & podagricis insignis est.
2. Per euacuationes catharticas, ad sordes primarum viarum & aliarum partium eliminandas. Hic conducunt e. g. helleborus niger, folia sennæ, radix ialappæ, specificum ialappinum, trochisc. alhandal.
3. Per attenuationem sanguinis spissioris; vbi conueniunt diuretica & incidentia mitiora rad. vincetox. valerian. pimpinell. alb. helen. dictamn. alb. essent. alexipharm. *Stahlii*, tinct. antimon. tartari.
4. Methodus itaque spasmos præcauendi & auertendi sequente modo instituat.
 - 1) Leniores laxationes per aliquot dies præmittantur.
 - 2) Deinde venæ sectio instituat.
 - 3) Post ea essentia quædam alexipharmaco-diuretica cum essentia succini remixta, per octo circiter dies propinetur.
 - 4) Coniuncto vbique placido & continuo corporis motu.

B. *In paroxysmo.*

Hic res consistit in ipsius *motus* medicatione, quæ obtinetur

1. per *remedia generaliora* lenientia atque emollientia, vulgo *paregorica*, dicta, e. g.
 - 1) Per succinum, modeste & sine separatione suæ substantiæ vsurpatum, sal succini volatile, liquorem C. C. succinatum, a superfluo sale vrinoso liberatum.

2) Per


- 2) Per vegetabilia acriuscula, quæ anticatarrhalia, neruina & carminatiua censentur, ex quibus temperata sunt feligenda.
- 3) Per emulsiua, gelatinosa, diluentia, nitrosa, cinnabarina.
2. Per *specifica*, quorum multa quidem vulgo recensentur, sed pauca experientiæ respondent, e. g.
 - 1) *Annuli antispastici* ex vngula alcis, cornu rupicapræ, mercurio coagulato, qui re vera nullius vsus sunt.
 - 2) Idem censendum de *annulis ferreis* ex catena patibuli suntis.
 - 3) *Dentis hippopotami* encomium, ex *Taberna-Montani hydrographia* excerptum, legatur in dissertatione de *lapide manati*, qui ipse etiam specificum habetur.
 - 4) *Lumbrici* denique *terrestres* maximam præ reliquis laudem merentur.
 - 5) Qualecunque autem specificum commendetur, exhibendum est illud methodo conueniente, nempe generalioribus præmissis.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Cinnabaris* ad motus specificè moderandos satis quidem famosa est, præstat enim effectum in sensibilibus & infantibus non contemnendum; pro vero tamen specifico non censenda, fungitur potius officio *cotis*, quæ, exors ipsa secandi, ferrum reddit acutum.
2. Puluis antispasmodicus ex nitro, sale medico & momento cinnabaris paratus, in sedandis spasmodis egregii quidem vsus sæpius deprehenditur, interdum autem non sufficit; quo casu largior portio cinnabaris rite præparata, addatur, ita vt quælibet dosis huius pulueris 6 - 8 grana cinnabaris contineat.
3. *Euaeuatio sanguinis* si non præmissa fuerit, parum efficient medicamenta iam laudata.
4. Hoc tanto magis valet de *salibus volatilibus urinosis*: hæc enim, licet præmissæ sint sanguinis ventilationes, non tamen nisi moderate adhibenda sunt; melius autem ope-

rantur, si cum tinctura quadam alcalina, e.g. salis tartari vel antimonii, remixta exhibeantur.

5. Facilius est motus *convulsuos* specificis compefcere, quam *spasticos*.



TABVLA XLVI.

DE

ADFECTIONIBVS SPASTICO-ARTHRITICIS.

I. DEFINITIO.

Megaron Ind.

Arthritis est spasticus quidam adfectus, articulos, in quacumque corporis regione, propter humores in hæmorrhagicum quidem finem congestos, hic autem & illic stagnantes aut impeditius procedentes, pertinacius adfligens, numquam vero ad salutarem illum finem, quem principium vitale intendit, perueniens. Derivatur ab ἀρθρον, articulus.

II. DIFFERENTIA.

1. Arthritis interdum *generaliter*, & recte quidem, sumitur, ac tum sequentes præcipue species sub sese comprehendit:

- 1) *Hemicraniam*, quæ dimidiam capitis partem occupat.
- 2) *Pleuritidem spuriam*, vbi thorax adficitur.
- 3) *Malum ischiadicum*, quod in coxis adfligit.
- 4) *Chiragram*, in qua manus occupantur.
- 5) *Gonagram*, vbi genua patiuntur.
- 6) *Podagram*, in qua pedes infestantur.
- 7) *Glossagram*, quæ linguam occupat.

Hæ species specialibus tabulis explicitæ sunt.

2. Interdum autem arthritis *specialiter ac strictiore* sensu accipitur, & sic illos tantum spasticos adfectus denotat, qui in *superioribus* corporis partibus obueniunt, & tum cum podagra sub vno genere *spasmi* constituta est, atque ita ab hac sequente ratione differt:

- 1) Arthritis, stricte sumpta, iuniores, podagra autem an-nosiores occupat.
- 2) Arthritis ordine prior est, & ætate accedente, in po-dagram facile transit.
3. Re ipsa autem omnes affectus arthritici non differunt, nisi quod ad loca & tempora attinet; in reliquis autem essentialibus conditionibus & causis generalibus pror-fus conspirant.
4. Arthritis diuiditur in *veram*, seu *fixam*, & *vagam*.
 - 1) *Vera* in certis partibus hæret, & licet interdum alias quoque partes occupet, antea tamen afflictas non deserit.
 - 2) *Vaga*, *simplex* & *scorbutica* vulgo dicta, cito ab vno loco in alterum profilit, e. g. ex thorace in coxas, & inde in pedes.
5. *Rheumatismus* & *arthritis* non sunt res maxime diuersæ, sed subordinatæ, id quod *tabula de rheumatismo* vberius demonstratum est.
6. Longius autem ab arthritide differunt *congestiones* & com-motiones sanguinis *simplices*.
 - 1) Ratione *effectus*: nam congestiones non raro ad sangui-nis eruptionem perueniunt, arthritici autem adfe-ctus numquam, licet eundem finem respiciant.
 - 2) Ratione *durationis*: congestiones enim breuiore sæ-pius periodo, arthritici autem affectus longiore cir-cumscribuntur.
 - 3) Ratione *partium* affectarum: congestiones partes ma-gis interiores, arthritici autem affectus non solum interiores, sed potissimum etiam exteriores muscu-losas occupant: illæ vasa sanguifera, hic vero fibras musculares sigillatim adfligunt.
 - 4) Ratione *euentus*: congestiones ad inflammationes vel vlcerationes, arthritici vero affectus ad rigores, con-tracturas vel tabidam membrorum extenuationem inclinant.

III. *SIGNA.*

1. Dolor interdum est tensius, strictorius & tractorius, qui motibus liberis illorum artuum, quos occupat, tantum infert impedimentum, quod sub conatu demum mouendi euidentiùs emicat.
2. Interdum vero hic dolor magis est lancinans, vibratilis, nonnumquam etiam pullatilis, compunctorius & fremebundus, sub leui motitatione membri, velut rupturæ periculum adferens.
3. Non tamen iugiter æqualis est, sed per vices remittit, immo quandoque intermittit.
4. In arthritide *vaga* dolor hic magis sentitur vellicatorius & subtiliter reptilis, quasi formicæ interiorem partem occuparent.
6. Pruritus & ardor coniunctus quidem est, sed sine rubore & tumore notabili, qui, si accedat, dolorum sensibilem mitigationem plerumque adfert.
6. Arthritis autem *vaga* non in vno loco hæret, sed recurrit & euagatur, modo ad superiora, modo ad inferiora, donec tumores in variis articulis post se relinquat.
7. Animus valde angitur sub his cruciatibus, vires languent, appetitus cadit & somnus deficit.
8. Nonnumquam æstus volaticus interstrepit.
9. Vrina rubra sedimentum tartareum post refrigerationem in fundo deponit, & lateribus vasis adfigit, hinc a sabulo calculosorum probe discernendum, quippe quod statim cum vrina emittitur, mox in fundo colligitur, nec lateribus adhærescit.

IV. *SVBIECTA.*

Arthritidi crebrius obnoxii sunt homines

1. Sanguinei, sanguineo-cholericici, immo etiam de phlegmatico temperamento participantes, verbo: qui habitus corporis sunt laxi & spongiosi.
2. Plethorici agiles, diætâ plena, non raro etiam spirituosa gaudentes, otiosi.

3. In

3. Indolis animi immoderatæ, præcipitis, iracundæ, corpus cito & fortiter exagitant.
4. Iuvenes æque ac viri ætatis consistentis.
5. Euacuationibus sanguinis naturalibus & artificialibus adfueri.
6. Macilenti raro his affectibus laborant, nisi vel externa causâ, vel hæreditaria dispositio, vel febres male curatæ occasionem iis dederint.

V. CAUSSAE.

1. Causâ *materialis* omnium affectuum arthriticorum est plethora.
2. Causâ *efficiens* est principium vitale, quod per motum sanguinis plethorici certis partibus destinatum depletionem illius intendit.
3. Nempe hi motus, licet erronei sint, respiciunt in hemicrania & glossagra narium hæmorrhagiam, in pleuritide spuria hæmoptysin, in malo ischidico, gonagra & podagra hæmorrhoides externas.
4. Causâ *externa, occasioales & procatartica* in descriptione *subiectorum* potissimum indicatæ sunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Species horum affectuum leniores, si sæpius recurrunt, non minus in consuetudinem abeunt, quam grauiore, immo successu temporis facile in grauiore & fixiore arthriticos dolores degenerant.
2. Arthritici autem morbi, qui superiores corporis partes in iunioribus subiectis occupant, non tam sæpe & obstinate eandem pertinaciam seruant, neque tam diu singulis paroxysmis ægros exagitant, quam podagra & malum ischadicum; quod ætatis genio maxime adscribendum videtur.
3. Hemicrania enim & pleuritis spuria, augete ætate, vel penitus iterum cessant, vel ad pedes descendunt.
4. Podagra autem ita plerumque insolescit, vt vix vnumquam ab illa in solidum iterum liberentur: hinc inueterata mitigari tantum, radicibus rarissime extirpari potest.

5. Quo magis spasmi sunt particulares, & in exiguis partibus contingunt, eo minus vtilitatis habent, & ad scopum naturæ minime perueniunt.
6. Qui iunioribus annis frequentius & pertinacius spasmos simplices experiuntur, augeſcente ætate variis arthriticis doloribus expositi sunt.
7. Si vero spastico-arthritici dolores inferiorum partium subiecta iuniora mature adfligunt, longe grauius iisdem exercentur, quam senes, immo raro ad senium perueniunt, sed ante, quam illud attingant, a doloribus istis vel nimis ferocientibus & in conuulsiones degenerantibus, vel retrocedentibus iugulantur.
8. Arthritico-spastici enim adfectus ad modum procliuus sunt ad recursus internos, immo ad internas inflammationes, in primis si imperite tractati repelluntur.
9. Fiunt autem hi recursus fere secundum ætates ad caput, diaphragma, præcordia, venam portæ, & ibi vel inflammatorios febriles, vel suffocatiuo-apoplecticos vel spastico-conuulsiuos effectus exerunt.
10. Ab arthritide *vaga* facile *fixa*, nimirum malum ischiadicum vel podagra initium capit.
11. Arthritis *vaga, scorbutica*, quo crudelior & diuturnior, eo magis ruit ad narium efferas hæmorrhagias, hæmoptyses, interdum vomitus cruentos, non raro mictus cruentos, & sæpe numero hæmorrhoides; vbi quam diu fluit sanguis, dolor cessat, simul atque vero fluxus sistitur, dolor recrudescit.
12. Quo citius medela adhibetur, & quo minus adfectus arthritici recrudescere adsueuerunt, eo facilius Medico auscultant.
13. Quando autem tales spasmi fixi iam sunt, & longius a loco excretionis sanguinæ, quam respiciunt, distant, pertinacius insistent & medicamenta adspernantur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Causa materialis, nempe plethora est remouenda

1) Per

- 1) Per *venæ sectiones*, conueniente loco & tempore institutas.
- 2) Per adplicationem *hirudinum*, ad hæmorrhoides promouendas.
- 3) Per *scarificationes* in subiectis spongiosis.
2. Cruditates primarum viarum, præcipue biliosæ, utpote motus spasticos insigniter exasperantes, sunt abstergendæ & leniter eliminandæ.
 - 1) *Abstergunt* salia digestiua: arcanum duplicatam, nitrurum antimoniatum, & tartarus vitriolatus, &c.
 - 2) *Eliminant* lenia laxantia, e. g. potiunculæ rhabarbarinæ, fennatæ cum passulis, tartaro solubili, sale Anglicano, liquore terræ foliatæ tartari maritatæ: item vina medicata ex incidentibus, abstergentibus, alexipharmaco-diureticis & purgantibus parata.
3. Orgasmus sanguinis & crasis sulphureo-salina sunt temperanda, rigor solidarum partium est demulcendus, quod præstant nitrosa, absorbentia salina, emulsiua, in spongiosis & robustis acida fortiora.
4. Æqualis humorum dispertitio est adiuuanda,
 - 1) In *cholericis* per salia media, porum sufficientem tenuem ex decocto C. C. infusa thée, coffée, item ex herbis discutientibus chamædrios, dulcamaræ, hyssopi, verbenæ, veronicæ, chærefol. &c.
 - 2) In *aliis* temperamentis simul adhiberi possunt alexipharmaca temperata, e. g.
 - a) Essent. alexipharm. *Stahlîi* cum essent. succini remixta.
 - b) Item decocta lignorum & radicum resoluentium, e. g. ligni sassafras, radicum sarsaparill. chinæ, pimpinell. alb. bardanæ &c.
5. Motuum spastico-dolorificorum vehementia est mitiganda & dissoluenda.
 - 1) *Mitigant*: antispasmodica cinnabarina, puluis lumbricorum terrestrium, & anodyna per alexipharmaca correctæ, e. g. theriaca, pilulæ *Wildegansii* genuinæ, M. P. de cynoglossa. E e e 2
 - 2) *Dis-*

2) *Dissolunt:*

- a) *Interne:* diapnoica & lenia alexipharmaca, modo commendata, in declinatione autem mixtura tonico-neruina *Stahlii*.
- b) *Externe:*
- α) Spiritus vini camphoratus crocatus.
 - β) Spiritus acidus formicarum.
 - γ) Spiritus lumbricorum terrestrium, cum prioribus parce remixtus.
 - δ) Spiritus serpilli abstractitius.
 - ε) Essentia castorei.
 - ζ) Sapo Venetus, spiritu vini solutus.
 - η) Ceratum de galbano matricale.
 - θ) Emplastrum Iaponat. *Barbette* largiter camphoratum.
 - ι) *Sacculi* odorati ex herbis coronariis chamæpyr. chamædr. organ. serpill. floribus verbasci, calendulæ, radicibus pimpin. albæ, angelicæ, sigilli Salomonis, seminibus dauci, anisi, vel breuitus: ex farina auenæ, flor. sambuc. croco; adspargendo vbique spiritum vini, vel sacculi vino calido immergendo.
 - κ) Caseus recens cum pelle leporina.
 - λ) *Suffitus* præcipue ex stœchade citrina, deinde etiam mastiche, olibano, ligno Rhodio, santalo citrino, fassafra.
 - μ) *Suffumigia vaporosa* ex decoctis, herbis carminatiuo-neruinis.
 - ν) *Frictiones* cum excutia molli, vel potius pannis calentibus, moderato suffitu imbutis.
 - ξ) *Scarificationes* profundæ in parte adfecta.
 - ε) Motus exercitium intensum, & quæcumque sensum in parte adfecta fortiter adficiunt, e.g. acupunctura Iaponensium, moxa Chinenisium, vesicatoria.

B. *Methodus specialis.*1. *In paroxysmo.*1) *Ter*

- 1) Ter vel quater per diem propinetur puluis quidam antispasticus, e. g.
 Recip. nitri depurati.
 tartari vitriolati ana vnc. femis.
 ocul. cancr. acido citri saturat. drachm. III.
 cinnabar. opt. scrup. IV.
 M. dof. scrup. I.
- 2) Succedente madore subiungantur diapnoica & lenia alexipharmaca, e. g. aquæ scord. scorzoner. plantag. cum antimonio diaphoret. & conch. præparat. mixtæ; vel essentia alexipharm. temperata.
- 3) *Externa* simul in subsidium vocentur; vbi inter multa, superius citata, primas tenet spiritus vini camphoratus crocatus, parti dolenti linteo quadruplicato imponendus, & aliquoties per diem repetendus: deinde egregie etiam conducunt emplastrum saponat. *Barbette*, spiritus serpilli abstractitius.
- 4) Aluus vt respondeat, clyster emolliens cum momento nitri iniiciatur, & deinde in perpetua libertate conseruetur per lenia & commoda cathartica, e. g. pilulas *Beccherianas*, *Stablianas*, sal Anglicanum, aqua calida solutum, quod simul incidit & discutit.
- 5) Post quatuordecim circiter dies cum modo dictis coniungantur
- 1) Tinctura tonico-nervina *Stablii*.
 - 2) M. P. de cynoglossa, cuius gr. I. versus somnum pulveri antispastico remisceatur.
 - 3) Externe spiritus formicarum.
- 6) Tandem, superato morbo, ad residuum membrorum rigorem emolliendum exhibeantur
- 1) *Interne*: essentia alexipharm. sine regimine continuata.
 - 2) *Externe*: pediluua alcalina, ex cineribus, &c. parata.
- a. *Extra paroxysmum.*
- 1) Ante omnia venæ sectiones circa æquinoctia instituantur.

- 2) In subiectis spongiosis simul in vsum veniant scarificatio-
nes menstruæ profundæ circa nouilunium, & qui-
dem in partibus adfectis vel confinibus.
- 3) Præcipue vero hirudines hæmorrhoidalibus locis ad-
plicentur.
- 4) Quater per annum congruis laxantibus corpus expur-
getur, e. g. per infusa sennata, rhabarbarina, & helle-
borata, cum remediis ad sanguinem purificandum
aptis remixta.
- 5) Sufficiens motus corporis consumptorius, tanquam a-
pex totius negotii, vbique inculcetur, coniuncto po-
tu diluto.
- 6) Quando vernali vel autumnali tempore paroxysmus
recurrat, exhibeatur versus instans tempus decoctum
lignorum fatis dilutum & instar thée vsurpandum;
subiunctis temperantibus nitrosis & tinctura tonico-
neruina.

VIII. CAVTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Omnes excretionum species, leniter promotæ, dolores
minuunt, suppressæ vero, vel fortiter intensæ, omnia
exacerbant.
2. Hinc quouis modo improbantur
 - 1) *Opiata*: hæc enim, siue particulis viscidis, siue sulphu-
re volatili, valde actiuo, in humores agant, præter alia
damna, contracturas facile relinquunt. In atrociam dolo-
rum *correcta* tantum sub prudente vsu conceduntur.
 - 2) *Anodyna* hæc & quæcumque alia interne adhibita in
vigore paroxysmi vel subitanam mortem, vel febres
lentas, hæcticas, vel in sanguineis dolores colicos arces-
sunt, cum aluinis semper ataxiis, i. e. obstipationibus.
 - 3) Immo ad prophylaxin, vel versus paroxysmos vsurpata,
impetum quidem aduenientem longius forte dura-
turum comprimunt, sed citiori recursum ansam præ-
bent, & tandem ad paralytin disponunt.
 - 4) Et licet in refractori dosi hunc in modum vsurpentur,
varia tamen inordinata & pertinacia pathemata re-
linquunt.

5) *Mar-*

- 5) *Martialia, bolaria & alia adstringentia* quæ excretionem supprimunt, viscera constringunt, & hydropem minantur.
 - 6) *Salia volatilia*, quæ, intempestive & largiter exhibita, viscera constringunt, & simul humores concitant, stupidum rigorem partibus conciliant, & dolorem osteocopon relinquunt.
 - 7) Maxime *externa adstringentia, refrigerantia saturnina, stupefacientia, narcotica, sulphurata*: licet enim temporarium leuamen adferre soleant, nodos tamen, topfos, immo contracturam inducunt, sapissime adfectum versus interiora retropellunt, & pessima ac funesta illa symptomata accelerant, quæ sub *prognosi* commemorata sunt.
 - 8) *Repellentia fortiora*: quæ simili ratione malum ab exterioribus ad interiora reprimunt, & grauissimas respirandi angustias, quin febres inflammatorias plurimum funestas inducunt.
 - 9) *Acrida, calida nervina*: olea destillata, balsami Indici, spiritus oleosi, quæ omnia exasperant, ardores intolerabiles, immo inflammationes adferunt: nulla enim hic partium debilitas, quæ per talia roboranda esset, sed potius nimia strictura & intensio accusanda est.
 - 10) *Spiritus urinosi*, qui pariter, stupidum rigorem parti laboranti adfricant.
 - 11) *Fortiora purgantia* in ipso paroxysmo exhibita: per hæc enim motus spastici ad interiores partes, cum vitæ sæpe discrimine, vocantur.
3. De *sanguinis ventilationibus*, præcipue autem *vena stesione*, hic idem valet, quod sub hæmorrhagiis prioribus tabulis sæpius inculcatum est: nempe vigente iam paroxysmo institutæ, morbi pertinaciam non solum frequentius augent, sed & recursum paroxysmorum tantocitiùs & obstinacius accelerant, ac reliquam medicacionem, nisi sanguis de nouo ventilatus sit, frustrantur.
4. Quando autem circa prima initia, aut in declinatione ventila-

- tilationes adornantur, tum vsum aliquem subinde præstant, præcipue *hirudines*, locis hamiori hoidalibus numero 4-5. adpositæ, vel etiam largæ ac profundæ *scarificationes* in partibus adfectis: qua ratione mali uchiadici impetus sæpe in totum sublatus est.
5. *Lumbrici terrestres* conueniente vehiculo, e. g. aqua card. ben. serpill. fumar. in forma pulueris ad scrup. l. bis aut ter per diem fumendi specificè commendantur in arthritide vaga, scorbutica.
 6. Decoctum inspissatum *strobilorum* seu *summitatum* abietis & pini viuæ etiam in hoc adfectu laudatur. Sumuntur huius liquoris inspissati ter per diem cochlearia tria vna vice in vehiculo calido.
 7. *Serpillum* itidem laudatur tam in decocto quam balneo; spiritus serpilli mixtus cum spiritu vini camphorato bono, i. e. multo sale alcali fixo imbuto, externe conducit.
 8. *Conserua satyriensis* in eodem adfectu prodesse dicitur; duo autem vel tres pro dosi cuspides cultri ter aut quater per diem sumuntur.
 9. Alii, tam in adfectibus spastico-arthriticis, & conuulsivis, quam in febribus corruptis, scabie nodosa, & vlcerosa, præcipue in gonorrhœa male tractata & inueterata *morsulos antimonii* conducere adseuerant:
 - e. g. Recip. animon. crud. Hung.
amygdal. dulc. excort. ana vnc. semis.
condit. cort. citr. drachm. II.
c. f. q. sacch. in aqua solut. f. l. a. morsuli in 8.
part. æq. diuid. & quotidie vnum tribus vicibus comedendi.
 10. *Spiritus vini camphoratus* crocatus, & *sacculi sicci* omnibus conducunt temperamentis.
 11. *Ceratum de galbano* camphoratum, præmissa statim sub initium venæ sectione, in phlegmatico-sanguineis præsentissimum sæpe adtert solamen; nisi tamen intra 2-3. horas effectum præstet, auferendum est.
 12. *Emplastrum saponatum Barbette*, largiter camphoratum, & per

- & per vices impositum, in recentiore malo, in primis ischiadico, satis efficax apprehenditur.
13. *Suffimigia*, maxime ex stœchade citrina, semper conferunt.
 14. Sic etiam *friktiones calida* quam plurimis profunt; qui autem a frigore solamen magis percipiunt, illis *embrocasio* commendatur.
 15. *Spiritus acidus formicarum sub methodo* non sine ratione post principia locatus est; quando enim vigente paroxysmo applicatur, dolores potius auget, quam lenit, in declinatione autem adhibitus, rigores artuum emollit, & contracturam præoccupat.
 16. *Acidularum* vsus, debito corporis motui coniunctus, robustis spongiosis conceditur, teneris autem & gracilioribus obstructions viscerum, cachexiam, hecticam &c. inducit.
 17. Alexipharmaca ad motus & dolores spasticos quidem conducunt, sed sine regimine propinari debent, alias dolores in artus diffunduntur.
 18. *Causse occasionales*, nempe diæta lauta, calida, bacchus, ira, venus, motus concussorii, equitatorii diuturni &c. nisi remoueantur, obtenta mitigatio non diu perdurabit.
 19. *Vsus salinationis* iu affectibus arthritico-contractis frustra a quibusdam laudatur.
 20. Fugiarur error multis communis, qui *adfectum dorsi spasticum*, pro *nephritico* declarat: est enim leuior arthritidis species, peculiari nomine nondum designata.



TABVLA XLVII.

DE

HEMICRANIA.

DEFINITIO.

Hemicrania est dolor capitis valde acerbus, dimidiam tantum

Fff

tum

tum illius partem occupans, ab *incompleta* sanguinis congestione ortus, & hæmorrhagiam narium *eminus* respiciens. Deriuatur ab ἡμι, semis, & κέρανον, caluaria.

II. DIFFERENTIA.

Hemicrania differt

1. a *cephalalgia*:

- 1) In hemicrania enim congestio est *rheumatica* & *incompleta*, quæ *eminus* quasi euacuationem sanguinis per nares intendit, & est adfectus spastico-arthriticæ indolis, in cephalalgia autem congestio tantum *simplex* contingit, quæ directe hæmorrhagiæ narium destinata est.
- 2) Hemicrania occupat solum dimidiam capitis partem, plerumque sinistram, & alteram immunem relinquit, cephalalgia vero modo per totum caput, modo per certas illius partes se diffundit.
- 3) In hemicrania sæpius subest causa ex consensu e. g. vitium primarum viarum, hæmorrhoidum, mensium; in cephalalgia autem simplex plethora magis peccat.

2. Hemicrania per se diuidi potest in

- 1) *Idiopathicam*, &
- 2) *Symptomaticam*, de qua modo dictum est. Item in
- 3) *Continuam, fixam*, perpetuo quasi ægrum adfligentem, & in
- 4) *Periodicam*, seu per paroxysmos recurrentem.

III. SIGNA.

1. Dolores vibratiui, interlancinantes, contumaces, spastico-arthritici, ordinarie adeo vehementes, vt ægri caput quasi distrahi sibi & diuelli autument.
2. Dimidiam quidem capitis partem, præcipue sinistram, hi dolores occupant.
3. In eodem autem latere modo sursum, modo deorsum ta vagantur; vt ex osse bregmatis ad os temporale, & ex osse temporali ad dentes atque oculum illius lateris, & sic ex vno loco in alterum excurrere soleant.
4. Eo ipso, quo inferiores lateris partes occupat, superioribus paul-

paullulum parcat, mox autem ex illis in has recurſat, & ſic quaſi intercuſando adfligit.

5. Immo dolor interdum ad illius lateris collum & brachium vsque excurrit.
6. In quibusdam ſubiectis dolores exiguam quidem caluariæ regionem occupant, ſunt autem tam acuti & pungentes, quam ſi telum ibidem infixum membranas diſſecet.
7. In partibus corporis *remotis* manifeſtat ſeſe motus tonicus ſtrictior.
8. Præ dolorum atrociam, ſæpius neque leuiſſimum ſonitum, neque lucis radios perferre poſſunt.
9. In paroxyſmo vrina eſt cruda, & in declinatione colorem præbet ſaturatum, qui paullo poſt copioſum deponit ſedimentum.
10. Aluus frequenter eſt ſicca.

V. *SVBIECTA.*

1. Temperamentum cholericum - ſanguineum huic adfectui præ aliis ſuccumbit, quia particulis ſulphureis, organum ſanguinis promouentibus, abundat.
2. Feminis familiarior eſt, quam viris.
3. Cum primis illis, quæ vitæ otioſæ addictæ, & crebris animi commotionibus obnoxia ſunt.
4. Quibus legitimus menſium, vel, in viris, hæmorrhoidum ſucceſſus turbatus eſt.
5. Specialiſſime feminæ, quæ in coniugio ſterili viuunt.
6. Tam quidem iuniores, quam adultiores hunc adfectum experiuntur, hoc autem discrimine, vt in illis dextrum præcipue latus, in his autem ſiniſtrum ordinarie occupetur.

V. *CAVSSÆ.*

1. Cauſſa *antecedens* eſt plethora cum ſulphureo - bilioſa ſanguinis dyscraſia, euſdemque nihilo minus aliqua ſpiſſitudine coniuncta.
2. Cauſſa *proxima* eſt congeſtio ſanguinis ad caput, ſeu molimen hæmorrhagicum, aliquam illius excretionem reſpiciens.
3. Cauſſa huius congeſtionis & dolorum inſtrumentalis eſt

partium inferiorum maior constrictio per motum tonicum auctiorem, superiorum autem porosarum relaxatio, & tamen *contraria* spasimorum *obluctatio*.

4. *Causæ externa, occasionales & procatartica* sunt
 - 1) Suppressio euacuationum sanguinis naturalium, præcipue mensium & hæmorrhoidum.
 - 2) Artificialium adfuetarum neglectio, e.g. venæ sectionis, scarificationis.
 - 3) Vel contra venæ sectio tumultuaria, aut stato tempore non repetita, vnde motuum excretoriorum ordo perturbatur.
 - 4) Vitium primarum viarum.
 - 5) Simplicis cephalalgiae peruersa tractatio per remedia calida & opiata minus secura.
 - 6) Motus arthritici per repellentia imperite tractati.
 - 7) Mutatio vitæ generis laboriosi in sedentarium.
 - 8) Nimia vigiliæ & lucubrationes.
 - 9) Nimia corporis excalectio.
 - 10) Aut repentina illius refrigeratio, in primis pedum tempore humidioris & frigidioris.
 - 11) Iracundia, in primis tacita & suppressa.
 - 12) Diæta aromatica, lauta & spirituosa.
 - 13) Dispositio hæreditaria.

VI. PROGNOSIS.

1. Hemicrania licet dimidiam tantum capitis partem occupet, hunc tamen defectum vehementia dolorum largiter compensat, & in locis confinibus facile decubitus ad oculos, & illorum suffusiones relinquit, maxime post peruersam in paroxysmo tractationem.
2. *Quem* ad modum hemicrania initium est adfectuum arthriticorum, ita progressionem annorum libentius in plenariam arthritidem transit.
3. Præcipue hoc euenit, si ineptis artificiis sanguis ad inferiores partes circa venam portæ restringitur, vnde facile podagra & malum ischiadicum introducuntur.
4. *Quod* si vero retropulsio sanguinis ad viscera facta est, febres

bres inflammatoriæ, præcipue in iunioribus, solent accedere.

5. Quo magis dolor ad illius lateris brachium vsque se extendit, & æger de obdormitione illius conqueritur, eo magis hemiplexia seu paralyfis illius lateris metuenda est.
6. Si nondum in habitum deducta est hemicrania, & in iunioribus se se manifestat, medicatio facilius succedit; quando autem in annosioribus, & præcipue feminis, quarum menses iam cessarunt, contingit, vix vñquam perfecte tollitur.
7. Præcipue hemicrania *periodica & paroxysans*, interdum adeo rebellis est, vt omnem fere medicationem respuat.
8. Suppressio mensium & hæmorrhoidum quando legitime tollitur, sponte aliquando soluitur hemicrania.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Quoniam semper fere cruditates primarum viarum adtunt, illæ ante omnia euacuentur. Fieri hoc potest
 - 1) Sub initium morbi commodissime per lenè emetico-catharticum v. g. per tartarum emeticum cum rhabarbaro iunctum.
 - 2) Quando autem dolores iam ad ἀνμὴν peruenerunt, & adfectus diu durauit, tum negotium per clysteres expediendum est. e. g.

Recip. Rad. alth.

malu. ana vnc. semis.

Herb. parietar.

verbasc.

Summit. origan. ana manip. semis.

Semin. anis.

caru. ana drachm. semis.

coqu. in s. q. aquæ simpl. coletur.

Recipe huius colaturæ vnc. X.

electuar. lenitiu. unc. I.

salis gemmæ.

olei chamomil.

Fff 3

aneth.

aneth. ana drachm. III.

M. f. clyster.

2. Deinde *orgasmus* sanguinis & acrimonia illius salino-sulphurea temperetur, per nitrosã, absorbentia, cinnabarina, antimonialia fixa, item per acidula, e. g. clyst. antim. potui instillandum.
 3. Quando dolor admodum vrget, tum cinnabaris largiori dosi propinetur, addecendo a. gr. V. ad X.-XX. immo ultra, *vid. cautel.* vel MP. de cynogl. gr. I. versus somnum temperantibus immisceatur, conducit etiam cortex cascarilla.
 4. Ad spasmos demulcendos conducunt etiam decocta mucilaginosã, gelatinosã, emulsiva.
 5. In progressionem medicationis, die circiter tertio vel quarto in subsidium trahantur
 - 1) *Interne* tonica & discutientia, v. g. mixtura polychresta tonico-neruina *Stahlii*, vel ess. alexipharmaca ad lenem transpirationem.
 - 2) *Externe* adhibeantur
 - a) In loco adfecto discutientia e. g. spiritus vini camphorat. crocat. vnguent. alabastr. camphorat. epithemata sicca, tabulis de *cephalalgia*, *clauo hysterico* & *cephalaa* commendata, item spiritus maialis, serpilli, lilior. conuall. formic. lumbr. terrest. r.
 - b) In locis remotis reuellentia e. g. euacuationes sanguinis in partibus inferioribus, laxantia, pediluua, frictions lateris oppositi, applicatio cucurbitularum caecarum, & in malo refractario vesicatoria furis applicata.
- B. *Post paroxysmum.*
1. Plethora, tamquam causa primaria, remoueatur per venæ sectionem, in talo instituendam, & circa æquinoctia repetendam.
 2. In feminis sufficientis mensium successus ratio habeatur per pilulas *Stahlii* vel *Beccheri* legitimo tempore propinatas, *vid. tab. de fluxu mensium*, item per essent. succin. versus menstruum tempus exhibendam.
 3. In

3. In viris negotium hæmorrhoidum respiciatur, *conf. tab. de hæmorrhoidibus internis.*
4. Alui successus semper promouetur, vel laxationibus per epicrasin operantibus, vel liquore terræ foliatæ tartari ad 30-40. gutt. coniuncto sufficiente potu, & moderato corporis motu.
5. Causæ procatarticae & occasionales reliquæ quouis modo euitentur.
6. Præcipue vita otiosa & sedentaria.


VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Vena sectio* in ipso paroxysmo non instituat, nisi sequentes duæ circumstantiæ vrgeant:
 - 1) Quando status eminenter plethoricus concurrat.
 - 2) Vel congestio ad caput ita copiose facta est, vt maiora inde mala metuenda sint.
2. *Arteriotomia* licet a *Sennerto* & aliis commendetur, plus tamen detrimenti, quam salutaris effectus ab illa expectandum est.
3. *Adapplicatio hirudinum in ipso paroxysmo* minorem difficultatem inuoluit & considerationem, quam *vena sectio*: in viris nempe, quorum hemicrania originem duxit ab hæmorrhoidum suppressione.
4. Acta N.C. obseruant, quod hirudines ad tempora adplicate, felices effectus præstiterint, sed longe salutaris hæmorrhoidalibus locis adplicantur.
5. Cautela opus est, *emetico-catharticum* propinare, immo in statu insigniter plethorico ab illo remedio plane est abstrahendum; dantur autem nonnunquam casus, in quibus sola temperantia non sufficiunt, & dolores post vomitum statim profligantur, qui antea temperantibus cedere recusant.
6. *Emetica autem sola*, sine coniunctione alicuius cathartici in his circumstantiis, vbi alius plerumque adstricta est, propinare non caret periculo: præter alias enim noxas, inde expectandas, visus læsiones metuendæ sunt.
7. Ad cruditates primarum viarum euacuandas, egregie et-

iam conducunt laxantia cum amaris vegetabilibus coniuncta e. g. infusum ex rad. gent. rubr. herb. cent. min. rhabarb. helleb. nigr. tartar. tartarifat. liq. terr. foliat. tartari, sal mirabile. Exsulent autem aloëtica, & tormulæ pilularum, his abundantes.

8. *Epithemata sicca* præferenda sunt *humidis*, nam hæc partes magis relaxant, & sic vltiori humorum congestioni, & non raro etiam inflammationi ansam præbent.
9. *Tinctura tonico neruina Stahlî* ex spiritu C.C. & tinct. antimoni. vel salis tartari parata, in augmento mali non propinanda est, ebullitionem enim sanguinis auget, in declinatione autem exhibita, sæpius lenem sudorem excitat, & dolores egregie soluit.
10. De *martialibus* hic etiam valet, quod alibi passim de illis dictum est; verbo: perturbationem moliuntur. In declinatione autem adfectus pro tonico scopo conducit crocus martis antimoniæ. aperitiu. *Stahlî*.
11. *Opiata*, quamquam dolores interdum aliquo modo suppressere soleant, minime tamen tuto ob mala consequentia adhiberi possunt.
12. Quod hemicrania *sinistrum* plerumque latus adficiat, meditationem suppeditat de conspiratione huius adfectus cum pathematibus hypochondriaco-hystericis, quæ etiam in sinistro plurimum latere obseruantur.
13. In diætâ eligantur cibi eupepti, temperati: absint nimium sicci & allati: vitetur aer nimium calidus, fuliginosus, suppressio transpirationis naturalis per aerem humido-frigidum, penetrans odor spirituosorum.
14. Obseruationes & cautelas tab. de cephalalgia commendatas cum his conferre, & dextre illas applicare, ex vsu erit.
15. Præcipue autem conferri debet tab. præcedens de adfectibus arthritico spasticis, ad quorum indolem hemicrania accedit.
16. In subiectis, qui sunt habitus spongiosi, conducit etiam prouidus & modestus vsus *thermarum & acidularum*.

17. Denique subiicimus, quod *pulveres antispastici largiter cinnabarati* vim suam anodynam in hemicrania longe efficacius ostendant, quam illi, quorum dosis aliquot tantum grana continet. Primam huius effectus occasionem suppeditavit Illustrissimi cuiusdam hemicrania, quæ adeo effera & pertinax erat, ut omnem medicationem in plures dies non tantum respueret, sed & ad convulsivos plane motus excederet. Quum vero in his angustiis vnica tantum dosis, quæ, præter reliqua ingredientia, octo grana cinnabaris continebat, propinaretur, confestim cessabant spasmi, & somnus, qui toto morbi tempore desiderabatur, placide sequebatur atque per 12 horas cum salutari sudore continuabat.



TABVLA XLVIII.

DE

PLEVRITIDE SPVRIA.

I. DEFINITIO.

Pleuritis spuria est species motuum rheumatico - arthritico - spasticorum, pectoris partes externas musculosas adficiens, a congestione humorum versus hæc loca, hæmoptysin eminus respiciente, & hinc stagnationem inducente, exorta.

II. DIFFERENTIA.

1. Pleuritis *spuria* a *pleuritide vera* & *peripneumonia* differt :

1) Ratione *graduum*.

a) In pleuritide enim vera & peripneumonia omnia symptomata sunt multo grauiora & acerbiora, quam in pleuritide spuria: nam illa indiuiduam semper habent comitem febrem acutam continuam, cum horrore inuadentem, & acri calore progredientem: hæc autem, quando omnino commo-

G g g

tiones

iones febriles habet coniunctas, sunt illæ leuiores & nomine vix dignæ, inæquales & sine typis, adeo, vt illi, qui ita sensibiles non sunt, illas pro re volatica & transitoria iudicent.

b) Illæ comitem porro inseparabilem habent tussim, hæc autem tam sæpe hic *sine* vlla tussi, quam illic *cum* eadem decumbentes vexat; præter ea notabilem per sputum excretionem non habet coniunctam.

2) Ratione *sedis*.

a) Pleuritis & peripneumonia longe vsitatus circa, aut paullo infra mamillam, se se exserunt, pleuritis vero spuria sæpissime altius circa ipsam clauiculam incipit.

III. SIGNA.

1. Experiuntur ægri circa clauiculam sub respiratione in alterutro thoracis latere sensum quemdam molestum, qui tensorius magis, quam punctorius est, & respirationis negotium impedit.
2. Locum, quem semel occupat, constanter non seruat, sed de die in diem magis deorsum tendit, donec tandem (nisi mature dissipetur) pectoris regionem deserens, infra costas nothas notabilem adhuc molestiam relinquat, vel ad scapulas excurrat.
3. Transit quidem hic adfectus paucioribus diebus, certa autem periodo non est circumscriptus.
4. Puncturæ sunt inæquales, non pulsui, sed respirationi respondentem, interdum etiam remittentes.
5. Ægri difficulter, & non nisi cum dolorum exacerbatione in latus adfectum decumbere possunt.
6. Sanguis venæ sectione emissus, in superficie cutem exhibet albam, tenacem.
7. Concurrunt virium & adpetitus magna imminutio.
8. Somnus est inquietus.
9. Vrina est rubicunda, tartareum deponens sedimentum.
10. Aluus plerumque est adstricta.

IV. SVBIECTA.

1. Sanguineo - cholericis & sanguineo - melancholicis, ætatis præcipue iuuenilis & virilis homines.
2. Qui congestionibus rheumatico - arthriticis obnoxii sunt.
3. Sexus virilis, præ sequiori.

V. CAVSSAE.

1. Causa *materialis remota* est plethora, & hinc orta congestio versus hunc locum euacuationi sanguinis destinata.
2. Causa *proxima* est stagnatio humorum per copiosum & diuturnum sanguinis adpulsum inducta.
3. Causa *efficiens* est principium vitale, quod per hosce motus congestorios hæmoptycam euacuationem eminus intendit.
4. Causæ *occasionales & procatartica* :
 - 1) Importuniores & repentini corporis motus sub caloris & frigoris alternationibus.
 - 2) Scabiei, vel aliorum qualiumcumque exanthematum retrocessiones.
 - 3) Repentinæ sanguinis ebullitiones per abusum potuum spirituosorum, vel iracundiam inductæ.
 - 4) Transpiratio auctior & diaphoresis subito repressæ.
 - 5) Euacuationes sanguinis naturales suppressæ.
 - 6) Artificiales aduertæ neglectæ.
 - 7) Violenta pectoris concussio per ictum, lapsum vel fortio-
riorem nisum in oneribus gestandis.

VI. PROGNOISIS.

1. Hic adfectus, si legitime tractatur, intra aliquot dierum spatium sine periculo decurrit.
2. Futuro autem tempore alii sæpe morbi spastici, videlicet nephritis, malum ischiadicum, & tandem podagra succedunt.
3. Si incongruentia adhibentur medicamenta, e. g. calida alexipharmaca, vel externa refrigerantia, tum externæ inflammationes, asthmata spastica, scirrhi hepatis, vel lienis inducuntur.

G g 2

4. Non

4. Non minus per medicationem peruersam in pleuritidem veram vel hepaticidem transmutatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Cruditates primarum viarum ante omnia respiciantur, & per lenia laxantia euacuentur, e.g. per sennata, rhabarbarina, mannata, it. correctæ aloëtica & helleborina.
2. Quando ex iracundia malum hoc existit, ad eliminandam saburram biliosam lene emeticum, & mox quidem propinetur.
3. Concurrente, & valde vrgente plethora, venæ sectio in pede instituat, maxime in illis subiectis, quorum consuetæ hæmorrhagiæ suppressæ, vel artificiales prætermittæ sunt.
4. Ad stasin, quæ ab humorum versus hæc loca stagnatoria congestione metuenda est, præoccupandam, præscribantur resoluentia, discutientia, & æqualem sanguinis distributionem promouentia, e.g. essentia alexipharm. & mixtura tonico-neruina *Stablii*, in subiectis floridis mixtura simplex.
5. Transpiratio vbique conseruetur per diaphoretica fixa, antimon. diaphoret. bezoard. minerale, coniuncto regimine modeste calido, non autem coactio.
6. Motus spastici & ebullitiones sanguinis demulceantur per nitrosa, absorbentia & cinnabarina, it. per decocta lenientia, gelatinosa, emulliuua ex sem. card. mariæ, amygd. dulc. & herbis pectoralibus, veronic. tussilag. heder. terrestr. scord. scabios. spermat. cer. & denique per portiones ex aquis temperantibus, additis nitro depurato, conchis citrat. corall. rubr.
7. *Vrgentibus* autem motibus spasticis adhiberi possunt pulveres antispastici largiter cinnabarati, vel cum cortice cascarillæ, & versus somnum cum M. P. de cynoglossa mixti.
8. Externe locum habent:
 - 1) Spiritus vini cum spiritu formicarum mixtus, & regioni dolenti applicatus.
 - 2) Ca-

- 2) Cataplasmata ex herbis lenientibus, discutientibus & neruinis.
- 3) Emplastra, e. g. emplastr. saponat. *Barbette* camphoratum, de tacamahaca.
- 4) Frictiones tam in loco adfecto, quam dorso.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Si plethora non ad modum vrget, venæ sectio prætermittatur, nam ad prophylaxin instituta, maioris est efficacix, quam sauiente dolore.
2. Euitanda sunt *externa remedia calida acria & volatilia*, ne adfectus a partibus externis ad interiora viscera retrocedat.
3. Exfulent remedia *narcotica, emollientia & expectorantia*, nec non interna *adstringentia*.
4. Eiusdem census est visus topicus remediorum *sulphureorum*.
5. *Externa refrigerantia* cum animi pathematibus fugiantur.



TABVLA XLIX.

DE

MALO ISCHIADICO.

I. DEFINITIO.

Malum ischiadicum est adfectus spastico - arthriticus ad modum dolens; qui motibus contentiosis coxas & os sacrum vehementer infestat, & sanguinis superflui per vasa hæmorrhoidalia ventilationem intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. *Malum ischiadicum ab arthritide strictè dicta* non differt, nisi quod hæc iunioribus, illud autem ætate prouectioribus obtingat & regionem coxæ atque ossis sacri pertinaciter occupet.
2. *Chiragra, gonagra, & podagra* eundem inuoluunt respectum, & ex ipsa denominatione dignoscitur horum adfectuum differentia *locatis*

Ggg 3

3. Quem

3. *Quem ad modum omnes arthritici adfectus a simplicibus motibus congestoriis hæmorrhagicis ratione effectus, durationis, partium adfectarum, immo etiam euentus differunt, ita & malum ischiadicum ab his congestionibus simplicibus est distinguendum. Conf. tab. de adfectibus spastico-arthriticis.*

III. SIGNA.

1. Dolor coxendicum vehemens, & pertinacia singulari sæviens; maxime in tendinibus circa iuncturas desinentibus.
2. Hic spasmus musculos totius lateris tam arcte stringit, ut æger curuus incedere cogatur, neque corpus sine intensissimis doloribus erigere queat.
3. Pro diuersa fibrillarum structura, modo inflatio omnium ferme vasorum cruralium obseruatur, modo dolor, qui interdum ad genu, interdum etiam ad pollicem vsque pedis se se extendit, sentitur.

IV. SVBIECTA.

Ischiadico malo sæpius obnoxii sunt homines

1. Sanguinei, sanguineo-cholericis, sanguineo-melancholicis, immo etiam de phlegmatico temperamento participantibus, qui habitus corporis sunt laxi & spongiosi.
2. Præcipue plethorici, floridæ diætæ, lautæ, aromaticæ, spirituosæ, dediti, animi pathematibus, in primis iracundiæ, nimis indulgentes, vitam otiosam degentes.
3. Dispositione hæreditaria adfecti, vel etiam veneri addicti.
4. Præ ceteris facile in hoc malum incidunt hæmorrhoidarii, & illi, qui artificialem sanguinis ventilationem neglexerunt, vel naturalem imprudenter suppresserunt.
5. Certius autem illi, qui rheumaticis & arthriticis stricte dictis morbis ætate iuniore obnoxii fuerunt, progressionem annorum a malo ischiadico infestantur.
6. Femine hæmorrhoidariæ, cælibes hæmorrhoidariæ post mensium cessationem nonnumquam fiunt ischiadiciæ.
7. Denique illi, qui vel percussiones violentas, vel suppressos sudo-

sudores in pedibus perpeffi sunt, vel diuturnis præter consuetudinem equitationibus se se exercuerunt.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *materialis* mali ischiadici est plethora.
2. *Efficiens* est ipsa natura, quæ sanguinem superfluum versus coxas & vasa hæmorrhoidalia, siue externa siue interna, ducit & ibidem exitum quærit.
3. Causæ *externa* & *occasionales* in *subiectis* recensitæ sunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Malum ischiadicum ægros magis excruciare solet, quam dolores arthritici, qui partes superiores infestant.
2. Cholericis sanguineis hoc malum tam insolenter interdum infestat, ut a strictura diuturna partium adfectarum extenuato & coxendicis aridura metuenda sit.
3. Dolor, qui iuncturam femoris occupat, diutius perseuerat, ægriusque tollitur, quam ille, qui circa os sacrum animaduertitur.
4. Malum ischiadicum, hæmorrhoides & nephritis mutuum quidem, sed non perpetuum, inter se habent commercium.
5. Hæmorrhoidum legitimus fluxus non solum passionem ischiadicam mitigat, sed & illius recursum in multis præscindit.
6. Quo insolentius passio ischiadica vrget, eo citius in podagram transmigrat, & quando hæc rite non tractatur, hætica scenam claudit.
7. Si dolores coxendicem deferere, & ad inferiora tendere obseruantur, optima omnino est nota solutionis spasmodorum.
8. Corpus si insolentius commouetur, malum exacerbatur.
9. *Hippocr. aphor. 59. Sect. VI.* dicit: quibus longo coxendicis dolore vexatis coxa excidit, & rursus incidit, iis mucoseres insunt.
10. Item *Hippocrat. aph. 60. Sect. VI.* quibus a diuturno coxendicis malo vexatis crus excidit, iis crus contabescit, & claudicant, si non vsti fuerint.

VII. ME-

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*


1. Methodus, qua malum ischiadicum tractari debet, non differt a regulis illis, quas tabula generali de adfectibus spastico-arthriticis exhibuimus.
2. Hoc tantum monere restat, vt medicatio eo maiori patientia continuetur, quo magis malum hoc ischiadicum ad pertinacem podagræ indolem accedere solet.
3. Quod ad *externa* remedia attinet, in malo recentiore non exiguum habent locum & effectum, præcipue *sapo Venetus*, spiritui vini solutus, & *emplastrum saponatum Barbette camphoratum*; item *ceratum matricale*. *Conf. caut. s.*

VIII. *CAVTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. *Ventilationes sanguinis artificiales*, si extra paroxysmum & mature satis instituuntur, motus eius modi ischiadicos multum præoccupare possunt.
2. *Hirudines* apud illos, qui hæmorrhoidum suppressione laborant, insignem edere effectum, immo totum interdum malum superare compertum est.
3. *Purgantia, sudorifera* eiusdemque commatis medicamenta sanguinem commouentia, hic omnino extulent, paroxylum enim exasperant, infarctum, scirrhum, vlcus inducunt, hæctica tandem insequente.
4. Optimum remedium præcauendi huius mali est *motus voluntarius*, præcipue extra paroxysmum, quantitate sanguinis prius imminuta, institutus. Notandum autem est, quod, nisi hic ipse motus ad consumptionem vsque sanguinis per modum insensibilis transpirationis diu ac continuo peragatur, magis noceat quam proficit. Ille enim motus, qui impetuosus & abruptus est, orgasmum sanguinis, virium prostrationem, & multa alia damna importat.
5. *Emplastra, ceratum matricale, & saponatum Barbette* in malo ischiadico recentiore efficaciter adhibentur, in statu autem inueterato sine fructu dolenti regioni applicantur.
6. Quoniam *balnea* sanguinis quantitatem non imminuunt, ideam vero naturam, sanguinem commouendi, imprimere

re possunt, horum loco suffumigia potius vaporosa partibus inferioribus admoueantur.

7. *Scarificationes* iam dum adueta temere non prætermittantur. Licet enim neque hoc remedio quantitas sanguinis satis imminui possit, docet tamen experientia practica, quantæ efficaciam sit consuetudo.



TABVLA L.

DE

PODAGRA, GONAGRA

ET

CHIRAGRA.

I. DEFINITIO.

1. *Podagra* est spastica-dolorifica motitatio in pede, a congestione sanguinis hæmorrhoidali externa initium sumens, & nullo ibi exitu potita, consuetudine ita insolescens, vt ex leuissima deinde occasione recurrat. Deriuatur a $\pi\acute{\epsilon}\varsigma$, pes, & $\acute{\alpha}\gamma\rho\acute{\epsilon}\omega$, capio.
2. *Gonagra* est dolor arthritico-spasticus sæuissimus, *genua* tantum occupans, & a causis supra indicatis ortum trahens. Deriuatur a $\gamma\acute{o}\nu$, genu, & $\acute{\alpha}\gamma\rho\acute{\epsilon}\omega$, capio.
3. *Chiragra* est dolor arthritico-spasticus, articulationes manuum & præcipue digitorum occupans, atque a causis supra indicatis proueniens. Deriuatur a $\chi\acute{\epsilon}\iota\rho$, manus, & $\acute{\alpha}\gamma\rho\acute{\epsilon}\omega$, capio.

II. DIFFERENTIA.

Hi adfectus a reliquis arthriticis pathematibus non differunt, nisi quod ad loca & tempora seu ætatem attinet.

III. SIGNA.

1. *Podagra*

- 1) Præludivit sæpe conspicua inflatio & infarctus vasorum

Hh h

per

- per crura excurrentium, præcipue apud illos, qui amplioribus vasibus instructi sunt.
- 2) Huic iungitur grauius aliqua totius corporis lassitudo, & tensio per ipsum femur deorsum, cum adpectu pallido partium musculosarum.
 - 3) Cum hoc languore concursat subinde notabilis horripilatio, immo non raro manifestus febrilis horror; licet vana sit speculatio illa, quod podagricis absolute omnibus aliquid febrile eueniat, præcipue, quando incongruentia artificia exclusa sunt.
 - 4) Huic succedit, immo cum illo concurrat, æstus modo volaticus, modo ardens, ad suum & impatientiam vsque varians pro temperamentorum diuersitate.
 - 5) Inuadit ordinario modo leniter circa vesperam, & summum gradum adipiscitur post medianam noctem, hora autem circiter nona ante meridiem mitescit. Deinde vsque ad vespertinum vel nocturnum tempus dolor *remittit*, immo interdum plane *intermittit*.
 - 6) Quando autem a manifestis irritationibus exoritur, e.g. ab ira, terrore, tum typum hunc non æque seruat, sed eo momento impetuose irruit.
 - 7) Incipit dolor in aliis, præcipue phlegmaticis, tantum tenuius, grauius & pressorius, liberum membri motum impediens, sub conamine autem mouendi insigniter pungens redditur.
 - 8) In aliis vibratilis lancinans, vellicans, palpatorius, pertinacissimus, ad eiulatum vsque se extendit, ita vt sub exigua etiam membri motitatione, rupturam illud incurrere videatur. Hos dolores sequentibus circiter verbis exprimunt: es reiße, zerre, fahre hin und wieder, es sechte und tobe, es lebe alles drinnen; es lauffe wie Ameisen, es arbeite drinnen; es reiße das Glied noch ganz zu schanden, es sey, als ob alles zerreißen und zerspringen müßte: als ob Madeln hin und wieder führen &c. Atque hic est *Galenii νόσος ἐλαώδης*, seu dolor contusorius, quem vulgus circumscribit, es thue so weh wie Blut-Schwären, daß sie sich fürchten, es anzurühren.

- 9) Sape enim numero micat, vibrat, salit, palpitat pars adfecta, ac simultæ acus intus vibrarentur, aut pectine ferreo locus carperetur.
- 10) Orditur hic dolor in aliis a superioribus partibus deorsum, nempe a coxa ad pollicem pedis, in aliis inuerso ordine, videlicet a pollice ad coxam, procedit.
- 11) Occupat hic dolor pedem, non solum strictissime dictum, sed ipsam etiam tibiam, genu & femur: nec solum articulationes harum partium, sed etiam intermedia spatia. Atque sub hac extensione & excursione gonagram, & malum ischiadicum simul inuoluit.
- 12) Durat hæc afflictio, sed cum temporaria remissione, per plures hebdomades: & quando dolor remittit, excipit eundem rigor; cui si motus accedat, vniuersus dolor cum ferocia recurrit.
- 13) Sub ipso dolore nullus adest somnus; & licet ille tempore remissionis languide obrepat, cum frequentibus tamen pauoribus coniunctus est; præcipue quando ægri improvida quadam *adlisione* pedis dolores reuocant.
- 14) Tumor aliquibus erumpit, interdum circa initium, interdum circa finem mali, sed non singulis eidem indiuiduo paroxysmis.
- 15) Primis horum dolorum temporibus vel numquam vel rarissime sudant, nisi præ anxietate. Impetus autem quando non nihil languescit, erumpit ad minimum lenis mador, non raro etiam copiosus sudor, præcipue ex adfecta parte.
- 16) Quibus autem sub ipsis doloribus reliquum corpus sudat, illis pars dolens fere sicca manet.
- 17) Adpetitus sub vigore mali aliis iacet, & ad nauseam vomiturientem inclinat, aliis satis constat.
- 18) Prioribus concurrunt syndromæ pathematum in abdomine, præcipue in sinistro hypochondrio, colici dolores, alui siccitates.
- 19) Posterioribus magis conspirant dolores lumbares, re-

nales ac nephritici, immo excretio sabuli & calculorum.

- 20) Denique decrefcunt dolores, & fuccedit ftupor vel rigor circa partem adfectam, fub quo ftupore & rigore fpafmodica mufculorum ftrictura adparet; cui ftricturæ contractura & immobilitas membri illius, ad quod mufculi pertinent, indiuiduo nexu ordinarie iunguntur.
- 21) Seceffio illa furfuracea, quæ in fine obferuatur, non omnibus eft familiaris, nec prouentus nodorum tophaceorum, nifi in malo ad modum inueterato, & habitu pituitofa.
- 22) Vrina, quo magis dolores vigent, eo magis etiam eft rubicunda, valde craffa, rubedine paulitper tenebriofa: fedimentum, crudiore adhuc malo, deponit pauciffimum, idque pallidum; prouectiore autem morbo craffum & fubmucidum rofeum oftendit: lateribus vitri adfigit & ad fundum etiam dimittit copiofa granula, inftar tartari, auranti faturatiffimi coloris.
- 23) Recurrit hic adfectus ftato fere tempore, maxime autumnali aut hiberno humidore, vel vernali humido-frigido aëre.

2. *Gonagræ & Chiragræ.*

Gonagræ & chiragræ figna peculiari non indigent euolutione. Hi enim dolores ad indolem aliorum adfectuum arthriticorum adcedunt, idem cum iisdem fchema exhibent, cum podagra facile confpirant, & non, nifi quod ad loca attinet, differunt.

IV. *SVBIECTA.*

1. *Podagræ* crebrius obnoxii funt homines

- 1) Sanguinei, fanguineo-cholerici, fanguineo-melancholici, immo etiam de phlegmatico temperamento participant, verbo: qui habitus corporis funt laxi & fpongiofi.
- 2) Plethorici, floridi, otiofi, diætæ lantæ, aromaticæ, fpirituofæ dediti, venere abutentes, animi comitotio-

ribus,

nibus, præcipue iracundia laborantes, & qui aut præter consuetudinem aut subinde animi gratia otiosum corpus vel equitando, vel vehendo vel laborando, fortiter exagitant.

- 3) Ordinarie viri consistentis & prouectioris ætatis, prægressa florida & sana iuuentute.
- 4) Graciles, & capacibus venis instructi, paucissimi hoc adfectu laborare inueniuntur, nisi antea spongiosi fuerint, vel hæreditaria subfit dispositio.
- 5) Rarius etiam ætas iunior, nisi ex eadem hæreditaria labe, vel motibus hæmorrhoidalibus prægressis, cum vini, iræ, veneris abusu.
- 6) Quidquid de *infantibus* podagricis circumfertur, ad rarissimos casus pertinet, & laborat fallaciæ suspicionem.
- 7) Quibus euacuationes sanguinis naturales suppressæ, vel artificiales consueta prætermittuntur.
- 8) Dispositi ad rheumatismum ex apostasi febrili non satis discussa; qui quidem alius etiam habitus, quam spongiosi, esse possunt, & qui ex violenta partis læsione, fractura, contusione, chronica spongiosa ulceratione, insigni perfrigeratione, venereis gummatibus & vitiosis inquinamentis in podagram incidunt.
- 9) Feminae rarius quidem hoc malo adficiuntur, quæ vero eidem obnoxia sunt, sunt plethoricae, hæmorrhoidariae, cælibes, & in his malum ischiadicum fere semper præcedit.
- 10) Subiecta *capitis amplioris* podagræ præ aliis obnoxia esse, vulgo quidem dicitur; sed quæ hic vera sunt, causa generaliore suffulciuntur. nempe illi, qui corporis spongiosi & diffusi existunt, amplius etiam caput plerumque habent.

2. *Gonagra & Chiragra.*

Hi adfectus eadem fere subiecta, quæ modo nominata sunt, infestant.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* horum adfectuum est *plethora*.
2. Causa *efficiens* commoti huius sanguinis est principium vitale, quod illum certis partibus destinat, ut per illas euacuatio obtineatur.
3. Nempe hi motus, licet erronei sint, respiciunt tamen in gonagra & podagra hæmorrhoides externas, in chiragra autem & pleuritide spuria hæmoptysin.
4. Causæ *externa, occasionales & procatartica* in descriptione *subiectorum* potissimum indicatæ sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Hi spasmodici dolores quo magis a loco excretionis sanguineo-hæmorrhoidalis, ad quam collineant, remoti sunt, eo pertinacius insistant, & medicationem respuunt. Hinc podagra & gonagra longe difficilius, quam malum ischiadicum eradicantur, & dolor ischiadicus circa os sacrum longe promptius mitigatur, quam qui iuncturam femoris occupat.
2. Podagra ita fere insolescit, ut patientes vix umquam ab illa in solidum liberentur: hinc inueterata mitigari tantum, radicibus extirpari rarissime potest.
3. Quando *iuniores & viri* a podagra corripuntur, totus morbi ambitus plurimum intra 14 dies finitur, in *senibus* autem sæpius ad aliquot menses extenditur; quæ differentia cuiusvis ætatis genio adscribenda est.
4. Podagra artificiiis suppressa vel repulsa, grauissimos & pertinaces morbos infert lethali euentu sæpe concludendos. Conf. num. 16.
5. *Vulgi traditio* non caret fundamento, quod nempe, qui ad modum iuniores podagra infestantur, non perueniant ad insignem ætatem, & hoc quidem ob frequentem passionum hypochondriacarum complicationem: Unde facile recessio ab artibus ad interiora contingit, quæ in sanguineo-cholericis inflammationes viscerum, in magis phlegmaticis hypochondriacos adfectus producit.

6. Sic etiam vera deprehenditur *altera vulgi observatio*, quod, qui tarde podagra tententur, ad seram vsque senectutem viuere soleant, & tandem marasmode vel hydropico-hecticis, vel paralytico-apoplecticis malis vitam amittant. Ex contrario iuniores, vel febribus acutis inflammatoriis, vel astuosis hecticis, vel apoplecticis euentibus moriuntur.
7. Quam diu *pauores* sub somno adhuc vigent, finis paroxysmi nondum adest.
8. Quo *sauioribus doloribus* podagra ægrum exercet, eo breuius & perfectius periodum suam terminat, eo diutius etiam nouus insultus emanet, sed eo certius desinit in spasmus, partes rigide trahentem, & in contracturas facile abeuntem.
9. In chiragrigo-podagrigo passione, eaque inueterata, stabiles tandem contracturæ & rigores horum membrorum eueniunt, nodi etiam circa articulos digitorum. Sed hæ *contracturæ* rariores sunt, nisi quidem grauib. animi pathematibus, diæta intemperante vinosâ, vel inconditis artificiis inducantur. Ad has autem contracturas referri non debet impotentia illa, partem flectendi sub doloribus, neque rigor ille in declinatione paroxysmi succedens.
10. Quo magis autem a paroxysmis remanet insigne vitium siue tumoris, siue torporis, siue rigoris, siue nodosæ duritiæ, siue contractæ distortionis, eo promptior, aut ad minimum eo certior, & in vniuersum peruiacior, fit recursus.
11. *Cholerico-sanguinei* a tumoribus pedum liberi sunt; ex contrario his strictoria potius partium extenuatio ad coxendicem vsque obtingit, eaque tanta aliquando est, vt in aridurâ metum coniciantur.
12. *Sanguineis* hi tumores eneniunt duri, rubicundi, calidiores interdum, *phlegmaticis* vero molles, œdematosi, vbiq. tamen cum sensu doloris.
13. Ad *suescunt* facile & tandem pertinacius durant ac
peren-

perennant, sed sine precipiti periculo, nisi repellantur, vel ineptis remediis hydrops, qui per se non infecutus esset, aduocetur.

14. Pauci podagrici dantur, qui non sabulo & calculis, vel ad minimum lumbaribus doloribus cum vrina vitiiis aut motibus hæmorrhoidalibus adficiuntur; immo præcludunt sæpe pathemata fere nephritica: vbi autem nephritis calculosa complicatur, ibi raro simul hæmorrhoides obseruantur.
15. Hæmorrhoides autem, debito ordine & quantitate fluentes, podagram in solidum auferre solent.
16. Podagra quando ex artubus ad interiora cito repellitur, siue id fiat per adstringentia, siue per ambulationem, siue per alia exercitia, solos artus mouentia, succedunt facillime tristia & periculosa pathemata, vti num. quarto iam diximus, & hic sigillatim indicabimus, nempe
 - 1) In iunioribus, insigniter plethoricis, & cholericis sanguineis, diætâ calida vrentibus, exoritur facile inflammatio vel hepatis, vel lienis vel ventriculi cum febre acuta.
 - 2) In mediocriter annosis, mucosis, diætâ non adeo calida vrentibus, requiritur deiectio adpetitus cum vomitu adsumtorum. Huic prostratio virium, agrypnia, splenica pathemata, colica tormina, multa flatulentia, febris lenta & hæctica mox succedunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA

1. *Podagra, chiragra & gonagra* eadem quidem methodo & iisdem medicamentis possunt tractari, quæ tabula generali de adfectibus spastico-arthriticis indicata sunt; quoniam autem diuicium æraria & magnatum chartophylacia indubiis testimoniis confirmant, & per vulgus adeo notissimum est, quod podagra medicationibus & medicamentis non cedat, *aliam viam*, eamque simplicissimam & fere certissimam, vtut delicatulis incommodam, monstrabimus, qua hoc malum, nisi ad modum sit inueteratum, & hæreditarium, *funditus* extirpari posse certissimum.
 2. Hanc

2. Hanc viam sequente consilio manifestamus: Podagra est *morbus dominorum*, die *Herren-Krankheit*: vnde qui hoc malo cupit liberari, *seruus fiat*, necesse est.
3. Durum hoc verbum! quis potest audire? Is autem audier, qui vere cupit liberari, & vitam commodam ac otiosam in laboriosam commutabit. Hæc enim sola causam podagræ, nempe plethoram, potest remouere.
4. Hoc adsertum sine formidine oppositi audacter defendemus: non paucis enim exemplis illud habemus confirmatum, inter quæ hoc, quod sequitur, est notabilissimum.
5. Vir quidam litteratus quinquaginta & quatuor annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, habitus corporis spongiosi & cralli, vita sua sedentaria non tantum varia mali hypochondriaci incommoda & motus hæmorrhagicos incompletos sibi cumulauerat, sed & insultus podagricos per viginti & plures annos, tantos iam pertulerat, vt prostratis demum viribus lectum semper fere custodire deberet, & præ nimia animi sensibilitate atque impatientia illos, quos habebat intimos, ne videre quidem posset, atque pecuniam, quam in statu sano non dilapidabat, in terram proiiceret. Nulla salus erat in medicamentis, quæ a multis Medicis exhibebantur, & quo copiosius optimæ bonitatis nutrimenta atque iuscula sic dicta confortantia die *Kraft-Brühen*, sumebantur, eo magis vires cadebant, donec corpulentia seu pinguedo corporis post paroxysmum aliquot mensium podagricum & febrem lentam remota esset. Consumta hac ratione plethora & recuperatis paulisper viribus, quærebam ex ægro hoc, num vere cuperet liberari a malo tam diuturno & pertinaci? quumque omnem lapidem se morurum esse cordate promitteret, non tam verbis quam ipsa praxi via monstrabatur, atque, præter corporis motum, venæ sectiones æquinoctiales, quas nemo antea cordi habuerat, eidem imponebantur. Sub initium quidem tantas vires non æger, vt extra domum ambulare posset, breui autem tempore in excursionibus & reliquis cor-

poris motibus habitum mirificum adquisuerat: factum enim est, ut tempestate commoda pluribus diei horis campos & sylvas percurreret, tempore autem nubilo vel hyemali domestica negotia, eaque satis laboriosa, omni assiduitate & constantia per tres annos susciperet. Omnia aderant sanitatis indicia, & podagra, quod per viginti annos frequentibus annuis paroxysmis nostrum exercuerat, tribus hisce laboriosis annis numquam redibat. Nihil, quod desideraretur, restabat, quam hoc vnicum matronarum domesticarum votum, videlicet ut pristina corpulentia, quam assiduus labor haecenus impediuerat, rediret. Redibat quarto anno, quo sensim a labore remittebat, & diata nihilo minus plena ac lauta utebatur, venæ sectionem etiam, quam magnopere auersabatur, omiserat. Hac ratione ampla illa vestimenta, quæ spe obtinendæ pristinae obesitatis angusta fieri matronæ recusauerant, ad vota erant expleta. Prædicebam pristinum morbum, qui quinto anno mitioribus quidem, sexto autem acerbioribus paroxysmis recurrebat, atque totam pinguedinis penum consumebat. Nouam hanc calamitatem litteris suis mihi indicabat æger (discesseram enim inter ea ex illo loco, quo vna habitabamus) & novam obedientiam pollicebatur.

6. Plura eius modi exempla nota sunt, quæ podagram, quoties desiderant, vita otiosa possunt reuocare, & ex contrario per sufficientem constanter laborem illam profligare.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Omnes excretiones, leniter promotæ, dolores horum adfectuum mitigant, suppressæ vero, vel fortiter intensæ, illos exacerbant.
2. Hinc quouis modo improbantur
 - 1) *Opiata*: hæc enim siue particulis viscidis, siue sulphure volatili valde actiuo, in humores agant, præter alia damna, contracturas facile relinquunt. In atrociam autem dolorum illa tantum, quæ correctæ sunt, sub prudente vsu conceduntur.

2) *Mar.*

- 2) *Martialia, bolaria & alia adstringentia*, quæ excretionem supprimunt, viscera constringunt, & hydropem arcellunt.
- 3) Cautelæ illæ, quæ tabula generali de *spasmis* indicatæ sunt, etiam hic valent.
4. *Pilulæ Stahlinae*, præcipue illæ, quæ ad tumores specialiter instructæ sunt, in tumore podagrigo extra paroxysmum laudantur.
4. *Hirudinum* applicatio ad loca hæmorrhoidalia, vel largæ & profundæ *scarificationes* in partibus adfectis vsum præstant.
5. Item *spiritus vini camphoratus crocatus & sacculi sicci* omnibus subiectis conducunt.
6. Quemlibet rheumatismum, siue a febribus male solutis, siue a scabie repulsâ &c. productum, pro podagra interpretari, caueatur.
7. *Causæ occasionales*, nempe diæta lauta, calida, bacchus, ira, venus, motus concussorii, equitatorii diuturni &c. nisi remoueantur, obtenta mitigatio non diu durabit.
8. Excell. *Stahlius* adlegat exemplum serui alicuius, qui a domino suo podagrigo ocreas dono acceperit, & breui abhinc tempore podagricus factus sit.
9. In doloribus podagricis egregie laudatur *emplastrum*, quod *tabul. chirurgica de contabescencia* describitur.
10. Ceterum res est altioris considerationis, quod repulsio podagræ ex artubus ad interiora tam infausta consecraria, eaque satis velocia habeat. Certe qui considerat paucas illas sanguinis guttulas, quæ spasticis illis contentionibus exagitur, non facile credet, quod illæ ipsæ ad interiora repulsæ tale infortunium producere possint. Hinc non tam in *materiam*, quam *motus pertinaciam* culpam reiicimus. Natura enim, quæ intentione euacuandi sanguinem occupata est, quando in externis partibus turbatur, ad interiores partes se conuertit, & in quocumque viscere vitali eosdem pertinaces motus strictorios & exprellorios instituit. Vnde istas humorum inflammatorias oriuntur, & tristia consecraria introducuntur.

TABVLA LI.

DE

I N C V B O.

I. DEFINITIO.

Incubus est spasmodica musculorum thoracis contractio, nocturno tempore contingens, & anxiam valde ac laboriosam respirationem inducens; germanice, *der Alp*, græce *ἐφιάλτης*.

II. DIFFERENTIA.

1. Incubus quo modo ab *asthmate conuulsivo* distinguendus sit, sequente tabula fusius indicatum est.
2. Differentiam a *catarrho suffocatio* signa utrorumque adfectuum, inter se collata, docent. *Conf. tabula de catarrho suffocatio*.

III. SIGNA.

1. Sensus ponderis alicuius, pectori incumbentis.
2. Respiatio anxiosa, & tam vehementer cohibita, ut neque mouere corpus, neque claram vocem emittere possint ægri.
3. Totius enim corporis motus paulisper sufflaminatus est, collecto motus vigore circa thoracem.
4. Oberrant sensibus varia phantasmata, quæ vere se conspiciere & a quibus iniurias se pati autumant afflictæ.
5. Soluitur hoc incommodum, simul ac vnicum tantum membrum ad motum denique concitetur.
6. Remanet autem aliquamdiu ingens lassitudo per corpus vniuersum, immo nonnunquam maculæ rubicundæ vel liuidæ, siue in artubus siue in pectore, conspiciuntur.
7. Hæc omnia nocturno tempore contingunt, medio inter vigilantem & dormientem statu.

IV. SVBIECTA.

1. Euenit incubus sæpius plethoricis, non quidem simpliciter talibus, sed notabili sanguinis spissitudine laborantibus.
2. Spe-

2. Speciatim; qui adfectibus hypochondriaco-splenicis obnoxii sunt.
3. Qui nimia ciborum quantitate ventriculum circa vesperam onerare, & in tergo decumbere solent.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *materialis* est plethora cum spissitudine sanguinis, præcipue circa venam portæ stagnantis, coniuncta.
2. Causa *formalis* spasticorum horum motuum est principium vitale, quod illos rationaliter quidem, sed ex errore constituit.
3. Cum causa materiali interdum conspirant cruditates primarum viarum.
4. Hac ratione exfulant fabulæ, quæ de hoc malo per vulgus circumferuntur.

VI. PROGNOISIS.

1. Incubus transitorius est adfectus & minoris periculi.
2. Contumaciter tamen interdum se gerit, nec prius auferitur, donec sanguinis quantitas imminuta & eiusdem spissior qualitas correctâ sit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.


1. Præmittantur per aliquot dies blandiora *laxantia* cum digestiuis & resoluentibus coniuncta.
2. Deinde, modo tempus sit opportunum, *vena sectio* in pede administrerur, subiunctis pulueribus nitrosis, digestiuis, cinnabarinis.
3. De reliquo eadem methodus, quæ *tabula de malo hypochondriaco-hysterico* commendata est, obseruetur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quo magis primarum viarum cruditates peccant, eo magis post euacuantia tonus per stomachica amara restituentus est; in quem finem præcipue laudantur essent. gentian. rubr. centaur. min. card. bened. absinth. cort. aurant.
2. Vbi incubus *vnice* a prægrauatione ventriculi dependet, ibi euacuatio commode per blandum aliquod *vomitari-*

um peragitur ; caueatur modo , ne in diagnosi error committatur, vomitus enim in adfectibus hypochondriaco-hysteriis grauia mala inducturus esset.

3. Adfuescant eiusmodi aegroti lateribus, non autem tergo, incumbere.



TABVLA LII.

DE

ASTHMA TE SPASTICO

SEV

CONVULSIVO.

I. DEFINITIO.

Asthma conuulsium est vehemens spastica musculorum thoracis compressio, hæmoptycam euacuationem, sed erronee, respiciens.

II. DIFFERENTIA.

1. Asthma conuulsium ab *incubo* sequentibus differt:
 - 1) *Incubus* euenit dormientibus tantum, vel ad minimum semidormientibus, *asthma* autem *conuulsium* vix aliis, quam vigilantibus, obtingit.
 - 2) *incubus* transitorius est adfectus, *asthma* autem *spasticum* longe pertinacius durat, & frequentissime statis paroxysmis reuertitur.
 - 3) *Incubus* respirationem tam vehementer cohibet, vt vocem claram supprimat, *asthma* autem *conuulsium* liberam magis habet respirationem.
 - 4) *Incubus* minoris, *asthma* autem *spasticum* maioris est periculi.
2. Asthma *spasticum* quo modo ab asthma *defectiuo*, nempe humido & sicco, differat, videatur *tabula de asthma humido & sicco*.

3. Differentiam a *catarrho suffocativo* docet *tabula de catarrho suffocativo*.

III. SIGNA.

1. Respiratio est quidem brevis, sed non tam vehementer impedita; neque oppletium quid in pectore sentitur: quibus circumstantiis a *catarrho suffocativo* præcipue dignoscendum est asthma convulsivum.
2. Torpor insuperabilis & extrema lassitudo per reliquum corpus.
3. In thorace vero & circa scapulas summa compressio sentitur, coniuncta cordis palpitatione.
4. Adspæctus faciei inæqualiter est rubicundus, & vasa circa tempora turgent.
5. Aluus plerumque est adstricta, vrina fere est suppressa, in nonnullis autem maiori copia excernitur.
6. Concurrit sæpe vertiginosa oculorum & mentis tentatio.
7. Hæc omnia non solum statò plerumque tempore, in primis circa primam noctem, per vnam alteramve horam adfligunt, sed etiam certas periodos formant.

IV. SVBIECTA.

1. Crebrius euenire solet hic adfectus plethoricis, quam aliis subiectis.
2. In puerili & adolescenti ætate non facile occurrit; nisi quidem aliis morbis accedat, quo vero casu mali ominis deprehenditur.
3. Magis familiaris est adultioribus, in quorum aliis mediocri tantum paroxysmus, sed eo sæpius, occurrit, in aliis autem cum impetu inuadit & breui tempore scenam claudit.
4. Specialiter euenit hic adfectus iis hominibus, qui ventilationes sanguinis adsuetas, præcipue scarificationes circa hæc loca, neglexerunt.
5. Qui vitam laboriosam in otiosam mutarunt.
6. Quibus podagra vel rheumatismus inconditis remediis ad interiora retropelluntur.

7. Porro

7. Porro illis feminis, quæ suppressis vel imminutis mensibus laborant.

8. Item viris hypochondriacis, quibus hæmorrhoides suppressæ sunt vel impeditæ succedunt.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *materialis* est plethora.

2. Causa *formalis* est irritata ad excussionem natura.

3. Causæ *occasionales* sunt variæ, est enim magis symptomaticus quam idiopathicus adfectus: unde vel febribus, præcipue malignis, vel arthritico-rheumaticis, vel pectoris violentis adfectionibus se se iungit. *Conf. subiecta.*

VI. PROGNOISIS.

1. Asthma spasticum est fonticum malum, & licet in præsentem non statim sit periculofum, facile tamen recurrit, & sæpe ægrum iugulat.

2. Pueros & adolescentes quando hic adfectus corripit, peioris est præfagil.

3. Si subiecta valde corpulenta ab hoc morbo infestantur, in hydropem pectoris aliquando incidunt.

4. In iunioribus enim hic adfectus vere spastico-conuulsivus deprehenditur, in mediocri ætate acutos morbos vel peculiare sanguinis eruptiones, præcipue hæmopticas, in senioribus autem catarrhos suffocatiuos, apoplexiam, paralyfin, post se relinquere observatur.

VII. METHODOVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *In paroxysmo.*

1) Ante omnia aliis solvatur per clysterem acriusculum, ad quem, deficientibus aliis, vrina recenter emissa, sumatur.

2) Deinde venæ sectio siue instituat, siue differatur, secundum indicationes sub *cautelis* legendas.

3) Post ea ad sanguinis commoti placationem sæpius exhibeantur pulveres nitrosi, absorbentes, cinnabarini.

4) Coniunctis, ad sanguinem congestum discutiendum, temperatis alexipharmacis cum regimine leniter diapnoico; quod tanto magis necessarium erit, quando febris, ut fieri solet, concurrat.

5) In

- 5) In casu valde urgente cum pulueribus nitrosis versus somnum misceantur gran. II. M. P. de cynoglossa, vel cinnabaris. largiore dosi adhibeatur.
- 6) Externe locum habent, tanto magis si æger scarificationibus aduersus fuerit, sequentia:
 - a) Spiritus vini camphoratus, circa scapulas, ceruices collum, adplicandus.
 - b) Dens hippopotami.
 - c) Frictiones cum panno calido, præsertim si sensus circa scapulas adest.
 - d) Suffimigia ex succino, mastiche, storace &c. item ex stœchade citrina, prunis iniecta, & parti dolenti adplicata

2. *Extra paroxysmum.*

- 1) Venæ sectiones æquinoctiales in pede numquam præmittantur, coniunctis pediluuiis, alternis hebdomadibus repetendis.
- 2) aduersæ scarificationes iterentur.
- 3) Hæmorrhoidum & mensium vitium legitima methodo corrigatur.
- 4) Lenia laxantia subinde exhibeantur.
- 5) Subiunctis, ad tonum roborandum, & æqualem sanguinis distributionem promouendam, tonico-neruis, e. g.

Recip. tinct. salis tartari.

essent. succin. ana drachm. II.

Spirit. C. C. drachm. I.

M. dos. gutt. XXX.

VIII. *CAPTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. *Venæ sectiones, in paroxysmo institutæ, hoc habent incommodi, vt adfectus in posterum pertinacius recurrat & idem auxilii genus efflagitet.* Natura enim per hosce motus spasticos e longinquo sanguinem exprimere intendit, & quando per venæ sectionem desiderium illius expletur, alia vice, simul ac molestam plethoram sentit, ad antiqua molimina reuertitur, & prius non placatur, quam vena scæta est.

kkk

2. Vnde,

2. Vnde, si æger hoc malum numquam expertus est, venæ sectionem absolute necessariam non iudicamus. Quando autem illa omnino placet, instituatursatis copiosè, & quidem vel iu vicinia, nempe in brachio, vel, si adfectus non ita vrget, in pede.
3. Quando vero æger ab hoc asthma te antea iam correptus, & venæ sectio administrata fuit, tum illius repetitio summe necessaria est: sine hac enim natura omnia reliqua subsidia spernit.
4. *Vomitoria*, sine matura circumstantiarum diiudicatione, data magis nocent, quam profunt, præcipue ratione plethoræ & latentis sub ea timoris hæmoptylæos. Si autem voracitas prægressa incrementum conferret, & nihil ad eo contra indicaret, lenè aliquod emeticum, præmissoclystere & pro re nata venæ sectione, concederetur.
5. Sic etiam *purgantia fortiora* non sine damno adhiberi possunt; lenia autem laxantia vsu suum præstant.
6. A nimia tali sanguinis pressione & spasmodica ipsius cutis contractione sæpius *sudor* prouenit, quem nitrolà re vera magis promouent, quam sistunt.
7. Quando pathemata *hypochondriaca* euidentius complicata sunt, *mixtura simplex*, leniter camphorata, bene acidulata, & sine regimine vsurpata, utilis est; hæc enim flatulentis hypochondriacis subiectis egregie conducit.
8. *Salia volatilia*, præcipue in paroxysmo, fugiantur.
9. *Anodyna*, si, alio nondum aperta, exhibentur, certissime damnum inferunt.
10. Circumspectus *hirudinum* vsus multis hypochondriaco-asthmaticis salutaris fuit.
11. *Diaphoretica* in primis calida multum nocent, quia paroxysmum fortio rem reddunt, lenia autem diaphnoica vsu habent.
12. *Expectorantia* in spastico-asthmaticis adfectibus, vbi nulla materia præsto est, adhibere velle, periculosum est.

TABVLA LIII.

DE

SINGVLT V.

I. DEFINITIO.

Singultus est motus diaphragmatis, & mesenterii cum intestinis semi-conuulsius, per quem principium vitale aliquid circa hanc regionem molesti discutere, propellere & eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. *Singultus* est vel *idiopathicus*, qui a vitio primarum viarum originem ducit, vel *symptomaticus*, qui per consensum nervorum in aliis morbis acutis contingit.
2. Qui morbis acutis superuenit, distinguendus est a singultuosa illa respiratione, moribundis infantibus familiari.
3. Differt *gradu*, est enim vel vehementior, cum summa vi & nisu eueniens, vel mitior, per spontaneam oris clausuram facile moderandus.
4. Qui *chronice* occurrit, vel mox cessat, vel, quod tamen rarius contingit, febrem inflammatoriam comitem habet, & maiore expiratione sonora ac fortiore impetu affligere deprehenditur.

III. SIGNA.

1. Præcedit sæpe dolor grauius & pressorius circa orificium ventriculi sinistrum.
2. Sequitur sub diaphragmatis concussionem exspiratio sonora, plus minus acuta.
3. Sub ipso hoc motu concussorio, in chronico adfectu, exferit se se sensus quidam vlcerosus, als wenn alles rohe und rund an demselbigen Orte wäre.
4. Post præterlapsam horæ quartam circiter partem sponte fere cessat.
5. Aliquando autem, ultra aliquot horas, immo dies durat.

IV. SVBIECTA.

1. Singultus chronicus euenit potissimum iis hominibus, qui nimis auide cibum, præcipue fructus fugaces austeros, & frigidum potum magnis haustibus ingerunt.
2. Singultus in acutis morbis facile illis subiectis accedit, quæ inflammatione quadam interna corripiuntur, specialiter aliquando in puerperis febre acuta correptis obseruatur.
3. Dysenteria, vel alia inflammatione intestinorum laborantibus.

V. CAUSSAE.

1. Singultus communis seu *chronici* causæ sunt:
 - 1) Prægrauatio ventriculi a cibis dyspeptis, crudis, austeris, præcipue festinato ingurgitatis, & hinc inductæ cruditates ac flatulentia.
 - 2) Potus frigidus, vel medicamenta refrigerantia.
 - 3) Exacerbationes motus peristaltici, per emetica vel purgantia fortiora inductæ.
2. Singultus in *acutis* occurrit præcipue in inflammatione mesenterii, pylori, diaphragmatis, sinuæ partis in hepate, ilei in dysenteria, item in febre caufodea.
3. Causæ *occafionales* sunt inflammationum externarum, vomitus, diarrhææ, hæmorrhoidum nephriticorum, vel podagricorum adfectuum repentina suppressio & retropulsio.
4. Interdum per adsumtum lentescens venenum singultus inducitur.
5. Hac ratione singultus ab actu naturæ rationali, quo obstaculum qualecumque remouere intendit, non autem materia neruos stimulante, irritante & vellicante dependet, id quod confirmat experientia quotidiana, dum vehementes imaginationes aut memoria terrificæ agentis rei alicuius &c. singultum sæpiuscule compescunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Singultus vulgaris, chronice occurrens, non est periculosus

iosus. Licet enim exempla quædam prostant, in quibus singultus sine morbo acuto lethalis fuit, rarissime tamen hoc euenire solet.

1. Quando autem hic singultus vulgaris sæpius recurrit, maiorem inuoluit considerationem, quia facile in consuetudinem transit, & multum molestiæ adfert.
3. Tale malum, pensitatis recte circumstantiis, a vulgari singultu gradu & vehementia longe differt, & frequenter a labore & motu quodam externo vehementiore mox cooritur.
4. Quando morbis *acutis*, præcipue versus *dies criticos* singultus superuenit, numquam caret periculo; facile enim mortis hic semi-conuulsius in veras & vniuersales conuulsiones per vniuersum corporis habitum transit, quibus breui tempore ægri expirant.
5. Sic etiam ille singultus periculo non caret, qui aliis morbis accedit. Testatur enim sæpe de aliis fonticis malis, e. g. internis inflammationibus diaphragmatis, ventriculi, hepatis & aliorum viscerum; item de scirrhis, periculosis infarctibus, præsentibus vel imminentibus corruptionibus. Interdum exanthemata difficulter erumpentia aut pene retropulsa comitatur.
6. Non minus ille singultus, qui colicæ præter consuetudinem accedit, mali ominis est; *conf. tabula de colica.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Singultus *communis* non indiget medicatione, breui enim tempore, immo paucis subinde momentis, transit; subleuatur autem commodè per externum calorem & potum qualemcumque calidum, e. g. thée, caffèe; item per expirationem paullisper cohibitam.
2. Quando autem hic singultus tempus ducere, & quod subinde contingit, ad vnam vel alteram hebdomadam se se extendere videtur, simulque saburram primarum viarum suspectam reddit, tum sequens methodus adhibeatur:
 - 1) Ad cruditates primarum regionum eliminandas præscribantur

- a) Interne lenia laxantia, præcipue rhabarbarina & hel-
leborata, item falia cathartica amara.
- b) Externe clysteres abstergentes.
- 2) Deinde ad ventriculum roborandum exhibeantur
- a) Interne stomachica amara & neruina, e.g. essent. ab-
sinth. galang. cort. aurant. centaur. minor gentian.
rubr. macis, mixtura tonico-neruina *Stahlii*, item
martialia selectiora, præcipue tinct. martis aperiti-
ua *Ludouici*, pulu. stomachicus *Birckmanni* seu *Quer-
cetani*, cortex cascarillæ, eiusque extractum.
- b) Externe camphorata, sacculi aromatici calidi, adiectis
radicibus odoratis, herbis coronariis, & seminibus
carminatiuis, it. balsama & enplastra stomachica.
- 3) His subinde interponantur, quæ acrimoniam corri-
gunt, nempe absorbentia cum antimonio quodam
fixo maritata.
- 4) Concurrente flatulentia, hæc legitime tractetur.
- 5) Ad prophylaxin purgans aliquod subinde præscriba-
tur, & ante vel post pastum aliquot piperis grana, in
vino adusto, sumantur.
3. Singultus, morbis *acutis* superueniens exposcit
- 1) *Interne*
- a) Alexipharmaca cum spiritu nitri dulci mixta, con-
iuncto leni regimine diaphoretico.
- b) Pulueres nitroso-absorbentes, magisterium dentis
apri.
- c) Emulsiua, gelatinosa, &, sedandi scopo, corticem ca-
scarillæ.
- d) Decocta ex rad. scorzon. sigill. Salomonis, apii, ci-
chor. caryophyllat. herb. veronic. scord. chæretol.
flor. sambuc. chamomill. semin. caru. fœnic. cort.
citr. cinnamom. addito nitro & crystall. tartari;
quæ autem decocta non copiosè sumenda sunt.
- 2) *Externe* sacculos carminatiuos discutientes, in quem
finem laudantur
- a) Radices helen. pimpinell. alb. leuist. imperator. irid.
Florentin. zedoar. b) Her-

b) Herbae hyssop. meliss. origan. serpill. pul. montan. salu. rorismarin. thymi, spicæ, lauendulæ, menth. chamomill.

c) Aromatica.

d) Ligaturæ hypochondriorum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Vñs *internus castorei*, & aliorum neruinarum calidorum, neque in singultu, neque in aliis infimi ventris morbis commendatur; *externo* autem viũ effectum suum præstat.
2. *Cassia fistulosa* & alia flatulenta laxantia, e. g. fol. *senna*, *agaricum* hic minus locum habent.
3. Acta N.C. anno quinto obseru. 118. notarunt, quod quinque dierum singultus in febre maligna feliciter sublatus sit per vñm *nitri*, *absorbentium*, *emulsiuorum* & *alexipharmacorum*.
4. Hæc obseruatio confirmatur quotidiana experientia, nitrosa enim cum absorbentibus & leniter diaphoreticis, quando in acutis adhibentur, rarissime singultum admittunt: inflammationes enim, propter quam discutiendam singultus a natura excitatur, præcauent.
5. Quando autem nitrosa non adhibita fuerunt, & singultus morbis acutis accessit, tum in casu adhuc recente & nondum præualido per dicta remedia frequenter profligatur, ad insolescentem autem adfectum raro sufficit, multo minus alia remedia famosa.
6. Qui *chronico* singultu vexantur, *cingulo* quodam abdomen per diem muniant, potum frigidum euitent, & labore corpus exercent.
7. Euitanda sunt remedia *stomachica acria*, *calida*, *volatilia* & *opiata*.
8. *Fortiora purgantia* & *emetica* in quouis singultu nocent.
9. Calor externus, pro mitigando singultu, egregie conducit.

TABVLA LIV.

DE

CONVVLSIONIBVS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Conuulsiones sunt repentinæ, reciprocæ ac extremæ motus tonici exacerbationes, in partibus præcipue musculosis, raptim tractis & remissis: quo summo, sed erroneo, conamine natura aliquid in corpore molesti, quod vel actu præsto est, vel ab illa fingitur, propellere & expellere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Quo modo conuulsiones a *spasmis* vere differant, videatur *tabula de spasmis*: Licet enim sub vno genere motuum, ultra naturalem gradum auctorum reperiantur, & vna species facile in alteram transmigræt, nullo tamen modo confundendi sunt. Distinguunt alias inter conuulsionem, ceu spasmum simplicem completum, & motus conuulsiuos; sed & hanc differentiam hic prætermittimus, ne confusio anîam præbeamus.
2. Conuulsiones sunt
 - 1) vel *idiopathica*, quæ sine euidente complicatione cum aliis morbis corpus infestant, & tempore stato, præsertim circa insigniores lunæ phases, ex nulla alia quam ideali causa erronee recurrunt. Huc pertinent conuulsiones illæ, quæ strictiore sensu *epilepsia* nomine veniunt.
 - 2) Vel *symptomata*, quæ fonticæ corporis periclitationi superueniunt, vti sub *caussis* dicitur.
3. Hoc solo respectu causarum & morborum complicatorum differt *epilepsia* a reliquis motibus conuulsiuis: illa enim nullam proportionem cum causa physica vel morali præ se fert, sed *idiopathice* absque aliis morbis corpus potissimum affligit, propriaque sui vehementia

pro-

prosterunt, licet a causa materiali initium sumserit; illæ autem causas plerumque fonticas cum morbis coniunctis pro fundamendo habent.

4. Convulsionibus *uterinæ* distinguendæ sunt a *lipothymiis* & *suffocationibus uterinis*: in his enim oculi semper clausi & membra flaccida sunt.

III. SIGNA.

1. In hoc tristi adfectu adparent partis alicuius vel vniuersi corporis agitationes reciprocæ, vehementes ac repentinæ, præter voluntatem, immo sæpe citra recordationem, contingentes.
2. Infestant hi motus per breues quasi paroxysmos, dum aliquando paullulum quidem remittunt, statim vero enormi vi recurrunt.
3. Immo in convulsionibus inualescentibus partes non solum motu, sed & situ torquentur, adliduntur & proiiciuntur.
4. His oculorum distorsio, præcipue versus superiora, & sensuum abolitio accedit.
5. Dentes sæpius colliduntur, & pollices, præsertim in principio, in pugnum contrahuntur.
6. In casu vehementiore artus adeo torquentur, vt diu in hoc distorto situ permaneant.
7. Spuma, vel ad minimum mucus saliuæ sub finem paroxysmi ex ore profluit.
8. In nonnullis aliæ excretiones, e.g. vomitus, diarrhœa, hæmorrhagia narium, excretio vrinæ vel spermatis, contingunt.
9. Subsequuntur insignis corporis lassitudo sitis, vertiginosa capitis perturbatio cum sudore graueolente.

IV. SVBIECTA.

Convulsionibus plerumque infestantur

1. Femina præ viris.
2. Ætas infantilis præ aliis ætatibus.
3. Habitus corporis succulentus præ sicciore.

4. Plethorici, crasso ad modum sanguine laborantes, & iracundi præminustalibus.
5. Caussis tandem sequentibus occasionalibus obnoxii,

V. CAUSSAE.

1. Causa convulsionum est nimia irritatio principii vitalis: hoc enim urgentibus casibus motum tonicum vitalem ad ultimam energiam intendit, ne quid intentatum maneat.
2. Cur autem paroxysmi in convulsionibus idiopathicis circa phases lunæ occurrant, explicatu difficillimum est: quæ enim causæ de dominio lunæ in humores, speciatim in cerebrum, item de mechanicis configurationibus effluuiorum, elasticis potentiis, proferuntur, laborant *principii petitione*.
3. Plus sane moralis & finalis rationis, quam physici corporis impulsus, in hisce motibus extremis subest: hinc multæ difficultates premunt crassiores illas de vellicatione & stimulatione nervorum opiniones, variolarum testimonio, ubi vix millesimus convulsionibus corripitur, licet omnes eandem putatam stimulantem materiam in illo morbo experiantur.
4. Causæ *occasionales* & concitantes hoc magis illustrent, sæpe enim nulla est proportio inter has & motus tales violentos. Sunt autem illæ concitantes causæ
 - 1) vel *materiales*, e. g.
 - a) Spissitudo sanguinis.
 - b) Coagulatio lymphæ circa caput, per refrigerationem inducta; quod potissimum in infantibus contingit.
 - c) Retropulso crustæ lactææ, scabiei, achorum vel aliorum vlcerum manantium.
 - d) Interceptio respirationis a tussis vehementia & materia valde tenaci.
 - e) Contenta in abdomine, e. g. vermes, præcipue apud infantes.
 - f) Morbi acuti infeliciter decurrentes, præcipue exanthemæ.

thēmata legitime non succedentia, e. g. variolæ, morbilli.

g) Dentitio difficilis.

h) Res solidæ, e. g. festucæ, grumi, fanies, sub cranio latitantes, item potus spirituosorum acriorum nimius.

i) Menses suppressi, vel aliæ debitæ excretiones retentæ.

k) Contusiones grauiores, præcipue vulnera tendinum aut neruorum.

l) Morsus animalium iratorum.

m) Quo magis autem conuulsiones in consuetudinem iam degenerarunt, eo minus cum incitamentis hisce materialibus proportionem seruant.

n) Vel *imateriales* e. g.

a) Dispositio hæreditaria.

b) Animi pathemata, quæ non solum promptissime conuulsiones prouocant, sed etiam pertinaciter illas fouent, præcipue ira, terror, amor vesanus ac desiderium.

c) Impressiones ideales per veneficia & philtrea, in primis sanguinem menstruum orgasticum.

d) Periodi temporum, præsertim phasēs lunæ.

VI. PROGNOSIS.

1. Omnium conuulsionum nullus corpori in solidum utilis est effectus.

2. Euentus quidem in *chronicis* causis & scopis non tantum periculi portendit, nisi impetu conuulsiones excedant; inter ea facile adsuescunt, & per leues pure morales causas proteruius reuocantur.

3. Quæ autem conuulsiones *acutis* causis accedunt, ancipitem sæpe euentum sortiuntur: per initia quidem morbi symptomaticæ hæ conuulsiones minoris, sub statu maioris, in declinatione & tempore debiti exitus summi periculi sunt, morbum lethali euentu claudunt.

4. Illæ conuulsionum species præ aliis sunt contumaces, quæ

a patheticis occasionibus, vicio hæreditario, veneficiis, phultris initium sumserunt, & consuetudine in habitum iam sunt deductæ.

5. Conuulsiones, quæ adolescentes & adultos corripunt, periculosiores sunt, quam quæ iuniores.
6. Mulier ex abortu conuulsa, raro euadit, teste *Aretæo* lih. I. c. VI.
7. Puer febricitans, variolas nondum perpeffus, si motibus conuulsiuis, & ardore circa lumbos, corripitur, postero die variolarum eruptio exspectanda est, obseruante *Bagliuio* in praxi med. pag. 79. & confirmante experientia frequente.
8. Sic etiam conuulsiones, febrilibus malis in infantili ætate superuenientes, plerumque lethales sunt.
9. Conuulsiones *symptomata* nulla re efficacius profligantur, quam promotione motuum se- & excretoriorum, morbo primario conueniente.
10. Epilepsia *uterina*, sub debita mali hysterici tractatione, sponte plurimum euanescit.
11. Quando autem nulla aut leuissima mali hysterici pathemata adparent, & ita conuulsiones nullam magis proportionem cum causa hac materiali obseruant, tunc prius non soluuntur, quam post specifici remedii, epilepsiaæ idiopathiaæ conuenientis, adplicationem.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Ante omnia consideretur, num conuulsio sit *symptomata* vel *idiopathica*.
2. In *symptomata* primarius morbus respiciatur: hoc enim feliciter sublato, conuulsiones interdum sponte remittunt.
3. Vbique autem reliqua medela, exceptis febribus acutis, præmittantur blandæ *primarum viarum* expurgationes. In hunc finem præcipue commendantur cholagoga & melanagoga.
4. Euacuationum *sanguinis* debitarum suppressiones legitima methodo reuocentur; qua ratione spissitudini humorum

morum simul confultur. Hac in specie pertinet *epilepsia uterina*.

5. In caussa *vermium, scabiei, vel efflorescentiarum retropulsione*, mercurius dulcis in vsum veniat, & expellentia, e.g. flores sulphuris, anticatarrhalibus mixti, vsurpentur.
6. In *pectoris* vitiis, lymphaque viscosa exhibeantur eadem anticatarrhalia, e.g. essent. succini, alexipharmaca, pimpin. alb. cum tinctur. antimon. reniscenda, in phlegmaticis liquor C. C. succinatus, essent. cortic. lassafrae.
7. Contra *spermatis* abundantiam & orgasmum praescribantur nitrosa & sufficiens corporis labor.
8. In caussa recrementorum *biliosorum*, infantibus infestorum, ordinentur rhabarbarina, e.g. sirup. de cichorio cum rhabarb. aurum fulminans cum crystallo montana preparata, clysteres emollientes, qui in flatibus concurrentibus praecipuum vsum praestant.
9. *Dentitio difficilis* & interceptio *asthmatica* tractentur, vt moris est.
10. Convulsiones per *philtrum* inductae, vomitorium exposcunt satis maturum.
11. Hisce praemissis, motus temperantia & sistentia propinanda sunt, e.g. cinnabarina, nitrosa, lumbrici terrestres, vel specifica adhibenda. Conf. *tabul. de epilepsia*.
12. Motus convulsivi symptomatici, *febris* superuenientes, non statim oppugnandi sunt, in primis per opiata, sed reliquus tebris decursus & successus iusto modo promovendus, cui scopo satisfaciunt aquae diapnoic. emulsiones, cinnabarina.
13. Convulsiones *idiopathicae* sequente methodo tractentur:
 - 1) Lenia laxantia per tres circiter dies propinentur.
 - 2) Reliquarum excretionum debitus successus conferretur. Denique
 - 3) Versus paroxysmum specifica sub moderato regimine exhibeantur. De quibus fusius *tabul. de epilepsia* agetur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Obseruatio illa generalis, quod *generalia specificis* sint *præmittenda*, in conuulsionibus potissimum locum habet.
2. Remedia illa, quæ in hoc malo alias efficacia sunt, quando in conuulsionibus, mortem præcedentibus, offeruntur, loco sedationis, maiorem motuum insolentiam excitant, donec ipsa mors sequatur: vnde eo tempore nisi *prognosis lethalis* locum habet.
3. Numquam ad motus tantum sistendos dirigatur intentio: neque etiam materiam, fortioribus præsertim medicamentis, expellere tentemus, vbi nulla talis præsto est.
4. *Adstringentia*, ad motus generaliter sistendos, hic exhibere, quouis modo improbat.
5. Sic etiam *narcotica*; intentionem ad mouendum paulisper obnubilantia, minus fideliter agunt, & ad specialis huius motus sedationem minime sufficiunt.
6. *Cinnabarina* in *idiopathicis* conuulsionibus minimam habent efficaciam, in *symptomaticis* autem & spasticis circa caput restrictionibus plus præstant.
7. *Fortiora purgantia* in conuulsionibus *idiopathicis* non solum inutilia sunt, verum etiam motus magis exacerbare obseruantur: in nonnullis autem *symptomaticis* insultibus, vbi materia crassa manifesta est, magis locum habent, præcipue in subiectis robustis, quibus etiam *vomitoria* aliquando salutariter propinantur; cauendo tamen vbique, ne nimis sint drastica, neque *sub ipsis paroxysmis* exhibeantur, restante virium imbecillitate.
8. Violentæ *pollicum eruptiones*, aliæque interpellationes paroxysmorum per odoramenta penetrantiora, insignem post paroxysmum defatigationem aut citiorem & frequentiore eisdem recursum procreare solent.
9. Caueant sibi ægri ab *animi commotionibus*, præcipue iracundis, ab otio, speculationibus, potu spirituoso, cibis acidis, refrigerationibus immodestis, rebus graueolentibus, prospectu in profundum.
10. *Vena sectionem*, si malum a plethora vel suppressione fluxuum

xuum sanguinis consuetorum prouenerit, institui necesse est, quam nonnulli in pedum *digitis maioribus* specificè celebrant.

11. *Liquor C. C. succinatus* in quibusdam effectum edit optatum, vitandus autem est eius abusus.
12. Ultimo loco mentionem facimus *olei* illius rectificatissimi, quod *Democritus* sic dictus *Christianus* tractatu, *morbus & medicina vita animalis*, in conuulsionibus commendat. Qui oleum hoc legitime præparare & dextre adplicare poterit, is in conuulsionibus non solum idiopathicis, verum etiam in quibusdam symptomaticis, præcipue vterinis, admirandos effectus obseruabit. *Conf. dissert. nostra inauguralis de efficaci quodam remedio in motibus exacerbatis.* Effectus, quos in hac dissertatione huic oleo rectificatissimo adsignauimus, in hunc usque diem sapius se commendant.



TABVLA LV.

DE

EPILEPSIA.

I. DEFINITIO.

Epilepsia est motus conuulsiuus plus minus repentinus, summe exacerbatus, artus præcipue & pectus miserrime affligens, sensuumque priuationem per totum paroxysmum inferens, cum aliis symptomatibus grauioribus, idiopathice magis absque alio morbi concursu ab anxia natura erronee formatus. Deriuatur ab *ἐπιλαμβάνω*, inhæreo, manum iniicio.

II. DIFFERENTIA.

1. Differentiam *epilepsie* a *motibus conuulsiuis* in genere *tabula* præcedente docuimus.
2. Distinguunt quidem vulgo inter *epilepsiam idiopathicam* & *sympto-*

- symptomaticam*, sed minus commode: hac enim ratione differentia illa, quæ est inter *convulsiones idiopathicas & symptomaticas* facile contunditur & obiscuratur.
3. Hinc quantumquam *epilepsia* sub *initium* per quascumque causas *materiales* interdum inuitetur & introducatur, *progressione* tamen temporis, quando motus vere epileptici in habitum obfirmantur, *motuum* magis quam *materia* vitia adcusanda & consideranda veniunt.
 4. Atque hoc intuitu *epilepsiam* sic dictam *symptomaticam* eiusque tractationem ad tabulam *precedentem* generalem de *convulsionibus in genere* relegamus, & *epilepsia* nomine hic tantum subaudimus adfectum convulsionis *idiopathicum*.
 5. multo minus solliciti sumus hoc loco de differentia illa vulgatissima, quæ *epilepsiam* infantum in *externam* seu *explicitam*, wenn das böse Wesen ausbricht, & *internam* seu *implicitam*, wenn der innerliche Jammer im Leibe oder Köpffen ist, distinguit. *Quem* ad modum enim convulsiones infantum tantum non omnes sunt *symptomaticæ*, ita & harum tractationem hoc quidem loco excludimus.
 6. *Idiopathica* hæc *epilepsia* est vel *recens*, vel *inueterata*.
 7. Item vel *periodica*, mutationes lunæ insigniores, præcipue nouilunia & plenilunia sequens; vel *vaga*, sæpius recurrens.
 8. Alia est *hereditaria*, alia ab impressione per *fascinum* aut nefarias artes magicas inducta, *conf. theoria Stablii pag. 1356.* alia vero aliunde *adquisita*.
 9. Alia *vehementior*, quando nimirum manus in auxilium qualecumque admouentur; alia vero huius intuitu *lenior*.
 10. Differt tandem *epilepsia* a *pauoribus* infantum ratione gradus & durationis, utpote qui huius mali sæpius esse solent prodromi.
 11. Quo modo *epilepsia* differat a *lipothymicis & apoplecticis* adfectibus, signa testantur.

III. SIGNA.

1. In aliis præcedit sensus quidam frigidus, ex partibus remotis repente versus caput ascendens, & scintillæ oculis obueriantur.
2. In aliis prodromi tales non sentiuntur, sed paroxysmus improviso per *casum repentinum* se se manifestat.
3. Sub initium paroxysmi *pollices* in pugnum imprimuntur, & quando manus in auxilium vocantur, contentio adest contumacissima & vehementissima, quæ corpus rigidum & mobile, non vero flaccidum & tranquillum seruat; in aliis vero, ubi eius modi symptoma deest, adfectus mitiore plerumque modo decurrit.
4. In paroxysmi auspiciis mox priuantur sensuum usu, unde post ea, quid factum sit, immemores sunt.
5. Procidunt hinc, quam primum hoc malo infestantur; protinus in terram, oculis apertis & toruis.
6. Concurrunt sæpe oculorum, linguæ & labiorum torsiones, stridor dentium & respiratio sonora cum clamore sæpius ingente.
7. Item violentæ artuum, immo totius sæpe corporis, iactationes & concussiones. *Conf.* quæ *tab. de conuulsione in genere* dicta sunt.
8. In nonnullis caput perpetuo agitur, ut fortissime illud ad sanguinis usque profusionem terræ adlidant; id quod iunioribus magis solemne est.
9. Desinit tandem paroxysmus cum largiore spuma, quæ ex glandulis salivalibus exprimitur, & ex ore profluit.
10. Epilepticorum quidam sunt auidi, præcipue panis, & magis quidem secalini quam triticei. Atque hi sunt, quorum paroxysmus plerumque terminatur cum vomitu, quo semi-coctum panem, seu fermentescentem magis pulvem, ex ventriculo excutiunt.
11. Nonnulli inter dormiendum solum ab hoc malo corripiuntur, in quibus tanto difficilius eradicatur.
12. In epilepsia *habituali* paroxysmi circa phases lunæ immo secundum diei horas recurrere plurimum observantur.

13. Finito tandem poroxyfmo haud vllius rei recordari valent, nifi quod a vehementi hac exagitatione remanentem lassitudinem sentiant, & de vertiginosa capitis perturbatione conquerantur.

IV. SVBIECTA.

Ab epilepsia plerumque infestantur

1. *Infantili* ætate a *convulsionibus* frequentibus correpti.
2. *Animi* adfectibus, præcipue terrori, iracundiæ & mœrori anxio dediti.
3. plethorici, habitu corporis laxo ac spongioso gaudentes, & spissitudine sanguinis eximia laborantes.
4. Speculationibus amoris vesani nimium indulgentes.
5. Omnium maxime *hereditaria* dispositione gaudentes.
6. Tandem iuniores & femina.

V. CAVSSÆ.

1. Causa *generalis* est intentio quædam naturæ excussoria, motibus transpressoriis & congestoriis tentanda.
2. Causa *specialis* est *idea motus* per qualemcumque impressionem iracundam, aut anxie trepidam intentionem excitata.
3. Hunc motum *idealem* concitare valent variæ mentis perturbationes, e.g.
 - 1) Animi pathemata vehementiora.
 - 2) Aversio naturæ nauseosa.
 - 3) Æstimatio eiusdem falsa.
 - 4) Intentio mentis fortissima.
 - 5) Ex his quoque non nihil liquet, quo modo *fascina* & *incantamenta* ad hunc adfectum sua symbola addere possint atque conferre.
 - 6) Omnium vero dispositio hereditaria est maxima.

VI. PROGNOISIS.

1. Epilepsia uti est actio naturæ contumacissima ac violentissima; ita & multa, eaque potissimum fontica, incommoda adfert; de quibus sequentia restantur.
2. Violentior oculorum distortio, quæ in hoc malo occurrit, durabilem sæpius procreat strabismum.

3. Quæ

3. Quæ caput sæpius adfligit epilepsia, id quod in iunioribus fieri solet; illa stupefacit tandem sensus & imminuit usum rationis.
4. Sæpius etiam iisdem subiectis impotentiam adfert paralytodeam.
5. Epilepsia *nocturna*, quia specificorum commodam exhibitionem non adeo admittit, maiores, quam *diurna*, inuoluit difficultates.
6. Quæ *adultis* obtingit, & habitum acquirit, illa vix amplius eradicatur.
7. Qui chronicæ habituali epilepsie adfueti sunt, illis, si etiam alio morbo correptis cooriatur, minus periculum denunciat.
8. Quid mutatio loci, temporis, vitæ generis, & præcipue ætatis ad epilepsie spontaneam solutionem conferat, ipse iam *Hippocrates* pailim obseruauit.
9. Hinc epilepsia, *ante mensium eruptionem* puellis eueniens, sæpe circa fluxus huius eruptionem, nempe finem secundi septenarii, sponte remittit.
10. Idem obseruare contingit in *maribus*, in quibus circa pubertatis annos epilepsia, priore tempore exorta, non raro soluitur.
11. Epilepsia, quæ *circa mensium eruptionem* exoritur, facile, licet debite cessauerit, tempore gestationis & præcipue partus, recrudescit.
12. Infantes epileptici, intra sex hebdomades adhuc constituti, raro euadunt.
13. Epilepsia tandem *habitualis* cum hæctica complicari & scenam claudere solet.

VII. METHODOVS MEDENDI ET REMEDIA.

Ante, quam ad ipsa *specifica* fiat progressus, *generaliora*, excretionibus ordinariis promouendis destinata, præmittantur. Qua de causa

1. Cruditates *primarum viarum* eliminantur *laxantibus*; per tres circiter dies propinatis: huc faciunt chologoga & melanagoga, v. g. rhabarb. hellebor. nig. mercur.

- dulc. syrúp. de cichor. cum rhabarb. vt & clysteres emollientes & abstergentes.
2. Deinde *reliquarum excretionum* debitus successus respiciatur.
 3. Denique *versus paroxysmum specifica* sub leni regimine exhibeantur. Hórum ingens farrago apud auctores inuenitur, ex quibus sequentem facimus selectum.
 - 1) Radix & semen pœoniæ maris.
 - 2) Viscus quernus & corylinus.
 - 3) Carbo artemisiæ.
 - 4) Cranium humanum.
 - 5) Secundinæ primiparæ humanæ.
 - 6) Stercus pauonis & leonis.
 - 7) Ungula alcis, de collo suspensa.
 - 8) Cerebrum corui.
 - 9) Hippomanes, id est glandulosa illa massa, quæ in ore pulli recens nati reperitur. Hæc omnia antiquorum tempore iam erant celebrata: a recentioribus laudantur:
 - 10) Spiritus sanguinis humani, immo sanguis ipse ab homine, violenta morte peremto, desumptus, præeunte *Helmontio*, quem tamen hic imitari non suademus.
 - 11) Os triquetrum carni humani, vel porcini.
 - 12) Os semi-lunare carpionum.
 - 13) Excretio alba gallinæ, oua incubantis, sub umbra exsiccata, & versus paroxysmum ad scrub. I. propinata, ac aliquoties repetita.
 - 14) Bilis recens canis atri, cum vnicornu fossili subacta, vel aliquot guttæ scorsim propinata.
 - 15) Malleus & incus ex cranio vitulino, habito ad sexum respectu.
 - 16) Spina lacertarum, in acervo formicarum exesarum.
 - 17) Corda & hepar talparum, ranarum viridium, hircudinum, & aliorum animalium minorum.
 - 18) Lingua siccata ex viuo tetraone sumta. *Vid. cant.*
 - 19) Ratura spinæ dorsi, violenta morte peremti.

- 20) Talus leporis.
 21) Lumbrici terrestres in coitu mense lunia ante ortum solis post prægressam pluuiam capti, spiritu vini vel ipso vino ablui & puluerisati.
 22) Egregium tandem antepilepticum, quod passim a *Stahlio* commendatur, hoc est:

Recip. cord. talpar. exsiccat. num. V.
 lumbric. terrestr. drachm. I.
 talor. leporis scrup. I.
 vngul. alcis subtiliter puluerisat.
 cortic. visci querni ana scrup. semis.
 cinnabaris, si placet, drachm. semis.

Misc. dof. gr. XV.

23) Plura *specifica* videantur in praxi *Barbettiana*.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Vera *specifica*, legitime etiam adhibita, in omnibus neque pari successu, neque vna eademque constantia, effectum edunt; quæ res in causis magis moralibus, quam physicis quærenda est.
2. Observatio *differentiarum* eximium in praxi habet usum, quando autem *specifica* sine tali specierum respectu promiscue adplicantur, nullum effectum sortiuntur.
3. *Barbette* purgandi scopo in epilepsia commendat sequentem haustum, qui paroxysmum miratu digno effectum gradatim imminuere dicitur:

Recip. sapon. Venet. alb. vnc. semis.
 lact. vaccin. vnc. VIII. coque & colaturæ
 vnc. III. exhibeantur.

4. Epilepsia quando *lenior* est, *excitantia* per odoramenta penetrantiora non adeo improbantur, præcipue in vterina; vbi autem grauior est adfectus, in paroxysmo excitare non conuenit, minime omnium per excitantia impetuosa, e.g. salia volatilia, sternutatoria: cient enim dolores capitis vertiginosos, febriles commotiones, insignem post paroxysmum lassitudinem, & quo sæpius turbantur, eo frequentius & promptius paroxysmi

M m m 3

recur-

Al
fuit
seq
Pr.

M
Post
quæ
ad
fuit
Bij

- recurrunt. Id quod etiam de violenta *pollicum* implicatorum *eruptione* valet.
5. Post paroxysmum lenes clysteres seu lenia laxantia commendantur; subiunctis neruinis carminariis, præcipue tinct. cortic. aurantium, cauendo ab usu *cyllorei*.
 6. *Puluis cephalicus Michaëlis*, licet non omni plane effectu destitutus sit, insignis tamen usus ab illo non expectandus est.
 7. Antepileptica melius *ante paroxysmum*, quam *post* eundem, exhibentur: oprati effectus certissimum signum est, si patientes in fronte fortiter sudent.
 8. Puluis antepilepticus, ex commendatione *Stahlii* sub methodo descriptus, non confundendus est cum *altero specifico* remedio, quod paucioribus granis propinatur, & ab auctore pro arcano habetur.
 9. In *abundantia & spissitudine* sanguinis conuenit *venæ sectio*, vel iuxta *Willisium* hirudinum venæ iugulari vtrique in infantibus adplicatio.
 10. Imminente paroxysmo *ligatura* parrium externarum suadentur.
 11. *Camphora* gr. I. cum aqua cheiri post paroxysmum propinare docuit *Ettmullerus*, ne cito recurat.
 12. *Amuletica*, vt semen poeon. corall. smaragd. &c. de collo suspenfa, speratum haud præstant effectum.
 13. *Dieta* epilepticorum sit moderata, cibi offerantur eupepti cum potu iustificenti & motu. Vinum, vt merito suspectum, vitetur cum animi pathematibus.
 14. *Lumbrici terrestres* non forti igne sed leni calore debent exsicari. Quoniam autem sub leni hac exsiccatione facile putrescunt, spiritu vini vel ipso vino prius ablundi sunt. Hac enim ratione mucus abstergitur, pori aperiantur, & superfluous humor, putredinis instrumentum, facilius deinde, sub leni calore, exhalat.
 15. Ultimo loco adiciamus arcanum illud antepilepticum, *Casparis Franckii*, pastoris quondam *Leopoldigrunensis*, quod post ipsius obitum agnati, peculiari quodam incantamento commoti, anno 1711. per nouellas detexerunt.

Rec. Rafur. cran. human. recent.

ungulæ alcis.

alumin. plumos.

spin. dorſ. violent. mort. perempt.

Ling. ex viuo tetraone ſumt. & ſiccat.

Talp. menſ. mart. capt. & noua olla ſiccat.

Rad. pæon. die paralcev. cum auro & argento foſſæ.

ana q. p.

M. ſ. puluis; cuius doſis pro adultis drachm. j, pro iunioribus & infantibus minus, cum aqua ceraſ. nigr. flor. tiliæ, vel ab infantibus cum lacte materno, ſumendâ. Sudor & ſomnus quando ſuccedunt, pro bono omni-
ne habentur.



TABVLA LVI.

DE

FEBRIBVS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Febris eſt principii vitalis ſalutare conamen, quo motibus ſecretoriis & excretoriis, vltra gradum naturalem quidem auctis, quantitati tamen & qualitati cauſſæ ſatis apta proportione plurimum oppoſitis morbiferam aliquam materiam ſiue præoccupare, ſiue remouere, intendit. Hoc ſenſu commode *febris* vocabulum deriuatur ab antiquo *februare*, id eſt, expurgare, ſpecialiſſime a ritibus illis ſolemnibus, *februa* adpellatis, quibus domicilia ab *umbris erraticis* defunctorum expurgare, & cauſſas malorum tollere intendebant.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres differunt ratione *periodi* ſeu meſura temporis, & ſecundum hanc differentiam ſunt 1) vel

- 1) vel *acuta*, quæ breui tempore circumscibuntur, e.g. febris ephemera, synocha, variola, pleuritis &c. Hæ acutæ iterum distinguuntur in
 - a) *simplices* & *peracutas*, e.g. pestilentes. Item in
 - b) *benignas* & *malignas*.
- 2) Vel *chronica*, quæ longiore periodo absoluntur, e.g. febres intermittentes, lentæ, hecticæ.
2. Febres ratione *ordinis* sunt:
 - 1) vel *typica*, quæ progressus suos & vniuersam periodum conueniente ordine seruant;
 - 2) vel *erratica*, quæ nullum constantem typum seruant.
3. Porro febres sunt:
 - 1) vel *continentes*, quæ eodem, quo inuadunt, tenore ad finem vsque perdurant, sine intermissione & remissione, e.g. ephemera simplex & plurium dierum, item febris synocha, seu *continens* *ναρ ἐξοχή* dicta,
 - 2) Vel *continua*, quæ singulis diebus ab exacerbationibus suis paullulum quidem *remittunt*, ad plenariam tamen *intermissionem* non perueniunt, e.g. febris quotidiana continua, seu catarrhalis, quæ vespertino tempore paroxysmos suos format, ante meridiem autem *mitius* adfligit.
 - 3) vel *intermittentes*, quæ post interualla vnus vel plurium dierum nouo deinde impetu insultant; e.g. intermittens quotidiana, tertia, quartana.
4. Ratione *temporis* febris consideratur, num sit
 - 1) vel in *principio* & ortu;
 - 2) vel in *incremento*;
 - 3) vel in *statu*;
 - 4) vel in *declinatione*.
5. Differunt porro febres ratione *causarum*, & secundum hanc differentiam sunt
 - 1) vel *sanguinea*, in quibus natura plethoram imminuere intendit, e.g. in febribus continentibus.
 - 2) Vel *biliosa*, quæ post insignem iracundiam & bilis largiorem effusionem proueniunt, e.g. febris cholericæ, causus.
 - 3) Vel

- 3) *Vel mucosa*, per quas pituitosa, mucida, serosa materia ex corpore profcribitur, quale quid contingit in febribus catarrhalibus.
 - 4) *Vel inflammatoria*, quæ inflammationibus viscerum & non raro etiam externarum partium *grauioribus* adcedunt. Huius census sunt: phrenitis, peripneumonia, pleuritis, hepatitis, splenitis, nephritis, & febres vulnerariæ.
 - 5) *Vel lochiales*, quæ puerperas post lochia siue imminuta, siue plane suppressa, siue aliam aduentitiam causam, infestant.
 - 6) *Vel lacteæ*, quæ lactis in mammas difficilem ingressum & prouentum comitantur.
6. Febres etiam diuiduntur in
- 1) *Essentiales, primarias, idiopathicas, &*
 - 2) *Accessorias, secundarias, sympathicas*, quæ adiunguntur inflammationibus, vlcerationibus, immo etiam impetuosis congestionibus atque restagnationibus humorum. Huc pertinent febres inflammatoriæ, vulnerariæ, lentæ, hecticæ &c. item febres catarrhales, rheumaticæ. *Conf. tab. de febribus secundariis.*
7. Febres iterum distinguuntur in
- 1) *Simplices*, quæ sibi quasi solis constant, & cum nulla alia febre complicata sunt; & in
 - 2) *Compositas*, vbi febris continens & continua, vel continua & intermittentes complicantur, aut intermittens duplicatur, e.g. synochus putrida veterum, quotidiana continua, tertiana duplex.
8. Febres pro diuersitate *originis, grassationis, locorum & subiectorum* sunt
- 1) *Vel epidemice*, quæ ex aëris vel aquæ communi vitio oriuntur, & contagiosæ existunt, e.g. petechiales seu catarrhales malignæ, variolæ, morbilli &c.
 - 2) *Endemice*, quæ certis populis & regionibus, præ aliis magis propriæ sunt, e.g. febres tertianæ & quartanæ intermittentes *Belgis* quasi propriæ existunt.

- 3) *Sporadica*, quæ ex individui causa hunc vel illum hominem, hoc vel alio loco infestant, e. g. febres *cholericæ-causodeæ* post insignem iracundiam: *intermittentes* ob vitium in primis viis, vel circa easdem: *inflammatoria* post insignem corporis exagitationem & haustum frigidum.
9. Denique febres ratione *indolis* sunt vel
- 1) *Legitima*, seu regulares, quæ consuetæ anni & dierum tempora obseruant, & solito tempore finiuntur; vel
 - 2) *Anomala*, irregulares, nothæ, quæ nulla certa tempora, nullum typum, & nullam periodum constanter formant, & cum insolitis symptomatibus complicatæ sunt.
- Item vel
- 1) *Benigna*, quæ mitius se gerunt, e. g. febres intermittentes; ex febribus *acutis benigna* dicuntur *resolutoria* seu *continentes* & viscerum *inflammatoria*. Bene autem notandum est, quod *inflammatoria*, si exitum spectemus, a malignitate febrium pestilentium parum differant, & ita hoc intuitu minime *benignæ* dici mereantur. Quoniam autem *non contagiosæ* sunt, uti *malignæ*, & non nisi vni, quem exercent, periculosæ *benignarum* nomine hoc quidem respectu venire possunt.
 - 2) *Maligna*, quæ grauioribus plurimum symptomatibus stipantur, & vel lethalem euentum adferunt; vel si omnino superentur, labem tamen viscerum facile post se relinquunt. Huius census sunt febres epidemicæ multæ. *Conf. cautel. 33.*
 - 3) *Permaligna*, seu plus minus *pestilentes*, quæ præcipiti insultu inuadunt, & plurimos paucis diebus ad tumulum comitantur. Huc pertinent *pestis* & *sudor Arglicanus*.

III. SIGNA.

1. *Motus* sanguinis progressiuus *auctior ex pulsu*, celeri & frequente dignoscendus.
2. Hunc auctiorem motum pressis vestigiis sequuntur *caloris* augmenta.

3. Motus *tonicus* modo relaxatur, modo constringitur.
4. Vnde ad spectus *faciei* modo est rubicundus & turgescens, modo pallidus & sublidens.
5. *Sitis* plus minus intentâ.
6. Abstinencia a *cibis*,
7. *Somni* neglectus.
8. *Animi* morositas, sollicitudo, sensibilitas, minor dispositio ad negotia consueta.
9. Notabilis *virium* iactura & impotentia ad voluntarium motum.
10. *Dolorum* qualiscumque sensus.
11. *Respiratio* anxiosa & suspiriosa.
12. *Sudoris* prouentus, a nulla facile febre excludendus.
13. *Vrina* conspicua mutatio, non modo *coloris* naturalis in exaltatiorem, sed etiam *consistentia* ordinariæ in copiosiore, & magis saturatam.

IV. SVBIECTA.

1. Febres sine discrimine omnem quidem sexum, ætatem & corporis habitum, infestant.
2. Sexus tamen virilis facilius illis obnoxius est, quam feminus.
3. Sic etiam ætas agilior, iunior virilis, satis florida, præ alia minus tali.
4. Item sanguineo-cholerici, vel cholericio-melancholici, in primis ad iram prompti.
5. Sigillatim personæ, euacuationibus sanguinis vel aliis excretionibus antea adueta, & iam ab illis libera viuentes.
6. *Infantes* magis ab acutis, quam intermittentibus febribus corripuntur.
7. *Bruta*, sicut non ita facile morbis obnoxia sunt, vt homines, ita minime omnium *veras* febres incurrunt; quæ obseruatio vsum pathologico-practicum suppeditat.

V. CAUSSÆ.

1. Causa febrium *efficiens* est principium vitale, seu anima, conseruationi corporis sui organici intenta.

2. *Causa materialis proxima, propter & contra* quam motus tales febriles suscipiuntur, est materia aliqua, quæ mixtionem sanguinis & reliqui corporis, intima corruptione fermentatiuo-putredinosa euertere potest. *Conf. Stahl's dissert. de febris retionali ratione.*
3. *Causa materialis remotior* est plethora. Quoniam enim principium agens principiis obstare solet, & non semper expectat, donec materia vires tales nocendi manifestas adquisiverit, non mirum est, quod simplex sæpe plethora pro noxia materia reputetur, & naturæ sufficiat, ut contra eandem febrilibus motibus inturgat: plethora enim facile stagnationem, stasim & corruptionem inducere valet.
4. *Causæ occasionales & procatartica* sunt:
- 1) Concoctio sanguinis nimia, & per hanc orgasmus eius, seu expansio.
 - 2) Vehementes refrigerationes.
 - 3) Cibi cocti difficiles.
 - 4) Potus spirituosus.
 - 5) Vigiliæ nimix præter consuetudinem.
 - 6) Excretiones aduetæ suppressæ, siue *sanguinea*, siue quæcumque aliæ, præcipue hæmorrhagia *narium*.
 - 7) Consuetudo non minimæ est efficacix ad febres reuocandas.
 - 8) Contagium.
 - 9) Animi pathemata, quæ præ omnibus facile primatum obtinent.
5. Exsulent itaque variæ causæ illæ fictitiæ, e.g. *adensionis flammula cordis, scintillarum* per latifundium sanguinis oberrantium, *explosionis* corpusculorum nitrosorum; item *nuda* recentiorum *fermentationes*, quas antiquorum *putredini* substituerunt; porro *confusiones* spasmodicorum, *adcelerata* spirituum commotiones.

VI. PROGNOSIS.

1. Natura humana, ad corporis sui integritatem intenta & attenta, in febribus eisdem motus vitales, progressuum nempe

nempe & tonicum, noxæ, periculum minanti, opponit, quibus alias corporis sui integritatem & conferuationem prosequitur; sed quo gradu febrilis noxa periculum minatur, eodem gradu etiam motus illi intenduntur, augentur & continuantur.

2. Hinc quando causa illa peccans celerem noxam corpori minatur, motus febriles sine remissione instituuntur; si vero paululum tardius damnum inferre videtur, tunc, quia non adeo urget necessitas, per interualla motus febriles opponuntur. Inde fluit differentia inter febres acutas & intermittentes.
3. Febres *acuta* exquisitas habent periodos, quibus motus febriles exercent, & per septenarios absoluunt; dum prima periodus, qua febris quædam acuta excurrere posset, septimo die absoluitur, altera decimo quarto, tertia vicesimo primo; nonnunquam, sed rarius, inter nos febris quædam acuta has periodos transgreditur, & ad vicesimum vsque primum vel octauum diem se se extendit, & tum in schema lentum transmutari videtur: intermittentes vero exquisitos temporis ordines non seruant.
4. Ita febrium *effectus* semper salutaris est, *uentus* autem sæpissime irregularis, vel plane lethalis, idque magis individuali, quam essentiali febrili culpa; nempe in pedito febris decursu & morbis aliis accidentibus. Ita non a *fobre*, sed *cum febre* intereunt.
5. Longissime tamen *pauciores* febribus moriuntur, quam iisdem *infestantur*.
6. Febres frequentissime salutariter decurrunt sola abstinentia, quiete, & spontaneis euacuationibus, sine vllis medicamentis; quæ si incongruenter adhibeantur, statas excretiones turbant, & felicem exitum interuertunt.
7. *Declinatio*, seu exitus febrium salutaris, fit vel *cito & unica* excretionis actione, quæ *crisis* adpellatur, & maxime in acutis locum habet; vel contingit *paulatim*, quæ terminatio *lysis* vocatur, atque intermittentibus familiarior est.

8. *Crisis* quando contingit, est vel *exquisita*, quæ fit per *eccrisin* seu excretionem subitam & copiosam; vel *minus exquisita*, quæ succedaneis debitis excretionibus, in primis tamen *die critico*, negotium absoluit.
9. *Crisis exquisita* nulli feбри propria, nedum perpetua, *minus exquisita* numquam abest sine anomalia.
10. Criticæ hæc euacuationes, iufficiente quantitate prouenientes, adferunt subitam quali puncto temporis euphoriam, & animi, antea summe anxii, alacritatem.
11. Nulla febris vniquam restituitur sine omni *sudore*, aut mutatione *urine*. *Vid. problemata febrium Stahl.*
12. *Sudor* in nulla febre sub *initium* prouenit, circa *statum* autem vel senescente illo, sudores spontanei, aut aliæ extrusionés ad peripheriam corporis erumpunt.
13. In nulla febre sudor fit sub *æquâ* æstus, sed quando huius impetus remittit; si secus, symptomaticus, inutilis, immo noxius est. *Ibidem*.
14. Sudores iusto tempore prouenientes, & iusta moderatione fluentes, euphoria subsequitur.
15. Retardationes autem augment grauitatem, lassitudinem artuum, protrahunt morbum, & febres *typicas in lentas* transmutant.
16. *Urinæ* mutatio, si nulla in febribus contingit, nec calor ordinarium gradum superat, valet commune illud adferunt: *urina sana, pulsus sanus, æger moritur*. Rarius autem hæc occurrunt.
17. Febres, quæ cum euidente aliquo *typo* non solum inuadunt, sed etiam progrediuntur, benigniores & minus formidabiles sunt.
18. Quo magis hunc typum *ordinate & tranquille* seruant, eo minoris sunt periculi, ex contrario, si valde acuto typo simul ferociter & æstuando inuadunt, & augendo vigent, certissimi & eximii periculi sunt.
19. Omnis febris, in corpus male dispositum ingruens, viribus iam aliunde exhaustis, facillime anomalizat.
20. Abiectio *animi* in febribus, eaque præter consuetudinem ægri, optimi non est ominis.

21. Si caussa materialis in febribus *exigua* molis est, & præcipue ad corruptionem putridam inducendam prona existit, malignitatis adcusanda est.
22. Per febres diuturnas & lentescentes temperamentum sanguineum facile mutatur in cholericum-melancholicum, cui anini indoles respondet.
23. Febres stata sua ordinarie habent tempora, nempe
- 1) *Tertiana* intermittentes tempore ientaculi, vel prandii, circa solstitium præcipue vernale, inuadunt.
 - 2) *Quartana* horis post meridiem, circa quartam & quintam circiter, & in primis autumnino contingunt.
 - 3) *Synocha* febres ante crepusculum oriuntur.
 - 4) *Biliose* circa ortum solis proueniunt, & post solstitialès existunt.
 - 5) *Catarrhales* circa vesperam insultant, & circa æquinoctia prodeunt.
24. Quo magis autem febris aliqua a legitima sua norma deflectit, eo deterior est prognosis; ad minimum
25. Omnis febris in alterius tempora, habitus, ætatis opportunitates incidens, vel in illam degenerat, vel in eius mores anomalizat. Vid. *problemata Stahlii*.
26. Quando itaque natura debitum ordinem transgreditur, & vel ultra vel citra modum operatur, vel præmature, vel præpostere se- & excretiones suscipit, aut secundarios quosdam effectus prosequitur, fluunt exinde graua & periculosa symptomata, vt sunt: spasmi vehementes, hæmorrhagiæ importuna, vomitus intempestiui, conuulsionès, prodigiæ diarrhœæ, affectus phrenitici, soporosi, deliria, singultus, extrema virium decrementa, exanthematum retrocessionès, lipothymia, cardialgiæ extrema, inuoluntariæ excretionès, &c.
27. Febres inconditis medicationibus, e. g. adstringentibus, nimis absorbentibus, opiatis &c. corruptæ, turbatæ, aut suppressæ, post ea autem redeuntes maiorem restitutionis inuoluunt difficultatem, quam febres sibi relictæ.

28. Febres si legitime & salutariter decurrunt, nouum plerumque sanitatis vigorem habent successorem.
29. Interdum vero accidit, vt, si natura in febrilibus functionibus impedita fuit, materia tamen aliquo modo ad eliminandum iam præparata est, particulares translationes congestoriæ ad certa loca fiant, quas *apostasés* seu *metastásés febriles* nominamus, quæ in iunioribus caput occupant, vt glandulosi tumores inflammatorii ibi occurrant; in adultioribus vero phlegmonodei tumores oriuntur.
30. Hæ metastásés quando temere repelluntur, prægressam febrem denuo & maiori impetu prouocant.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Si vmquam alibi, certe in febribus requiritur, vt Medicus sit *minister* naturæ.
2. Hæc autem circa *iniciu*m & *incrementum* præparat, disponit & *secernit* materiam noxiam; in *statu* vero & *iub* *declinatione* præparatam materiam per conuenientia loca *excernere* & *eliminare* adlaborat.
3. In hoc duplici negotio, *secretionis* nempe & *excretionis*, naturæ succurrere, *artis* est.
4. Sed quia de febribus tantum in *uniuersum* hic agimus, *generalem* etiam tantum modo methodum & remedia *generaliora* adlegare, specialia autem specialibus tabulis subsequentiis exhibere, conuenit.
5. Remedia, quæ *præparationi* & *secretioni* inferuiunt, sunt:
 - 1) *Humectantia*: huc pertinent
 - a) Sufficiens dilutus potus ordinarius.
 - b) Decocta sãtis nota ex hordeo, C.C. &c.
 - c) Infusã thée, coffée, non tamen cum lacte, item herbarum & radicum alexipharmacarum, sed temperatiorum.
 - 2) *Lentam humorum crassitiem & tenacitatem resoluentia*, cuius cenus sunt:
 - a) Radices alexipharmacæ temperatæ, & leni simul diuretico effectu præditæ, e.g. rad. helen. pimpinell, alb. vincetox. gentian. petasit.
 - b) Her-

- b) Herbae eiusdem efficaciam, vbi præ omnibus scordium laudatur.
- c) Salia absterfua & digestiua, ex acido vitriolico & alcali fixo parata, e. g. tart. vitriolat. nitrum antimoniatum, arcanum duplicatum, item *tartareæ*, e. g. arcanum tartari.
- 3) *Acrimoniam sulphureo-salinam & tenuem obtundentia & incrassantia*, qualia sunt:
- a) *Absorbentia* ostracodermata, e. g. conch. præparat. mater perlarum præparat. item testæ ouorum, oculi cancri.
- b) *Nitrosa*, e. g. nitrum crystallifatum, nitrum tabulatum seu lapis prunellæ.
- c) *Subacida*, e. g. succus citri, berberum, ribium, tinct. florumbellidis: ex magis acidis, clyffus antimonii, spiritus vitrioli & nitri.
- d) *Emulsiua*, e. g. emulsio amygdal. fem. card. Mariæ.
6. *Remedia excretioni subuenientia* sunt:
- 1) *Diaphoretica*, antimonium diaphoret. tenerrimum, bezoard. mineral. aquæ diaphoreticæ, e. g. aqua scord. card. bened. flor. sambuc. galeg. &c.
- 2) *Alexipharmaco-diuretica*, e. g. essent. alexipharm. *Stahlii*, mixtura simplex, leniter camphorat.
- 3) *Aluum* leniter expedientia, e. g. clysteres.
7. Hæc tria remedia euacuantiã in plurimis febribus locum habent; sequentia autem in quibusdam tantum febrium speciebus tuto adhibentur:
- 1) *Vomitoria*, quæ interdum in intermittentibus conueniunt. *Vid. cautel.*
- 2) *Laxantia & purgantia.*
- 3) *Vena sectiones*, in casibus & circumstantiis ad modum specialibus. *Vid. cautel.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Missitarunt quidem ab antiquissimis temporibus Medici, quod in febribus pugna quædam sit naturæ cum morbo; agnouerunt, quod dies ad excretionem critici sint

- pugnæ illius veluti exitus, & decedentium inter se partium, aut potius ex parte naturæ eueniens victoria; sed dolendum, quod tam pulchram obseruationem non melius excoluerint.
2. Immo perite animaduenterunt, quod non solum salubriores, firmiores atque certæ naturæ victoriæ seu crises fiant per manifestas excretiones & præcedentes (vt illi adpellabant, coctiones) secretiones, materiam qualemcumque ad corrumpendum efficacem iustis temporibus & locis expellentes; sed ex aduerso etiam morbi victoria seu funestus febrium exitus nitatur huiusmodi excretionum infido successu, immo potius defectu.
 3. Hæc cum vtique ita se habeant, Medicus sollers ad has considerationes omni ratione instituendas animum aduertere debet: nam ab harum excretionum vera agnitione pendet febrium therapia generalis, vt Medicus, has excretiones *arte* debite protequendi, consilium conuenienter capere & exsequi possit.
 4. Contra, si natura, nullius determinatæ commotionis opportunitatem inueniens, nihil horum vel faciat vel perficiat, considerandum tanto prudentius Medico, quid in sua arte positum sit, siue ad tempestiuam huius materiæ subtractionem, siue ad eius præparationem, vt obedientior fiat etiam ipsius naturæ commotionibus.
 5. *Methodus correctoria*, quæ causam morbidam, seu corruptelam ab illa subnatam, alterare, subigere, & in crasin corporis tolerabilem redigere studet, vniuersæ naturæ methodo aduersatur; vtpote quæ totam vitam non correctionibus peiorum materialium, sed *excretionibus* mechanice conseruat.
 6. Simplicissimæ etiam rationi magis conuenit, materiam vel corruptentem vel corruptam potius absolute ex vniuerso corpore eicere, quam difficilibus, longinquis, immo irritis & vanis correctoriis tentaminibus eam subiicere, & in ambiguo herere, an optata mutatio corruptæ materiæ in melius euentura sit.

7. Omnes

7. Omnes autem *vehementes* euacuationes & medicationes in febribus ad modum suspectæ sunt, quia principium vitale sapius placide motus suos febriles administrat.
8. Hinc *vomitoria*, ab aliquot lustris omnibus fere febribus destinata, rarissime & adcurata circumspeditione vsurpanda sunt.
9. Vomitoria enim commotiones non solum ventriculum & reliqua viscera abdominis vehementer concutiunt, sed stringunt etiam vasa, ad caput pertinentia, arteriosa & venosa circa œsophagum, fauces & collum; vnde varia distensiones vasorum & meatum in capite ingruunt.
10. Concurrit angustia præcordiorum, anxietas & insignis virium iactura.
11. Et licet subiecta *cueteta* sint, docet tamen experientia, quod etiam *salia* in febribus acutis ægerrime & laboriosissime sapius vomant; præcipue si nulla saburra crassior in ventriculo præsto sit.
12. Præter ea in febribus acutis *legitimis* causa numquam hæret in primis viis.
13. In febribus *biliofis* inflammatoriis hæret quidem causa in primis viis, sed materia ita non est disposita, vt secure semper per vomitum possit euacuari; *conf. tabula specialis de febribus biliofis*: neque status inflammatorius, ibi præfens, vehementem talem concussionem tolerat.
14. In intermittentibus vomitoria, non nisi tertianis, locum habent, nec ibi necessaria sunt, nam cruditates & saburra ita præparari & disponi per alia remedia possunt, vt sine tali tumultu commodius eliminari queant.
15. *Acriora purgantia* ad modum etiam raro in febribus conueniunt.
16. *Vena sectiones* in febribus, siue acutis, siue intermittentibus, directe non conueniunt, modo vnica febris *synocha* excipiat.
17. Secta etiam vena, nisi sufficiens sanguis emissus sit, & regimen placide diaphoreticum subiungatur, facile versus dies criticos congeitiones sanguinis ad caput contingunt.

- gunt, unde deliria, aphthæ, & alia grauiora mala produ-
cuntur.
18. Sic etiam præmaturum *regimen diaphoreticum*, præcipue per calida alexipharmaca, versus paroxysmum, & vigente æstu, institutum, motus naturæ ordinaros facile perturbat. Conueniunt potius ante & versus paroxysmum temperantia, absorbentia, diluentia, digestiua salia.
 19. In omni febre *potulenta* congrua, sufficienter concessa, reficiunt ægrum, minuunt æstum, promouent quietem, & debitos sudores. *Vid. problemata februm Stahlis.*
 20. Continentia quieta circa opportunitates potior est omni medicamento. *ibidem.*
 21. *Symptomata* februm ne deterreant Medicum; multo minus a legitima methodo ad alienas medicationes, essentialibus februm circumstantiis inimicas abducant.
 22. Hinc *adpetitus* deiectionem & *vigilias*, præcipue in acutis, nihili faciat: *sitim*, quantum sine immodestia fieri potest, largiter subleuet: *inquietudines*, ab impatientia morali plurimum dependentes, seriis dehortationibus, & pessimorum effectuum denunciationibus componat.
 23. In omni febre *refrigeratio* corporis, & voluntaria, & accidentalis ad modum noxia est; *vid. problemata practica Stahlis.*
 24. Materia numquam moueatur, nisi sit mobilis. *ibidem.*
 25. In *alterantibus* autem, vti iam supra monuimus, parum præsidii quærendum est, exceptis aliquo modo intermittentibus & quibusdam inflammatoriis acutis: speratus enim *alteratiuus* effectus quam nimium superatur a manifesta humorum *organica* efficacia, quæ plus certe incommodi adfert, quam ille præsidii pronuntiat.
 26. Sufficiens potus in omnibus febris iniungendus est, cauendo tamen a frigore illius nimio, præcipite ingurgitatione, consistentia spissa & alibili, qualitate illius inebriante, vertiginosa, flatulenta. Loco ordinarii potus vsui esse potest decoctum e rad. scorzoner. fol. veronic.

- nic. flor. tunicæ, aquileg. borragin. bugloss. melni. turcicæ, cort. citri, aurant. præsertim recent. cum modico cinnamomi, cardamom. & momento sacchari.
27. *Emulsiones* dilutæ etiam conueniunt, sed non ex seminibus frigidis dictis, verum ex amygdalis & mundis pineis, paratæ, satis saccharatæ, & aromatica quadam aqua, e.g. cinnamomi, gratiores reddita.
28. *Alexipharmaca* exhibeantur sub exitu paroxyfimi, & tempore, quo acutarum impetus paululum remittit, non tamen proxime versus nouum insultum.
29. *Salia volatilia*, e.g. sal & spiritus C.C. in febribus acutis a multis quidem annis summis laudibus mactantur, sed varia incommoda, immo pericula fontica inducunt, præcipue tumores œdematosos & tandem asciticos.
30. *Acida* in febribus ita reformidanda non sunt, vti quidam recentiorum putant, solatio potius sunt, præcipue sanguineis, in nimio æstu & siti, nominatim spiritus vitrioli, sulphuris, succus citri, berberum, tussi autem præfente, quæ a vitriolicis exasperatur, *acidum tantum citri* locum habet, præcipue cum saccharo ad gratiam edulcoratum.
31. *Acida autem dulcificata* iisdem effectibus destinare, experientia & ratio interdicit. Crasis, ex hac imaginaria correctione emergens, nondum satis cognita est efficacæ, & penetrantem fouet adstrictionem.
32. *Vius adstringentium* vniuersæ febrium intentioni aduersatur, nam secretiones & excretiones, apertas poscunt vias, quæ autem ab adstringentibus coarctantur, & hinc ferocia non tantum symptomata, verum etiam in acutis plane funesti euentus inducuntur.
33. In intermittentibus contumacioribus, vbi materia peccans iam eliminata est, & motus tantum a consuetudine perennant, actiones interim vitales, adpetitus, concoctio, somnus, alius debite sibi constant, vius illorum prudens conceditur.

34. Post febrium, præcipue acutarum, decursum vsus alexipharmacorum per tempus aliquod adhuc continuandus est, quia semper aliquid restat eliminandum.
35. *Specifica* antifebrilia magis optanda, quam speranda sunt; & licet *Apinus* de cortice *casçarilla* in substantia aut extracto, in febribus nominatim epidemicis, tempestiue exhibitio, adseueret, quod medio morbi curlu cito in melius, & secundo vel tertio die in integrum restituti fuerint ægri, dolendum tamen est, quod hoc adsertum non ita vbique experientia respondeat.
36. Inter ea hic cortex egregium tonicum effectum præstat, fouet enim adstrictionem vix sensilem, saporem aromaticum, & amarorem penetrantem.
37. *Nitrum* quibusuis temperamentis, præcipue autem cholericis, optime conuenit: in forma *liquida* diluta sumtum, aluum lubricat, in *sicca* autem exhibitum acrimoniam sulphureo-salinam egregie obtundit.
38. *Saccharata*, modeste exhibita, non ita reiicienda sunt in febribus, vti quidam ex variis præiudicatis opinionibus concludunt.
39. Vt ordo sequentium de febribus tabularum eo magis perspiciatur, sciendum est, quod primo loco illæ *acuta* positæ sint, quæ *benigna* vocantur, nempe febres *resolutoria*, *consumtoria*, *inflammatoria*, *lenta* & *hectica*. Has benignas sequuntur acutæ *maligna*, *contagiosa*. Post ea succedunt febres *intermittentes*. Tandem febres *composita* & *corrupta* hanc scenam claudunt.

TABVLA LVII.
DE
FEBRE EPHEMERA SIMPLICE
ET
PLVRIVM DIERV.M.

I. DEFINITIO.

Febris ephemera est species febrium *continentium sanguinearum* veterum, qua natura sanguinem abundantem siue per sinceram euacuationem, siue per resolutionem in serum, consumere & euacuare intendit, motibus secretoriis, & excretoriis, vltra naturalem gradum auctis. Deriuatur ab ἐπι, supra & ἡμέρα dies.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris ephemera, quæ etiam *diaria* vocatur, est vel *vnus* vel *plurium* dierum, quæ non differunt; nisi tempore durationis; nam ephemera *simplex* per 24. tantum horas, *plurium* autem *dierum* ephemera per quatuor circiter dies durat.
2. Ephemera hæc *benigna* quam maxime differt ab illa *maligna*, quæ *sudor Anglicanus* dicitur; sudor quidem, quia naturam per sudorem largum sibi prospexisse, obseruatum est; Anglicanus autem, quia in Anglia primo initium sumsit, speciem pestis exhibuit, qua ægri intra 24. horas ad mortem plurimum properarunt.
3. Differt ratione *gradus & temperamentorum*, in subiectis enim temperatioribus etiam febris est temperatior, & vice versa.

III. SIGNA.

1. Inuadit hæc febris *sine* vlllo *frigore* aut *horrore*, nisi inflammatio interna, vel variolæ aut morbilli subsint.
2. Statim cum æstu, eoque continuo, & ad finem febris sine remissione continuante.
3. Calor autem satis est tolerabilis, & blandior, quam in febre *synocha*, strictè sic dicta.

4. Capi-

4. Capitis *dolores* in nonnullis sunt pulsui respondentes & punctorii, in aliquibus autem grauius & obtusi.
5. Qui ex hauſtu frigidus in hanc febrem coniciuntur, illi *ſenſum preſſionis* circa dextrum hypochondrium perſentiunt.
6. Facies eſt inflata & rubicunda.
7. Laſſitudo membrorum ad modum notabilis.
8. Pulsus eſt magnus, celer, frequens.
9. Vrina tinſta, cum rubore ſaturato, aurantiorum æmulo, roſeum deponens ſedimentum.
10. In diaria *ſimplice* primo ſtatim die *coctio* in vrina adparet. *Vid. Foreſti obſeruaciones.*
11. Soluitur hæc febris ordinarie placido ſudore, rarius autem narium hæmorrhagia.
12. Breuiſſimæ eſt periodi, nam vt modo dictum, ſimplex finitur ſpatio 24. horarum, ſi vero quarto demum, vel ad ſummum quinto die ceſſat, ephemera plurium dierum vocatur.
13. Somnus vel nonnullus adeſt, vel ſi ægroti paullulum dormiant, dormire tamen ſibi non videntur.
14. Vomitus nonnumquam in ſubiectis voracibus oritur, præfertim ſi larga ingeſtio ciborum anteceſſit; & tunc natura rationale conſilium ad materiam crudam ex ventriculo eliminandam, ſuſcepit.

IV. SVBIECTA.

1. Euenit hæc febris iunioribus, adoleſcentibus, ſanguineo-cholericis, ſucculentis, ingluuiei deditis, monachis. *Vid. Foreſtus.*
2. Qui euacuationibus ſanguinis antea adſuefacti, e. g. mēnium, hæmorrhoidum vel narium, iam vero illarum ſuppreſſionem experiuntur.
3. Qui diurno corporis exercitio, abuſu vini, vigiliis inſolitis, mora ad ignem diurniore, & grauiore iracundia, ſanguinem in organiſmum concitarunt, vel poſt ſudores repentinum frigus admiſerunt.

V. CAUSSAE.

1. Causſa materialis *antecedens* eſt plethora.
2. Causſa *proxima & immediata* eſt exagitation & commotio plethoræ.
3. Causſæ *occaſionales plethoræ* ſunt:
 - 1) Emanſio vel ſuppreſſio hæmorrhagiarum conſuetarum.
 - 2) Laeta diæta & otium.
4. Causſæ *occaſionales turgeſcentiæ* ſanguinis, ſeu exagitationis plethoræ ſunt.
 - 1) Vehemens corporis exæſtuatio, ardor ſolis.
 - 2) Nimiſ potus vini vel aliorum ſpirituſorum.
 - 3) Incandefcentia animi.
 - 4) Nimiæ vigiliæ.
 - 5) Præpoſtera regiminum ſudoriferorum adminiſtratio.
 - 6) Incondita refrigeratio vel hauſtus frigidus, corpore calente.

VI. PROGNOſIS.

1. Febris ephemera, præcipue *ſimplex*, ſibi relicta, lenior eſt, & ſola continentia quieta, cum potu affatim diluto, ſalutariter plerumque ſuccedit.
2. Sponte ſua, ſine auxilio Medici, largiore ſudore plurimum ſoluitur.
3. Si autem ineptis medicamentis tractatur, vel malo regimine turbatur, ſiue in lentam tranſire ſolet, ſiue in ſynocham ſtrictè dictam, immo inflammatoriam febrem poteſt præcipitari.
4. Si nullus ſudor ſuperuenit, vel ſi poſt ſudorem febris non deſinit, ſed tempus conſuetum tranſgreditur, ſignum eſt, ephemeram in alium morbum declinare.
5. Corpus macilentum & ſiccum facile hecticam induit: ſigna vero instantis hecticæ ſunt; duratio ultra diem naturalem, calor inrenſior poſt paſtum, pulſus durus, parvus, & æqualis. *Vid. Foreſt.*
6. In ſubiectis valde plethoricis ephemera facile mutatur in ſynocham, & in cacochymicis ſynocha *putrida* eſt metuenda. *Conf. Foreſt.*

7. Urina & sudor si bene succedunt, spes est.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Generalis.

1. Sanguis in orgasmo constitutus est temperandus.
 - 1) In *cholericis* per nitrosâ, temperantia, & diluentia, item per antimonialia fixa, & hæc quidem in parca dosi adhibita.
 - 2) In *sanguineis* per acida, v.g. succum citri, clyssum antimonii.
 - 3) Cuius temperamento conuenit potus sufficiens tepidus, & per acidum citri acidulatus.
 - 4) Item huic scopo inseruiunt iulapia, emulsiones, serum lactis, ptisanæ coctæ, quæ etiam stases sanguinis inflammatorias præoccupant.
2. Successus sudoris, quem natura intendit, iusto tempore, & placide, est promouendus; quod obtinetur
 - 1) per potiones ex aquis destillatis diapnoicis paratas, e. g. aqua scabiosæ, scordii, card. ben. fior. sambuc. vlmæ. galæg. plantag. cum absorbente & momento antimonii diaphoret. permixtas.
 - 2) Per aquæ calidæ potum, hodie vsitatum, théé vel coffeé.

B. Specialis.

1. In febre ephemera *simplice* auxilium Medici non facile requiritur: sufficit enim plerumque tranquilla continentia; quod si vero fiat, tum
2. Interdium vsurpentur pulueres nitroso-temperantes, e.g. Rec. nitri depurati, ocul. cancri, acido citri saturat. ana drach. II. antimon. diaphoret. drach. I. M. dof. scrup. I. ter per diem.
3. Versus noctem vero, quo tempore plerumque sudor subsequi solet, iungantur potiones diapnoicæ, iam modo descriptæ.
4. In ephemera *plurium dierum* eadem est methodus, per plures dies continuanda.
5. Sub exitu febris lenia laxantia adhibeantur, e.g. e rhabarb. fol. sennæ & passulis, nam, primis viis hoc modo depuratis, appetitus & vires restaurantur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. In febre ephemera a medicamentis *sudoriferis* & coactis regiminibus, item etiam a calidis alexipharmacis abstinendum: summas enim anxietates, immo sudores colliquatiuos, producant.
2. Hinc quando omnino alexipharmaca adhibenda censentur, sint illa temperatissima.
3. Prius autem in usum non trahantur, quam si excretio halituofo-sudorifera legitimo tempore non succedat.
4. *Vena sectio* in ephemera, praecipue simplici, superuacanea est.
5. Febris ephemera quando in lentam vel hecticam degenerat, hi morbi consequentes genuinae methodo facilius cedunt, quam si ex scirrhis vel vlceribus viscerum propullularunt. Conuenit autem in tali casu, lenia laxantia antifebrilibus interponere.
6. *Absorbentia* marina organium sanguinis temperant, materiam ex dissoluta illius compage secedentem incrassant, & per vias vrinarias educunt.
7. *Diaeta*, omnibus febribus communis, probe est obseruanda, praecipue continentia, quod ad corpus & animum attingit, quietata.
8. Abstinentum est a nimia ingurgitatione *potus frigidi*, quia sudorem perquam vtilem impedit, fluentem vero sistit.
9. In obstructione alui *clysteres* in usum trahantur, minime vero purgantia fortiora aluum commouentia.
10. *Salia volatilia* damnum inferunt, dum sudores vel nimis excitant, vel plane impediunt, febribusque inflammatoriis ansam praebent.

TABVLA LVIII.

DE

FEBRE SYNOCHA

SEV

CONTINENTE καὶ ἐξοχὴν DICTA.

I. DEFINITIO.

Febris synocha est species febrium *continentium sanguinearum*, qua principium vitale plethoram immunere intendit, siue per sinceram narium hæmorrhagiam, siue facta sanguinis in serum resolutione per sudorem, motibus secretoriis & excretoriis, ultra consuetum gradum auctis. Deriuatur a συνέχω, contineo.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris synocha est vel

- 1) *Simplex*, quæ in nostris regionibus satis raro occurrit; vel
- 2) *Composita*, ubi continens cum febre continua complicatur, quæ a veteribus synochus *putrida* adpellatur, & multo frequentior est, quam simplex. *Vid. tabula de febribus compositis, & cautela.*

2. Febres *continentes* differunt a febribus *continuis*: Hæ enim suas habent *remissiones*, illæ autem continenter & in eodem tenore ad criseos tempus pergunt.

III. SIGNA.

1. Conuenit quidem febris *synocha* cum *ephemera*, præcedente tabula tradita, in omnibus fere signis, præcipue etiam in hoc, vt sine frigore inuadat, æstus autem, sitis, languor & reliqua symptomata in synocha grauius vrgent.
2. Occurrunt enim anxietas oppletiones pectoris, suspiriosæ angustia & quasi suffocationes.
3. Item *dolores* capitis lancinantes, rubor faciei & oculorum, tinnitus aurium, vertigines, summæ inquietudines.
4. His omnibus *mentis* motiones intercurrunt.
5. *Vrina* est rubicunda, pellucida, & ante quartum diem mutatio-

rationem vix subit; sub ipsâ autem mutatione sedimentum offert rosei coloris.

6. Alui ficcitas est plerumque molesta.
7. Coniunguntur tensiones dorſi & artuum spasmodicæ, molestissimæ, tam in principio exacerbationum, quam in illarum mitigatione.
8. Septimo plerumque die terminum suum inuenit hæc febris, prodeuntibus in *iuniore* ætate hæmorrhagiis narium, vel in *seniore* præcipue sudoribus largis.

IV. SVBIECTA.

1. Febris synocha eadem subiecta, quæ ephemera, nempe plethorica & succulenta, occupat.
2. Temperamentum sanguineum, vel sanguineo-cholericum.
3. Ætatem mediam adolescentem.
4. Præcipue personas, euacuationibus sanguinis adſuetas.
5. Tempore plerumque vernali & æstiuo.

V. CAVSÆ.

Synocha febris conuenit etiam in eo, quod ad causas attingit, cum febre ephemera, nempe

1. Causa *antecedens* est plethora.
2. Causa *proxima* immediata est orgasmus sanguinis abundantis.
3. Hunc *orgasmum* inducunt causæ occasionales sequentes:
 - 1) Vehementes corporis exagitationes.
 - 2) Abusus potus spirituosus, ad ebrietatem vsque sumti.
 - 3) Nimia vigilia.
 - 4) Iracundia.
 - 5) Sudationes nimia coactæ & medicamenta calida.
 - 6) Immodica corporis refrigeratio, vel haustus frigidus, corpore calente, sumtus.
4. *Plethoram* autem ipsam cumulare solent
 - 1) Hæmorrhagarum naturalium suppressio, e.g. mensium, hæmorrhoidum, hæmorrhagiæ narium, vel artificialium neglectio, e.g. venæ sectiones, scarificationes.

2) Diætā superflua & vita otioſa.

VI. PROGNOſIS.

1. Febris ſynocha *per ſe* adeo non eſt periculofa.
2. Quando enim hæmorrhagia critica vel ſudor ſeptimo die legitime contingit, optimæ ſucceſſionis ſpes eſt.
3. Si vero excretio illa critica non ſuccedit, & tamen congeſtiones adſunt, *iunior* quidem ætas phrenitide & convuſſionibus facile corripitur; adultior autem sæpe ſopores incurrit.
4. Sapiffime etiam increbeſcit plenitudo peſtoris anxia, anhelofa, ſuffocans, cum ſuccedente in *principio* peripneumonia, in *incremento* autem anginoſa ſtagnatione & inflammatione.
5. Crifis hæmorrhagica quando in non nullis excedit, vires quidem notabiliter conſumuntur.
6. Suppreſſa autem hæmorrhagia multo grauiora damna intert, nempe hecéticas, cachecticas, hydropicas, valedudinarias viſcerum obſtipationes.
7. *Hæmorrhagiam criticam* antecedunt:
 - 1) Narium ſtrictura aut pruritus.
 - 2) Dolor capitis intenſior.
 - 3) Rubor faciei & oculorum.
 - 4) Horum quoque ſiccitas, aut expreſſio lacrimabunda.
 - 5) Aurium tinnitus, ſufurrus.
 - 6) Immo ipſius mentis perturbatio, quæ etiam euenire ſolet ante eruptionem ſudoris critici, vbi ſimul
 - 7) Die *indicatorio* punctio & pruritus ſub cute, imminutio vrinæ, inquieta iactatio, & abdominis inflatio præcurrunt.
8. Quarto die quando ſanguis ex naribus ſtillare incipit, die ſeptimo, niſi turbetur natura, hæmorrhagia certiffime redibit.
9. Querelæ de ſumma anxietate præcordiorum omen præbent infauſtum.
10. Non minus etiam nimia inquietudo, excretio macularum nigrarum vel fulcarum, inuoluntaria lacrimarum emiſſio,

ſio, nulla a ſomno reſectio. Hæc enim *ſtatum complicatum* delignant.

11. In ſanguinis conſtitutione *crassa* facilis eſt tranſitus in febrem lentam, hecticam aut in tumores.
12. Si intra primum ſeptenarium non terminetur ſynochus, nubeculæ autem in vrina cocta adpareant, & ſemper adparuerint, circa ſecundum ſeptenarium febris ſolutio adhuc eſt ſperanda.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Cauſa *continens* huius febris, nempe *plethora*, remoueat per venæ ſectioem, ſub initium morbi inſtituendam, nempe ante, quam vrinæ coctio adparet.
2. Deinde *orgaſmus* ſanguinis & motuum vehementia moderetur, atque æqualis ſanguinis diſtributio atque reſolutio promoueat per temperantia, præcipitantia, & nitroſa, item per potum ſufficientem, acido citri vel clyſſo antimoni acidulatum, item per iulapia, emulſiones, per diaphoretica fixa, cum aquis diapnoicis ſub febre ephemera commendatis, iungenda, per febrifugum *Kergeri* ex cryſtallis tartari & coralliis paratum, per regimen leniter diapnoicum v. g.
3. Horis ante meridiem exhibeatur puluis ſequens: Rec. matr. perlar. præparat. nitri depurat. ana vnc. ſemis, bezoardic. mineral. drach. II. M. dof. ſcrup. I.
4. Horis vero poſt meridiem ſequens exhibeatur mixtura: aquæ ſcabioſ. card. bened. ſcorzoner. ſcord. ana vnc. II. ſucc. citr. vnc. ſemis M. dof. cochlear. II. poſt quatuor horas repetenda. De vſu alexipharmacorum eſſentiarum ſub *cautelis* dictum eſt.
5. Dieta tranquille continentia, ſufficientis tepidi potus, & caloris moderati ſimul iniungatur.
6. Aluus, ſi obſtructa, per clyſteres modeſte aperiat.
7. Sub declinatione morbi primæ viæ leniter euacuentur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quod in *ephemera* ratione *alexipharmacorum calidorum* monui-

- monuimus, id hic omnino repetendum est, ad inflammationes viscerum præcauendas.
2. Immo temperata etiam alexipharmaca in febre synocha, si venæ sectio præcellerit, reponantur.
 3. Quando autem venæ sectio non instituta est, tum ipsa alexipharmaca, temperata tamen, bis de die, nempe ingruente & media nocte, sine regimine, adhiberi possunt, e. g. essent. alexipharmaca *Stablii*, vel mixtura simplex gutt. XX - XXX. interpositis per reliquum tempus pulueribus nitroso-temperantibus.
 4. *Refrigerantia & adstringentia vena non secta*, improvide adhibita, translationes ad fauces, & stases seroso-mucidas relinquunt, cum febre lenta, alexipharmacis & resoluentibus colliquanda.
 5. *Tinctura bezoardica officinales*, - utpote calidæ & opio insuper inquinatæ, quouis modo in hac febre reiciuntur.
 6. *Venæ sectio* si post vrinam *coctam* instituitur, vbi natura iam ad motus secretorios & excretorios materiam disposuit, grauiores hamorrhagias inducit, vel, si hæ emanent, sequuntur deliria, aut symptomata soporosa.
 7. Existant enim exempla, in quibus post coctam vrinam venæ sectio, & deinde refrigerantia adhibita fuerunt, quod die *critico* mortui sint febricitantes.
 8. Quem ad modum venæ sectio in synocha *simplice* satis commoda, eoque commodior est, quo magis cruda, limpida minusque rutila obseruatur vrina, ita nullius ex contrario vsus est in synocha *putrida*, vel in simplice ad statum iam progressa: sæpe enim post ea recidiuam adfert, vel odiosam postulat sui repetitionem.
 9. *Aluum* irritare non conuenit, bene vero modeste eam lenire. Exeunte autem febre repurgatio primarum viarum per rhabarbarina, vt adpetitus & vires restaurentur, egregie conuenit.
 10. *Salia volatilia* tumores cachecticos facile post se relinquunt.

11. *Opiata*, pro capitis doloribus sedandis adhibita, deliros furiosos, comata, paralyfes, inducunt.
12. *Angina* quando superueniunt, succurrendum est per gargarismata, additis, pro maiore adstrictione radic. torment. terra catechu, alumine crudo, cum venæsectione primum in brachio, deinde sub lingua instituenda. Reliqua *vid. tabula de angina.*
13. *Vinum* in hac febre improbat. *Regimen* licet coactum esse non debeat, perpetua tamen transpiratio promouenda, & æris accessus præcludendus est.
14. *Hæmorrhagia critica*, si nimia videtur, caute tractetur: duæ enim circiter libræ medicæ sine vitæ periculo, in hac excretionem perferri possunt. *Vid. tab. de hæmorrhagia narium.*
15. Ceterum rariores esse, in nostris climatibus, febres *simpliciter* continentes, in praxi bene notandum est. Nam propter spissitudinem sanguinis abundantis nostrates longe proniores sunt ad rheumatico-inflammatorias stases, & hinc ad typos febrium magis *continuos.*
16. Hæc est ratio, cur febres *continentes* cum *continuis* sapissime apud nos complicentur, & ita ordinarium schemata in *mixtum* aliquod transmutent; quæ res summa attentione indiget, quia multi motus sibi contrarii in hac complicatione reperiuntur.
17. Et quia *urina* sub his febribus compositis fœtido sedimento conspicuæ sunt, veteres vel ex hoc signo finxerunt sibi putredinem, & hinc febres *putridas* illas vocarunt. Plura de his sub febribus compositis dicemus.

TABVLA LIX.

DE
FEBRE CONTINVA SIMPLICE.

I. DEFINITIO.

Febris continua simplex est species februm acutarum, in qua principium vitale viciosa humorum *qualitatem* corrigere, & præcipue orgasticas illas ac subtiles materias, quæ putredinem producere possent, eliminare intendit, idque motibus, qui ultra gradum quidem naturalem aucti continui sunt, a vehementia autem sua certis diei horis paullulum remittunt.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris *continua simplex* differt a febre *continente simplice* sequentibus:
 - 1) Continens *sine*, continua autem *cum* horrore inuadit.
 - 1) Continens *nullas*, continua *aliquas* habet remissiones.
 - 3) Continens *quantitatis* imminutionem, continua *qualitatis* correctionem respicit.
 - 4) Ceterum *continua* cum *continente putrida* aliquam habet conuenientiam.
2. Differt ab *intermittentibus & chronicis*:
 - 1) *Remittit* quidem per aliquot horas a feruore & acerbitate sua, prorsus autem non *intermittit*, sed continuo cursu ita ad finem properat, vt in illis etiam horis, quibus ægri non adeo intenso æstuant, & calor, & sitis & capitis dolores adsint.
 - 2) Præcipitem & acutam habet periodum, & vel septimo, vel decimo quarto die stadium suum decurrit.
3. Continua *simplex* differt a continua *composita*, quæ vel cum alia continua, vel cum continente, vel cum intermittente complicata est. *Conf. tabul. de febris compositis ex acuta periodo.*

III. SIGNA.

1. Inuadit plurimum cum horrore, & hunc excipit æstus, isque ad finem vsque morbi continuus.
2. Quando autem impuritates primarum viarum conspirant, primis quidem diebus frigus *aliquoties* recurrit, & cum æstu ad normam intermittentis alternat, deinde autem ordinarium continuæ typum exhibet.

3. Con-

3. Coniungitur capitis dolor insignis, cum siti & oris siccitate.
4. Pullus est celer & frequens.
5. Quem ad modum excretiones per diuresin & diaphoresin huic feбри quasi essentialia sunt, ita per has etiam salutarem exitum & euentum querere obseruatur.
6. Vrina enim, quæ primis diebus limpida & rubicunda est, quarto circiter die cocta adparet.
7. Non minus sudor ab illo tempore quemlibet paroxysmum, qui bene cedit, in declinatione sui sequitur.
8. Reliqua sub *differentia* diximus.

IV. SVBIECTA.

1. Homines floridæ & mediæ ætatis
2. Qui lauta diætâ non tantum plethoram, sed & otio ac seignitie motus impediunt, quo minus debitæ excretiones materiarum noxiarum per transpirationem naturalem & vrinam succedere possint.

V. CAVSSAE.

1. Adcusamus quidem pro *caussa materiali* in hac febre vitium *qualitatis*, non alio autem sensu, quam vt plethoram illius matricem esse adseueremus.
2. Quem ad modum enim plethora in otiosis spissitudinem sanguinis contrahit, ita hæc debitum illius circulum retardat, & ordinarias secretiones atque excretiones impedit.
3. Hæ retentæ impuritates, quando commotionibus vehementibus vel animi vel corporis exagitantur, & in orgasticam ac halituosam quasi subtilitatem resoluuntur, ansam præbent nostræ, de qua loquimur, continuæ.
4. *Causa efficiens* autem est ipsa natura, quæ per motus hostice febriles materiam illam subtilem & orgasticam ex humoribus separare, & per conuenientia excretoria loca eliminare intendit; ne putridam corruptionem, quam celeri cursu alias producit, subire possit.
5. *Causæ occasionales* sunt

- 1) Immoderatæ corporis commotiones & exastuationes.
- 2) Repentinæ sudorum prægressorum repressiones.
- 3) Abusus spirituosorum.
- 4) Iracundia.

VI. PROGNOISIS.

1. Quo magis plethora peccat, eo difficilius negotium succedit: hac enim ratione duplex labor naturæ obiicitur, & *continens simplex* facile mutatur in *compositam*, qua primario quidem correctio qualitatis, secundario autem imminutio quantitatis respicitur.
2. Vnde non raro euenit, vt die quarto vel septimo narium hæmorrhagia erumpat, vel, si hæc non succedat, motus hi hæmorrhagici deliria concitent.
3. Signa coctionis in vrina, & sudor in cuiusuis paroxysmi remissione placide succedens optimam spem promittunt. Quarto enim die quando adparent, febris septimo die ordinarie soluitur; sin secus, ad vndecimum vel decimum quartum diem.
4. Quando autem coctionis signa neque septimo die adparent, & hac ratione prima periodus nihil vtilitatis & leuaminis attulit, cum natura laborem febrilem de nouo quidem adgredi solet, quoniam autem præcedentibus diebus & conflictionibus hosti nihil detrahere potuit, sub initium secundæ periodi animum facile abiicere solet. Vnde *nonus* dies periculosus esse in acutis deprehenditur.
5. Vomitus, sub initium morbi erumpens, non est reformidandus.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Primis diebus, quibus natura materiam peccantem præparat, & ex nexu, quem cum massa sanguinea habet internum, liberat, resoluit, inuoluit & facultatem nocendi quodam modo infringit, Medicus, qui minister est naturæ, laborem hunc salutarem imitetur, & in eundem finem remedia præparantia, nempe abstergentia, inuoluentia, & temperantia propinet, e.g.

Rec. Ocul. cancr. citrat,

Con-

Conchar. præparat.

Nitr. depurat. ana drachm. I.

Antim. diaphoret.

Arcan. duplicat. ana scrup. II.


M. d. in 12 partes, & harum quatuor per 24 horas, interpositis diluentibus, exhibeantur.

2. Correcta hac ratione materia, uti ab ipsa natura circa & post quartum circiter diem per diaphoresin & diuresin solet expelli, ita Medicus hunc quoque scopum remediis suis respiciat, & placida diaphoretico-diuretica præscribat, ita tamen, ut sub ἀκμῆ paroxysmorum pulveres modo præscriptos, in remissionibus autem essentiam alexiph. temperatam, vel in sensibilibus decoctum aliquod diaphoret. aut potionem diaphoreticam propinet. Materia enim licet *correcta* audiatur, cum natura tamen in gratiam redire nequit, sed eum in finem præparatur, ut commode & innoxie excerni possit.
3. Reliqua sub *cautelis* dicentur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Ordo, quem natura in his & aliis febribus observat, manifesto nos docet, quam nocentes, & naturæ methodo contrariæ sint *heroicæ* illæ curationes, quæ sub initium febrium *purgando, vomendo, sudando* &c. instituuntur.
2. Hic enim Medicus internus therapiam suam cum excretionibus minime inchoat, sed prioribus diebus efficaciore sanguinis transitu per partes porosas operam navat, ut materia peccans ab intima illa cohæsiōne, quam cum massa sanguinea habet, prius liberetur, abstergatur & ad evacuationem apta reddatur. Deinde reliquis diebus hanc præparatam materiam per paroxysmos paulatim eliminat.
3. Huic absterfioni & segregatiōni egregie inseruit restrictio humorum ad viscera colatoria. Hæc enim uti exterioribus partibus stricturam & horripilationem, ita interioribus necessariam relaxationem & aperturam conciliat, ut, quidquid alieni in illis hæret, abstergi possit.

4. Quando plethora insignis naturam adgrauat, & necessarias secretiones atque excretiones impedit, tum *venesectio*, primis morbi principiis instituta, non reiicitur; præcipue si consuetudo huius euacuationis, tempus opportunum & orgasmus sanguinis adint. *Conf. tab. chirurg. de vena sectione.*
5. Caueatur, ne *vomitus* vel *alui fluxus*, qui sub initium huius morbi læpius contingunt, inepte supprimantur. Natura enim has primarum regionum impuritates eum in finem eliminat, ne succellum abiteriuium & secretorium impediunt. Conuenit itaque naturæ intentionem per digestiua & præparantia promouere.
6. Quando autem hi motus excretorii omnino *excedere* videntur, *cortex cascarilla* vsui esse potest.
7. Quæ prioribus tabulis de *calidis alexipharmacis*, item de *regimine sudorifero coacto*, & de *opiatiss* passim monuimus, illa & hic obseruanda commendamus.
8. Tranquilla corporis continentia quam maxime commendatur: promouet enim placidam transpirationem & vniuerso febris succellui adfert vtilitatem.



TABVLA LX.

DE

FEBRIBVS SECVNDARIIS

VVLGO

SYMPTOMATICIS.

I. DEFINITIO.

Febres secundariæ sunt febrium species, ad indolem modo *continuarum*, modo *chronicarum* accedentes, quæ aliis corporis fonticis læsionibus eum in finem superueniunt, vt materialis noxa superetur, & immensum periculum auertatur.

II. DIF.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres *secundaria* a *primariis* seu *idiopathicis* sequente ratione differunt:

- 1) *Primaria* propriam suam habent indolem & causas directas; præter ea tam ordine, quam gravitate, primæ sunt: *secundaria* autem aliis morbis iunguntur, qui proprium suum esse habent & constituunt, & qui aliquando, præcipue sub initium sui, sine febre existere solent, e. g. *inflammatio* contenta esse potest motibus suis *particularibus* sine *uniuersali febrili* sanguinis commotione; item *ulcus pulmonum* sine febre hæctica diu esse potest. Immo manent morbi primarii id, quod sunt, sub ipsa etiam febre, e. g. *ulcus* manet *ulcus*, quidquid agat febris concursans. Paucis: *secundaria* causas habent *indirectas*, & ordine re vera sunt *secunda*, illi autem, quibus accedunt, morbi *sine febre* esse & res suas *sub febre* seorsim habere possunt & solent.
- 2) *Primaria* ordinatis magis progressibus & successibus innituntur, ambitum vniuersum & typum longe constantius & exquisitius seruant, quam *secundaria*; quæ quidem interdum etiam typicæ videntur, hunc autem ordinem mox amittunt, & in varios, inordinatos atque inæquales successus euagantur.
- 3) *Secundaria* habent quidem respectum & efficaciam utilitatis & quodam modo necessitatis, tam absolutam autem necessitatem non inferunt, neque tam exquisitam proportionem efficaciam habent, quam *primaria*. Materia enim peccans, propter quam hæc primariæ fiunt, *in humoribus adhuc simpliciter oberrat*. Hinc non superueniunt *noxe non orta sed oriunda*. Vnde materiam talem mobilem in ordinem facilius cogere, & per ordinatos typos superare possunt.
- 4) Morbi illi, quibus *secundaria* febres accedunt, propriis interdum methodis & remediis infringuntur: ex
con-

contrario illæ materiæ peccantes, quæ febres *primarias* possunt & fouent, alio motu ex corpore non possunt præscribi. quam vere febrili.

- 5) Per *primarias* febres excernuntur quidem etiam noxiæ materiæ, sed hæc ita comparatæ sunt, ut per, & ex se, proprium schema, aut peculiarem morbum nondum forment. *Conf. num. 3.*
2. *Secundaria* febres vulgo etiam *symptomata*, sed minus commode, vocantur, ob sequentes rationes:
 - 1) *Symptomatis* nomen in schola medica vulgo designat rem, quæ alteri cuidam accedit ex *necessitate physica*, qua v. g. læsiones *actionum* sequuntur læsam *partem*: sed febres *secundariae* ex physica necessitate, aut essentiali & propria ratione primariorum morborum non obtingunt. Potest enim & sapissime solet e. g. inflammatio sine successu febris iâlua essentia sua propriam suam sphaeram absolueret.
 - 2) Porro symptomata sunt accidentia quæcumque, licet primario morbo nec necessario nec directo vinculo adnexa; febres autem *secundariae* ab indole illorum adfectuum, quibus accedunt, non sunt alienæ, sed rationali nexu cum illis coniunctæ.
 - 3) Denique per symptomata specialissime subaudiunt talia accidentia, quæ malo primario noxam potius & damnum, quam auxilium & leuamen adferunt; febres autem secundariæ contrario modo se habent: sunt enim confectarium moralis utilitatis & necessitatis.
 - 4) Ceterum si differentia illa, quæ est inter symptomata *actiua* & *passiua*, a schola medica magis recepta esset, nulla difficultas *symptomata* febris denominationem premeret. *Conf. different. tab. 1.*

III. SIGNA.

1. Hæc cum signis reliquarum febrium generalibus, per omnia quidem conueniunt, hoc autem speciale habent signum diagnosticum, ut typum exquisitum non forment,

ment, vel si omnino typice quasi inuadant, accuratum tamen & ordinatum typum non seruent.

2. Quem ad modum enim materiae *qualitas* non est in potestate simplicis commotionis, ita & hæ accessoriae febres materiam male dispositam qualibuscumque motibus suis ita non possunt disponere, vt obsequium præstet, & certa mensura atque typo ordinato circumscribatur.

IV. SVBIECTA.

De his non habemus, quod specialiter dicamus. Occupare enim possunt febres secundariae omnes illos homines, qui primarios morbos, sub *caussis* indicatos, incurrunt.

V. CAUSSÆ.

Morbi primarii, qui febres secundarias adsciscere solent, sunt præcipue sequentes.

1. *Inflammationes*, præsertim partium internarum. His enim febres inflammatoriae accedunt, quæ pro partis inflammatae diuersitate nomina sortiuntur diuersa. Huc pertinent phrenitis, paraphrenitis, pleuritis, peripneumonia, hepatitis, & aliae febres inflammatoriae, inflammationis visceribus accedentes. Huc etiam referenda sunt grauiuscula vulnera & contusiones.
2. *Vlcerationes & scirrhi*, e. g. in pulmonibus, renibus &c. Vnde febres lentæ & hæcticae proueniunt.
3. *Impetuosæ, copiosæ & restagnatoriae humorum congestiones*, ad inflammationem aut vlcerationem tendentes. Huc pertinent rheumata arthritodea & vera arthritides in plethoricis, iisque sanguineis aut cholericis - sanguineis.
4. *Causa efficiens* febrium harum secundariarum est eadem, quæ primariarum: non enim dependent ab effectibus & læsionibus materialibus, quibus superueniunt, ex physico-mechanica necessitate, sed ab ipsa natura in salutarem finem suscipiuntur, non vt morbum foueant & augeant, sed potius eundem auertant.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Quando adfectus primarii constitutio nondum est inseparabilis, neque viarumabilitas fallit, febres secundariæ effectu & euentu saluberrimo efficaciam suam præstant.
2. Negandum autem non est, quod plus difficultatis & periculi inuoluant, quam quidem primariæ.
3. Quo magis secundariæ typum ordinatum & moderatum, quod autem rarum est, ostendunt, eo maior spes est felicitis successus. Ex contrario quando typos quidem habere videntur, impetuose autem, præmature & inordinate agunt, sinister euentus est metuendus.
4. Licet febres secundariæ præcipue inflammatoriæ malorum morum ex eo vulgo arguantur, quod nihil constantis, fidi & æqualiter vegeti exhibeant, longe tamen minor culpa in febres has, quam in adfectus ipsos rebelles & intractabiles, quibus superueniunt, conicienda est.
5. Multo minus ex dictis anomalicorum motuum circumstantiis hæc febres argui possunt *malignitatis*.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. Tractatio harum febrium non quidem recedit a methodo generali febrium reliquarum, notandum autem est, quod morbi primarii, quibus superueniunt, simul sint respiciendi & legitime tractandi: remoto enim antecedente, facile hic remouetur consequens.
2. Ceterum quoniam tabulis sequentibus plurimas secundariarum febrium species specialiter tractatæ sunt, & specialis earum methodus indicata est, necessarium non iudicamus, hoc quidem loco fusius hac de re dicere.

VIII. *CAVTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. Secundariæ febres ex utrolibet censu, acutarum nempe & chronicarum contingunt, motusque hi febriles egregie respondent conditioni illarum læsionum, quibus corrigendis & restaurandis superueniunt.
2. Nam febres illæ secundariæ, quæ inflammationibus accedunt, sunt schematis acuti, & quidem iustissima necessitatis

fitatis ratione. Stasis enim inflammatoria, vt vix vquam quartum diem præterit, quin corrumpi incipiat; ita necesse est, vt febris motibus acutis instruat, quo breui tempore desideratum effectum absoluere possit.

3. Ex contrario in illis febribus, quæ vlcerationibus accedunt, lentum schema sufficit: nihil enim hic aliud, quam præcautio & præoccupatio intenditur, videlicet ne loco serosæ corruptionis largior sanguinea admixtio & inflammatoriæ indolis accessio, quæ repentinam supurationem aut sphacelum adferat, introducat.
4. In illis febribus, quæ arthritico-podagricis adfectibus iunguntur, eadem harmonia & rationalis proportio obseruanda est, quem ad modum enim in his pathematibus spastica tantum adfunt stricturæ, quæ sanguinem ad certas corporis regiones ita restringunt, vt stasis forte inflammatoria sequi possit: ita motus febriles leuiores tantum a natura instituuntur, vt stasium euentus occupetur.
5. Quando autem repulsio fit ad interiora, *motuum* magis quam *materiarum* ratio habenda est. Quando enim hi motus spastici, in viscere quodam vitali administrati, sanguinis portionem, vt vt exiguam, in stasin inflammatoriam ibi deducunt, mox lentum febris schema in acutum commutatur.
6. Genius materiæ peccantis quoniam *ἀκρῶτος* est, & sensim procedentibus potius excretionibus, quam vnica eliminandi actione excuti potest, non conuenit, *criticas tentare commotiones*: Crisis enim non sequitur, sed tristitia consecutaria, nempe languores repentini, desperabunda actiuitatis omisio. Quo vehementior etiam fuit impetus, eo certior erit funestus euentus.
7. Non minus in hisce febribus nocent reliquæ *heroica* medicationes, videlicet *emetica*, *purgantia*, & quæ alia organum sanguinis excitare possunt.

TABVLA LXI.
DE
FEBRIBVS INFLAMMATORIIS
GENERATIM.

I. **D**EFINITIO.

Febres inflammatoriæ sunt species febrium continuarum secundariarum, quibus principium vitale stas in quamdam, quæ motui inflammatorio *particulari* cedere recusat, per motum *universalem* febrilem resolueret & discutere intendit.

II. **D**IFFERENTIA.

1. Febres inflammatoriæ accedunt
 - 1) modo inflammationibus *externis*; & hoc quidem rarius,
 - 2) modo inflammationibus *internis*, idque frequentius.
2. Pro diuersitate locorum & partium, in quibus stasis inflammatoria contingit, febres inflammatoriæ diuersa sortiuntur nomina, e.g.
 - 1) *Phrenitis* vocatur febris illa, quæ inflammatis meningibus accedit.
 - 2) *Paraphrenitis* diaphragmati inflammato superuenit.
 - 3) *Pleuritis* stas in pleura,
 - 4) *Peripneumonia* in pulmonibus discutere intendit.
 - 5) *Hepatitis* hepatis,
 - 6) *Splenitis* splenis stasi opponitur.
 - 7) *Nephritis* renibus inflammatis succurrit.
 - 8) *Lipyrria* vel allodes vocari solet febris illa, quæ ventriculo aut lieni inflammato superuenit, & internis partibus ardorem, externis autem frigus adfert. Vnde periculosior potius status quam melior fit, & intra paucos dies exitum suum nanciscitur lethalem. *Conf. different. tab. de inflammatione.*
 - 9) *Typhodes* dicitur, quando inflammatio erysipelacea vel hepa-

hepatis, vel ventriculi, vel vteri febrem prouocat quæ anxiis, frigidis & inutilibus sudoribus coniuncta est. Deriuatur a *τύφος*, fumus, seu res inanis fumo similis.

- 10) Quando autem febres *cholericæ* & *causodeæ*, quæ etiam ad inflammatorias pertinent, eius modi sudores inutiles exhibent, *elodes* & *hydrodes* vocantur.
- 11) *Lyngodes* seu *singultuosa* vocatur illa febris inflammatoria, quæ inflammationi vel diahragmatis vel ventriculi vel intestinorum superueniens, singultum habet complicatum, qui motus conuulsiuus funeste plurimum cedit. Deriuatur a *λύγξ*, singultus.
- 12) *Phricodes* seu *horrida* adpellatur febris, quando stasis inflammatoria ad suppurationem adpropinquans, insignibus horroribus coniuncta est. Deriuatur a *φριξην*, horror.

III. SIGNA.

1. Hæc cum signis februm continuarum conueniunt.
2. Nonnumquam autem parum frigoris præcedere obseruatur, & æstus, qui horripilationem excipit, mox ita increbescit, vt sub initium nescias, num ad continentium vel ad continuarum indolem eius modi febris inflammatoria referenda sit.
3. Quando membrum aliquod aëri leuiter tantum exponitur, horrore percelluntur ægri, simul ac autem illud obtegitur, æstum vehementem iterum persentiscunt.
4. Typum vel plane nullum, vel inconstantem hæc febres seruant, id quod ab inæquali successu & euentu ipsius inflammationis dependet. *Conf. tab. de febribus secundariis.*
5. Urina rutila & crassa circa & post quartum diem dimittere solet sedimentum roseo-pallidum, quod de lympha quidem attenuata & intermixto principio sulphureo-feroso testatur, pro vero autem pure falso a nonnullis habetur.
6. In iunioribus interdum narium hæmorrhagiæ concurrunt;

runt ; vel si sanguinis versus caput congestio exitum hæmorrhagicum non nanciscitur, deliria sequuntur.

7. Quando febris superficiali inflammationi accedit, dolor pulsans & lancinans in loco adfecto sentitur, si vero profundior est inflammatio, sensus quidem molestus, sed obtusus est.
8. Ceterum quo grauior status est, eo plures angores & inquietudines tacite quasi conspirant.

IV. SVBIECTA.

1. Quæ subiecta inflammationibus obnoxia sint, legi potest *tabula de inflammationibus generatim.*
1. Quibus autem febres accedant, ex causis subsequens elucescit.

V. CAVSSAE.

1. Quas causas *tabula de inflammationibus* posuimus, illas hic repetendas commendamus.
2. Non minus illa consideranda suademus, quæ præcedente *tabula de febribus secundariis* sub *causis* diximus.
3. Vnde liquet, quod febris inflammatoria intentionem salutarem habeat, & a natura *propter* inflammationem discutiendam instituat.
4. Hinc directum effectum *materialem* hic excludimus, & non tantum *nanias antiquas* de accensione caloris in corde per exhalationes, quæ ex parte aliqua, fomitem putredinis continente, ad cor transmittantur, prætermittimus, sed & recentiorum mutatam denominationem, nempe particulas acres, ex membris inflammatis ad cor delatas, reiicimus.
5. Notum enim est, quod *externis* inflammationibus longe rarius febris accedat, quam *internis*, licet communio sanguinis cum corde eadem sit ex partibus externis quam internis.
6. Itaque *formalem* rationem & respectum hic agnoscimus. Videlicet quem ad modum negotium inflammationis in partibus externis commodius & felicius succedit, quia
laxi-

laxioribus poris, maioribus vasis & vegetiore motu tonico instructæ sunt, ita febris concurtus raro necessarius est. In partibus autem internis si pulmones excipiamus, contrario modo res se habet, hepar enim, intestina &c. paruis arteriis, adeoque debili impulsu instructa sunt.

7. Ergo concludimus, quod febris inflammatoria sit actio, quæ negotii inflammatorii discussorii, & apospasmatum suppurascentium elisorii maiorem adhuc intensiorem inuoluat, & æque ac simplex motus inflammatorius a moralibus & finalibus respectibus, non autem a physico-mechanica necessitate dependeat.
8. Constantes illæ horripilationes, quæ in non nullis occurrunt, dependent a continua sanguinis ex superficie ad interiora restrictione. Vnde a leuissima etiam aëris accessione subinde exquisitiore sensu adficiuntur.
9. Causæ *occasionales* tabula de inflammationibus exhibentur. Notandum autem est, quod *simplex spissitudo* sanguinis stases inflammatorias prouocare non solet, sed immoderata hæmorrhagicæ congestiones & restrictiones humorum.
10. Huc in primis etiam pertinet repentina illa partium restrictio & sanguinis inclusio, quam immoderata refrigeratio corporis exæstuantis accelerat.

VI. PROGNOSIS.

1. Quem ad modum tam inflammationis, quam concursantis febris primarius scopus est resolutio & discussio staseos, ita, si hic obtinetur, vniuersum negotium salutariter succedit.
2. Quando autem resolutio & discussio staseos fieri non potest, status est conclamatus. Interni enim abtæcellus non possunt emundari, hinc vlcus ad minimum immedicabile cum febre hectica subnascitur.
3. Maxime funestæ indolis sunt primarii illi morbi inflammatorii, quibus febres superueniunt, & quo nobilior est viscus, quod inflammatione obsessum, eo periculosior

fior status, & eo difficilius febris felicem sortitur euentum.


4. Quo impetuosius procedunt hæ febres, eo minus salutarem finem attingunt.
5. Dubii euentus est harum febrium status, quando materia peccans, putrida corruptelæ iam proxima, ex partibus interioribus ad exteriores proiicitur, ibique abscessum, latiore sensu sumtum, format. Hæ enim abscessiones talis nonnunquam sunt indolis, vt neque in totum ex interioribus ad exteriora loca transferantur, neque felicem maturationem admittant.
6. Si vero neque simplex & salutaris staseos discussio, neque translatio in partem quamdam ignobilem obtinetur, pars nobilis, quæ adfecta est, corrumpitur, & decumbens a primario morbo interficitur. Vnde secundarius, qui febris est, salutem adferre nequit.
7. Difficilis autem successus potior ratio in eo fundata est, quod inflammationes cum febribus exquisite non quadrent, sed indolem plane diuersam habeant. Sunt enim particulares tantum commotiones: vnde manifestum est, quod vniuersalis commotio, quæ febris est, locum & efficaciam *directe* hic minime tueri possit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Motus febriles, qui staseos inflammatoriæ discussionem respiciunt, prudente ratione subleuandi sunt.
2. In hunc finem ante meridiem bis de essentia alexipharmaca *Stablii*, post meridiem autem aliquot pulueres febriles exhibeantur.
3. Aluus aperta seruetur.
4. Externa, quando loci adfecti conditio concedit, non negligantur.
5. Præter ea ante meridiem potionibus acidulatis, post autem meridiem emulsionibus dilutis febricitans reficiatur.
6. Specialia specialibus tabulis reseruantur.

VIII. CAUSE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Ad solemnem illam questionem, num *vena sectio* in morbis inflammatoriis & febribus, iisdem accedentibus, necessaria vel utilis sit, in diuersis iam locis, responsionem dedimus, præcipue *tab. medic. de inflammationibus generatim*, & *tab. chirurg. de vena sectioe*.
2. Quo insignior est plethora, eo certius congestiones hæmorrhagicæ versus caput instituuntur, & quando sanguinis excretio non subsequitur, vehementes vasorum oppletiones deliria producant.
3. Euenit nonnumquam, vt stasis inflammatoria circa ventriculum, vel in liene in corruptionem abeat, & putridis quidem per vomitum reiectionibus ansam præbeat, salutaris autem effectus, quem natura intendit, nullo modo obtineatur.



TABVLA LXII.

DE

FEBRIBVS BILIOSIS,

NEMPE

FEBRE CHOLERICA ET CAUSO.

I. DEFINITIO.

Febres biliosæ sunt species febrium acutarum, continuarum, secundariarum, originem ducentes a commotione bilis, præcipue effusoria, tempore quo cibi in ventriculo & intestinis fermentescentes reperiuntur. ≡ ≡ ≡

II. DIFFERENTIA.

1. *Causus* differt a febre *cholericæ* duobus præcipue signis pathognomonicis.
 - 1) *Gradu*: *causus* enim multo acerbior & periculosior est, quam febris *cholericæ*.

- 2) *Excretionibus*: in cholericâ febre excretiones biliolæ modo per vomitum, modo per diarrhœam, modo ἄνω & κάτω simul obueniunt, in caufa autem materia illa noxia conclusa potius detinetur. Reliquæ differentia ex signis subsequētib; elucescent. Taceamus, quod *symptomata* in caufa sūt grauiora, quam in febre cholericâ.
2. Antiqui ad febres biliolas etiam tertianam intermittētem & continuam referebant; illam quidem sine ratione, hanc autem non sine omni fundamento: nam bilis, circa primas vias collecta, pro materiali, licet accidentali, eius causa habenda est.
3. Differt tamen biliola nostra tertiana continua in eo, quod illa quotidie exacerbationes paroxysmorum, hæc autem post vnius diei interuallum, & stas magis horis, eandem habeat.
4. Ad differentiam magis nominalem quam realem pertinet, quod, si materia, in caufa conclusa, ventriculo, duodeno, vel simæ hepatis parti inflammationem iam induxerit, febris *leypria* a λείπωμαι, & πῦρ, vel *affodes*, ab ἀσπάζομαι, nauseo, & εἶδⓄ forma vocetur.
5. Differt febris cholericâ a diarrhœa cholera simplice, cholera humida dicta, vbi nulla febris adest, & biliola tantum saburra excernitur; quamquam negari nequeat, quod, si negotium huius excretionis impeditius succedat, febris facile accedere possit. *Vid. tabul. de diarrhœa.*

III. SFGNA.

1. Generalia.

- 1) Anxietas notabilis, & plus minus distincta cardialgica pathemata, scilicet angustia & ardor circa præcordia.
- 2) Æstus quam maximus, præcipue oris interni & faucium cum siti intolerabili.
- 3) Vertiginosa capitis afflictio.
- 4) Agrypnia fere continua, aut sub leui somno anxietatis phantasia, morus artuum pauidi, & semiconuulsiui.

5) Ani-

- 5) Animi impatientia, taciturnitas, fastidium, indignatio, mentis aberrationes, & ad deliria furiosa procliuitas.
- 6) Accedunt sæpius prunellodes faucium, & linguæ ardores, ficcitas etiam harum partium ad filluras vsque increbescens.
- 7) Icterodes oculorum, vel totius cutis decolorationes non raro superueniunt.
- 8) Quo magis hæc febres insolescunt, eo frequentius horripilationes post leuissimam refrigerationem oriuntur, madores etiam roridi, anxii, & quasi perpetui, sub exigua autem membrorum denudatione statim frigidi obseruantur.

2. *Specialia*

- 1) Febris *cholericæ*, strictè dictæ:
 - a) Languor vniuersi corporis, ardor & angustia circa præcordia, cum siti immodica.
 - b) Hæc pathemata præcedit, vel illa sequitur vehemens, horrida refrigeratio corporis, quam excipit æstus grauissimus, & eximius capitis dolor.
 - c) Pathemata hæc circa præcordia, nili intra vnum vel alterum diem dissoluantur, quod tamen post insignè frigus raro contingit, tum notabiliter auferunt, & erumpunt denique in conatus & actus vomendi.
 - d) Euomunt materiam causticam, biliosam, fauces adrodentem, excoriantem, raucedinem inducentem, dentes stupefacientem, & cum pavimento calcario aut nuda terra effruelcentem.
 - e) Hæc excretio vehementes spasmos tarp circa ventriculum, quam exquisitos lancinatorios torminosos dolores in abdomine habet coniunctos.
 - f) Vomitus hic nisi perquam mature superueniat, & hanc materiam statim eliminat, tum concurrat plerumque diarrhœa biliosa, & tenesmodes irritatio, ad ani vsque erosionem.

- g) Cardialgica & syncoptica fit hæc febris, quando conatus, varie intensi, parum aut ægre aliquid eliminant, magisque ad superiora quam inferiora tendunt.
- h) Perpetua inquietudo corporis, & virium debilitas.
- i) Pulsus est celer & frequens, sæpius autem paruus.
- k) In externis partibus, præcipue in fronte sudores frigidi proueniunt.
- 2) Febris *ardentis* seu *causi*.
- a) Prælibauimus generalia, videlicet anxietatem, ardorem præcordiorum, horrorem insignem, cum infequente æstu vehemente, & capitis doloribus.
- b) Sitis in causa longe maior & inexplebilis est, hinc *clamosa* dicta; cui si ægri largis, & insuper frigidis, haustibus subuenire velint, cardialgico-lipothymica mala superueniunt.
- c) Aluus sicca & fere adstricta est, nulla quoque ad vomitum propensio obseruatur.
- d) Vrina subrufa, interdum plane flammea, pauca, crassa, post moram turbida, rosea cum sedimento eiusdem coloris, & non ita raro cum flauedine mixta.
- e) Adest interdum verus circa præcordia dolor, immo vrens ardor adeo exquisite, vt ne attractum quidem huius regionis ægri perferre queant, & non nunquam versus dorsum, immo per totum corporis habitum extenditur.
- f) Respiratio est ita difficilis & laboriosa, vt non nunquam ore aperto fieri debeat, & halitus egrediens est ad modum calidus.
- g) Aliquando anxius, vagus, inordinatus & frigidus sudor prorumpit, nihil autem leuaminis adfert, sed funestus euentus indicium est.
- h) Præualente morbi impetu, succedunt cardialgiæ graues syncopticæ, deliria, conuulsiones.

IV. SVBIECTA.

1. Generatim sunt homines calidioris genii, ante, sub, vel post

- post ciborum adsumptionem ira commoti, quando mox ingerunt potum frigidum, sacuiennum, cereuisiarium, spirituosum, cibos dulces ad modum & fermentescentes, mellita, fructus fugaces hortenses, vel etiam illo tempore repentinæ refrigerationi se exponunt.
2. Speciatim febris *cholericæ* inuadit magis cholericos, & cholericos-sanguineos, diætæ acriori & calidæ deditos, vino abutentes, statim ante vel post cibum adsumtum irascendi occasionem nactos.
 3. *Causus* autem sæpius adfligit cholericis-melancholicis, aut sanguineo-melancholicis, qui ad iram satis quidem proclives sunt, sed illam dissimulare solent, & præter ea ad siccitatem atque inclinant.
 4. Adulti præ iunioribus.
 5. Feminae magis quam viri.

V. CAUSÆ.

1. Causa *antecedens remota* est bilis excrementitiæ copia.
2. Causa *antecedens propior* est effusio bilis in intestinum duodenum copiosa & impetuosa; præcipue illo tempore, quo cibi & potus fermentescentes in ventriculo & intestinis præsto sunt.
3. Causa *materialis proxima* est acrimonia penetrantissima, acido-corrosiua, ex eius modi copiosæ bilis cum cibis acescentibus fermentatione prognata, quæ, intestinum & ventriculum adrodendo, ac inflammando, humores lymphales circa hæc loca in tenacem spissitudinem coagulando, prouocat reliquorum humorum directionem & adfusionem ad loca periclitantia, vt materia illa rebellis & noxia resoluatur & per viscerum horum varias motitationes exprimat.
4. Motus humorum & partium auctior, a natura tamquam causa efficiente eum in finem instituitur, vt talis materia resoluatur & eliminetur.
5. A motu humorum auctiore dependet pulsus celer, frequens, & caloris incrementum.
6. A partium autem motu, excussionem respiciente, nascuntur

cur prestorii, palpitatorii, angustantes & spastici effectus, tum intus circa præcordia, ventriculum & intestina, tum ex:us circa peripheriam per contentum.

7. Causa *procatarctica* est, quidquid *excussionem*, vel simplicem *adfusionem* bilis, in intestinum duodenum concitare potest.
 - 1) *Excussionis* causa præcipua est iracundia.
 - 2) *Adfusionis* autem causæ sunt edulia fermentescentia, potus eiusdem indolis, & reliqua in subiectis iam nominata; quibus autem *saccharum* iniuria adcenetur.
 - 3) Huc etiam referri possunt venena, purgantia drastica, corrosiva, propinata; item
 - 4) Decubitus humorum vitiosorum ad ventriculum.
 - 5) Denique refrigeratio corpori calenti admissa, in primis si pedes aquæ frigidæ immerguntur.

VI. PROGNOSIS.

1. Febres biliosæ, maxime *causæ*, periculo non carent, in primis si iam per aliquot dies inualuerint. Hinc *Hippocrates libr. II. de morbis*, causam febrem *lethiferam* appellat.
2. Nisi remedia, ad modum conuenientia, accedant, hæ febres difficulter bonum finem attingunt, & sic ad paucos illos adfectus possunt referri, in quibus autocratia naturæ arti aliquo modo cedere cogitur.
3. Perturbata naturæ deliberatio, hæsitatio & fluctuatio primaria causa est, quod febres hæ sæpius tam periculose decurrant, dum motus non tempestive suscipit, nec constanter protequitur.
4. Optimæ terminationis sunt, si materia matre & copiose sursum eiiciatur. Quo magis autem ad inferiora tendit, eo manifestior & fortior concurret motus febrilis.
5. Si vero materiæ biliosæ sub variis conatibus exigua tantum portio, & hæc ægre quidem excernitur, magisque ad superiora tendit, facile cardialgia syncoptica, & singultus superueniunt.
6. Motus enim ancipites & ricubantes, quando citra sufficientem

entem excretionem contingunt, tum materia, intus conclusa & agitata, internas inflammationes erysipelaceo-ulcerosas, vel sphacelosas superficiales, intestini duodeni, pancreatis, hepatis, mesenterii, diaphragmatis, pessimi & plerumque funesti euentus arcessit.

7. Et licet tandem versus dies criticos materia in *causa* euacuetur, non facile tamen pessimus *effectus*, qui ab illa inductus est, tollitur: Vnde iam *Hippocrates* obseruauit, quod in hac valde acuta febre funestum esse soleat, si quinto vel sexto die biliosa varii tetri coloris materia reiiciatur.
8. Vbi autem vomitus multæ bilis, modò non male coloratæ, sine diarrhœa, procedit, ibi minoris periculi adfectus censendus est.
9. Sic etiam aluis sicca, præcipue in *statu*, semper periculosior est, quam nimia illius solutio.
10. Hæ febres, in primis cholericæ mitior, si per præcipitantia, stomachica, acida, leuiter mitigatæ fuerint, transeunt facile in lentas, cum maiore virium & appetitus decremento, somno paucò, siti multa, adpectu inter audacem & meticulosum fluctuante; quæ tandem in hecticam transmigrant. In his enim circumstantiis *adrosio ventriculi*, intestini *duodeni* vel partis cuiusdam vicinæ facta est.
11. Hæc, quando pro phthisi reputata, traumaticis tractatur, fit inmedicabilis apud sicciore, in tumidis autem subiectis sequuntur ascitici tumores, & œdemata inferne, superne vero tabes exoritur.
12. Quo magis delirium in biliosis hisce febribus adest, & continuat, eo periculosior est morbus.
13. Dolores & ardores, si repente cessant, æstuique frigus succedat, inualecente virium deiectione, angustis, anxietatibus lipothymicis, sphaceli insecuti haud obscura indicia adsunt.
14. Febres ardentes summe sensibiles reddunt agros, vt deinde

- inde post lenissimas mentis commotiones, præsertim circa annum recursum, recidiuæ facile obnoxii fiant.
15. Cholericam febrem excipit nonnumquam vel cœliaca passio, vel pro temporis ratione dysenteria.
 16. Horror externus, sudor frigidus, cum vnguium liuore & singultu, veram inflammationem & mortem mox securam indicant.
 17. Cholera in principiis morborum malignorum eueniens, funesti non raro est euentus.
 18. Vrina nigra, tenuis & pauca, vt & alui siccitas in *causo* signa sunt lethifera.
 19. Quo magis angustia circa præcordia vrgent in *causo*, eo periculosior est status.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Medela harum febrium in eo consistit, vt caustica & corrodens materia siue *euacuetur*, siue *corrigatur*, & proxime illata *adrosio*, atque inde contractus *ardor*, *mitigetur* & *abstergatur*.
2. Quas difficultates autem *materia euacuatio* inuoluat, sub *causelis* indicabitur. Et sic *correctio* primarium momentum absoluit.
3. Hinc, ad materiam acrem causticam obtundendam & corrigendam, omnis neruus intendatur. In hunc finem conducunt:
 - 1) *Temperantia nitrosa*, e.g. nitrum depuratum, & quod penetrantius operatur, regeneratum, crysell. mont. præparat. lap. prunellæ.
 - 2) *Acida*: iuccus citri, sirup. acetosit. citri, berber. ceras. acid. cydon.
 - 3) *Absorbentia ostracea*, e.g. conch. præparat. mater perlarum præparata, oc. cancri.
 - 4) *Mucilaginosæ*, e.g. C.C. citrat. iuscula pullorum tenuia, iulapia acidulata, ptisana, sirupus rosarum solutiuis.
 - 5) *Diluentia*, e.g. dicta iuscula, emulsiones diluta, ex femine card. Mariæ parata, & exiguis haustibus tepide adsumta.

4. Aluus si sicca & adstricta manet, modeste aperienda
 - 1) Vel per *clysteres* oleosos cum sale.
 - 2) Vel per lenissima *laxantia* rhabarbarina.
5. Motuum febrilium, inflammationis *discussionem* respicientium, ratio habeatur
 - 1) *Interne* per excretionem diaphnoico-diureticam. Huic scopo inferuiunt
 - a) Mixture simplex bene preparata, essent. alexipharmaca *Stahlii*, cum pauca portione essentiae millefolii mixta, & refractis, sed repetitis, dosibus propinata.
 - b) Subiunctis vbiq; pulueribus nitroso-absorbentibus.
 - 2) *Externe* per spiritum vini camphoratum, regioni scrobiculi impositum.
6. Factae *adrosionis restauratio* hic quidem naturæ potissimum incumbit, totum tamen negotium illi soli non est relinquendum, sed potius per *clysteres* ex lacte, vitello ouorum, seuo ceruino, ante omnia autem ex scordio paratos, succurrendum.
7. Vltimo loco, tonica, corallata & gemmata vsui sunt, item analeptica ex aquis odoratis, nec non mixtura tonico-neruina *Stahlii*, tinctura martis *Ludouici*.
8. His scopis, præcipue *correctioni*, si satis factum est, non opus erit *refrenatione* vomitus vel diarrhœæ, cui triuialis praxis tantopere inhiat, impetus enim sponte solet cessare.
9. Quod si vero, subacta materia, omnino necessarium videtur, impetuoso vomendi & purgandi conatui aliquid opponere, fieri hoc potest per lenientia, e. g. theriacam, puluerem cascarillæ gr. X. ad Xij. exhibitum, vel per illius essentiam ad gutt. XX. aut essent. millefolii cum essent. alexipharm. sociatam, propinandam.
10. Multo minus opus erit in *caso emetico-cathartica*, vt vulgo moris est, adhibere. Quædamna inde proueniant, sub *cautelis* indicabimus. Ceterum prudentiæ Medici

relinquitur, num statim sub initium morbi, noxiam materiam per vomitum excernere, circumstantiæ concedant.

11. Quando autem *drastica* purgantia ab aliis iam fuerunt adhibita, tum *theriacalia*, nec non alia *opiata correctæ* conducunt.
12. Ad motus nimios sistendos nitrum omnibus aliis palmam præripit, dum necessariam excretionem promouet, excedentem vero mitigat. Conueniunt etiam spec. de hyacinth. corall. rubr. præparat. MP. de cynogl. theriac. coelestis, cortex cascarilla.
13. Denique, morbo superato, commendetur moderatus ciborum usus, ne ventriculus de nouo oneretur, &, ad reliquias impuritatis biliosæ abstergendas, propinetur lene laxans, e. g. ex rhabarb. vel sale Anglicano.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Hæ febres quum constantem typum non exhibeant (nisi quod circa meridiem in aliis exacerbationes oriantur, in aliis autem tertianarium quid referant, vt veteres per *hemitritæi* vocem monuerunt) cauendum maximopere est, ne medicationis ordo paroxysmorum intentioni repugnet, neque calidiora circa horum initium offerantur.
2. *Calida* enim febres biliosas mutant in inflammatorias; *adstringentia*, *anodyna* & *cruda terrea*, in lentas, *frigida*, *mu- cida*, in intermittentes.
3. Hinc ab omni importuna humorum commotione abstinendum, nempe
 - 1) A *diaphoreticis* & regimine sub initium: nam materia biliosa longe lateque in sanguinem diffunditur, & licet tenuis sit, sudori tamen non obedit. Hinc rheumatismos, & ictericas decolorationes ad minimum importat. Sufficit in declinatione vdor & regimen tantum diapnoicum, transpirationi non aduersum, per potum tepidum conseruandum, quod tanto magis locum habet, si critieus sudor accedit.

2) A


- 2) *Avena sectione*: licet enim per initia instituaturs, vsum tamen nullum, nisi in vehementer plethoricis, iisque huic euacuationi aduersis, exhibet. Secta autem vena extra has circumstantias, circa dies indicatorios & criticos, raptum humorum ad caput inducit, cum deliriis & faucium inflammatione.
4. Quod ad *euacuationem emeticam & catharticam* attinet, circumspectio summa requiritur, vt cum vtilitate, & quidem sub initium, adhibeatur: corruptio enim acida in horas augmenta sumit, & in statu vigente nulla excretio, nisi placidissima per *clysteres*, locum habet.
5. Si euacuatio illa suscipitur, simulatque bilis in intestinum duodenum effusa est, tum salutarem potest edere effectum.
6. Quando autem agri artis subsidium sero quaerunt, nemo peritus suadebit, materiam, mora temporis corruptam, & acrem causticam factam, ad euacuationem commouere.
7. Materia enim hac caustica, in primis si deorsum per intestina tenuia turbetur, vias longe lateque adgreditur, & per longitudinem illorum iisdem sese illinit, & sic excretionem frustratur. Praeter ea status pylori, ventriculi & intestini duodeni iam talis est, vt importunioribus stricturis, emetico-cólico-catharticis illa excretio minime tentari possit, sine inflammationis & ardoris exacerbatione.
8. Antiqui Medici religioni sibi ducebant, leuissimum stimulum in cholericis commotionibus incipientibus adhibere, memores, materiam iam commotam, & motibus excitandis aptissimam, freno potius egere, quam stimulo.
9. Hac consideratio tanto magis valet, si perpendimus, quod omnia vomitoria ventriculum laedendo, adrodendo, & subtili σήψει adficiendo, vomitoriam euacuationem proritent. Hinc circumspetione opus est, num ali-

- quid vterius tum addendum sit, quando acris materia caustica per se hoc viscus iam obsidet.
10. Non opus etiam est, methodum hanc ambiguam, difficilem & periculosam eligere, quia ars hic amplius quid potest, quam natura, nempe qualitatem materiae pessimam inuertere, corrigere, eneruare citra partium exagitationem, immo partes ipsas consolari, demulcere, ardorem temperare, & acrimoniam abstergere.
 11. Experientia profecto docebit, quod nitrosa cum absorbentibus iuncta, materiam obtundendo & disponendo, tantum emolumentum praestent, vt ita mitigatam, & motui idoneam redditam, natura deinde absque stimulo eandem sponte eiiciat.
 12. Inter ea tamen aliud debet solui: si enim obstructioni pertinaci mature non succurritur, vel per incondita medicamenta illa tractatur, facile corruptiones sphacelosa in subiectis plethoricis oriuntur.
 13. Scriptores medii aevi & proximorum seculorum adseuerant, *cholera morbum sine febre fieri*, & tamen aegrum vnus vel alterius diei spatio interimere posse. Sed non obseruarunt, quod talis cholera horridis frigoribus aegros exagitet, cum angoribus grauissimis, vt aestui (a quo eminenter febrem solent nominare) non detur locus, & illa congestio ad interiora inter ea inflammationem inducat.
 14. *Bilis flaua, vitellina, prasina, porracea, isatodes & aruginosa*, communem quidem habent malitiam, sed proprium eiusdem malitiae gradum.
 15. *Refrigerantia*, in inflammationibus vulgo commendata, corruptionem materiae inflammatoriae certissime post se relinquunt.
 16. Absint etiam *externa refrigerationes*, potus frigidus, item faeculentus, fermentescens, nauseosus, quae omnia anxietates flatulentas, singultuosas, & morus spasticos inferunt. Sic etiam ab inquietudine, quae familiaris harum febrium comes est, cauendum: nam facile lipothymiae inde eueniunt.

17. *Eccrisis icterica* circa dies *criticos* non impediatur, sed subiunctis lenissimis laxantibus soluatur.
18. In *cholericâ* febre ratione temporis, vius *nitri* indifferens est, in *causa* parcior & repetitus sit. Nam in tali statu alternatione continua, & iugi temperatione opus est, quia materia tenuius expansa, latius diffusa, & altius poris partium adreëtarum immerita vno impetu non inuerti, nec ardor vno icu auferrî potest.
19. *Inflammatio*, a *causa* inducta, cum longe periculosior sit illa *simpliciore*, quæ a *tenui sanguine*, in vasis ventriculi, duodeni stagnante, originem ducit, tanto circumspiciendus tractanda, & ab imminente spâcelo mature præmunierda est.
20. *Transitus in heëticam* colliquantibus & discutientibus prohibetur, vitando vbique semina frigida, quorum viscosa & lenta textura nausëam & spasmos anxios augere solet.
21. *Adstringentium* antifebrilium & *opiatorum* vsum intempestiuum protheiformia sequuntur schemata & pericula.
22. In *cholera simpliciore*, iam diutius persistente, ad inflammationem præuertendam & discutiendam, nitrosis additur gr. semis *camphoræ* pro dosi; in febre *ardente* vero vius illius internus suspectus est.
23. *Ad præcautionem* iracundis, & in iram præcipitibus suadetur, vt mox post commotionem sumant pulueris rhabbarbari, quantum cultri culpâ capit. Illi autem, qui magis sanguinei sunt, drachmas ij. oc. cancr. per vices sumant, e.g. intra duas horas. Hac enim ratione non numquam aliquot sedes flauî coloris, & croco quasi imbuta sequuntur.
24. *Crato crystallum montanam* pro biliosis malis atque diarrhæis infantum commendat, quod recentiores itidem faciunt. Sed obseruatores non fallit, quod concretamenta hæc crystallina, quæ ex stanni præsertim fodiinis erui solent, (*Druën*) non tan simplicem absorbentem, quam re vera stypticum effectum, scopo nostro contrarium, exerant.
25. *Celsus* de cholera, graui quidem morbo, per artem ta-

- men superando, magnifica elocutus est, sed ex paupia sui temporis vix tale instrumentum producere poterit, cuius beneficio hoc promissum in effectum deducere liceat.
26. *Hippocrates* etiam cum mulso suo & oxymelite acrimoniam biliosam non infringet: hæc enim per talia fermentescencia notabiliter potius augetur.
 27. Non tacenda est *methodus ipsius nature*, per ingentem *stim* sibi consulturæ: nam liquida, in primis simplicia ad acido-acrium materiarum dilutionem & proliuionem eximie conducunt; sed dolendum, quod nauseosa & vomibunda ventriculi subuersio non diu ferat, nec altius dimittat copiosã (in quibus neruus) liquida, quare salutare hoc cœptum non semper ex voto succedit.
 28. *Bilem* pro *balsamo* sanguinis habere, vel *alcalinam* ipsi indolem adscribere, magnas turbas in praxi excitauit. Non ad speculationes referenda, sed practica est quaestio, *num bilis sit alcali vel acidum*. Si enim alcalicæ esset indolis, frustra ei absorbentia & præcipitantia opponerentur. *Hippocrates* propius ferit scopum, & *ὀξύηλα δριμύτα* seu acidam acrimoniam accusat, & hæc in infantibus facis conspicua est, quando post iracundiam nutricis excrementa biliosa tam acria & caustica excernunt, vt posteriora excorient, & lintea, aquæ fortis instar, discerpant.
 29. Quod substantia ciborum acida seu acescens, cum tenui biliosa & sulphurea concurrens, tantam acrimoniam producere possit, ipsa *æconomica praxis* docet, e. g. ad *acetum* magis acidum obtinendum, *aromata* adiiciuntur, item, vt *brassica muriatica* tanto penetrantiorē adquirat acorem, *semina pingua oleosa* immiscentur.
 30. Sic etiam *mel*, multa oleosa substantia prægnans, aptum est, ad valde acres acscentes fermentationes, & cum bile confermentationes subeundas, & hinc colicas & inflammatorias *καυσώδεις* inducendas.
 31. Plus rationis vulgus habet, dicens: Dem Patienten ist die Galle

- Galle in den Magen getreten, quam Medici quidam, qui cerebrinis obstaculis potentiam & actum talis redundantia negant.
32. Febres *biliofa* nonnumquam cum febribus *petechizantibus*, & aliis acutis concurrunt. *Vid. tabula de febribus compositis.*
33. *Absorbentium* vsus rationi quidem & experientia respondet, illud autem obseruandum est, quod haec remedia acrimoniam tantum temperent, sed tenacitatem augeant, nec nocumento, partibus iam illato, moderamen adferant. Vnde illis solis non fidendum, sed *nitrum* addendum est. Huic enim praecipua & certissima in hoc morbo efficacia adscribitur, quoniam materiam acrem incrailat & febrem inuertit.
34. *Corporis & animi inquietudines* summo studio fugiantur.
35. Praeter febres malignas pestilentes, nulla ferme datur febris, in qua causa morbifera tam corrosiua indolis, quam in caulo existit.
36. Haec autem intercedit differentia, quod materia peccans in malignis in massa sanguinea haereat, adeoque facilius per excretiones periphericas remoueri possit, in caulo autem statim ventriculum cum reliquis partibus vicinis, ad vitam maxime necessariis, adgrediatur, adrodat, & inflammet. Viscerum autem laesiones, a quacumque causa inductae, maiorem considerationem inuoluunt, quam vicia humorum.



TABVLA LXIII.

DE

P H R E N I T I D E .

I. DEFINITIO.

Phrenitis est febris acuta, *secundaria*, discussioni staseos san-

sanguinis in meningibus cerebri destinata, & actus rationalis perturbatione potissimum conspicua. Deriuatur a *Φρην*, mens.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt *phrenitis* a *paraphrenitide*, in hac enim *diaphragmatis* inflammatio reperitur, & delirium ex consensu paris octavi neruorum prouenit; in illa autem *meninges* inflammatae sunt, & mentis alienatio, a cerebro, proxime adfecto, inducitur.
2. *Phrenitis in se* est vel
 - 1) *Idiopathica*, vbi febris & inflammatio vno tempore & opere concurrunt, quæ species ad modum raro contingit; vel
 - 2) *symptomata*, quæ in febribus acutis malignis ob incompletam sanguinis versus caput congestionem occurrit.
3. *Phrenitis* differt ab aliis deliriis malo hypochondriaco-hysterico superuenientibus. Licet enim deliria hypochondriaca in nonnullis tam vehementia sint, vt schema acutum primis hebdomadibus exhibeant, causa tamen non in meningibus, sed in abdomine quaerenda est. Præter ea phrenitici per sensus externos ad res extraneas ita non sunt attentis, vti quidem hypochondriaci, qui ad modum sensibiles obseruantur. Conf. *tabul. de mania & deliriis*.

III. SIGNA.

1. *Phrenitidis imminentis*
 - 1) Vigiliæ immodicæ & quasi continuæ.
 - 2) Somnus inquietus, & imaginibus repletus.
 - 3) Capitis, in primis occipitis & ceruicis, dolores acuti, perdurantes.
 - 4) Exiguum potus desiderium.
 - 5) Respiratio magna & rara, ex profundo pectore deprompta.
 - 6) Pulsus modo paruus, rarus, modo celer & frequens.
 - 7) Urinæ

- 7) Vrinæ suppressio.
- 8) Obliuio rerum ante factarum.
2. Phrenitidis *praesentis*
 - 1) Venæ capitis turgent, & tempora quasi saliunt.
 - 2) Oculi rigent, scintillant, toruo & truculento obtutu.
 - 3) Sermo delirus.
 - 4) Violentia in circumstantes, & laboriosum erumpendi conamen, non tam continuum, quam per paroxysmos recurrens.
 - 5) Lingua arida, aspera, citrina, nigra.
 - 6) Externa frigent.
 - 7) In iram adest pronitas.
 - 8) Dentium stridor.
 - 9) Vrina tenuis, alba, pellucida.
 - 10) Manuum tremores, quibus aliquid colligere velle videntur, & reuera colligunt linteamina vel alia integumenta.
 - 11) Reliqua symptomata cum febribus acutis habet communia.

IV. *SVBIECTA.*1. *Idiopathica.*

- 1) Homines temperamenti choleroico-sanguinei, & sanguineo-choleroici, ad incandesceniam animi proclues.
- 2) Diætæ calidæ, vinosæ & aromaticæ dediti.
- 3) Qui præter consuetudinem inter diurnos solis ardores veriantur.
- 4) Vel nimis vigiliis & lucubrationibus obnoxii sunt.
- 5) Quibus narium hæmorrhagia antea familiaris, emanfit.
- 6) Crebris cephalalgis vexati.
- 7) Quibus caput violenta ratione, e.g. ictu, contusione vulneratum est.
- 8) Qui venæ sectiones, in confiniis capitis celebrari solitas, neglexerunt.
- 9) Viri ex hæmorrhoidum ad caput translatione.
- 10) Feminae ex repentina mensium versus caput represione

2. *Symptomática.*

Hæc inuadit homines, febre acuta laborantes, ob incompletam criticam sanguinis versus caput congestionem, quam peruerfæ medicationes non parum promouent.

e. g.

- 1) Venæ sectio inepta, vel ad minimum intempestiua.
- 2) Remedia & regimina calida.
- 3) Excretio sudoris repressâ.

V. *CAVSÆ.*

Causfæ ex iis, quæ de *subiectis* diximus, facile sunt colligendæ, nempe

1. Causfâ *antecedens* est congestio sanguinis versus caput, exitum per nares quidem respiciens, sed eundem non inueniens.
2. Causfâ *continens & proxima* est stasis inflammatoria in meningibus.
3. Causfâ *efficiens* est conamen naturæ per motus febriles stasim hanc discutiendi, concurrentibus sub hoc conamine ancipiti variis mentis perturbationibus.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Phrenitis, siue idiopathica siue symptomática, periculo semper est plenissima.
2. Nisi enim ante quartum diem stasis discutiatur, *fideratio* seu sphacelus meningum facile succedit & furentem iugulat.
3. Extremam perniciem denotant:
 - 1) Continua & furiosa dementia cum vigiliis.
 - 2) Vrina aquosa.
 - 3) Deiectio albicans.
 - 4) Inuoluntaria alui & vrinæ excretio, vel perfectâ suppressio harum excretionum.
 - 5) Transitus in pathemata soporosa, vel in adfectus synopticos.
 - 6) Tremor, rigor, stridor dentium, conuulsiones, singultus.

7) Vox

- 7) Vox clangosa, lingua tremula & extremorum frigus.
 8) Subitanea cessatio doloris, cum tranquillitate adparente coniuncta.
2. Spem autem salutaris exitus faciunt:
- 1) Sudores critice superuenientes.
 - 2) Alui fluxus, præcipue morbo ad coctionem tendente.
 - 3) Larga narium hæmorrhagia.
 - 4) Parotides, seu tumores glandularum, post aures sitarum.
 - 5) Hæmorrhoides. *Conf. Forest. obseruat. lib. X.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Methodus generalis.*

- 1) *Orgasmus* sanguinis est temperandus; quod faciunt:
- a) Nitrosa, e.g. nitrum depurat. tabulatum.
 - b) Præcipitantia marina, acido saturata.
 - c) Diaphoretica fixa, e.g. antimon. diaphoret.
 - d) Cinnabarina.
 - e) *Acidula*, e.g. clyffus antimonii, spiritus vitrioli in potu, acetositas citri.
 - f) Sufficiens & dilutus potus, qui cum succo citri præcipue in sexu masculino, ad gratum acorem componitur. Théé, coffee, qui potus non adeo calide exhibendus est. Item loco ordinarii potus laudatur decoctum hordei passulatum, & acido succo citri gratius redditum.
- 2) *Stasis* in meningibus quantocyus est discutienda. In hunc finem laudantur:
- a) *Interne.*
 - α) Alexipharmaca temperata, e.g. mixtura simplex, essent. alexiph. *Stahl.*
 - β) Aquæ diapnoicæ cum præcipitantibus fixis.
 - γ) Emulsiones ex semine cardui Mariæ.
 - δ) Succus chærefolii.
 - b) *Externe.*
 - α) *Camphorata*, e.g. spiritus vini camphoratus, vertici, fronti, ceruicibus & temporibus adplicatus.

- β) *Vnguentum alabastrinum* camphoratum, cum aceto forti simpliciter, vel rosaceo, paratum.
- γ) *Epithemata* ex emulsionibus cum *nucleis persicorum* paratis, camphoratis, linteolis imbutis, fronti adligata, quæ prælentius discutunt. Item domesticum illud remedium ex cumino, baccis iuniperi, sale & pane,
- δ) *Cucupha ex radicibus*: valerian. irid. Florentin. rhod. cyper. rotund. bryon. *herbis*: verben. maioran. meliss. betonic. rut. origan. *floribus*: chamomill. sambuc. papauer. rhead. *seminibus*: carminat. *ligno* santal. citrin. cum *camphora*.
- ε) *Bufo* vertici adplicatus.
- 3) *Adfluxus* humorum est reuellendus. Faciunt hoc
- Clysteres* acres colocynthiaci.
 - Friktiones* pedum.
 - Vesicatoria* plantis pedum adplicata.
 - Cataplasmata* rubefacientia ex allio, ruta, lupulo, rad. pyreth. pipere, sinap. stercore columbino, fermento, semine nasturtii.
 - Scarificatio* narium, retro aures, vsus *hirudinum*, *vena sectio* in brachio &c. *Vid. cautel. 2.*
2. *Methodus specialis.*
- Delirantibus ægris si clyster quoquo modo non adeo incommode applicari possit; protinus id faciendum est, ut strictura versus caput solvatur, & ad inferiora reuocetur; sin secus, per nitrosa & potum largiorem alius expedienda est.
 - Deinde *venæ sectio* vel instituat, vel omittatur, secundum indicationes, sub *cautelis* commendatas.
 - Interne* propinentur
 - Alexipharmaca temperata. e. g. mixtura simplex leniter camphorata, vel essent. alexiph. *Stahlis*, & quidem circa tempus alicuius remissionis, wann sich der Patient etwas erträglicher befindet.
 - Per reliquum tempus exhibeantur, pulueres ex abfor-

forbente aliquo, acido citri saturato, antimon. diaphoret. nitro depurato, & pauca portione cinnabaris, parati: interpositis subinde emulsionibus, superius descriptis.


- c) Vbiq̄ue autem commendentur potus dilutus, sufficiens, acidulus, & regimen placidissimum ad lenem transpirationem.
- 4) *Externe*, in *incremento* morbi & versus *statum* adplicentur remedia modo commendata, e. g.
- a) Spiritus vini camphoratus, circa tempora & frontem.
- b) Frictiones, vesicatoria, cataplasmata rubefaciencia in plantis pedum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Vena sectio* in fronte, vel sub lingua, tamquam praesidium alias vsitatum, licet provide fiat, ambiguo tamen plane euentu instituitur: inuoluit enim haec duo grauia facile incommoda:
- 1) Sectio *raninarum*, non satis late facta, auget praesentissime, cum primis in statu plethorico, humorum versus caput congestionem.
- 2) Quando autem raninae satis sectae sunt, succedit facile haemorrhagia insuperabilis.
2. In phrenitide *idiopathica*, vbi a causis violentis externis, vel a commotione plethorae, malum exortum est, facilius conceditur venae sectio, & quidem statim sub initium in brachio, & deinde circa statum, vrgente adhuc necessitate, sub lingua.
3. *Baglinius* obseruauit, quod methodus reuulsoria feminis magis proficua fuerit, quam viris.
4. Ad phrenitidem praecauendam in febribus acutis quouis modo eurentur *opiata*; non minus autem in ipsa huius mali tractatione.
5. Sic etiam vsus *salium volatilium* proscribendus est, licet vulgo ad discussionem commendetur.
6. Vbi *lingua* nimis turgida, rubicunda, aut albo mucro obducta

ducta est, ibi *gargarisma adstringens*, si modo ita sui memores sint, ut non deglutiant, optime conuenit. Specialiter laudatur radix *pseudoacori*, in taleolos concisa, sub lingua detenta, manducata sed minime deglutita.

7. Vti refrigeratio transpirationem impedit, sic calidum regimen sanguinem exagitat & deliria auget.
- 8- De corruptionibus modo (phacelosis, modo suppuratoriis, post mortem phreniticorum in cerebro & illius meningibus detectis, legi meretur *Boneti* sepulcrum.



TABVLA LXIV.

DE

PARAPHRENITIDE.

I. DEFINITIO.

Paraphrenitis est febris acuta, secundaria, discussione staseos inflammatoriae in diaphragmate destinata, concurrente ob consensum neruorum paris vagi, alienatione mentis. Deriuatur a $\pi\alpha\rho\alpha$ & $\phi\eta\eta$ mens.

II. DIFFERENTIA.

1. *Paraphrenitis* differt a *phrenitide*, ratione loci adfecti, in hac enim *meninges* cerebri infestantur, in illa autem *diaphragma* stasi inflammatoria occupatur.
2. Differt etiam delirium, in paraphrenitide occurrens, a reliquis deliriis *hypochondriacis*, in quibus febris acuta inflammatoria non deprehenditur. Conf. quae tabula praecedente hac de re dicta sunt.
3. *Paraphrenitis in se* est vel
 - 1) *idiopathica*, vbi febris & inflammatio vno tempore & opere concurrunt; vel
 - 2) *symptomata*, quae aliis morbis, praecipue autem febris praegressis, succedit. Conf. *caussa*.

III. SIGNA.

III. SIGNA.

1. Cum aliis febribus inflammatoriis *communia*. Hæc tabula generali de febribus *inflammatoriis*, & de *hepatitide* descripta sunt.
2. *Propria*.
 - 1) Tumor præcordiorum.
 - 2) Cardialgia ita exquisita, vt ne leuissimum quidem contactum perferre *circa præcordia* possint.
3. Mentis alienatio, sermonibus deliriosis se se manifestans, sed ad violentiam phreniticorum non accedens.
4. Respiratio interrupta suspiriosa.
5. Singultuosæ commotiones & interdum vomitus niger, ob consensum ventriculi.
6. Tussis sicca, & hypochondriorum palpitatio dolens.
7. Fauces exarescunt.
8. Lingua sæpe alba & scabra obseruatur.

IV. SVBIECTA.

Præter ea, quæ antecedente tabula diximus, hic adhuc notari meretur, quod paraphrenitis non raro illis subiectis accedat, quæ *morbo Hungarico* seu *castrensi* laborant.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *materialis proxima* stasis sanguinis inflammatoria in diaphragmate quidem habetur. Sunt autem, qui simul vitium in capite quærunt, & ita adfectum cum *phrenitide* complicatum statuunt.
2. Causa *efficiens* est laboriosum conamen principii vitalis, per motus febriles staseos discussionem obtinendi; sub quo labore ambiguo delirium ob consensum paris octaui neruorum accedit.
3. Causæ occasionales & procatarcticæ sunt:
 - 1) Metastasis materiæ febrilis ad diaphragma.
 - 2) Euacuationum sanguinis naturalium, e. g. narium, hæmorrhoidum, mensium, suppressio &c.
 - 3) Artificialium neglectio.
 - 4) Potus, corpore calente, *frigidus*, præcipue fermentescens.

5) Morbi

- 5) Morbi anginodei repulsi, & infeliciter ad hanc partem adfectam translati.

VI. PROGNOISIS.

1. Paraphrenitis tanti quidem, & tam præcipitis non est periculi, quanti phrenitis, sufficit tamen non raro ad ægrum iugulandum.
2. *Euentus* huius morbi *triplex* est,
 - 1) vel enim stasis inflammatoria mature *discutitur*, & sudores, die critico superuenientes, salutarem adferunt effectum.
 - 2) Vel stasis sensim quidem resoluitur, excretio autem materiæ resolutæ legitime non succedit, sed per *metastasin* traicitur modo ad *aures*, vnde parotides & nonnumquam surditas proueniunt, modo ad *artus*, & tum mala arthritica vel erysipelacea inducit.
 - 3) Vel stasis abit in *corruptionem*, & sic intra septem, vel, ad summum, quatuordecim dies, æger consumitur.
3. Vrinæ albæ & perspicuæ, vigiliæ continuæ, status constanter delirus, singultus, perennes extremorum refrigerationes ad stridorem dentium vsque, frequentes oscitationes, vrinæ & fecum aluinarum inuoluntaria excretio, ardores interni grauiores, sudores algidi, infausta sunt præfagia: testantur enim de gangræna in Iphacellum mox transitura.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Vbi ex errore, in diætâ prægresso, materia peccans in primis vis hæret, ibi euacuatio *emetica* locum habet; quo vero casu præmittantur digestiua, & quando vomitus sponte non succedit, tartarus emeticus exhibeatur.
2. Quibus autem subiectis paraphrenitis a motu sanguinis eluctatorio exoritur, illis venæ sectio statim ab initio morbi conceditur, & vrgente necessitate, repetenda iudicatur.
3. Ante meridiem mixtura simplex vel essent. alexipharm. temperata, ad gutt. XX. aliquoties exhibeatur, interpositis

porionibus, diapnois itemque emulsionibus ex nucleis pingvibus paratis.

4. Post meridiem pulveres nitroso - temperantes cum diaphoretico fixo & sale digestiuo singulis binis horis propinentur.
5. *Externe* in subsidium simul trahantur :
 - 1) *Emplastrum* sic dictum *miraculosum*, largiter camphoratum, scrobiculo cordis & oppositæ in tergo regioni adplicandum.
 - 2) *Fricciones* & *sinapismi* in pedibus.
 - 3) *Clysteres* stimulantés, colocynthiaci, vel *suppositoria* acria.
 - 4) *Hirudinum* ad hæmorrhoidalia loca adplicatio in iis subiectis, quæ antea huic euacuationi exposita fuerunt.
6. Transpiratio placida ubique conseruetur :
 - 1) Per regimen sub vsu remediõrum temperatissimum.
 - 2) Per porum sufficientem tepidum, qui succo citri, vel clysto antimonii acidulus fieri debet, ne formulæ diluiores flatulentiam excitent.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quæ tabulis de *phrenitide* & de *hepatitide* monuimus, ea etiam in *paraphrenitide* obseruanda commendantur.
2. Præcipue hic euitetur potus *frigidus*, qui præsentanea incommoda, nempe ructus, singultum, angustiam præcordiorum maiorem, adfert.
3. *Electuarium de ouo*, pro scopo alexipharmaco specialiter hic laudatur.
4. In adfectu paraphrenitico idipathico, ab iracundia corpori inducto, *emeticum* statim ab initio exhibeatur.
5. *Hæmorrhagia narium*; quando tempestiue superuenit, haud parum emolumenti adfert paraphrenitidi.
6. Camphorata cum maxima prudentia & modestia *interne* sunt vsurganda.

TABVLA LXV.

DE

PLEVRITIDE ET PERIPNEVMONIA.

I. DEFINITIO.

1. *Pleuritis* est febris acuta continua, inflammatoria, secundaria, qua principium agens motibus, vltra gradum naturalem auctis, humores copiosius versus pectus dirigit, & per fortiorem & frequentiore[m] sanguinis ad *pleuram* adpullum, stasin, in hac membrana factam, resoluer[e] & discutere intendit. Deriuatur a *πλεῦρα* latus, item membrana thoracis.
2. *Peripneumonia* est itidem febris acuta, continua, inflammatoria, secundaria, discussione staseos sanguinis in *pulmonibus* facta, dicata. Deriuatur a *περὶ* circum, & *πνεύμων* pulmo: quo fundamento, sub *differentia* indicatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Non confundendi sunt hi duo morbi cum *pleuritide spuria*, quæ quod ad sensum punctiõnis attinet, aliquam quidem cum illis conuenientiam habere videtur, sequentibus autem differt:
 - 1) *Pleuritis vera* inflammatorium adfectum cum angustante oppressione pectoris, respiratione difficili, mutato pulsu, modo febrili, modo duro, modo pleno, modo magno, constituit.
 - 2) *Vera* pleuritis & peripneumonia circa aut paulo infra mamillam sensum suum dolentem exserunt, *spuria* altius circa *claviculam* incipit.
 - 3) Illæ puncturas habent æquales, pulsui respondentes, hæc inæquales, & pulsui minus *σύγχροναις*.
 - 4) Illarum puncturæ sunt continuæ, huius interdum remittunt & intermittunt.
 - 5) Illæ tussim semper habent comitem, cum sputo plurimum colorato, & respectiue cruento, hæc modo

cum, modo *sine* cussi adfligit, nec aliqua notabili per sputum excretionem deprehenditur.

- 6) Ille febrem *acutam*, continuam, cum horrore inuadentem, & calore acri progredientem, inuoluunt, hæc vix febriculam aliquam, eamque inæqualem & *ἀτυπὸν* exhibet.
 - 7) Illæ cursum suum ante septimum diem non absoluunt, hæc paucioribus diebus circumscribitur.
 - 8) Illæ iuniori magis ætati propriæ sunt, hæc indifferenter se habet ad ætatem iuuenilem & virilem.
2. Vterque adfectus ratione *indolis* est vel *benignus*, vel *malignus*: respectu *loci* adfecti, modo *adscendens*, modo *descendens*: porro est vel *simplex*, vel *compositus*; item vel *vagus* vel *periodicus*.
3. Differentiam *pleuritis* a *peripneumonia* sequentia docent:
- 1) Pleuritis longe rarissime, peripneumonia autem frequentius occurrit. Sed huius rei in praxi quotidiana contrarium statuitur.
 - 2) In peripneumonia *sputum cruentum*, quod circa finem secundi diei & sequentibus obseruatur, licet & hoc primarium sit signum, falso pleuritidi tribuitur: nam multæ difficultates credere nos vetant, quod sputum tale cruentum in pleura gigni, pulmones perrumpere, & sic per eosdem transire possit.
 - 3) Dolor punctorius in peripneumonia magis se extendit per vniuersum pectus, in pleuride autem puncturæ in dextro magis latere paullo infra mamillam sentiuntur. Insuper pleuritis cum horrore tam notabili non incipit vti peripneumonia.
 - 4) Insignis autem vsus medicus ex hac differentia non emanat: licet enim in pleuræ inflammatione per *topica* maior spes sit discussionis obtinendæ, quam in *peripneumonia*, in hac tamen topicorum applicatio, vti prodesse, sic etiam nocere non potest.
 - 5) In successu minus felici, nempe suppuratione staseos,

diagnosis hæc aliquem vsûm præstare videtur: quando enim in pleura suppuratio contingit, tum euacuatio per *paracentesin* locum habet, in peripneumonia autem, per sputum tantum res peragitur, exceptis rarissimis illis exemplis, vbi *vomica*, in *superficie* pulmonum rupta, & in concavum thoracis effusa, eandem per paracentesin euacuationem admittit.

4. Schola medica vulgo quidem statuit, quod peripneumonica inflammatio magis sit erysipelacea seu superficialis, arque hoc ipsa huius morbi denominatione exprimere intendit, ita, vt peripneumonia idem sit, ac pulmones circumambiens morbus; verum hæc distinctio refragatur experientiæ: scrutinio enim anatomico profunda stasis in medullio pulmonum sæpius detecta fuit. Præter ea sputum cruentum a pulmonum *superficie* tam expeditè ad exspuicionem peruenire non posset.

III. SIGNA.

1. *Vtrique adfectui communia.*

- 1) Vertiginosæ capitis perturbationes sæpius paullulum præcedunt.
- 2) Corripiuntur ægri horrore, qui magis magisque inualefcit, & sæpe ad cardialgiam nauseabundam, immo ad vomitum ipsum excedit.
- 3) Succedit exæstuatio insignis cum notabili siti & capitis dolore.
- 4) Item angustia præcordiorum, & difficultas respirationis.
- 5) Præcipue persentiscunt ægri dolorem punctorium in thorace, iugiter continuantem, & quoties tussunt valde sensibilem.
- 6) *Vrina* primis diebus rubicunda, saturata, post aliquot autem dies, mox vbi refrixit, turbatur, & deponit sedimentum copiosum, subroseum.

2. *Vni vel alteri adfectui magis propria.* Hoc sub *differentia* iam indicauimus.

IV. *SUBIECTA.*

1. pleuritis & peripneumonia non cuius promiscue *etate* eueniunt, sed maxime *iuuenili*.
2. *Tempore* imprimis verno ineunte.
3. Personis habitus corporis sanguinei.
4. Præcipue narium hæmorrhagiis antea aduetis, iam vero ab illis immunibus.
5. Sexui magis virili, quàm feminino.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *antecedens* est largior sanguinis *abundantis* ad pulsus versus pectus, per ætatis rationem exitum ibidem intendens.
2. Causa magis *propinqua* est stagnatio sanguinis diuturnior, per contentionem pertinacem circa pectus sustentata. Unde sensus pressiois, oppletionis, renifus, dependet.
3. Causa *proxima* & *continens* est vera stasis, a tali diuturniore sanguinis stagnatione suborta, inflammationi occasionem præbens.
4. Causa *finalis* est intentio agentis interni, per motus febriles transpressorios & absterforios hanc stasim resolvere & discutere.
5. Causæ *occasionales* & *procatarctica* sunt:
 - 1) Repentinæ sanguinis expansiones per motus corporis immoderatos, potus spirituosos, ultra modum adsumptos, & animi excaudescantiam.
 - 2) Refrigeratio immodesta, corpori calenti admissa, quæ repressioem sanguinis ad interiora efficit.
 - 3) Euacuationum naturalium solitarum, præcipue autem hæmorrhagiæ narium, suppressio.
 - 4) Euacuationum artificialium aduetarum neglectio.
 - 5) Violentæ pectoris concussiones, fortior nitus in oneribus gestandis.

VI *PROGNOSIS.*

1. Licet febres inflammatoriæ periculo non careant, pleuritis tamen & peripneumonia in *iunioribus* infra tricesimum

num annum adhuc constitutis, adeo perniciosæ non sunt, quam quidem in annosis.

2. Quando legitima methodo hi duo morbi tractantur, sæpius septimo, vel ad summum vndecimo die per spontaneum largum sudorem feliciter solvuntur, ita, vt tempestive naturalis pulsus, calor, adpetitus, somnus, & vires redeant.
3. Quando autem vltra septimum diem hæc febres *pertinaciter* continuant, id quod occurrere solet in annosioribus, tum ancipitis valde sunt euentus.
4. Vrina, si ante quartum diem turbatur, & post ea sedimentum cum liquore claro superstante exhibet, spes est felicitis morbi per sudorem criticum solutionis.
5. Quando per tussim materia flavescent, non adeo viscida, neque spumosa, excernitur, & præcipue in peripneumonia sputus cruentus accedit, totius morbi felix successus sperandus est.
6. Vbi autem excretio plane nulla per sputum succedit, vrina etiam cruda obseruatur, ibi deterior euentus timendus est.
7. Sputum cruentum licet læsionem pulmonum qualemcumque designet, hæc tamen plus vtilitatis quam damni portendit.
8. Pleuritis ascendens versus partes superiores, ægrotantibus maius periculum minitatur & contra.
9. A peripneumonia phrenitis, malum, dicit *Hipp. sect. VII. aph. 12.*
10. Si in pleuritide dolor punctorius locum mutat, maiorem inflammationem, maiusque periculum indicat.
11. Bona respiratio est bonum signum, malum vero difficilis.
12. Staseos discussio & resolutio quando non obtinetur, tum sequitur corruptio, eaque vel sphacelosa, vel suppuratoria, vel vlcerosa, phthisis dicta.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Aluus* per totum morbi decursum ordinarie succedat, nullo autem modo irritetur.

2. Vbi

2. Vbi insignis *plethora*, angustia pectoris, & magna oppletio concurrunt, ibi statim sub initium venæ sectio ad vnc. VI. instituat, & si opus fuerit, sequente die repetatur; subiungendo sollicitè regimen leniter diapnoicum. In casibus autem ordinariis venæ sectio non est necessaria.
3. Ante meridiem bis exhibeantur diaphoretica liquida, e.g. essent. alexipharm. *Stablii*, vel mixtura simplex, ad gut. XXX. item *potiones* diapnoicæ.
4. Post meridiem & sub noctem bis vel ter propinentur *pulveres* antifebriles, ex nitro, antimonio diaphoretico, & absorbente marino, acido citri saturato, parati. Item conducunt emulsiones, præcipue ex semine card. Mariæ confectæ.
5. Quando hæc medicamina per aliquot dies exhibita sunt, dolores tamen adhuc vrgent, tum essentia *cascarille* salutariter potest interponi.
6. Regioni dolenti cum linteis quadruplicatis adplicetur spiritus vini camphoratus. In vsum etiam venire possunt emplastra, non continuo, sed per vices adplicanda, alias conglutinant poros & impediunt transpirationem.
7. Vbique regimen æquale & continentia tranquilla maxime circa diem criticum, conferuetur.
8. Conferatur tabula *de hepatitide*, vbi methodus fere eadem fusius explicata est,


VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Dissident auctores de *vena sectione* in his adfectibus instituenda: sunt qui illam ad modum necessariam censent: sunt qui eam prorsus reiiciunt, e.g. *Ermullerus* observat, stasin post venæ sectionem, in pleuritide adhibitam, certius suppurare: sunt qui consiliis suis fluctuant, & eandem vel adhiberi vel omitti posse statuunt: iunt qui dissoluentia, & discutientia præmittenda esse, vrgent, & præcipue *salia volatilia* ad sudorem, & hinc staseos discussionem, commendant, & his si cedere recuset morbus, moderatam venæ sectionem subiungendam esse autumant.

2. Verum, vti per regimina & remedia calida, sanguinem expandentia, discussionem tentare, infelix conamen est, ob sanguinem in concitatione & inflammatione iam constitutum: ita venæ sectionem non nisi in statu insigniter plethorico, & vbi grauissimæ angustix ac infarctus pectoris vrgent, instituendam esse censemus.
3. Contingit in summe plethoricis, horum malorum genere defunctis, scrutinio anatomico pulmonum alterum latus sanguine differtum, & adeo expletum detegere, vt etiam in aqua subsideat: quo itaque insignis plethoræ casu venæ sectio commendatur.
4. Methodus *Sydenhami*, quæ consistit in venæ sectione, eaque satis larga & repetita, adiunctis lenissimis expectorantibus, auctori alias experientissimo relinquenda est.
5. *Riuerii* exemplum de famulo, larga venæ sectione paucis horis a pleuritide liberato, dubium adhuc est, an non potius hepatis vel ventriculi inflammatio fuerit, vti ferè ex circumstantiis historicis colligendum.
6. Post venæ sectionem, si in sanguine crusta alba non adparet, pro bono signo non habetur.
7. *Purgantiæ* ac *vena sectio* circa dies criticos celebrata pessimi sunt euentus.
8. *Sideritis* seu *herba Iudaica*, pectori adposita, commendante *Borello*, soluere dicitur pleuritidem: quod proinde experimentis explorandum est.
9. Inter *specificæ* etiam a quibusdam laudatur *papauer erraticum*; *Ettmüllerus* autem & alii nihil specifici illi concedunt, sed anodynum tantum communem & topicum effectum; quo vero respectu non commendatur.
10. *Dentibus apri* specifici quid tribuere, experientia non concedit.
11. *Semen cardui Mariae* specifico effectum ita commendatum est, vt hinc grana illius *Stech-Körner* soleant adpellari, nec plane de nihilo: docet enim experientia, quod aliquot grana deglutita dolorem punctorium sæpe auferant, licet febris ante septimum diem cursum suum non absoluat.

12. *Expectorantia* hic inutilia sunt, nisi forsitan sputum cruentum circa quartum diem, non satis succedens, portionem aliquam pectoralem efflagitet, quo casu aqua hyssopi præ aliis laudatur.
13. *Expectantium* in pleuritide abusus facile peripneumoniam inuitat.
14. *Nitrum* primis diebus vsque ad quartum intrepide potest propinari, sequentibus autem diebus, si moderate & æqualiter morbus succedat, parcius, & bis tantum per diem exhibendum est.
15. *Camphorata* externe aliquam lenitionem promouent, *oleosa* autem & pingua omittenda sunt.
16. *Opiata* ad irritationes in pectore non possunt commendari: sanguis enim hic specialis est tenacitatis; id quod illius per venæ sectionem emissio confirmat, vbi rubicundæ portioni innatat materia flauo-albescens, admodum tenax, sic est so *sâhe wie Leder*. Hæc sanguinis constitutio requirit concussionem, resolutionem, excretionem, quorum omnium contrarium opiata præstant.
17. *Cascarilla* pro discussione a pectore, in primis in peripneumonia, specialissime laudatur: modo iusto tempore & decente subordinatione exhibeatur; vti sub *methodo* indicatum est. Non solum discutit, verum etiam lenit & sedat, & quando hic cortex irritationes non mitigat, tunc opium certo nociturum est.
18. *Radix pimpinella alba* egregii vsus est in adfectibus pectoris, præcipue autem in chronicis, resoluit enim & discutit.
19. Conuenit etiam irritationem mitigare & discussionem promouere per *ulapia* diapnoico-analeptica, ex aquis card. bened. scordii, plantag. chærefol. scabios. modic. cinamom. & syrupo acetositat. citri.
20. Item per *emulsiones*, ex his aquis cum semine card. mariæ, aquileg. & amygdal. dulc. ad gratum saporem mediocriter saccharatas.

21. Conferantur cautela & obseruationes, quæ *tabula de hepaticide* indicatæ sunt.



TABVLA LXVI.

DE

HEPATITIDE.

I. DEFINITIO.

Hepatitis est febris acuta, continua, secundaria, inflammatoria, qua natura humores fortius & frequentius per hepar transpellit, ad stasin sanguinis, in hoc viscere factam, dissoluendam & abstergendam.

II. DIFFERENTIA.

1. Hepatitis a *reliquis inflammatoriis* febribus differt
 - 1) ratione visceris inflammati,
 - 2) ratione periculi, quo respectu reliquas omnes superat.
Vid. prognosis.
2. In specie a *pleuritide* differt in eo, quod dolor infra diaphragma magis vrgeat, febremque aliquo modo leniorem, quam pleuritis, habeat coniunctam.
3. Hepatitis in se differt *gradu* inflammationis:
 - 1) Aliæ enim inflammationes magis sunt superficiales.
 - 2) Aliæ stasin profundiolem inuoluunt.
 - 3) Quo modo hepatitis differat ab *infarctu* hepatis, patet *ex signis* collatis.

III. SIGNA.

1. Inuadit frequentissime cum *horrore* insigni & diuturno.
2. Hunc excipit sensibilis, grauissimus *æstus*, & quidem paroxyzans, (si nempe tranquille negotium succedit) cum siti intensissima.
3. Vbi autem impetuosus magis morbus est, ibi nullos paroxysmos, aut notabiles remissiones exhibet.

4. Per-

4. Perferunt ægri dolorem grauatissimum in latere *dextro* circa septimam vel octauam costam.
5. Et hic impedit, quo minus ægri in dextrum latus decumbere possint.
6. Agrypnia, prostratio virium, angustia præcordiorum, valde vrgent cum difficili respiratione.
7. Pulsus celer est & frequens.
8. Circa extrema facile refrigescunt, quoties ventilare corpus suscipiunt, *wenn sie sich nur ein wenig lüfften.*
9. Quando bibunt, non raro eructant, vnde anxia angustia, non æque vero dolor, augetur.
10. Immo nausea & vomitus biliosi sese exserunt; ex quibus signis haud friuole concluditur, inflammationem occupare potissimum *simam* hepatis partem.
11. Vbi autem *gibbosam* magis regionem infestat, ibi motus spastici per consensum circa iugulum, ac si deorsum illud trahatur, sese exserunt.
12. *Tussis*, quando adest, exigua plerumque & sicca deprehenditur.
13. Sunt hi ægroti vel perpetuo leui *madore*, facile frigescente, adfecti;
14. Vel, quod peius est, iugi siccitate, æstum & anxietatem augente, corripuntur.
15. *Vrina* primis diebus rutila, & admodum crassa est, quarto autem die ordinarie turbatur, & copiosum sedimentum deponit, manente tamen superstante liquore satis adhuc crasso, aurantii coloris.
16. Sedimentum hoc rosei quidem coloris, sed submucidæ & veluti purulentæ est consistentiæ: vnde hoc phenomenon multis imponit, vt pro vero *pure* illud agnoscant, & abscessum accusent. Sed *verumpus* statim post emissionem fundum petit, sedimentum autem illud mucidum post refrigerationem demum vrinæ prouenit.
17. Dissoluitur hoc sedimentum mucosum, si aquæ tepidæ vas vrinarium immergitur; quod phenomenon specialiter de inflammatione testatur.

18. Peculiare adhuc signum est in hepatitis, quod decumbens subinde colorem mutet, ordinarie quidem palleat, sed sæpe etiam fuscum & flavescentem colorem non solum in toto corpore & facie, verum præsertim in oculis exhibeat.
19. Vbi staseos *suppuratio* contingit, ibi omnia symptomata eueniunt grauiora, nempe maior sentitur æstus, difficilior respiratio, maiores accedunt anxietates, in loco affecto sensus doloris exacerbatur, & rigores circa extrema eueniunt frequentiores.
20. *Ruptio* autem *apostematis* dignoscitur ex dolore quidem & æstu remittente, succedente autem virium amissione, frequente lipothymia, febre hæctica, & quando materia purulenta in concanum abdominis effusa est, huius intumescence crassitie.

IV. SVBIECTA.

1. Generatim sunt illa, quæ tabula de inflammatione generatim indicauimus.
2. Speciatim autem, quæ causis subsequenter sunt obnoxia.

V. CAVSÆ.

1. Causa maxime *remota* est plethora.
2. Causa magis *propinqua* nulla alia suppetit, quam congestio sanguinis ad hepar, vel ipsius visceris constrictio.
3. Causa *proxima* est stasis in hepate collecta.
4. Causa *finalis* est intentio naturæ, ad stasin discutiendam, in quem finem sanguinem, bene adhuc fluidum, specialiter & copiosius dirigit ad portionem illam, motu suo iam priuatam, vt per fortiorem adpulsam & transpressionem humorum stasis resoluatur & discutatur.
5. Causæ *occasionales* & *procatartica* sunt:
 - 1) Præuix vehementes corporis motiones, cursibus, saltationibus, onerum cum maximo nisu tractationibus, facta.
 - 2) Violentæ contusiones, plagæ & casus ab alto.

3) Or-

- 3) Orgasmus sanguinis, vel per dictas, vel per alias causas inductus, e.g. per spirituosas, excandescantiam animi.
- 4) Repentinæ externi habitus refrigerationes, sanguine ita calente.
- 5) Siceriam potus frigidus, mox & intemperanter superingestus.
- 6) Medicationes adstrictoriæ, commotionibus febrilibus repente oppositæ.
- 7) Repentinæ repulsiones excretionum, aut moliminum excretoriorum suppressiones, e.g. scabiei, erysipelatis, hæmorrhagarum, motuum hæmorrhoidalium, congestionum arthriticarum.
- 8) Topica frigida, item cucurbitulæ, regioni hepatis applicatæ.

VI. PROGNOSIS.

1. Inflammatio hepatis omnium fere est periculosissima.
2. Et quo' profundior est inflammatio, eo contumacior ad discussionem, & pronior, vel ad corruptionem repente lethalem, vel ad maturationem, quæ æque funesti euentus est, reperitur.
3. Ita etiam *concaua* partis inflammatio ominis semper tristioris est, quam *gibbosa*.
4. Nonnumquam hæc febris scirrhus hepatis solet relinquere.
5. Commotio humorum magna, insolens, vehemens, statim sub initium, numquam bonæ spei est, hac enim ratione sanguis in arctissimos meatus potius impellitur, quam stasis resolvitur.
6. Quo magis febres inflammatoriæ, citra externas causas occasionales matutino tempore innadunt, eo plus habent indolis continentis, maioris æstus & periculi.
7. Felix euentus variat: aliquando enim stasis *pedetensim* resolvitur & discutitur: aliquando & sapius diebus criticis euacuatio contingit, eaque vel per hæmorrhagiam naris dextræ, vel per sudorem copiosum, spontaneum, vel per diarrhœam.

8. Quando autem hepatis inflammatio intra primum septenarium discussionem staseos non attingit, tum morbus insolēcit, dextrum hypochondrium inflatur, cum sensu ardoris, tensionis, grauitatis, accedit singultus, & sic fit, vt ægri septimo vel nono, rarius vndecimo die moriantur.
9. *Suppuratio* staseos licet tam præcipitem funestum euentum non inferat, vti quidem corruptio sphacelosa, est tamen vndique periculo plenissima: materiæ enim purulentæ euacuatio non potest fieri, & si omnino fieri posset, consolidatio tamen erosæ & exesæ portionis nullo modo obtineretur, ob viscus hepatis laxum, porosum & sanguine imbutum.
10. Et sic res fere semper transit in hecticam.
11. Si *urina* iusta coctionis signa exhibet, sedimentum nempe copiosum, non admodum tenerum, coloris subrosei, & febricitans de reliquo mediocriter bene habet, spes est feliciis euentus.
12. Quando autem clara & limpida manet, exitum portendit periculosum & lethalem.
13. Turbida si redditur, nullum autem deponit sedimentum, sed parietes vitri alba lactea & subcœrulea cuticula obducit, non adeo boni est præfagii.
14. *Sudores* nimii aquosi pari ratione nihil boni produunt, tolerabiliore autem sunt, quam perpetua cutis siccitas.
15. Quando post hæmorrhagiam narium ægrotus non subleuatur, sed vires in horas deficiunt, vigilæ etiam & phantasie accedunt, tum nihil boni inde portenditur.
16. Singultus contumax, *statui* morbi accedens, citra causas externas excitatus, signum est lethale.
17. Refrigerationes extremorum faciles & frequentes, cum insigni ardore interno, & intercurrentibus lipothymicis debilitatibus, infausta sunt indicia.
18. *Vomitus nigri*, instar *rob sambuci*, vti in *acutis* pessimi omninis, ita in plerisque febribus inflammatoriis præfagium sunt

sunt mortis instantis. Non minus deiectiones *alui*, eiusdem tetri coloris, bonæ non sunt prognoseos.

19. Falso adesse iudicantur abscessus hepatis, quando pus per urinam secessit: hoc enim indicat abscessum glandularum intestinalium seu mesaraicarum.
20. Si dolores ad modum vrgent, *febris* concurrit magna, *inquietudo* multa, dolores autem deinde *cito* profus evanescent, pulsus & vires cadunt, febris tamen pergit, ibi corruptio vel sphacelosa, vel suppuratoria, eaque rupta, certe diiudicatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. *Discussio* staseos inflammatoriæ vniuersum hic absoluit negotium.
2. Hæc in potestate magis naturæ, quam Medici sita est, potest autem aliquo modo promoueri per medicationem, eamque placidam potius, quam vehementem & impetuosam. Commendantur in hunc finem leniter abstergentia & humores fundentia.
 - 1) *Absorbentia marina*, acido citri, tartari, vel spiritu nitri saturata; quæ euidentem effectum diureticum exhibent, e. g. oculi cancri, conch. præparat. mater perlar. præparat.
 - 2) Vniuersa *ossa capitis lucii piscis*, aceto in præparatione imbuta. *Vid. cautel.*
 - 3) *Diaphoretica fixa*, inter quæ antimonium diaphoreticum reliquis præfertur, sub initium largiore, post ea autem parciori dosi exhibendum.
 - 4) *Radices* diuretico-diapnoicæ vtiliter etiam in his stasibus exhibentur. Ex horum censu præcipue sunt: rad. vincetox. pimpinell. alb. helen. petasitid.
 - 5) Ex *compositis* huc conducunt: mixtura simplex leniter camphorata, essent. alexipharm. *Stahl*i, essent. pimpin. alb. cum æquali portione essent. scordii mixta.
 - 6) *Emulsiones* dilutæ, magis ad temperandum, quam ad alendum, ex pineis, amygdal. semin. card. mariæ, aqua-

aquileg. & in progressionem morbi semin. papau. albi, parata, & abunde edulcorata; abstinendo a *feminibus* sic dictis *frigidis*.

- 7) *Potiones* diaphoreticæ, vel iulapia, ex aquis scabiosæ, plantag. chærefol. geran. maior. scorzoner. cichor. bugloss. galeg. bellid. minor. cum syrupo acetositis citri, vel clysto antimon. acidulata.
- 8) *Nitrosa*, quæ in his inflammationibus omnibus aliis palmam præripiunt.
- 9) *Externe* conducunt:
 - a) Spiritus vini camphoratus crocatus, regioni hepatis applicatus.
 - b) Fodus calidi, sicci ex farina secalina, fabarum, milii, furfure, radice irid. Florentin. sigill. Salomon. bryon. herba hyssopi, quæ etiam interne conducit, item emplastr. de spermate ceti camphorat.
 - c) *Vena sectiones* non, nisi in specialibus circumstantiis, conducunt. *Vid. Cautel.*
 - d) *Clysteres* emollientes, ad reuulsionis scopum, & alni legitimum successum.

B. *Methodus specialis.*

1. *Vena sectio* vel instituatür statim sub initium, vel omitatur, secundum indicationes sub *cautelis* explicatas.
2. *Aluus* ubique seruetur aperta, non validis stimulantibus; in primis talibus, quæ altius in sanguinem penetrant, sed vel emollientibus clysteribus, moderate tamen adhibitis, vel lenissimis humectantibus, præcipue nitrosis, it. oleo amygdal. dulc. syrupo violarum.
3. Motus febriles, discussionem staseos respicientes, quantum fieri potest, subleuentur.
4. Hinc mane dosis refracta essent. alexipharm. *Stahl*i, vel mixtura simplex adhibeatur, & per reliquum diei tempus pulueres nitroso-absorbentes singulis tribus horis propinentur, e. g.

Recip. nitr. depurat.

tartar. vitriolat. ana drack. II.
ocul. cancr. acido citri saturat.

maxill. lucii piscis, acido quodam præparat.
ana scrup. IV.

Antimon. diaphoret. drachm. I.

M. f. pulu. dof. scrup. I.

5. Ante meridiem *poriones acidulatae*, versus noctem autem *emulsiones* interponantur.
6. Sub his omnibus *externa* non negligantur, e.g. spiritus vini camphorat. crocat. regioni hepatis applicandus.
7. Vbi dolores ad modum inoleſcunt, ibi *anodynum* aliquod, ad illos mitigandos, non autem prorsus tollendos, pulveri commendato remiſceatur. Verum hoc non in ſtatu, ſed incremento tantum morbi locum habet.
8. Conueniens *diata*, nempe ſufficiens humectatio, continencia tranquilla, calor moderatus, placidum regimen, ſollicite iniungatur.

VIII. CAUTE LAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ *tabula de febris inflammatoriis generatim* monuimus, illa hic quoque ſeruanda ſunt.
2. Difficilis eſt formatio conſilii de adminiſtratione *vena ſectionis* in febris inflammatoriis; de qua re fuſius *tabula chirurg. de vena ſectione* egimus.
3. Hoc loco tantum adiucimus, quod *vena ſectio* in hepaticide ſtatim ſub initium, præmiſſo clyſtere, concedatur,
 - 1) Vbi conſpicua plethoræ inſignis indicia adſunt.
 - 2) Tanto magis, ſi conſuetæ *vena ſectionis* tempus incidit.
 - 3) Quando graues ſanguinis commotiones proxime præceſſerunt.
 - 4) Vel morbus cum vehementia, anxietate, ſummo ardore, interlancinationibus dextræ partis abdominis, & febrili inſultu magis, quam ortu, inuadit.
4. Largior autem eſſe debet ſi inſtituitur *vena ſectio*, & in ſuper, requirente neceſſitate, repetenda.
5. Siue ſecta ſit *vena*, ſiue prætermiſſa, vbique libera & æqualis diſtributio ſanguinis, & leniſſima tranſpiratio conſeruanda; quod tanto magis neceſſarium eſt, quia ſecundum ſolertem *Sydenhami* obſeruationem, & *αυτοψία*

post venæ sectionem, sanguis summe lentescens indolis apud eius modi patientesprehenditur, quæ vero hac humorum distributione & attenuatione non potest in actum deduci.

6. Titulo magis, quam reali effectu, his commendantur pleuraque, sanguinem coagulatum resoluentia: quæ enim efficaciter hoc præstare possunt, partium sunt tenuiorum, & hinc organum sanguinis longe præfectiorem inducunt, quam partem adfectam consolantur, e.g. *Camphora* ubi mox ad locum læsum pertingit, potentissime resolvit, sed intra corpus adsumta, mediocri licet quantitate, sanguinem vehementissime concitat, neque tamen directe ad rem ipsam multa contribuit: dimidium granum pro dosi, cum largiore portione nitri remixtum, conceditur.
7. *Sambucinarum* commendatio nota quidem est, sed interna parum efficient.
8. *Aqua florum tilia*, *plantag. scord. scabiosa* vulgo commendantur, sed re vera parum in illis erit præsidii.
9. *Chærefolium* ad discussiones internarum stasium laudatur, sed debilioris est efficaciam, &, si omnino quid de illo sperare liceat, in substantia erit sumendum.
10. Idem etiam de *floribus bellidis minoris* sentiendum est.
11. *Gummi resina*, e.g. galbanum, sarcocolla, myrrha, satis quidem penetrant & resolvunt, vehementius autem, præcipue myrrha, sanguinem commouent, neque tamen loco adfecto satis faciunt. Vnde vix aliquem hic habent locum.
12. *Specificæ* efficacia *maxilla lucii piscis*, *dentis apri* &c. experientiam non responder; faciunt, quod possunt. Copiose si adhibentur, e.g. ad drachm. I. male habent decumbentes.
13. *Externe* sub initium commodius adhibetur spiritus vini camphoratus, post ea autem foci siccos camphoratos substituere conuenit. Agunt autem hæc externa non tam penetrando, quam potius transpirationem aperiendo,

- endo, & motum tonicum roborando, quibus auxiliis discussio stales iuuatur.
14. Si in *gibbosa* hepatis parte inflammatio in *pus* abierit, istud per incisionem interdum salutariter eliminatur.
 15. *Pinguia externa* tuto hic non adhibentur, quia suppurationem promouent: vnde & emplastica valde mucida locum non habent.
 16. *Composita* famosiora internis inflammationibus parum conueniunt, e. g. theriaca, michridatum, diascordium *Fracastorii*, *Sylui*, & alia tinctura bezoardica, opio inquinata.
 17. *Antimonii diaphoretici* efficaciam alii hic nimium extollunt, alii prorsus reiiciunt: media sententia vera est, quod in primis testantur sensibiliores.
 18. *Sulphuris* vsus, si circa prima *initia*, vel in *declinatione* prudenter adhibetur, insignem efficaciam exhibet, in *statu* vero magis est ambiguus.
 19. *Anodyna* ad modum prouide adhibenda sunt, magis in incremento, quam in statu, ne debitas excretiones impediant, vel plane sphacelum inuitent.
 20. Quid praestet *hepar galli nigri*, a *toele* pro certissimo in hepatitide remedio commendatum, experientiae relinquitur. Iubet, hoc viscus, adhuc calens, aliquot uncias acciti rosacei conterere, & aliquo modo resolutum a fibris per colaturam separare, ac tepide exhibere.
 21. Quae tabulis de *infarctu* & *scirrho* hepatis ratione *refrigerantium*, interne & exterue adhibitorum, item *opicorum* calidorum, diximus, ea hic etiam obseruanda sunt.

TABVLA LXVII.

DE

S P L E N I T I D E .

DEFINITIO.

Splenitis est febris acuta continua, secundaria, inflammatoria,

qua principium agens, motibus, ultra gradum naturalem auctis, sanguinem copiosius versus lienem dirigit, & fortius ac frequentius per eundem transpellit, ad statin, in hoc viscere collectam, resoluendam & discutiendam.

II. DIFFERENTIA.

1. *Splenitis* differt ab *infarctu lienis*, in quo sanguis non plane subsistit, sed tantum stagnat, & impeditius mouetur, nulla etiam febris acuta præsto est.
2. A *nephritica renis sinistri* inflammatione dignoscitur partim *atrocia doloris*, qui in nephritide acutior est, partim *loco adfecto*: in nephritide enim dolor versus spinam dorsi, in splenitide autem magis antrorsum adfligere obseruatur.
3. *Splenitis in se* differt *gradu* inflammationis: aliquando enim substantia, vulgo *parenchymatica* dicta, occupatur, & sic satis profunda contingit inflammatio; aliquando autem *membranacea* & superficialis tantum portio infestatur.

III. SIGNA.

1. Signa pleraque, sub *hepatitide* tradita, huc possunt referri, nempe
2. Inuadit cum insigni horrore.
3. Hunc sequitur grauissimus æstus, cum siti ad modum intensa.
4. In hypochondrio *sinistro* dolorem, grauitatem & tumorem perferunt.
5. Paroxyfmi typum fere quartanarium formant.
6. Vbi paullulum libero aëri se exponunt ægri, statim circa extrema perfrigescunt.
7. Hæmorrhagia si contingit, sanguis stillat ex nare sinistra.
8. Signa vrinæ eadem sunt ac hepatitidis.

IV. SVBIECTA.

Personæ status *plethorici*, temperamentum *sanguinei*, habitus corporis laxioris, vti inflammationibus præ aliis obnoxie sunt, sic etiam eadem a splenitide potissimum infestantur.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* maxime *remota* est status plethoricus, cum spissitudine sanguinis plurimum coniunctus.
2. Causa *magis propinqua* est congestio seu restrictio sanguinis versus lienem.
3. Causa *proxima* & *continens* est stasis in hoc viscere exorta.
4. Causa *finalis* est sollicita naturæ intentio, ope motus febrilis transperforii & absterforii hanc stasim resolvere & discutere.
5. Causæ *occasionales*, quæ plethoram, tamquam causam antecedentem, inducunt, sunt præcipue
 - 1) Evacuationum sanguinis naturalium, e.g. mensium, hæmorrhoidum, suppressio.
 - 2) Consuetarum artificialium prætermissio.
6. Causæ *procatarctica* huius staseos sunt:
 - 1) vehementes corporis & animi commotiones.
 - 2) Expansio seu orgasmus sanguinis.
 - 3) Repentinæ refrigerationes, corpore calente.
 - 4) Quo etiam spectat potus frigidus, post fortio rem motum, haustus.
 - 5) Peruersæ medicationes adstrictoriæ in febribus adhibitæ.
 - 6) Abusus topicorum frigidorum in lienis infarctu.

VI. PROGNOSIS.

1. Quæ tabula præcedente de *hepatitidis prognosi* diximus, illa etiam de splenitide plurimum valent.
2. Licet enim splenitis non ita extreme perniciofa sit, uti hepatitis, satis tamen sufficit, ut plurimos, qui ab illa verò corripuntur, iugulet.
3. Id vnicum, quod de *vomituum nigrorum periculo* præcedente tabula dictum est, hic, secundum auctorum observationes, mitigandum esse videtur: dicunt enim, vomitus tales nigros, versus diem criticum contingentes, splenitidem solvere. Atque hoc adsertum exemplo quodam notabili iam habemus confirmatum.
4. Observatum etiam aliquoties fuit, quod hæmorrhoides salutariter huic malo superuenerint.

5. Quando substantia visceris parenchymatica *profundius* occupatur, tum inflammatio fit *apostematoues*; vbi autem *superficialis* portio stasi exposita est, ibi inflammatio magis *erysipelatodes* contingit.
6. Frequentissime autem inflammatio in splenitide degenerat in *scirrhum*.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.


Methodus eadem hic est, quæ in hepaticide.

1. Alius itaque ante omnia per clysterem emollientem solvatur.
2. Venæ sectio, si secundum observationes, præcedente tabula sub *cautelis* traditas, indicetur, primum in brachio, deinde, urgente adhuc calu, in vena *saluatella*, quæ est inter annularem & minimum digitum, instituat.
3. Ad staseos discussionem naturæ succurratur:
 - 1) Ante meridiem dosi aliqua essent. alexipharm. & portionibus diapnoicis, acidulatis.
 - 2) Post meridiem pulueribus nitroso-absorbentibus, præcedente tabula commendatis, & emulsionibus dilutis.
 - 3) Vbique sufficiente humectatione, continentia tranquilla, & regimine diapnoico, continuo.
4. Dolores, quando in incremento morbi valde insolescunt, paullulum mitigentur per M. P. de cynoglossa cum puluere nitroso-præcipitante ad gr. I. remiscendum. *Vid. cautel. præcedentis tabula.*
5. Denique post felicem staseos dissolutionem mixtura tonico-neruina *Stahlii* aliquoties per diem propinetur.

VIII. CAVELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ præcedente tabula dicta sunt, ea hic repetantur.
2. Hæmorrhoidum adstrictarum suppressio si hanc ægritudinem foueat, *hirudinum* ad hæmorrhoidalia loca applicatio efficacior erit, quam ipsius venæ sectionis institutio.
3. Quoniam splenitis facile in *scirrhum* transmigrare observatur, ex vñ omnino erit, methodum illam, tabula de infarctu & scirrho lienis commendatam, tempestiue adhibere.

4. Vfus *vini* non nisi in declinatione conceditur.
5. Ante, quam materiam de inflammationibus internis obfirmamus, monendum est, quod aliarum quidem illarum species adhuc restent, e.g. inflammatio *ventriculi, pancreatis, uteri* &c. eandem autem methodum & tractationem exposcant. Unde necessarium non ducimus, plures tabulas speciales hac de re subiungere.
6. Hoc unicum de *ventriculi* inflammatione adiicimus, quod tanti periculi non sit, quanti quidem sunt stases inflammatoriarum in aliis visceribus. Gaudet enim ventriculus *motu tonico peristaltico*, eoque perpetuo, quo stases difficultus facilius promouetur.



TABVLA LXVIII.

DE

FEBRE CATARRHALI BENIGNA,

SEV

VETERVM QVOTIDIANA CONTINVA.

I. DEFINITIO.

Febris catarrhalis est febris acuta, continua, secundaria, qua principium vitale motibus secretoriis & excretoriis, ultra gradum quidem naturalem auctis, satis tamen moderate procedentibus, lympham, siue qualitate siue motu læsam, corrigere intendit. Deriuatur hæc denominatio a *κατὰ* & *πύλω*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Licet febris catarrhalis *benigna* a *maligna*, quoad *speciem* non differat, sed tantum quoad *gradum* noxiæ materiæ & symptomatum, quia tamen *maligna*, paullo aliam methodum, eamque leniorem & magis circumspectam exposcit, insuper etiam pure epidemicæ petechizantis constitutionis est, placuit, illam peculiari tabulæ reseruare.

2. Sta-

2. Stasis illa *mucido-ferosa*, cum partibus sanguinis tenuioribus mixta, cui febris catarrhalis superuenit, differt omnino a *stasi vrente, rodente, venerca, ulcerscente*: licet enim hæc easdem partes, nares, infundibulum, pharyngem, tonsillas, palatum, immo parotides, oblideat, nulla tamen febris illi accedere solet.
3. Differt etiam a *rheumaticis* illis congestionibus, & febrilibus motibus, quibus viam strauit heteroclitica apostasis post febres acutas, vel intermittentes turbatas; sicut etiam ipsa talis febris a nostra catarrhali maxime diuersa est.
4. Neque febris *intermittens diuturna* in febrem catarrhalem transiisse existimanda est, si, quod satis frequenter contingit, grauedinem, coryzam, cussim, branchum generet.

III. SIGNA.

1. Inuadit hæc febris plerumque circa vesperam.
2. Tempore æquinoctii, præcipue autumnalis.
3. Præcurrunt, vel statim iunguntur, grauedo aut coryza.
4. Raucedo, molestia deglutitionis.
5. Immo intra collum erysipelacea quasi constitutio.
6. Prægrauatio pectoris.
7. *Tussis* satis quidem violenta, parum tamen excernens, & per totum morbum fere durans.
8. Vniuersi corporis *languor*.
9. Inuadit autem hæc febris cum *frigore* horrido, immo rigore, præcipue vero tenuis doloribus in dorso.
10. Durat hoc frigus per dimidiam circiter horam, aliquando integram, raro diutius.
11. *Calor* succedit protinus satis quidem lenis, cum angustia tamen & anxietate circa præcordia coniunctus.
12. Quæ, circa præcordia, pathemata in paucissimis tantum iubicctis nauseabunda aut vomibunda obseruantur.
13. Durat hic æstus pro gradu plethoræ per horas bene multas, ita vt primis paroxysmis vix altero mane notabiliter tepescat.
14. *Pulsus* est celer & frequens.

15. *Appetitus & vires labefactæ, somnus imminutus.*
16. *Caput est magis debile, quam dolens.*
17. *Ad diarrhæas hæc febris valde inclinatur, interdum accedunt vomitus.*
18. *Sudores, quouis tempore matutino æstum excipientes, febrem sensim mitiorem reddunt, ac catarrhales hos morbos infringunt; elapso tandem primo vel secundo septenario febris cum symptomatibus cedit.*
19. *Urina præter colorem aurantium, febribus acutis familiarem, hoc peculiare habet, quod pauca mora tenuissimam cutem, vitro subtiliter adhærescentem, ostendat, lacteolientis coloris cum sedimento roseo-pallido, Fleischfarbig.*

IV. *SVBIECTA.*

1. *Euenit hæc febris præcipue temperamento sanguineo-phlegmatico.*
2. *Subiectis mucosis, spongiosis, & seri inquinamentis abundantibus.*
3. *Quæ multum & diu partes capitis & colli glandulosas frigori, præsertim humido autumnali, exponunt.*
4. *Quibus scabies vel alia ulcera repelluntur.*
5. *Quæ nimis vigiliis indulgent.*
6. *Vel vino adusto abutuntur.*
7. *Item quæ coryzam & tussim negligunt, vel mala in iisdem arte, malisque remediis tractantur.*

V. *CAVSSÆ.*

1. *Causa antecedens huius febris est lentor & tenacitas lymphæ.*
2. *Causa proxima est catarrhus peculiaris conditionis, nempe salso-acris: simplex enim catarrhus, seu mucida stasis, satis liber manet a febre; quando autem portio sanguinis subtilior, quam, veteres præcipue, biliosam esse putant, huic stasi simplici immiscetur, tum inuoluit periculofam inflammatoriam in his locis indolem, vnde facile corruptio sphacelosa prouenire potest.*

3. Ad hanc corruptionem auertendam febris accedit, tamquam causa *formalis*, & salutare naturæ opus, quo lenta abstersione sensim iterum auferatur, quod ita coaceruatum hæret.
4. Causæ *occasionales* & *procatartica* sunt:
 - 1) refrigerationes corporis immodestæ.
 - 2) Tempestas humido-frigida, præsertim autumnalis.
 - 3) Potus frigidus, calente corpore sumptus.
 - 4) Materia acris, in corvæ excerni solita, repulsa.
 - 5) Item scabiei vel crustæ lacteæ repressionses.
 - 6) Verbo: omnia ea, quæ naturalem & genuinam impediunt transpirationem.

VI. PROGNOISIS.

1. Febris catarrhalis *simplex* & *benigna* salutariter plurimum decurrit, & quidem sæpissime bono tantum regimine.
2. Accedente autem *malignitate*, vel præpostera medica tractatione periculo non vacat. *Vid. tab. de febre catarrhali maligna.*
3. Quo magis ab indole sua leniore recedit, & cum vehementia tam frigoris quam æstus insultat, eo iustior est metus alicuius labis, citra viscera hærentis.
4. Optimus successus & euentus consistit in staseos rheumaticæ, acris, causticæ, inflammationem cientis & corruptionem minantis, assidua resolutione & dissipatione.
5. *Hippocrates* iam obseruauit, a fluxione eius modi materiæ acris, causticæ, in pharyngem præcipue, oriri raucedines, cynanchas, erysipelata, peripneumonias, & quam diu materia in tali intemperie existat, perdurare talia pathemata, si vero spissescat & concoquatur, illa minui & febrem solui.
6. Nisi ergo mature, & placido successu, materia hæc sensim abstergetur & dissipetur, vlceratio sanioso-ichorosa succedit, quæ promte in sphacelofam & funestam putredinem ruere solet; id quod satis confirmant vlcera illa externa, ex diuturno erysipelate vel phlegmonibus
non

- non discutiendis oriunda, quæ, licet topica præsentiora admittant, pessimam tamen indolem exhibent.
7. Quo acrior igitur inflammatoria stasis subest, eo propior dicto euentui existit.
 8. Quo magis autem febris *simplex & benigna* catarrhalis dici meretur, eo longior ab hoc euentu distat; magis autem in lentas & hecticas febres propendet, præcipue quando nimis absorbentibus & refrigerantibus tractatur.
 9. Indoles huius febris non est, vt *apostasies* formet, seu materiam, semel resolutam extrinsecus in locum arctiorem cumulet, vti hoc in parotidibus & angina contingit.
 10. Quando autem per intempestiuas artis commotiones aliquid extrinsecus protruditur, adparentes tales *apostasies*, pro criticis excussionibus vulgo venditæ, genio huic febri proprio non debent imputari.
 11. Multo lenius adhuc decurrunt *febricula* illæ, catarrhalibus adfines, quæ hyeme tepida repentinis tumoribus, e. g. glandularum sub auribus, tonsillarum &c. superueniunt.
 12. Quando autem per coacta regimina turbantur, vel materia insuiste ad interiora repellitur, febres satis acres & inflammatoriæ periculosæ inde proueniunt; præsertim si perturbatio talis artificialis verno & autumnali tempore, quo sanguinis commotio familiarior nobis est, contingit.
 13. Ceterum, quam *benigna* etiam sit hæc febris catarrhalis, est tamen contagiola, vti & ipsi catarrhi tenuiores & coryza eiusdem indolis esse obseruantur.
 14. Quo magis autem *contagiosa* reperitur, eo certius petechiæ complicantur. *Vid. tabul. de febre catarrhali maligna.*
 15. *Diarrhæa*, quando sub initium accedunt, minuunt impetum morbi; in statu quæ superueniunt, si moderatæ & indolentes existant, non adeo periculosæ sunt.
 16. *Alui* autem *adstrictio* hic æque ac in petechialibus purpuratis nocentissima est, &, præcipue in statu, deliria, comata, conuulsiones, inducit.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *Methodus generalis.*

1. Vitium *lymphæ*, in muco & tenacitate consistens, est corrigendum. Resoluunt lentorem
 - 1) *Radices* catarrhales, alexipharmaco-diureticiæ, præcipue rad. pimpin. alb. vincetox. ari, helenii, imperator. angelic.
 - 2) *Essentia* alexipharm. e.g. *Stahlii*, tinct. entimon. tartari.
 - 3) *Salia colligantia* digestiua, e.g. arcan. duplicat. tartar. vitriolat. nitrum antimoniatum.
2. Motus *febiles* secretorii & excretorii eundem finem respicientes, prudente ratione sunt adiuuandi; cui scopo antifebrilia temperata, e.g. essent. alexipharm. *Stahlii*, mixtura simplex, puluis bezoardicus ex nitro, antimon. diaphoret. oculis cancri, acido citri saturatis, & sale digestiuo, satis faciunt.
3. Tussis sicca tuto est mitiganda; in quem finem conducunt
 - 1) antifebrilia, modo commendata.
 - 2) Liquiritia cocta, sirup. violarum, de erysimo *Lobeli*.
 - 3) Emulsio ex amygdal. vel femin. card. bened. mariæ, parata.
 - 4) Mucilago hordei, auenæ.
 - 5) Oleum amygdalarum.
 - 6) Trochisci becchici.
4. Aluus semper aperta est seruanda
 - 1) per diætam liquidam ex prunis, passulis, pomis.
 - 2) Per potum sufficientem, tepidum, ex infusis thée, veronic. ruffilag. teucr. ver.
 - 3) Per clysteres emollientes cum stimulo salino.
 - 4) Per pilulas *Stahlianas* vel *Beccherianas*, mane exhibendas.

B. *Methodus specialis.*

1. Mane propinetur essent. alexipharmac. *Stahlii* ad gutt. XXX. cum lenissimo regimine.
2. Per diem autem vsque ad tempus paroxysmi puluis quidam bezoardicus bis vel ter ad scrupul. i. exhibeatur. e.g.

Recip.

Recip. nitr. depurat.
 tartar. vitriolat.
 antimon. diaphoret.
 ocul. cancr. acido citri saturat. ana drachm.

I. M

3. Durante paroxyfmo potiones tepidæ, & qualescumque congruæ humectationes porrigantur.
4. Quam primum æstus remittit, & mador in decumbente obferuatur, difcuffio diapnoica promoueat,
 - 1) vel per dofim effent. alexipharmac.
 - 2) vel per potiones diapnoicas ex aquis fcord. card. bened. flor. fambuc. galeg. cum antimon. diaphoret. & aliquo abforbente, paratas.
5. Ad *tuffim* validam mitigandam exhibeatur verfus illud tempus, quo maxime adfligit, emulfio quædam ex femin. card. benedicti, mariæ, cum aquis difcutientibus & pectoralibus, præcipue hyffopi, parata.
6. In obftipatione *alui* vel clyfteres, vel pilul. *Stabliana* audacter adhibeantur.
7. *Diarrhæa* autem quando accedunt, tartarus vitriolatus ex puluere, fupra defcripto, remoueat, & cryftallus montana præparata fubftituatur.
8. Hæc methodus per quatuordecim dies continuetur, quia mitior hæc febris, nec breui adeo periodo finitur.
9. Quando *gruedo* huic febri iuncta eft, externa quoque adhibere conuenit ad euacuationem per coryzam promovendam: vbi egregie conducit fpiritus falis ammoniac. interdum naribus admotus. *Vid. tab. de coryza.*
10. Si alia adhuc accedant fymptomata, e. g. angina, peripneumonia, aphthæ &c. methodus horum malorum fpecialis fimul in vfum trahatur.
11. In lentam febrem quando defleat, effentia alexipharmaca ad reuocandos motus febriles fufficientes, & materiam eliminandam aliquoties per diem, verfus noctem autem puluis digeftiuus propinetur. *Vid. caut. 4.*


VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Febris catarrhalis, vti succellum habet placidum, ita omnis medicatio huic indoli debet esse conueniens. Hinc optima est methodus illa, quæ excretiones diuretico diaphoreticas *lenibus* succellibus promouet.
2. Omnes autem *commotiones* inconsideratæ euitandæ sunt, maiores enim ad interiora repressiones, inflammationes acres, erysipelaceas, generant, & febrem in se benignam, periculosam reddunt.
3. *Regimen* semper sit tepidum, cauendo a *refrigeratione*, quando enim transpiratio & sudores supprimuntur, lentæ & hecticæ febres inde emergunt.
4. Quæ lentæ & hecticæ, si insequantur, ter per diem, sed sine regimine, propinetur essentia alexipharmaca ex rad. pimpin. alb. helen. ari. imperat. parata, quæ interposito versus noctem puluere abstergente, ad recuperandam breui integritatem, egregie conducit.
5. *Expectorantium* abusum in catarrho pectorali excipiunt sæpe dispositiones phthificæ, vlcerosæ.
6. Idem de *refrigerantibus* est sentiendum.
7. Alexipharmaca, si, impetu senescente, *copiose* propinantur, febrem reuocant: vnde sufficiunt diaphoretica fixa, cum abstergentibus sociata, vsus denique vini modicus, & laxatio per mercurium dulcem. *Confer. num 22.*
8. In catarrho *chronico*, non adeo æstuoso, sufficit *laxatio* per pilulas *Beccheri*, cum mercurio dulci & extracto panchymag. *Crollii* sociatas, coniunctis discutientibus, præcipue essent. succin. lignorum.
9. Et sic *succinata* & *ligna antiuenerca* in catarrhis quidem simplicibus conueniunt, minime autem in febribus, catarrhis superuenientibus.
10. A calidis *diaphoreticis* valde sibi temperandum est, ne quidquam hic cum impetu agitetur, conf. num. 1. & 2. sed vnice assiduis & moderatis transpirationibus insistatur, aut tenuior substantia acris tardius exhalando dissipetur.
11. Hæc cautela tanto magis notanda est, quia sudorifera sub præ-

prætextu illo specioso, *venenata* nempe *malignitatis de corde propellenda*, passim commendantur.

12. Huc etiam pertinet peruersa illa & rationi contraria methodus, quæ materiam ex interioribus ad exteriora propellere docet: nam materia, ex infarctu aliquo semel resoluta, ita mutatur, vt ineptior sit ad nouum talem infarctum in exterioribus, e.g. in parotidibus, formandum.
13. Quod si tamen glandulosi tales tumores post has febres turbatas vel neglectas remaneant, essent. pimpin. albæ, cum interposita leni laxatione, eximie se gerit.
14. Aquæ diaphnoicæ quando adhibentur, remouenda est aqua *fumaria*.
15. *Pulueres nitrosi* non tantum ante & versus paroxysmum, sed etiam in feruidiore illius æstu locum habent, & longe post se relinquunt pulueres Pannonic. Marchion. &c. in infantibus etiam egregium edunt effectum.
16. *Nitrum* incrassat materiam catarrhalem subtilem, & in rheumaticis recessionibus, quando perite adhibetur, tantæ est efficaciam, vt illo etiam solo grauiora ab illis inducta damna restingui possint.
17. Ad æstus mitigationem *nitrum* etiam in potu exhiberi potest: hac enim ratione ipsum potum corrigit, & non adeo insigniter, sed lenius & tolerabilius ægrum adfcit.
18. *Adstrictio alui* catarrhum & febrem auget, & sic per totum morbi decursum apertam illam seruare maxime necessarium est: irritare autem eandem tanto minus conuenit, quanto acrior est catarrhus.
19. In minus vero acribus fluxionibus & febribus, in primis vbi adfluxus grauedinosus seu becchicus incommoda notabiliter adfert, ibi egregie conducit, materiam præparatam leni laxatione subducere.
20. *Salia volatilia* hic euitanda, in sensibilibus & teneris prorsus abominanda sunt, quia materiam catarrhalem acrem vehementius commouent, & inflammationes facile inferunt.

21. *Emulso* ex semine *cardui marie* hic, quando *tussis* nimium adtingit, præ ceteris conuenit, quæ non modo egregie temperat, sed & inflammationes metuendas præcauet, & ipsas iam præsentis ad modum mitigat.
22. Essentia alexipharmaca *Stahlî* ieròli-mucidam materiam non solum incidit & attenuat, sed & diapnoicam exferit efficaciam, & sic, prudenter adhibita, medicationi huius febris commodissime satis facit.
23. Post febris decursum non indulgeat conualescens securitati, sed aëri cum circumspectione adiuuescat, & per octo adhuc dies essentia alexipharmaca utatur: hac enim ratione, experientia teste, vires eo citius restaurantur.
24. Denique notandum adhuc est, quod sanæ rationi repugnet, febrem catarrhalem ibi arguere velle, vbi neque tussis, neque grauedo, neque raucedo, neque peripneumonia, neque erysipelaceum quidquam se se manifestat.



TABVLA LXIX.

DE

FEBRE LENTA.

I. DEFINITIO.

Febris lenta est auctior motus sanguinis, quo principium vitale infarctum quemdam, vel stasin circa viscus aliquod vitale hærentem, discutere, & imminentem huic visceri læsionem auertere & præcauere intendit.

II. DIFFERENTIA.

Febris *lenta* differt a febre *hectica*

1. Ratione *originis*, nam

1) Febres *lenta* degenerant ex febribus *diariis*, *synochis*, aut quotidianis continuis, mala methodo tractatis;

item

item ex febribus intermittentibus, sed valde æstuosis, duplicatis, per adstringentia suppressis.

2) Febris autem *hæctica*, excipit vomicas, empyemata & inflammationes viscerum apostematodes.

2. Ratione *causæ continentis*.

1) In *lenta* febre nondum præsto est vera visceris læsio; sed constitutio tantum ad illam proxime inferendam.

2) In febre autem *hæctica* semper adest vel scirrhus contumax, vel apostema, vel ulcus siue simplex, siue fistulosum.

3. Ratione *finis*.

1) In febre lenta natura per motus febriles labem visceris imminentem & metuendam auertere, & præcauere adlaborat: in hæctica autem principium vitalem læsionem iam inductam corrigere, quamvis plurimum frustra, intendit.

4. Ratione *symptomatum*.

1) In *lenta* omnia symptomata sunt mitiora, in *hæctica* febre acerbiora.

2) Lenta numquam tanta vehementia occurrit, ut languentem lecto diu adfixum detineat, sed in dies mitior succedere solet: in hæctica autem contrarium obseruatur.

3) Lenta (excepta illa, quæ adstringentibus successit) prona est ad largissimas sudationes; hæctica autem, nisi fere consummata sit, aut sub ineptis artificiis erret, arido tantum & mordaci calore manifesta est.

4) Lenta tenuia tantum habet excrementa, paucis mucis conspicua: hæctica autem consummata diarrhœis, exitum accelerantibus, se se manifestat.

5. Ratione *prognosis & exitus*.

1) *Lenta* adhibitis congruis remediis paulatim, *hæctica* vero ad modum difficulter aut plane non curari potest,

2) *Lenta* in aliud schema facile transit, nempe vel in febrem illam, ex qua originem petiit, vel in hæcticam ipsam, hæctica autem nullum agnoscit μετασχηματισμόν.

- 3) Lenta redit vel sponte sua ad tranquillitatem, & sæpius, salutariter exit: hæctica autem vix vniquam.

III. SIGNA.

1. Calor præternaturalis, non ad modum quidem sensibilis, ægro tamen satis molestus.
2. Siticulosa oris siccitas.
3. Adpetitus & virium amissio; si autem aliquid adpetunt, sunt magis alimenta frigida, quam calida.
4. Color pallidus cum genarum rubore, aut pallido circuitu concluso.
5. Corporis extenuatio.
6. Sudor largior, in primis sub somno.
7. Somnus est turbulentus.
8. Capitis vertiginosa afflictio.
9. Vrina copiosa, post emissionem rutila, crassa, turbida, sedimentum accipit roseum, liquore claro superstante.
10. Aluus est inordinata, modo liquida, modo sicca.
11. Pulsus est celer, sed debilis.

IV. SVBIECTA.

1. Homines calidioris genii & plethorici, qui in ephemera, vel synocha, per calidiora tractantur.
2. Qui febre aliqua continua aut composita, vel intermittente valde æstuosa, laborarunt, & vel per impatientiam, vel per incondita remedia diaphoresin suppresserunt.
3. Qui grauioribus hæmorrhagiis exhausti sunt.
4. Hæmorrhoidum anomaliis laborantes.
5. Qui adsuetas sanguinis ventilationes prætermisere.
6. Quibus vlcera vel scabies retropulsa.

V. CAVSÆ.

1. Causa *materialis*, *continens* & *proxima* est infarctus alicuius visceris vitalis, vel stasis circa illud collecta.
2. Causa *efficiens* huius febris est principium vitale, quod per motum talem auctiorem materiam impactam resolueret, & hac ratione imminentem læsionem præoccupare intendit.

3. *Cauffas antecedentes & occasionales sub differentia & ſubiectis iam indicauimus.*

VI. PROGNOSIS.

1. Febris lenta, ex intermittente legitima, ſeu compoſita, recens nata, ſi in intermittentem, cum primis ſimplicem, iterum tranſit, minus periculofa eſt.
2. Febris lenta vti lentam pro fundamento habet materiam, quæ præcipitem noxam haud infert, dum ad euacuati- onem iam aliquo modo præparata eſt, ita natura typum acutum in lentum tranſmutat, & Medico indicat, quod eadem lenta via incedere debeat. Quando autem in ſalutaribus ſuis excretionibus impeditur, tum vel priorem typum acutum repræſentat, vel ſi materia viſcera quæ- dam teneriora iam adfecit, in hecticam delabitur.
3. Quæ lenta in lento typo diu continuat, vel in ſtatum tran- ſit acutum, periculoſior reperitur.
4. Tranſitus autem in hecticam maxime anceps eſt, quando ſcilicet adpetitus redire videtur, reliqua tamen ſympto- mata perſiſtunt; præcipue autem, ſi tuſſis ſicca & respira- tio laborioſa vrgeat, vel in vnum aut alterum latus fiat decubitus, & ſenſibilis grauitas in hypochondrio dextro perſentiſcatur.
5. Quo magis calor aridus, corporis extenuatio cum ſiccita- te & virium decremento increbeſcunt, eo propior ad hecticam eſt gradus.
6. Oriuntur non numquam ex ſuppreſſa diaphoreſi phleg- monodeæ quædam translationes ad partes externas.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Methodus generalis.*

- 1) Stagnatio ſeu ſtaſis circa viſcus aliquod vitale collecta, eſt diſcutienda. Faciunt hoc
 - a) Vegetabilia reſoluentia, nempe.
 - a) *Radices* helen. pimpinell. alb. vinçetox. & reliquæ alexipharmacæ temperatæ
 - b) *Herba* bellid. min. heder. terreſtr. chærefol. vrtic.

Bb bb z

vero-

- veronic. scord. tempore maxime verno in substantia aut succo propinata.
- b) Salina colliquantia, e.g. tartar. vitriolat. arcan. duplicat. nitr. antimoniæ. solut. conch.
- 2) Saburra viscida, a febre intermittente relicta, est incidenda; quod præstant
- a) Penetrantiora amara, nempe extract. centaur. min. card. bened. absinth. fumar.
- b) Gummi-resinæ, e.g. gummi ammoniac. hederæ. galbanum &c.
- c) Tonus primarum viarum & viscerum est restituendus. Laudantur in hunc finem
- α) Martialia leniora, e.g. tinct. martis aperitiua *Ludovici*.
- β) Stomachica carminatiua: rad. ari, zedoar., galang. cichor. caryophyllat. herb. absinth. centaur. min. card. bened. tanacet. quæ etiam ad petentiam cibi resuscitant.
- γ) Vires sunt reficiendæ per analeptica ex emulsiuis, vino extraneo medice sumto, pane saccharino amygdalato, vulgo *Matronen*, fructibus conditis, cibis eupeptis.
- δ) Sudores colliquatiui modeste sunt refrenandi; quod gemmata, legitime vsurpata, præstant, e.g. species de hyacinth. corallata cum nitro, item MP. de cynogl.
- ι) Aluus semper aperta est seruanda, partim per infusa leniter laxantia, partim per pilulas *Stablianas* vel *Beccherianas*.
2. *Methodus specialis.*
Hæc variat secundum causas, quibus febris lenta originem debet.
1. Quando ex acuta quadam periodo febris lenta exorta est, tum ad visceris infarctum discutiendum sequentia adhibeantur:
- 1) Ante meridiem essent. alexipharm. *Stablii* aliquoties ad gutt. 25-30. sed sine regimine propinetur. 2)

2) Post meridiem pulvis absorbens salino-digestivus bis exhibeatur; cui alternis diebus, pro æstus moderatio-
ne nitrum admisceatur, e.g.

Recip. tart. vitriolat.

antimon. diaphoret.

oc. cancr. acid. citr. saturat. ana. vnc. se-
mis. M. dof. scrup. i.

Vel: Recip. arcan. duplic.

nitr. depurat. ana. drach. III.

antimon. diaphoret.

solut. conch. ana drach. ij. M.

3) His interponantur subinde lenissima laxantia, e.g. pilu-
læ *Beccheri* vel *Stablii*.

2. Si febris lenta ex intermittente quadam subnata sit, felici-
cius curari non potest, quam per intermittentis reuoca-
tionem, cui scopo inferuiunt

1) Pilulæ *Beccheri* vel *Stablii*.

2) Spiritus salis armoniaci, si *Ettmüllero* fides habenda est.

3) Sequens formula, quæ etiam in lenta ex acuta quadam
degenerata, vsui esse potest.

Recip. Rad. vincetox.

enul.

pimp. alb. ana drach. ij.

Herb. fumar.

capill. vener.

cuscut.

summit. cent. min. ana manip. semis.

flor. schœnanth.

stœchad. Arab. ana pug. iij.

cort. aurant. vnc. semis.

fol. fennæ vnc. j.

fibr. helleb. nigr.

rhabarb. orient. ana drach. ij.

Incis. contus. fiant species pro nodulo. cum vino
aduso extrahendæ.

3. Deinde reuocata febris intermittens tractatur, vti suo loco
indicatum est.

Bb bb 3,

4) V-

4. Vbi autem lenta grauioribus hæmorrhagiis successit, ibi methodus analeptica & humectans requiritur, e.g.
 - 1) Decocta gelatinosa C.C. cum rad. cichor. scorzon. veronic. scord.
 - 2) Veterum quinque radices aperientes cum sero lactis coctæ.
 - 3) Externe balnea, ex aqua dulci parata, & pro tolerantia ægrorum gradatim vsurpata.
5. Tonum roborantia non numquam interponantur, e.g. tinct. martis aperitiua *Ludouici*, quæ etiam languentem adpetitum reuocat.
6. Sudoribus colliquatiuis moderate opponantur absorbentia, corallata & gemmata, e.g.

Recip. matr. perlar. drach. j

nitr. depurat. drach. semis.

spec. de hyacinth. gran. XV.

M. P. de cynogl. gran iij.

M. d. in 5. part. æqv.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

Vena sectio in febre lenta nullius fere vsus est; in hysteriarum tamen lenta, cum mensium vitiis complicata, item si in plethoricis lenta ephemera successerit, prudenter instituta, leuamen adferre solet.

2. Nec *emetica* profunt; excepto illo casu, vbi lenta in robustis biliosam anxiam cardialgiam producit.
3. Vitandæ quoque sunt *sudationes & purgationes*, quibus lenta facile in febrem continuam, præcipue viscerum inflammatoriam, præcipitatur.
4. *Sudores* autem *spontanei* non statim supprimendi, alias debilitas augetur, sed declinante morbo, lenioribus remediis, sub methodo speciali commendatis, moderandi sunt.
5. *Calidorum, antihellicorum, traumaticorum & adstringentium* abusus transitum huius febris in hecticam promouet, a *refrigerantibus* autem tumores œdematosi subnascuntur.
6. *Salia volatilia* non minoris sunt periculi.

7. Febres lentæ, ex febribus ephemeris pullulantes, sæpius quam vulgo creditur, occurrunt; licet ab auctoribus pro dignitate non obseruentur.
8. Lentæ lentam exposcunt medelam: hinc medicamentis per 14. circiter dies continuandum est.
9. Concurrente alui fluxu, minime ille supprimendus est, sed conducunt in hoc casu absorbentia vel simplicia vel cum acidis & nitro maritata, item ess. pimp. alb. gentian. rubr. ari. Quando autem excedere videtur, abhiberi possunt corall. rubr. præparat. cort. cascarill.
10. Si febris lenta *hamorrhagiis suppressis* originem debet, earum reuocatio respiciatur; quando autem a prægressis *nimiis hamorrhagiis* orta est, temperantia & lenia diaphoretica exhibeantur.



TABVLA LXX.

DE

FEBRE HECTICA.

I. DEFINITIO.

Febris hectica est auctior motus sanguinis, perpetuæ absterfioni labis alicuius vlcerosæ, in viscere quodam vitali, a natura destinatus. Deriuatur ab *ἥξις*, habitus.

II. DIFFERENTIA.

Hectica differt

I. Ratione graduum:

1) *Mitior gradus* vix sensibilem exhibet molestiam, & solo titulo *debilioris constitutionis* subinde regitur. Germani dicunt: *fränckliche, hinsällige Personen, welche nichtß vertragen können.* Et quoniam sub hac constitutione per decem & plures annos hectici viuere possunt, non immerito a quibusdam *hectica chronica*, vocatur.

2) *Elatior gradus* omnia quidem signa, quæ inferius indica-

cata

cata sunt, in tali vigore exhibet, vt manifesto agri intelligantur, maximam tamen partem extra lectum viuere possint. Germani exprimunt: Der Patient gehet herum, will sich nicht gerne ergeben, sondern hält sich mit aller Macht in der Höhe. Hoc gradu eminent pallores faciei, flaccida, immo tabida extenuatio, adpetitus & digestionis vitia, ac excretionum detrimenta. In tali statu per aliquot adhuc annos ager subsistere potest, & hæc hectica κατ' ἐξοχήν *habituæ* nomine venit.

- 3) *Vltimus gradus* magnam exacerbationem symptomatum inuoluit, in lectum tabidos coniicit, & febriles commotiones cum siti, siccitate oris, agrypnia, anorexia, debilitate & consumptione corporis, ac summo languore, ita auget, vt diu in hoc statu durare non possint.
 - 4) Obseruandum autem est, quod hic ordo non in omnibus indiuiduis nobis obueniatur. Natura enim, pro diuersa læsionis conditione, modo lente & gradatim, modo cum festinatione noxæ materiali se opponit.
2. Ratione *visceris læsi*; quæ quidem diagnosi difficilis est, nisi sensus & morbi prægressi aliquid designent: ita
- 1) *Pulmonum* exulceratio dignoscitur, si prædicta morbi acidis, motu corporis, succedente languore, coniunctis liuidis oculis, volaticis ardoribus, cum rubore genarum, item quando tussis augetur post profundam aëris inspirationem. *Conf. tab. de phthisi.*
 - 2) *Hepatis vitium* indicatur per tussim siccam, colorem faciei liuidum, hypochondrii dextritensionem.
 - 3) *Lienis* vlcerosa corruptio diiudicatur ex anxietatibus hypochondriacis.
 - 4) *Renum* læsio dignoscitur ex prægressa nephritide, item ex magna quantitate tenacissimi ex vrina mucii, anguillarum mucositate sua vix cedentis.

- 5) *Partium genitalium* læsiones dignoscuntur ex prægressis pathematibus venereis, exulcerationibus, gonorrhœa maligna, quæ debitæ methodo cedere recusarunt, sed potius debilitatem cum tabe corporis reliquerunt.
3. *Hæctica febris* quo modo differat a *lenta*, præcedente tabula fulius indicauimus.

III. SIGNA.

1. Diuturnitas *typi*.
2. *Calor* perpetuus aridus, qui præsertim post pastum in manibus præualefcit.
3. *Pulsus* debilis, & paruus, frequens & celer.
4. *Vrina* crassa, aurantii coloris, sedimenti rosæ, cum cuticula nitida, pingui & odore grauolente.
5. *Adpetitus* languidus ad frigida propensior.
6. *Sitis* licet, haud adeo magna, tamen pene continua cum *oris* siccitate & *salina* spumida, aut plane glutinosa.
7. *Somnus* vel nullus vel inconstans: delassans magis quam reficiens.
8. *Extenuatio* corporis in dies increfcens.
9. *Virium* facilis consumptio.
10. *Animi* fastidium & languor.
11. In hæctica abdominali obseruatur *sensus* alicuius ponderis in alterutro hypochondrio.
12. *Sensibilitas* specialis & exacerbatio circa tempestatum mutationes, præsertim vero anni conuersiones æquinoctiales & solstitiales:
13. *Caput* vertiginosum, & quasi temulentum, quando eleuare sese volunt ægri.
14. *Sudores* in malo prouectiore succedunt colliquatiui, cum virium summa amissione.
15. *Diarrhœa* tandem sub *facie Hippocratica* hanc scenam claudunt, cui aliquando defluuium capillarum & hæmorrhoides modo copiosæ modo cæcæ iunguntur.
16. *Tussis* semper & perpetuo ad hæcticam non pertinet, sed potius effectus est causæ alicuius, um hæctica coniunctæ.

IV. SVBIECTA.

Hecticæ potissimum obnoxii sunt homines:

1. Sicciore, teneri, diætæ calidæ, vinosæ, aromaticæ, animi pathematis addicti.
2. Qui nimis curis, vigiliis, venere, abusu spiritus vini, inedia diuturna, fortioribus purgantibus, vires consumserunt.
3. In primis vero, qui euacuationes sanguinis consuetis vel intermiserunt, vel inconditis medicationibus suppresserunt.
4. Vel qui hæmorrhagiis nimis exhausti sunt, in quibus deinde viscera iusto arctius constringuntur.
5. Maxime vero qui in febribus, siue intermittentibus, siue acutis præpostere sunt tractati.

V. CAVSSAE.

1. Causa *materialis proxima* hecticæ est læsio visceris alicuius vitalis, siue sit vlcus, siue apostema, siue contumax scirrhus. *Conf. differentia.*
2. Causa *efficiens* est principium agens, quod per motus febriles labem illam vlcerosam perpetuo abstergere, & hac ratione præcipitem visceris corruptionem, a corruptente illa materia expectandam, auertere intendit.
3. Causas *antecedentes & occasionales* in descriptione subiectorum iam indicauimus.

VI PROGNOISIS.

1. Veram & confirmatam hecticam curare velle, frustraneum est: læsio enim visceris vlcerosa, cui abstergendæ febris hectica perpetuo opponitur, in integrum restitui non potest, quod contra vanas pollicitationes probe obseruandum.
2. Methodo autem prouida symptomata mitigare, præualefcentem exulcerationem ac tabem temperare, & fatalem exitum quodam modo differre, vniuersum est, quod a Medico hic potest desiderari. Hecticæ enim febres, vlcerationum internarum comites, quam diu tranquille pro-

procedunt, possunt quidem occupare repentinas & prævalidas exacerbationes & grassationes, præcipue inflammatorias, vlceri tamen, *qua tali*, nihil detrahunt, & licet ipsi non noceant, certissime etiam nihil commodi adferunt.

3. Illa in primis hæctica, quæ dysenterix & aliis acutis supervenit, mali ominus censenda est; non minus etiam illa, quæ hæmorrhagias sequitur.
4. In iunioribus febris hæc citius depascit, quam in adultis. Hinc anni periculosiores sunt a decimo octavo ad tricesimum quintum. Qui post ea hæctici fiunt, chronice plerumque hoc morbo laborant. *Conf. Hippocrat. aphorism. IX. sect. V.*
5. Temporum mutationes hæcticis sunt periculosæ, e. g. solstitia, æquinoctia, in primis autumnale; item anni *climacterici*.
6. Hinc hæctici, qui circa æquinoctium vernale ab hoc morbo in lectum coniciuntur, circa æquinoctium autumnale sæpius intereunt; & qui solstitiali tempore in hæcticam incidunt, altero solstitio fere moriuntur.
7. Hæctici si, consumtis iam viribus, sanguinem hæmorrhoidalem deliciant, conclamatum est; quando autem hæc hæmorrhagix species sub initium hæcticæ contingit, tum stases, nuper factæ, per eandem dissoluuntur.
8. Ultima huius morbi tragœdia exit in motustonicæ debilitates, partium tam internarum, quam externarum.
 - 1) *Internæ* debilitates tonicæ manifestant se per diarrhœam non solum spontaneam, sed etiam cum magno conatu obtingere solitam. *Conf. Hippocrat. aphorism. XII. sect. V.*
 - 2) *Externæ* autem relaxationes produnt se per magnam lassitudinem, defluivum capillorum, spontaneum sudorem, qui, poris externi ambitus laxatis, passivè quasi elabatur, & quidem lymphatico-glutinosus,

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Sordes mucosæ tenaces in primis viis collectæ, per salia media, e. g. tartar. vitriolat. arcan. duplicat sunt incidendæ, & aliis per rhabarb. mann. psilul. mercur. dulc. clysteres leniter est soluenda.
2. Acrimonia materiæ vlcerosæ est obtundenda, diluenda, temperanda & abstergenda; cui scopo interuiunt:
 - 1) *Absorbentia* marina, cum acido citri saturata; conchæ, mater perlarum, oculi cancri, immo etiam corallia, & sano vsu, osteocolla.
 - 2) *Ex radicibus* præcipue pimpinell. alb. vincetox. cichor. taraxic. helen. moderate abstergunt & discutunt.
 - 3) *Decocta gelatinosa* & alia diluentia, e. g. decoctum C. C. cum radice cichorii, & floribus bellid. cremor hordei, auenæ, ptisanæ cum herba bellidis, serum lactis cum bellide vel radice cichorii.
3. Nimia humorum per vlcerata loca commotio est auertenda; quod per venæ sectiones æquinoctiales, scarificationes in aduetis, extra tempus exacerbationis in pedibus institutas, obtinetur.
4. Tonus post aliquam orthostadiam est roborandus, in quem finem laudantur:
 - 1) *Mixtura tonico-neruina Sthalii*, ex sale quodam volatili & tinctura alcalica pirata, e. g. spiritus C. C. & tinct. antimonii ana remixt.
 - 2) *Corallia* cum antimonio diaphoretico, vel bezoardico minerali.
 - 3) *Traumatica lenia*, & quidem in vitio *hepatis*, hedera terrestris, in *hectica lienis*, virga aurea, hypericon, pyrola, faniula.
5. *Symptomata* sunt mitiganda.
 - 1) *Diarrhæas* & *sudores* moderantur absorbentia, coralliata, species de hyacintho & gemmata.
 - 2) *Tussim* refrenat massa pilular. de cynoglossa, pectoralem specificè sedat extractum tabaci, legitime præparatum.
 - 3) *Astum febrilem* temperant emulsiones amygdalate, sacchara-

charactæ, succus citri, clysius antimonii, decoctum auenaceum pro potu sumendum, & denique nitrum, cum circumspeditione usurpatum, *vid. cautela.*

- 4) *Tabi* succurrunt diæta nutriens ex potu emulsiuo, cibis gelatinosis, gelatina C. C. lacticiinis, ptisanis cum tragacanth.

B. Methodus specialis.

1. *Tempore exacerbationis.*

- 1) Mane exhibeatur moderata dosis essent. alexipharmacæ, de essentia pimpinellæ & scordii plurimum continentis.
- 2) Post meridiem aliquoties propinetur puluis quidam abstergens, præcipitans & diureticus, e. g.

Recip. tartar. vitriolat.

conch. acido citri vel tartari saturat. ana
drachm. II.

M dof. scrup. I.

- 3) Vel loco pulueris detur potio aliqua temperans, e. g.

Recip. aquæ plantaginis,

scabiosæ,

ceraforum nigrorum ana vñe. I.

cinnamomi sine vino drach. II.

ocul. cancr. præparat.

antimon. diaphoret. ana drach. semis.

M. f. potio, cum saccharo perlato edulcoranda,
& singulis ternis horis ad cochlear I.
propinanda.

- 4) Sub horum vsu alius expediti seruetur, potus sufficiens, temperatus & paruis haustibus sumendus, iungatur, corpusque, vbi fieri potest, modeste moueatur, a solis autem calore æger defendatur.

2. *Tempore remissionis.*

- 1) Venæ sectio in pede circa æquinoctia instituat, nec vinqum facie prætermittatur.
- 2) In iunioribus loco venæ sectionis temperantia substituantur, e. g. puluis quidam ex nitro, tartaro vi-

triolato, matre perlarum, coralliis rubris, vel potio temperans, superius descripta.

- 3) Ad robur viscerum bis per diem subinde propinetur tinctura tonico-neruina *Sibalii*. vel potio aliqua eiusdem efficaciam, e. g.

Recip. aq. rosarum,

cichorii, ana vnc. II.

extract. cascarillæ scrup. II.

corall. præparat.

antimon. diaphoret. ana drach. semis.

symp. bellid. vnc. semis.

M. dof. ad cochlear. I. mane & vesperi propinanda


- 4) His in spem consolidandi interponatur mixtura balsamica, ex essent. succini & scordii ana remixta.
- 5) In diætâ a crudis, calidis, aromaticis abstinetur. Conducunt autem emulsiones, iuscula pullorum, potus tenuis, & vbi vires adhuc constant, præ primis in hætica habituali, locum habere potest cura lactis.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Cum febris hæticiæ scopus versetur circa perpetuam lenem absterforiam discussionem, deinde etiam circa euacuationem moderatam apospasmatum talium vlcerosorum, quam maxime hinc cauendum est ab omnibus *æstuosis & balsamicis calidis*, sanguinem turgescentibus.
2. Hinc nec ad lenitiuam laxationem adhibere conuenit *acria resinosa*, præcipue *aloën*, vtpote sanguinem insigniter commouentem.
3. Idem sentiendum est de *balsamicis acrioribus*, quæ in spem *consolidationis* vulgo exhibentur.
4. Absorbentium *terreorum* nimius vsus nocet, nedum inepte præparatorum, e. g. C. C. philosophice præparat. lactis lunæ.
5. Magno ægrorum damno offeruntur absorbendi scopo *bolaria*, vti & *martialia*, quæ manifesta sua adstrictione abster.

- absterfionem impediunt, infarctum obftipant, & anxietates augment.
6. Idem detrimentum inferunt alia *adstringentia* & vegetabilis *traumatica*, quæ vulgo propinari folent in confufione hecticæ abdominalis cum pectorali feu phthifi, licet & huic, præcipue antiquæ, certe noceant.
 7. Similis efficacix funt *falia volatilia*, copiofe & intempeftiue propinata, quorum moderatus & subordinatus vfus alias non reiicitur.
 8. Famofum eft *antihecticum Poterii*, fed nullius boni effectus: eft enim calx adftrictoria, ex qua vix draftica corrofiua quidquam foluunt; nedum vt in corpore humano operæ pretium faciat.
 9. Eiusdem furfuris eft *tinctura antiphthifica Grammani*, de qua sub *cautelis tabulæ de phthifi* plura diximus.
 10. *Expectorantia* faburram humorum ad pectus inclinant, & hoc ipfo ftatibus & corruptioni incrementum adferunt. *Vid. tabul. de phthifi.*
 11. *Absorbentia* marina per *acidum tartari* vel citri fatiurata, maiorem habent efficaciam abfterfivo diureticam, & præcipitant fimul acriores partes in maffa fanguinea, quæ alias ca'orem augment.
 12. *Nitrum* vlcerationi quidem internæ non prodeft, sobrius tamen & peritus illius vfus, cum abforbentibus coniunctus, aut illis subordinatus, neceffarius fere eft ad æftum febrilem mitigandum.
 13. Aequalis humorum diftributio, non autem diaphorefis indicatur. Hinc *antimonium diaphoreticum* in hoc adfectu nihil prærogativæ habet, nec reliquæ ex antimonio parata. Optandum alias, vt *Syluiana* antimonii diaphoretici commendatio ad vlcerationes internas experientix fati faceret.
 14. *Sudores* nimios & *diarræhas*, conclamati & funefti niali figna, adftringentibus & iteratis anodynis adgredi, nihil aliud eft, quam mortem accelerare; *moderari* autem hæc excretiones, circumfpectæ artis eft. Cauendum autem

- autem, ne largior fudor, quo febris lenta ordinarie soluitur, cum hectico confundatur.
15. *Aër* humidus hecticis magis amicus est, quam siccus. Hinc veteres *navigationem* commendabant.
 16. Sic etiam omnes humectationes illis conueniunt quævis autem animi pathemata insigniter nocent.
 17. *Locorum mutatio*, ad modestam corporis succussionem obtinendam, non est spernenda, & *equitatio* a *Sydenhamo* laudata, sicut tantum sane valebit, quantum *navigationis veterum in Ægyptum*,
 18. A medicatione *continua* abstinendum est, maxime si euphoria aliqua succedat. Simul ac autem noua exacerbatio recursum minatur, medicatio mature repetenda est, cum primis si periodus solstitialis aut æquinoctialis existat, quo tempore etiam diæta corporis & animi esse debet temperatissima, ne motus gliscentes prouocentur.
 19. Quo magis vero hectica ad ἀκμὴν peruenit, eo magis ab omni medicatione abstinendum, & exitus sub analepsi gelatinosa expectandus est.
 20. Cum his cautelis conferri merentur illæ, quæ *tabula de phthisi* indicatæ sunt.



TABVLA LXXI.

DE
FEBRIBVS MALIGNIS
ET
EPIDEMICIS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

1. *Febres malignæ* sunt febres acutæ & contagiosæ, in quibus principium vitale subtilissimam quandam materiam, quæ corpori nostro repentinam perniciem minatur, motibus febrilibus, indoli materialis noxæ satis accommoda-

modatis, eliminare atque hac ratione præceptis periculum auertere intendit.

2. *Febres epidemicæ* sunt itidem febres acutæ, plus vel minus malignæ & contagiosæ, in quibus natura agilissimam materiam, quæ tamquam causâ communis plures eodem tempore homines infestat, motibus febrilibus ex corpore proscibere, & hoc modo corruptionem putridam præcauere adlaborat. Deriuatur ab ἐπι & δῆμος, populus.

II. DIFFERENTIA.

1. Exigua quidem est differentia, quæ inter *malignas & epidemicas* intercedit, negandum autem non est, quod interdum epidemicæ, e. g. variolæ, morbilli, occurrant, in quibus malignitatem notabilem non possumus accusare, & malignæ non semper sint epidemicæ, id est, populariter grassantes.
2. Differunt malignæ malignitatis *gradu*, cuius respectu in *peste* summus est. Vnde febres pestilentes *per malignæ* dicuntur. Hunc excipit febris petechialis, castrensis, seu Hungarica. Mirioris gradus sunt febres catarrhales malignæ petechizantes, purpura, variolæ, morbilli, dysenteria.
3. Præter ea tempora & tempestates malignitatis adferunt notabilem differentiam. Notum enim est, quod hæc febres hoc anno maiorem, altero autem minorem edant stragem.
4. Porro malignæ febres sunt vel *simplices* vel *complicatæ*: modo enim cum peripneumonia, pleuritide, modo cum febribus intermittentibus &c. sunt coniunctæ.
5. Ceterum vt de malignitate rectius, quam vulgo fit, sentiamus, notandum est, quod febres malignæ adpellantur illæ, quæ ex propria sua indole & constanter malignæ sunt. Vnde ab aliis febribus, quæ per accidens tantum mali & periculosi moris obseruantur, bene distinguendæ sunt.

III. *SIGNA.*

1. Insolita & repentina virium debilitatio sine causa manifesta.
2. Animi abiectio cum tacitis vel vagis anxietatibus & præmaturato mortis præfagio.
3. Sub initium morbi non raro lipothymia accedunt; nonnumquam etiam in incremento.
4. Adfunt commotiones febriles, si aliunde perturbationes excluduntur, satis moderatæ. Vnde neque vehementem calorem, neque pulsus insignem exagitationem offerunt, cuius potius frequentiam & eeleritatem cum paruitate illius compensant.
5. Vacillatio mentis obliuiosa, vel vera deliria, cum agrypnia fere continua.
6. Insidiosa symptomatum dissimulatio.
7. Secretionum & excretionum internarum suspensio & retentio notabilis. Vnde alui stricturæ & vrinæ exigua mutatio.
8. Breui temporis ambitu pleræq; absoluuntur, & breue hoc tempus in longe breuiores *opportunitates* inclusum est.
9. Intra hosce dies fomes febrilis vel ex toto corpore, vel ad minimum ex partibus nobilibus ad peripheriam expellitur.
10. Pleræque enim sunt exanthematicæ, hoc est, insignes quasdam eiectiones ad peripheriam corporis proferunt.
11. Propius accedunt ad indolem continentium quam continuarum. Vnde crisin strictè dictam non exhibent.
12. Quo minus negotium ad vota succedit, eo facilius motus conuulsiui superueniunt.
13. Ceterum epidemicæ sunt vere contagiosæ, & plures homines vno fere modo & iisdem plane symptomatibus infestant.

IV. *SVBIECTA.*

1. Quamuis malignæ & epidemicæ nulli facile homini parcant, præ aliis tamen occupant plethoricos, sanguineos, iunidos & speculabundos.

2. Purpura alba *puerperis* in hisce regionibus familiarior, quam aliis, obseruatur.
3. Variolæ & morbilli infantibus magis eueniunt. Plura videantur tabulis specialibus.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est materia longe tenuissima, mole paucissima, agilitate potentissima. Vnde inuisibilis halitus forma de corpore in corpus transferri, atque praesentissimos & latissime grassantes pessimos effectus indole sua fermentescente putrida producere potest.
2. Causa *efficiens* est principium vitale, quod repentinum hoc periculum per motus quidem qualescumque febriles auertere adlaborat; quoniam autem per materiae pessimam indolem, inops quasi tempestiui consilii, in terrorem coniicitur, animum & vires facile abiicit, & multis motuum trepidationibus atque anomaliis sese opponit. Vnde negotium non raro infauste succedit.
3. Causas *occasionales externas* exhibent tabulae specialiores.
4. Ceterum quod ad exanthemata attinet, nullum fundamentum habet adfertio illa, quod ex *corporali & mechanica necessitate* cuti impingantur, quia particulae talem habeant figuram, quae solum cutis poris quadret. Docet enim non raro tristes experientia, quod haec materia, quae multo labore ad cutim deducta fuerat, paucis momentis ad interiora recurrat. Hinc rationi magis consentaneum est, quod ipsa natura noxiam hanc materiam a nobilioribus partibus ad ignobiles, minus necessarias, robustiores & euacuationi aptiores exprimat. Vt paucis dicamus: veterum locutiones de propulsione materiarum noxiarum ad partes ignobiles, plus habent veritatis, quam recentiorum figurae pororum exquisitae, ad captandas specificas materias in hac & non in alia parte efformatae.

VI. PROGNOISIS.

1. Quoniam causa materialis, quae in malignis est, efficaciam habet, ut corruptionem putridam repente inducere

re possit, sanæ rationi respondet, vt periodus febrium malignarum breuis sit, & materia, quæ præceps periculum minatur, satis mature eliminetur. Hinc febres hæc omnes periodum formant acutam, & nonnullæ peracutam, ita vt prior septem dierum ambitum, posterior autem dimidium tantum septenarium pro termino fatali agnoscat, intra quem vel ad mortem, vel ad salutem declinant. Licet enim catarrhales malignæ & variolæ ad finem secundi vsque septenarii sæpe se extendant, fit tamen hoc ob mitiorem in his malignitatis gradum. Reliquarum autem contagiosarum acutarum ἀκμή, seu vigor primum septenarium non transcendit, & si hoc tempore potior ad minimum causa non superatur, summe ambigue & periculose cedunt.

2. Si intra primum septenarium conueniens *eccrisis* satis libere facta est, spem facit felicitis exitus. Quando autem languide & non sat largiter hæc successit, valde anceps lusus.
3. Effectus corrumpens quando euitari plane non potest per plenissimam materiæ euacuationem, sub halitus forma obtinendam, tolerabilius est, corruptionem talem ad ignobiles partes externas ante deuolui, quam effectum suum noxium humoribus, vel ipsis adeo partibus nobilibus, & ad conseruationem vitæ directe pertinentibus, induxerit.
4. Vnde non tantum variolæ & morbilli, tranquille in superficie efflorescentes, & efficaciam suam vlcerosam ibidem exferentes, saluberrime decedunt, sed & ipsa pestis, quæ carbunculos, vel ad minimum bubones, circa exteriores partes producit, spem salutis multo maiorem ostendit, quam si nihil harum rerum contingat, & solæ anxietates cum capitis grauissimis perturbationibus adsint.
5. Quamquam enim & illi passim succumbant, qui carbunculos habent & bubones, fit tamen hoc vel ex eo, quod hæc exanthemata tardius eruperint, & ita totam materiæ labem non complectantur, vel quod corruptio illorum putrida velocissime facta sit, seque in humores late diffuderit.

6. Quæ

6. Quæ male cedunt malignæ, illæ inflammationes internas subtilissimas, acerrimas & corruptiones sphacelosas præcipites moliantur; id quod de peste præcipue notum est. Ante enim, quam cadavera refrigescunt, ita se exserit putrescendi energia; vt mox turgescant, liuescant, nigrescant, & deinde in tabum diffuant.
7. Ad calamitosum euentum non exiguum pondus adferunt:
- 1) Abundantia sanguinis commoti, præcipue, si dyscrasia concurrat.
 - 2) Læsiō visceris cuiusdam, quæ vix vñquam spem relinquit.
 - 3) Adfuetudo motuum peculiarium translatoriorum, v. g. hæmorrhagarum, vomitionum, diarrhœarum, dolorum capitis rheumaticorum, pectoris infarctum, faucium & aurium adfectum.
 - 4) Indoles morbi fallax, quæ efficit, vt contagium mox non possit obseruari, neque maturo consilio superari.
8. Salutaris effectus non alia via sperandus est, quam sensim progrediente *secessione* noxiæ materiæ a reliqua humorum massa. Hæc contingit, dum sub motu progressiuo & adpulsiō ad talia loca, quæ eius modi materiis aditum præbent, dilabatur, secedit & tandem penitus excedit.
9. Nullum autem in toto corpore diuerticulum, ad hanc secessionem admittendam, aptius est, quam *superficies*. Post hanc capacitas quidem *intestinarum* præ aliis idonea esset, periculo autem non vacat, si talis materia ad interiora viscera & intestina ducitur.
10. Petechiæ simpliciores propria sua indole *sero* efflorescunt. Quæ vero mature, copiose & saturate adparent, illæ deterioris, vel plane pestilentis sunt indolis.
11. Carbunculi pestilentes, qui nimis cito & numero plures erumpunt, illi expertorum Practicorum testimonio sunt infames.
12. Animi trepidatio, sub initium accedens, boni non est præsagii.

13. Quo maior est virium lapsus, & symptomatum dissimulatio, eo grauius periculum est metuendum.
14. *Diarrhææ* moderate succedentes, non sunt noxiæ, & licet morbum non soluant, longe tamen tolerabiliores sunt, quam alui adstrictiones.
15. *Nerium hæmorrhagiis*, extra dies iudicarios & criticos contingentibus, parum fidei habendum est. Quando deliria & aphthas adferunt, prælagii sunt pessimi, melioris autem, quando deliria prægressa minuunt, vel soluant.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quem ad modum malignæ per se, extra specialia ab indiuiduis impedimenta moderatis, ordinatis & prouidis motibus progrediuntur, ita Medicus hunc eius genium ita ante oculos habeat, vt non tantum euitet methodum contrariam, præcipitem, turbulentam & exagitantem, sed & caueat, ne a symptomatibus illis, quæ per indiuiduorum malos mores inducuntur, in illum errorem prolatabatur, vt in his consulere velit, posthabito morbi primarii respectu.
2. Hinc primis diebus nulla remedia, præter pulueres absorbentes, cum antimonio diaphoretico & nitro propinentur, continentia tranquilla & tepida, quanta vniquam obtineri potest, respiciatur & iniungatur, omnes autem commotiones calidæ, expulsiuæ, & ex contrario refrigerationes euitentur.
3. Quando morbus ad *αικμήν* peruenit, temperatissima alexipharmaca paucis & repetitis dosibus coniungantur, regimen autem sudoriferum excludatur. In non nullis, præcipue variolis, hæc alexipharmaca non sunt necessaria, immo ne quidem vtilia.
4. Analeptica temperata interponantur? *Conf. cautela.*
5. Ceterum, quia extra & ante periodum conuersio in melius non est speranda, Medicus *expectationem* non quidem otiosam, neque tamen etiam intempestiuam negotiis occupatam sibi habeat commendatam, & energiam naturæ sub grauissimis etiam turbis firmissime credat.

6. Hæc methodus simplicissima quid possit in morbis tam arduis & periculosis, experientia docebit.
7. *Vomitus* promotionem placidissimam absolute quidem non reprobamus, pro vniuersali autem methodo illam non habemus. Per hanc enim crassam euacuationem nequaquam potest exantlari materia maligna halitiosa, sed illa tantum, quæ forte in ventriculi cauitate a fermentatiua efficacia in bilioso acidam acredinem conuersa est. Hinc vbi indicia huius in hoc vel illo indiuiduo adsunt, ibi modesta vomitio non contemnitur. Hæc autem de peste præcipue valent, in aliis enim malignis ipsi vomitoriorum patroni, *præter Apinum*, vomitum non facile commendant.
8. Quando febris periodum suam cum euphoria absoluit, caute se gerat patiens circa adpetitum & aërem frigidum. Hinc sensim aëri adsuescat & essentiam alexipharmacam continuet.

VIII. CAUTE LAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Si vniquam alibi, certe in malignis conuenit animum diligenter aduertere ad duo hæc phænomena: videlicet primum, quid in hisce febribus fiat *sine artificijs*, & deinde quid effatu digni obtineatur in iis, qui *remedia* adhibent. Hac enim ratione vana atque friuola fiducia, quam in traditiones variorum remediorum vulgo collocant, in talem moderationem reducitur, vt methodum, quam Deus naturæ humanæ iniunxit, pro optima sapientia & maximo arcano habeamus, inanes autem persuasiones, quas de summa & indubia medicamentorum potestate imbibimus, hic deseramus.
2. Et quem ad modum *motus* febriles in hisce febribus a natura ita instruuntur, vt *materie indoli* quam maxime quadrent, ita cardo totius negotii in eo vertitur, vt methodum hanc naturalem sequamur, eandem promoueamus & iuueamus; illa autem commenta opinionum, quasi arte commodior methodus, quam naturalis est, instrui possit, exterminemus.

3. Hinc

3. Hinc materia peccans ad *peripheriam* corporis, non autem ad alium locum, est dirigenda. Atque hoc fieri debet per directiones ad siduas quidem & nullo modo interruptas, attamen moderatas; breui quidem ambitu, sed non præcipiti impetu.
4. Sub hac opera opportunitates temporum seu momenta periodica exquisita, quæ *critica* dicuntur, sunt obseruanda. Hæc si obseruantur & natura non turbatur, materia peccans per excretiones periphericas, siue *simpliciter diaphnoicas*, siue *exanthematicas* eliminantur, & optima spes est salutis.
5. Rationi consonum est, materiam hanc peccantem per nullam aliam viam commodius & feliciter posse excerni, quam per *transpirationem*, Hac enim ratione *latius* dissipatur, & *vis unita*, quæ alias fortior est, infringitur.
6. Hinc tam contra rationem, quam experientiam impingunt illi, qui materiam hanc halituosam crassis commouendi & euacuandi methodis adgrediuntur. Non minus absurdum est, materiam in humores late expansam & disseminatam, per *particularem* quamdam euacuationem cum periculo in vnum locum, e.g. in ventriculum & intestina colligere, & ibidem eliminare velle.
7. Est autem fallacia *non causse vt causse*, quando materiæ pestilenti primariam sedem in primis viis ex eo adligant, quod superficies interna ventriculi & intestinorum *nigra* conspecta sit in corporibus, peste peremptis. Dubitandum enim est, num hæc constitutio sit vniuersalis: præter ea fieri potest, vt miasma vel per saluam infectam & deglutitam in ventriculum incidat, vel ex massa sanguinea ad primas vias potius, quam ordine inuerso recedat.
8. Et licet verum esset, quod venenum contagiosum *primum aditum* per *ventriculum* inueniret, non ferret tamen materiæ illius conditio, per crassam methodum illam eliminare. Diu enim in cavitare non fluctuaret, sed texturam altius penetraret, quam vt crudo vomitu posset exant-

antlari. Tacemus maxima illa detrimenta, quæ per vehementiam vomitus motibus vitalibus, qui in malignis solent esse moderati, inferuntur. Et cur non potius *alexipharmaca*? hac enim, si quid vniquam ad venenum edomandum valent, hic certe valerent, vbi materiam pestilentem proxime attingere possent.

9. Hæc omnia, quem ad modum dubitare nos iubent, an materia contagiosa ventriculum sæpe obsideat, & vsum vomitoriorum, quem vulgo rationalem habent, exposcat: ita *effatum Hippocratis: exsoluta aluo, febris soluitur*, veritati simpliciter non respondere, nemo nescit Practicorum.
10. Reiecta methodo crassa euacuatoria emetica & cathartica, de *methodo correctoria* notamus, quod & hæc hoc loco minimam spem faciat: materiam enim malignam vti natura mouendo & excernendo vnice superare intendit, ita cauere sibi debet Medicus a vanis artificiis & corrigendi tentaminibus.
11. Itaque methodus restat *diaphoretica*, quæ ad salutarem progressum, decursum & exitum febrium malignarum contagiosarum præcipuum est momentum.
12. Notandum autem est, quod hic non minus excludantur fortes humorum commotiones per medicamenta calida & regimen coactum. Incondita enim illa persuasio, quod in violentis sudationibus & feruidis remediis vnicum veneni expellendi præsidium sit, maximam quouis tempore edidit stragem. Et quando sub prætextu exanthematum expellendorum sub initium admittuntur, sana deinde consilia atque remedia raro habent locum. Vnde in suscipienda exanthematum promotione quam maxime caueatur, ne quid intempestiue & præmature per inconsultam exstimulationem tentetur. Et sane quantum damni intemperatæ commotiones adferant in *febre purpurata miliaris*, hic loci addiscere possumus.
13. Quem ad modum autem *festinatio* præmatura euitanda & violenta methodus excludenda est; ita ex contrario

cunctatio negligens non debet admitti, multo minus tempestiuus successus turbari.

14. Totum negotium ita vult administrari, vt *media via*, quæ vnice salutaris est, teneatur. Est autem hæc transpiratio liberissima, paullulum aucta, moderata madefactione conspicua, quantum vniquam fieri potest placidissima per longum tempus modeste & iugiter continuanda. Hanc promouet sufficiens potus tepide sumtus, pulueres febriles, sub methodo indicati, & temperatissima alexipharmaca, exiguis dosibus sumta, & post aliquot horarum interuallum repetita.
15. Non exigua autem est difficultas, quæ ex parte *agrorum* tranquillæ continentia & saluari febris successui sæpius obicitur, quando vel sponte sine phantasia & voluntatis conscia concursu peruersè se gerunt, vel per immorigeram voluntatem varias anomalias inducunt, e.g. quando sanguinei motibus voluntariis, cholericis impetuosis, & sic vtroque modo *moderamen* motuum vitalium transgrediuntur. Item quando priores anxia, posteriores importuna impatientia diurnas & continuas transpirationes respuunt, medicamina negligunt, potum frigidum extorquent, vel aliis modis immorigeros se gerunt.
16. *Alexipharmacorum* vera æstimatio bene distinguenda est a fallaci illorum prædicatione. Vti enim specifica rara sunt, ita reliqua, quorum effectus est remotior, ambiguus & fallax, exposcunt methodum circumspectam, non autem nudam empiriam.
17. Sic verbi gratia andacissima quidem est adfertio illa, quod *totus ceruus sit alexipharmacus*, cui vero venenorum generi vniquam vere quid subtraxerit, non constat.
18. Hoc tanto magis valet de *unicornu*: quem ad modum enim id, quod *verum* dicitur, in pharmacopoliis non reperitur, licet in formulis semper præscribi soleat, ita absolum est, *marino*, nedum *fossili* eandem efficaciam tribuere, quam vulgo *vero* adscribunt.

19. *Theriaca, mithridatum, philonium* & alia confusa magis, quam composita remedia, plus sane damni, quam auxilii adferunt. Hinc ad iusta Dei iudicia referendum videtur, quod falsæ de his remediis traditiones vniuerso fere terrarum orbi imposuerint.
20. Quod *vena sectiones* in febribus malignis *curatorias* nullo modo probemus, *tabula chirurgica de vena sectione* cum sufficientibus rationibus indicauimus. Hinc quando insignem plethoram in ægro quodam obseruamus, institui illa debet in principio principii.
21. *Opiatorum* abusus stupores, deliria, angustias & anxietates inducit, deinde sudationes frigida sequuntur, & has mors excipere solet.
22. Quem ad modum *repentinæ & impetuosa diarrhæa* in peste & variolis periculum minantur, & neque per adstringentia; neque per fortes diaphoreticas commotiones, huic malo iuste consulitur, ita adseueramus, quod *pulis corticis cascarilla* omnibus aliis præferri mereatur. Conducit etiam præcipue in *peripneumonia concursu*, non minus in circumstantiis illis, quæ *sedantia* exposcunt. Quum enim *narcotica* semper adferant stupidos, remulentos, turbulentos, caput grauantes & deliros effectus, hic cortex sine hisce damnis efficit, quidquid bonæ spei par est, & sedatio, quam adfert, e salubri qualitate proficiscitur. Quando autem anodynum effectum ille non exferit, alia soporifera effectum certe calamitosum introducent.
23. Rationi consentaneum est, quod in plerisque malignis, præcipue directe exanthematicis, *aluus* plerumque *adstricta* sit, maxime tempore illo, quo exanthemata excluduntur. Quando enim partes interiores constrictæ sunt tum humores ad exteriora loca vberius secedunt, ad interiores autem partes non fit largior aditus. Vnde etiam vrina multum non mutatur. Inter ea multa subiecta eius modi constipationem alui non experiuntur, & hæc sunt illa, quibus motus febriles ordinate atque tranquille succedunt.

24. *Sitis* in aliis quidem febribus semper fere est insignis, in malignis autem, uti sub *signis* indicauimus, non raro satis moderata obseruatur. Neque hoc sine ratione: in his enim peccantes materiae crassa copia non fecernuntur, & febrilis commotio, quae calorem & sitim parit, tanta hic non est, ut ingentem diaphoresin promoueat, & hinc humoris defectus multum resarciri debeat.
25. *Diuretica* circumspecte in usum vocanda sunt, ne intempestiua stimulatione, materia peccans, dum per intimiores corporis partes ad vias vrinarias ducitur, ab ignobilibus ad nobiles reuocetur. Hoc respectu in febribus malignis manifeste exanthematicis locum non concedimus directis diureticis. Ipsa enim natura paullulum constringit colatoria interna, ut noxia materia ad peripheriam educatur.
26. Excipimus autem *nitrum*, quia hoc efficacia magis inuertente, quam diuretica euacuante praeditum est. Egrege enim temperat, dum non solum tenues, acres humores moderate inspissat, & efficaciam putridae fermentationis potenter infringit, sed & sensum rosionis, ardoris, immo verae vstionis mitigat, & ipsas inflammationes minuit & temperat. Propinandum autem est a granis 4. ad 6. vel ad summum 8. miscendo illud cum absorbente quodam & antimoniato fixo, & tum omnis generis feroces exacerbationes sincerius & nihilo etiam tegnius quam *opium* placabit.
27. *Antimonium diaphoreticum* ita praeparatum esse debet, ut ab omni effectu vomitorio - cathartico - alienissimum sit, & tum in eius modi sensibilibus morbis & subiectis efficaciam exferit blandissime diaphoreticam, atque *bezoardico minerali*, quod vulgo multis encomiis extollitur, praerogatiuam non concedit.
28. *Absorbentium* vsus in malignis quibuscumque vix vquam negligendus est: non tantum enim illa remedia occupant causas antecedentes, bilioso-fermentatiuo acidas, acres, sed & effectus a commotione humorum febrili sub-

subnascentes. Effectum suum præcipitantem ita exferunt, vt cum acidis particulis simul agiles sulphureas irretiant.

29. Et quoniam præcipue in peste animaduersum est, quod ægri saburram biliosam, ex acidorum cum bile concursu intente viridem, per vomitum reiecerint, vel post mortem in ventriculo habuerint, spes non est vana, absorbentia in eiusmodi casibus operæ pretium esse factura, & eo ipso litem illam, quæ de vomitus necessitate vel utilitate mouetur, facile compositura. Certe enim prudens illorum administratio, non solum ambiguitatem circa vomitus promotionem expedire, sed & vera emolumenta atque salutares effectus adferre potest.
30. Praferimus autem *conchas*, sine igne præparatas, & *matrem perlarum* ipsis *cancrorum oculis*. Minore enim cum impetu solutionem & absorptionem vti peragunt, ita & hunc effectum suum in corpore humano tranquillius absoluerunt obseruantur. Tacemus *cancrorum oculos*, sæpissime adulteratos, indolem habere terreorum reliquorum crassorum, quæ tanquam noxia hic excludimus. Atque inter hoc est præcipue *cornu cervi* tam vsum, quam philosophicum.
31. *Acida* non coniungenda, sed *opportune subiicienda* sunt *absorbentibus*: hæc enim primas vias magis respiciunt & humores præcipitant. Vnde prudenter discernenda est adparens illa repugnantia, per absorbentia acores obrundere velle, & tamen acida in vsum trahere. Morbidi enim fermentatiui, bilioso-sulphurei acores alterius plane indolis sunt, quam sinceri, vel crassiore oleosa compositione exuberantes. Et hæc ratio est, quod acidis mineralibus in eadem formula absorbentia non debeant sociari. Liquamen autem ex saturatione succi citri cum absorbente quodam, seposito crassa sedimento, locum quidem habet, sed magis in aliis acutis, quam in malignis. Exerit enim efficaciam maiorem, quam

- imperitus crediderit, præcipue quando pectoris oppletio vel tussis coniuncta est.
32. Ex acidis autem primum locum adsignamus *acido citri*, alterum *spiritui sulphuris per campanam*, tertium *spiritui vitrioli & clyffo antimoniū sulphurato*; modo obseruetur, quod acida mineralia parca dosi sint adhibenda.
33. Acida compescunt acriores putrescentes fermentationes & æstuosas febriles exagitationes. Vnde *Thonerus* non exiguam in patria existimationem adeptus est, quod iulapia, insolito tum temporis more, fecerit acidula & iucunda.
34. De *aceto* speciatim notandum est, quod efficacia illa, quam *simplex* habet, non referenda sit ad *destillatum*: hoc enim nimis est penetrans & subtile, atque raucedinem ci-et notabilem. Quadrat autem acetum simplex melius *vehiculo alexipharmacorum*, quam aliis formulis.
35. *Analeptica* non debent continere *acria aromata*, sed temperata, & gratus sapor, qui per saccharum aut sirupos iis conciliatur, non est reformidandus, neque etiam acidorum vsus pro scopo corrigendi coniunctus, si solas *variolas* excipias: In his enim & ratio & experientia acidorum vsum dissuadet.
36. *Aqua destillata*: scabiosæ, scordii, galegæ, cardui benedicti, plantaginis, diapnoën placidissimam & benignissimam promouent: Atque cum his iulapia acidula commode possunt componi, sed sine admixtione *absorbentium*, præcipue si acida *mineralia* adiecta sint.
37. *Sulphur crudum* licet certissime expellat, in malignis tamen non commendatur, quia commotionem exæstuantem concitat.

TABVLA LXXII.
DE
FEBRE CATARRHALI MALIGNA
PETECHIZANTE.

I. DEFINITIO.

Febris catarrhalis *maligna* est febris acuta secundaria, qua natura moribus secretoriis & excretoriis, ultra consue- tum tenorem auctis, materiam catarrhalem, in lymphâ spissiori hærentem, valdeque acrem & agilem, vnde- cumque prognatam, eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Quod febris catarrhalis & petechizans, item quotidiana veterum continua phlegmatica, dulcis & salsa, *specie* non differant, sed tantum *gradu*, tabula de febre catarrhali *benigna* iam indicatum est.
2. In quantum autem *petechizans epidemice* grassatur, & ab indole benigna febris catarrhalis *simplicis* recedit, atque ad varias excurrat anomalias, in tantum peculiari indiget tractatione.
3. Quo modo hæc febris catarrhalis maligna *petechizans* a febre *petechiali*, *Hungarica* & *castrensi* differat, collatio huius & sequentium tabularum docet.
4. *Macula*, quæ hac febre efflorescere solent, non sunt confundendæ cum maculis *scorbuticis*.
5. Differt tandem a *morbillis*, *purpura miliari* & *purpura urtica*. *Vid. tabula* harum febrium *speciales*.

III. SIGNA.

1. Quæ signa præcedente tabula de febre catarrhali *benigna* indicauimus, illa plurimum etiam valent de *maligna*.
2. *Malignitatis* autem magis *propria* indicia sunt:
 - 1) Angor animi insignis.
 - 2) Repentina virium exsolutio.
 - 3) Agrypnia fere continua,

- 4) & abſtinentia a cibis, ad vndecim & plures dies continuans.
- 5) Lipothymiaꝝ intercurrentes.
- 6) Deliria.
- 7) Præter ea in hac catarrhali *maligna* dolores valde ſenſibiles & tendentes circa dorſum & artus occurrunt,
- 8) quibus ſæpe ſuccedunt maculaꝝ illæ, ſeu *petechiæ*, a quo ſymptomate febris ordinariæ vocari ſolet *petechialis*, ab Italico *pedechio*, pediculus, pulex.
- 9) Quæ *petechiæ* interuentu medicamentorum calidorum facile augentur.
- 10) *Angina* & *aphthæ* huic feбри præ omnibus aliis facile ſuperueniunt, maxime vbi aluus eſt clauſa.
- 11) Non pauci quoque ægrotantium *diarrhæis* adſiguntur, ad quas hæc febris ad modum prona eſt, & ſæpius hiſce *quafi critice* ſeſe ſoluere ſolet.
- 12) *Purpura alba* cum hac febre ſæpius complicatur, præcipue ſi methodo inconueniente tractata fuerit.
- 13) Siſtit plerumque indolem *continentis*, & ſine inuaſione cum frigore & horrore plurimum accedit; ab accidentali autem cauſa in quibusdam cum frigore ſeſe manifeſtat.
- 14) Eſt quidem ordinariæ ſine *typo*, & ſtatas exacerbationes, quas aliæ continuæ exhibent, non agitatur, ſed non ſine *periodo*, nec ſine *indicatoriis* & *criticis alterationibus*, licet ad *criticas excuſſiones* ineptior obſeruetur.
- 15) Nonnunquam autem indolem habet *continua* & tum quidem non ſolum cum horrore inuadit, ſed &
 - a) Aeſtus eodem tenore continuat per totam noctem.
 - b) Sequenti autem die, in primis circa meridiem, aliquantulum remittit.
 - c) Circa vesperam denuo adoritur, cum ſymptomatibus ordinariis.
 - d) Primis diebus remittente paroxyſmo nullus conſpicitur ſudor, ſed tantum lenis vdor,
 - e) Continuatur hoc modo vsque ad finem ſeptenarii, vbi ſudores lenes poſt exacerbationem obſeruantur.
 - f) In

- f) In aliis quarto statim die augetur transpiratio.
 g) In aliis septimo die catarrhus imminuitur, vel plane tollitur.
 h) In non nullis eodem tempore paroxysmus augetur, & post ea petechiæ efflorescunt.
 i) In aliis aliud schema induit.
- 16) *Contagiosa* est, more febrium malignarum.
 17) Tandem hoc adhuc peculiare habet, vt cum aliis morbis facile complicetur, vel pro anni mutationibus illorum schema exhibeat, e. g.
- a) Mense *februario, martio, aprili*, sub pleuritidis & febris tertianæ schemate adparet.
 b) *Maiò & iunio* anxietatibus cardialgicis, & hypochondriacis innotescit, & cum febribus cholericocausodeis facile complicatur, vbi simul in quibusdam circa initium morbi *enormes hemorrhagia* eueniunt.
 c) *Iulio & augusto* dysentericiæ schema ludit.
 d) Reliquis mensibus multa tussi affligit.

IV. SVBIECTA.

1. Quia contagiosa est hæc febris, inuadit, vbi grassatur, omnis generis subiecta.
2. Ea tamen intercedit differentia, vt teneri, delicati, otiosi, timidi, multo magis ab illa corripiantur, quam robusti, laboriosi, & tempestatibus quibuscumque insalubribus adfueri.
3. Præcipue etiam illos inuadit, qui ad catarrhos alias præclives sunt, & excretiones naturales, in primis sudores spontaneos, neglexerunt.

V. CAUSSÆ.

1. Causas febris catarrhalis summam præcedente tab. LXVII. indicauimus; quæ autem causæ catarrhalem *malignam* producunt sequentia docebunt.
2. Causa *materialis* est catarrhus acris causticus, seu miasma maxime subtile, fermentescens, & putridum quid inferens.
3. Causa *efficiens* est laboriosum naturæ conamen, per mo-

tus febriles noxiam illam materiam ex corpore profcribere, & hac ratione corruptionem imminentem præoccupare.

4. Causæ *occasionales*, quæ hanc febrem prouocare solent, sunt potissimum sequentes:
 - 1) *Aër* fermentescentibus & putridis exhalationibus repletus.
 - 2) *Contagium* per alios hæc febre correptos; quo casu timor & auersatio multum contribuunt.
 - 3) *Fructus fugaces*, hortenses vel alii cibi fermentescentes.
 - 4) *Refrigeratio corporis exæstuantis*.
 5. *Frequens animi excandescencia*, eaque supprimenda.

VI. PROGNOISIS.

1. Quæ præcedente tabula de *febre catarrhali benigna* ratione *prognoseos* diximus, illa etiam de hac febre, licet maligna, plurimum valent.
2. Præter ea notandum, quod maculæ quidem non absolute sint de *essentia* huius febris, & rectius hinc *petechizans*, quam *petechialis* adpelletur, inter ea tamen eidem præ aliis proprium est, maculas tales proferre.
3. Et licet hæ maculæ pro pure critica excretionem, quæ determinatis diebus, immo horis adligata est, non habendæ sint, pro *absolute* tamen *symptomatica* excussione non possunt declarari, sed potius pro *ëccrissi* utili, ita ut hæ maculæ, sibi relicte, nec præcipitanter concitata, morbum quodam modo subleuent.
4. Quæ maculæ ante *septimum* diem erumpunt, illæ tam salutaris exitus non reperiuntur, quam quæ circa eundem efflorescunt.
5. Quæ *post* primum septenarium proueniunt, illæ magis salutaris adhuc euentus sunt, quam quæ *circa* eundem se se manifestant.
6. Quæ nimis copiose erumpunt, illæ plerumque cum periculo retrocedunt.
7. Quo magis rubicundæ sunt maculæ, coloris rosei, & post tres vel quatuor dies sensim iterum euanescent, ac ægrum

grum aliquo modo subleuant, eo melioris spei censenda sunt; quo magis autem ad colorem saturatiorem nigricantem, & liuescentem accedunt, eo deterioris sunt prælagii.

8. Quando post eruptionem macularum euphoria non sequitur, *purpura miliaris* sæpissime adhuc expectanda est.
9. *Delirium* ante primum septenarium minoris est periculi, quam illud, quod post eundem occurrit.
10. *Sudores* iusto citius erumpentes, placidum morbi decursum turbant, & facile in nimios, summeque debilitantes, degenerant.
11. *Diarrhæa*, licet reliquis febribus exanthematicis, e.g. variolis, infelicem retrocessionem, & hinc non raro mortem admaturare soleant; in *petechizantibus* tamen hoc obseruare non contingit: quamquam enim morbum non soluant, nec vllum insigne emolumentum hisce febribus adferre videantur, nullum tamen notabile damnum inferunt, & longe minoris periculi obseruantur, quam alii *adstrictiones*.
12. *Hippocratis* effatum: *soluta aluo febres soluantur*; cum grano salis hic accipiendum est, & non nisi certis circumstantiis quadrat. Quamquam enim *diarrhæa spontanea*, huic feбри superuenientes, nihil adeo metuendi portentant, artificiales tamen laxationes minime sunt substituendæ.
13. *Hæmorrhagia narium* extra iudiciaria tempora, cum incremento delirii eueniens, maiora mala prænuntiat, aluo præcipue sicciore: deliria enim & aphthæ facile succedunt; quando autem diuturnis deliriis hæc vel alia hæmorrhagia superuenit, tolerabilior obseruatur. Inter ea obseruamus, quod hæc narium hæmorrhagiæ alio quidem tempore benignioris, alio autem peioris sint prognoseos.
14. *Aphthæ*, quando huic feбри accedunt, ad funestum exitum plerumque inclinant: paucis enim horis ita inualescunt, vt per œsophagum ad ventriculum diffundantur;

cuius signum est borborygnus post potum, es folset bis in den Magen.

15. *Lipothymia* frequentius adfligentes, ad modum sunt periculosa.
16. *Hippocratis* prognosin de fluxione acri caustica præced. tab. LXVIII. iam adlegauimus; quæ proinde hoc loco repetenda est.
17. *Inflammatio*, quæ huius indolis fluxiones sequitur, quo minus *sanguinea* admixtionis inuoluit, eo minus etiam ad acrem effectum vlcerosum properat, sed potius discussione iterum resoluitur.
18. *Vlceratio* autem, quando obtingit, multis modis est deterior, quam simplex *suppuratio*; immo ita maligna deprehenditur, vt facile in putridam sphacelosa corruptionem abeat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. *Correctio* materiae malignæ, contagiosa, pro viribus tentanda est, & sic commotio humorum intestina, & ab illa pullulans acrimonia vlcerosa mitigatur. Ad hanc correctionem eligenda sunt talia alexipharmaca, quæ sine multa commotione *tantum corrigunt*, siue ad excretionem disponunt. Valet hic præ aliis essentia *scordii* cum essentia *radicum alexipharmacarum* mixta: facit quod potest, non autem quod necessitas sæpe postulat: *specificæ* adhuc desiderantur.
2. Lentæ & sensim progredientes lenes *euacuationes* diuretico diapnoicæ magis quam sudoriferæ, promoueantur. Obtineretur hoc felicius
 - 1) per *absorbentia*, absterfuo-diuretica virtute prædita, nempe *acido saturata*, it. per acida, v. g. succ. citr. si-rup. acetos. citr. tinct. rosar. decoct. C.C. & scorzon. citrat.
 - 2) Per *diaphoretica fixa*, e.g. antimon. diaphoreticum, be-zoard. mineral.
 - 3) Efficacissime per maritacionem cum *nitro*.

4) Per

4) Per diluentia.

5) Per potiones diapnoicas, in sanguineis leuiter acidulas.

3. *Virium & Symptomatum* vrgentium habenda est ratio:

1) *Vires* restaurant *emulſiones* ex aqua roſarum, cinnamon. & ſemin. card. bened.

2) *Cephalalgia* & agrypnia occurritur per camphorata, externe adplicanda.

3) *Diarrhœa* excedens tuto tractatur per nitrum & cryſtall. montan. præparat.

B. Methodus ſpecialis.

1. Mante exhibeatur eſſent. alexipharm. cum multa eſſentia ſcordii remixta, ad gtt. 25. 30.

2. Per diem autem puluis bezoard. propinetur, e.g.

Recip. nitr. depurat.

antimon. diaphoret.

ocul. cancr. acido citri. ſaturat. ana drachm. I. M.

doſ. ſcrup. I.

3. Item potiones ex aquis diapnoicis cum præcipitantibus & antimonio diaphoretico paratæ. e.g.

Recip. aqu. flor. acac.

galeg.

ceraſor. nigr.

ſcord.

ſcabiſ.

plantag.

cinnamom. ſine vino ana vnc. I.

antimon. diaphoret. ſcrup. II.

ocul. cancr. drachm. ſemis

ſacchar. perlat. q. ſ. ad gratiam, doſ.

cochl. I. poſt 2. 3. horas repetenda.

4. His ſubinde interponi poſſunt *ſulepi*, aut potiones *acidulae*, e.g. clyſſus antimon. vel ſuccus citri, potui inſtillandus.

5. *Emulſiones* ex ſemine aquilegiae, card. Mariae, citri, valent præcipue, ſi maculae & purpura conſpiciantur.

6. Concurrente *diarrhœa*, eadem quidem manet methodus, pulueres autem nitroſi eo frequentius repetantur, &

crystallus montana adiciatur, obseruato adhuc magis regimine diapnoico.

7. In *adstrictione* autem *alui* sufficiens humectatio, vsus puluerum nitratorum & clysteres, moderate adhibiti, conueniunt.
8. In *doloribus capitis* sub initium spiritus vini camphoratus, deinde autem vnguent. alabastrium camphoratum adhibeatur.
9. Simul ac ægri male deglutire sentiuntur, *gargarismata* subadstringentia, interne & externe discutientia, ac lenissime laxantia tempestiue adhibenda sunt, ne aphthæ præualeant. Idem de *aginodeis* malis censendum est.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quo magis hæc febris epidemica est, & petechizat, adeoque ad veterum quotidianam continuam, a phlegmate *falso* exortam, accedit, eo circumspectiore & leniore methodo adgredienda, ac periodus illius septenaria obseruanda est.
2. Hinc magis adhuc, quam in febre catarrhali *benigna*, cauendum, ne vlla vehemente commotione euacuatoria morbus *primarius*, nempe stagnatio materiæ acris, exagitetur; quod in progressu morbi *secundarii*, scilicet febris, tanto magis euitandum: nimis enim mature & copiose maculæ prodeunt, ac facile recedunt.
3. Procul itaque absint aluum stimulantia, alexipharmaca calida, anticatarrhalia lignosa, succinata, salia volatilia vrinosa.
4. Secus si fiat, maior ad interiora regestitio, inflammationes internæ erysipelaceæ, anxietates, & virium amissio producuntur.
5. Hinc *Baglinius* a simplicibus exagitationibus intempestiuis per alexipharmaco-sudorifera in malignis epidemicis mortem adnunciauit.
6. Specialiter monendum est, quod euacuatio sanguinis per *venæ sectionem* in hac febre summe noxia sit: nam circa dies criticos congestiones humorum versus caput plu-

- plurimum contingunt, & aphthas ac deliria excitant, cum euentu funesto; nisi continuum regimen diapnoicum, statim post venæ sectionem iniunctum, hunc infelicem successum aliquo modo infringat. Hinc etiam Medicus post venæ sectionem demum in auxilium vocatus, regimen diapnoicum sibi commendatum habeat.
7. Non tantum doctrina de *specificis fermentis & fermentationibus* difficilis est, & nulla spes adfulget perspiciendi tandem rationem, cur talia fermenta certas quidem animalium species violentissime inuadant, aliis autem minime noceant, ita vt canes de talibus recenter mortuis sine damna edere possint.
 8. Vnde & huius febris toxium fermentum ad certam corruptionis classē laboriose referre, superuacaneum est; videtur tamen aliquid *scorbutici* fouere.
 9. In *specificum* autem huius febris *corrigen*s inquirere, maioris esset utilitatis.
 10. Dantur quidem *alexiteria*, quæ certæ speciei contagia tollunt, e.g. *scorzonera* delet venenum, per morsum serpentum communicatum; sed *specificum* corrigens contagii, in hæc febre præsentis, adhuc incognitum est.
 11. *Apinus*, in libr. de febribus, multis quidem laudibus *essentiam extracti cascarilla*, præmissio vomitorio exhibitam, extollit, & *Stahlius* bonum inde effectum, sed sine vomitorio præmissio, itidem obseruauit, *specificam* autem experientia nondum confirmata est, quia febris ordinarium suum tempus solet seruare.
 12. Sic nec *elixirium polychrestum*, vniuersale *specificum* habendum est, nam febris statum suum tempus ad 7. 9. 11. dies continuat: attamen continuato eius vsu symptomata multo mitiora obseruantur. Præter ea abusus, non vero moderatus vsus summe debiles reddit ægros, vt diu vires colligere non possint, immo facile in febres lentas incidant.
 13. De reliquo, licet contagium huius febris propria sua indole

dole facis segne & lene obseruetur, ita vt post 3. 4. septimanas demum corripiatur aliquis ex illa familia, in qua ante tantum temporis alter decubuit, variat tamen secundum maius & minus, pro anni, temporis, & reliquarum circumstantiarum diuersitate; imo obseruata sunt non pauca exempla, quæ non decubuerunt hac febre, & tamen maculas experta sunt.

14. Quando autem plures simul, aut breui temporis interuallo ab illa corripiuntur, iusta suspicio subest, quod formido, moeror & insolita fatigatio in alterius ægroti seruitio, sint accusanda. Huc etiam spectat, quando sani cibum suum capiunt in illo conclauis, quo æger decumbit.
15. Dubitat omni iure *Schelhammerus*, num terrea præcipuam suam efficaciam in corpore exferant per *acidi* absorptionem: non enim tam *acidum* et *torbent*, quam particulas *tenuiores sulphureas*, quæ fermentatiuas & putidas corruptiones inferunt, coagulant, & sic illarum agilitatem infringunt.
16. Hinc euenit, vt *absorbentia* ostracodermata sudorem promoueant, quia scilicet acrimoniam talem salino-sulphuream, orgalimum sanguinis inducentem, & hac ratione ventilationem sudatoriam impredientem, feliciter corrigunt, & per diuresin euacuant.
17. Eundem commodum effectum exhibet *nistrum*: in crassat enim tenues catarrhos, & ad motum excretorium & diureticum promouet: vnde etiam in repulso rheumate grauia mala, ab his agilibus particulis expectanda, præoccupat. *Conf. tabul. LXVII.*
18. Quando *petechiæ* erumpunt, *emulsiones* temperantes tutius, quam alexipharmaca fortiora propinantur.
19. Quando *diarrhææ* accedunt, caueat sibi æger, ne sub aluo deponenda frigori se exponat: vnde opus est, vt patina, huic negotio accommodata, ægro decumbenti supponatur.
20. In *tussi catarrhali*, quæ sæpius cum hoc morbo coniuncta est,

est, interponantur *infusa*: hæc enim & materiae excretionem, & diapnoën adiuuant.

21. *Vigilia* nimia non per *narcotica*, sed sufficientem potum, pulueres nitrosos, cinnabarinos, emulsiones & potiones analepticas oppugnandæ sunt.
22. Hæc etiam remedia in deliriis, vel lipothymiis, optima sunt, coniunctis paruis, sed repetitis dosibus bezoardicorum.
23. *Potus* ubique *sepidus* exhibeatur, cibus ægroto recusanti non obtrudatur, & mens, quantum fieri potest, tranquilla commendetur.
24. Finito morbo essentia alexipharmaca aliquam diu continuetur, quo residuum materiae noxiæ prorsus eliminetur; præcipue quando excretiones in ipsius morbi periodo non adeo largas fuisse animaduertimus.



TABVLA LXXIII.
DE
FEBRE PETECHIALI.

I. DEFINITIO.

Febris petechialis est species febrium malignarum fati acuta, in qua principium vitale miasma malignum ex massa sanguinea separare, ad peripheriam corporis in forma macularum, pulicum morsibus similibus, protudere, & penitus denique expellere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt febris *petechialis* a *catarrhali maligna petechizante* ratione *gradus*: quo respectu illa hanc longe superat. Præter ea in *catarrhali maligna* catarrhus semper adest, *petechiæ* autem non semper proueniunt. Vnde *petechizans* tantum adpellatur; in *petechiali* autem strictè

dicta catarrhus non reperitur, maculae vero non tantum perpetuo adiunt, sed & maturius erumpunt: immo dantur casus, ubi petechiae anteadparent, quam aeger decunabit.

2. A *purpura rubra* in eo quidem differunt petechiae, ut nullam in cute eminentiam ostendant, fieri autem non raro solet, ut haec exanthemata sint coniuncta, & alia aliis interspersa, ac tum quidem a se inuicem difficulter distinguuntur.
3. A febre *Hungarica* seu *castrensi* etiam distinguere solent hanc petechialem, & hanc differentiam, utut exiguam, signa huius & sequentis *tabulae* ostendent.
4. Quod a *peste* differat *gradu malignitatis* & dispari *exanthematum* ratione, omnibus fere notum est.
5. Denique ipsa petechialis pro locorum, annorum, & temporum diuersitate diuersos gradus malignitatis & periculi exhibere obseruatur.

III. SIGNA.

1. Haec conueniunt cum signis febrium malignarum.
2. Inuadit autem plerumque circa vesperam cum leni horrore.
3. Aestus, qui sequitur, comites habet dolores capitis insignes, virium amissionem, anxietates praecordiorum, animi summam inquietudinem & abiectiōem, ad lipothymias saepius excedentem.
4. In aliis motus conuulsiui occurrunt.
5. Deliria sunt fere ordinaria.
6. Non raro conqueruntur aegri de faucium ardore, cui nisi arte occurratur, morbi aphthodei vel anginodei succedunt.
7. Petechiae, uti sub *differentia* diximus, maturius erumpunt, quam in *catarrhali maligna*.

IV. SVBIECTA & CAUSSAE.

Haec conueniunt cum iis, quae *tabula de febribus malignis generatim* diximus.

V. PROGNOSIS.

1. Febris petechialis sæpius ita maligna & contagiosa est, ut brevi tempore insignem stragem edat.
2. Quo magis symptomata dissimulat & insidiosè procedit, eo grauius periculum minatur.
3. Speciaticim mortem minantur abiectio animi præter manifestam rationem, inquietudo continua in lecto, angina vel aphtharum concursus, lipothymia grauiores, deliria non interrupta, respiratio laboriosa, singultus, subsultus tendinum & motus conuulsiui, præcipue, quando hæc symptomata in statu vel declinatione accedunt.
4. Quo maturius & copiosius petechiæ erumpunt, eo maior malignitas subest.
5. Petechiæ, quæ inconstantes sunt, ita ut modo adpareant, modo evanescant, nil boni portendunt.
6. Quæ sunt coloris rosei & floridi, illæ meliores censentur, quam quarum color est obscure rubicundus, lividus vel plane niger.
7. Adfectus soporosi cum frigore extremarum partium, lethalia sunt signa.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA CVM CAUTELIS.

1. Quamquam febris petechialis malignior sit febre catarrhali maligna, eadem tamen methodo incedendum est.
2. Hinc ante meridiem bis exhibeatur essentia alexipharmaca temperata, post meridiem autem pulueres febriles, suo loco descripti, propinentur.
3. *Analeptica*, eaque temperata, interponantur, & tranquillitas tam animi quam corporis quouis modo respiciatur.
4. Omnes autem *commotiones* per remedia calida & regimina coacta excludantur.
5. *Vena sectio*, si omnino necessaria videtur, in principio principii instituat.

TABVLA LXXIV.
DE
FEBRE HVNGARICA SEV CASTRENSI'

I. DEFINITIO.

Febris *Hungarica* seu *castrensis* est febris acuta maligna, sæpius epidemica, qua principium vitale motibus vltra gradum naturalem auctis, miasma quoddam malignum ex corpore proscribere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris *castrensis* seu *Hungarica* licet cum *catarrhali maligna* & *petechiali* tantam habeat conuenientiam, vt pro vna eademque febre a non nullis reputentur, differunt tamen *gradu symptomatum*: in *Hungarica* enim seu *castrensi* omnia sunt grauiora.
2. Speciatim differt a *catarrhali maligna* ratione *catarrhi*, qui in febre *Hungarica* ordinarie non reperitur.
3. Differt a *peste miasmatis gradu*, quo huic multum cedit.
4. Sunt, qui inter *Hungaricam* & *castrensem* differentiam adhuc statuunt, hæc autem non nisi in accidentalibus tantum circumstantiis locum habet.

III. SIGNA.

1. Corripit subiecta cum horripilatione & dolore capitis.
2. Æstus ac sitis, præcipue in plethoricis, est fere intolerabilis, & ardor circa scrobiculum cordis eximius.
3. Lingua continuo est sicca & sæpius tumida.
4. Angina ad modum est familiaris.
5. Circa quartum aut septimum diem grauia deliria accedunt.
6. Vasa capitis sanguinea valde turgent, & oculi sunt fulgidi.
7. Circa vesperam paroxysmus exacerbatur.
8. Aluus numquam fere rite succedit: vel enim nimis stricta est, vel diarrhœæ adsunt.
9. Pro subiectorum, temporum annuorum, regiminis & diætæ diuersitate conspirant vomitus, dysenteria, petechia, parotides, paralyfes, hemiplexia.

10. Narium hæmorrhagia non raro etiam concurrunt.
11. Adest agrypnia fere continua & abstinencia a cibis per multos dies.
12. Pulsus ordinarie est fortior quam in aliis malignis.
13. Ceterum hæc febris plurimum mensibus Iunio, Iulio, Augusto, rarius aliis temporibus exoritur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Contagiosa hæc febris omnis quidem generis subiecta, ubi grassatur, inuadit, præ aliis autem plethoricis est infensa.
2. Speciatim corripit milites, qui in castris aëri impuro expositi sunt, aquas stagnantes bibunt & alia diætæ vitia admittere coguntur, præcipue, quando hæc omnia cum priorie vitæ genere non conueniunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis* est miasma valde subtile, maxime agile & fermentescens, cum corpore communicatum
2. Causa *efficiens* est ipsa natura, quæ motibus suis salutaribus corpus a miasmate illo maligno liberare intendit.
3. Causæ *occasionales* potiores sunt:
 - 1) Aër fermentescens putridis halitibus refertus:
 - 2) Contagium per alios inductum.
 - 3) Parua diætæ, speciatim fructus immaturi, potus aquarum putridarum, refrigerationes corporis exæstuantis.
 - 4) Animi pathemata, præcipue suppressa.

VI *PROGNOSIS.*

1. Hæc febris multis respectibus est periculosa.
2. Dolores enim capitis & deliria quo magis vrgent, eo maiorem metum phrenitidis incutiunt.
3. Non minus ardores illi interni, qui circa scrobiculum cordis pertinaciter adfligunt, inflammationem diaphragmatis vel ventriculi arguunt.
4. Petechiæ huic feбри superuenientes sinistrum omen præbent.
5. Valet & hoc de illis deliriis, quæ extra tempus paroxysmorum adueniunt.

6. *Metastases humorum ad fauces periculo plenissimæ, sed longe mitioris prognoscos sunt parotides.*
7. *Aluus laxa tolerabilior est adstricta.*
8. *Hæmorrhagiæ narium extra dies criticos ancipitis sunt prognoscos: quæ vero diebus criticis completa & moderata contingunt, illæ morbum subleuant.*

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*


1. *Commendamus quidem hic eandem methodum, quam tabula de febre catarrhali maligna indicauimus.*
2. *Quoniam autem curatio huius febris ob individuales circumstantias tum demum Medicis solet commendari, quando grauias symptomata iam habet constipata, mature de circumspecta illorum tractatione cogitandum est, v. g.*
3. *Deliria tractentur remediis temperantibus nitrosis, absorbentibus cirratis, emulsiuus, potu sufficiente & blando regimine diapnoico: externe adplicentur camphorata, vel vnguentum alabastrinum largiter camphoratum.*
4. *Anginodes & aphthodes symptomata, quo modo tractanda sint, tabula medica de angina, & tab. chirurgica de iniectionibus videatur.*
5. *Diarrhœæ, siue simplices, siue dysentericæ, tractentur absorbentibus, nitrosis, cortice calcarillæ, & pilulis Stahlianis.*

VIII. *CAVELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. *Quæ cautelæ tabula generali de febribus malignis & epidemicis ratione vena sectionis, vomitoriorum, purgantium, sudoriferorum & aliorum vehementer operantium remediorum traditæ sunt, illæ in febre castrensi tanto magis considerari merentur, quoniam methodus heroica cum indole expeditionum bellicarum egregie conuenit, & in castris quam maxime recepta est.*
2. *Vena sectio quando in principio instituenda iudicatur, non tantum largior esse debet, sed & necessum est, ut regimen diapnoicum mox subiungatur, & quouis modo conferretur, ne commotiones hæmorrhagicæ exoriantur.*

Hunc

3. Hunc in finem commendamus de essentia alexipharmaca temperata pulueri febrili guttas XXV. instillare, hancque dosin post trium horarum interuallum repetere.
4. *Opiata, adstringentia & multum incrassantia* nullo modo hic habent locum.
5. Superato morbo conualescentes, in primis iuniores, ad modum sunt voraces: hinc moderamen in diata sollicitudine est incutendum.
6. Et quoniam aer liberior facile *recidivam* adfert, consultum est, per aliquod tempus domi se continere & essentia alexipharmaca uti.



TABVLA LXXV.

DE

FEBRE PURPUREA SEV MILIARI, PUR-
PVRA VRTICATA

ET

FEBRE SCARLATINA.

I. DEFINITIO.

1. *Febris purpurea seu miliaris* est febris acuta, continua, exanthematica, vbi principium vitale miasma aliquod subtile fermentescens ad peripheriam corporis extrudere intendit: motibus secretoriis & excretoriis, vltra consuetum ordinem auctis.
2. *Purpura vrticata* est species febris benignioris & mitioris, in qua natura per eodem motus auctiores materiam quamdam acrem, papulas siue eminentias, lationibus post vrticarum ictum similes, formantem, expellere nititur.
3. *Febris scarlatina* est species februm acutarum, continuarum exanthematicarum, in qua natura materiam quamdam acrem causticam, corpori insensam, in peripheriam, maculas latas rubras formantem, expellit.

II. DIF;

II. DIFFERENTIA.

Hæ diuersæ species sub vno genere omnes conueniunt, & minima quoddam acre, subtile, fermentescens fouent, ratione tamen efflorescentiæ cutaneæ aliquo modo distinctæ sunt. Et sic differt

1) *Purpura*; germ. der Griesel.

1) a *purpura urticata*, germ. die Nessel- oder Wiebel-Sucht, nam in illa exanthemata magnitudine granum milii vix superant: in hac autem sunt maiora & altiora, sie sehen natürlich aus, als wenn man einen mit Brenn-Nesseln gepeitschet hätte.

2) A *febre scarlatina*, germ. das Scharlach-Fieber; in qua exanthemata sunt ad modum lata & insigniter rubentia, in purpura vero parua sunt eminentia.

3) A *petechiis*, quæ profunde in cute hærent, purpura vero cutim superat.

4) A *maculis scorbuticis*, quæ & colore & magnitudine dispares sunt.

5) A *morbillis*, in quibus exanthemata sunt elatiora, quam in purpura.

2. Purpura ipsa est vel *alba* vel *rubra*.

3. Purpura *alba* ordinarie est maligna, & febribus petechizantibus facile complicatur, in quibusdam etiam locis purperis accidere proximis abhinc annis obseruata est.
Vid. subiecta.

4. Purpura autem *rubra* multo benignior ordinarie obseruatur, ad quam proinde definitio, modo tradita, in totum non potest applicari.

5. Purpura *alba* & *rubra* differunt fere vt variolæ & morbilli.

1) Vti enim variolæ malignius ordinarie segerunt, quam morbilli, ita etiam purpura *alba* malignior est *rubra*.

2) Quem ad modum autem aliquando variolæ benigniores, morbilli autem maligniores obseruantur, sic etiam purpura *alba* interdum benignior, & sine grauiore febre, *rubra* autem malignior, & cum febre acuta coniuncta adparet.

2) Sicut

- 3) Sicut variolæ pustulas habent albas, & morbilli protuberantes tantum hirsutas efflorescentias, ita etiam purpura *alba* veras habet pustulas, & purpura *rubra* hirsutos solum nodulos; id quod ex *signis* magis elucescet.

III. SIGNA.

1. *Purpurea alba.*

- 1) Inuadit plerumque cum horripilatione & angustia ac anxietate præcordiorum.
- 2) Frigus & æstus volatilis alternant,
- 3) Ante eruptionem exanthematum ægri de pruritu intercutaneo conqueruntur, vel profus grauiora pathemata anxietatis incurrunt; inter ea omni sollicitudine a frigore se præmuniunt.
- 4) Circa quartum ordinarie diem exanthema hoc erumpit, primum in collo & pectore, post ea in reliquo corpore, nonnumquam etiam serius, die scilicet septimo, immo vndecimo & decimo quarto, hæc eruptio contingit.
- 5) Sub qua eruptione primum *rubedo* quædam per superficiem corporis adparet.
- 6) Post ea in medio cuiusuis rubicundæ maculæ *pustula alba* exsurgunt, & quidem tam copiosæ, vt vna fere alteram attingat.
- 7) Ordinarie cum febre *acuta*, rarius sine illa.
- 8) Diaphanæ sunt hæc pustulæ, & aquam tenuem continent.
- 9) Quando per quatuor circiter dies substiterunt, exsiccantur, squamarum instar decidunt, & febris soluitur.
- 10) In humidioribus autem, & absente febre, pustulæ hunc humorem exstillant.

2. *Purpurea rubra.*

- 1) Inuadit eadem fere ratione, vt *alba*, nempe horripilationibus & æstu volatili illis intercurrente.
- 2) Cum tensione & pressione in dorso.
- 3) Item cum angustia præcordiorum & tussi.

- 4) Circa diem quartum, septimum, vel adhuc serius erumpunt exanthemata, seminis *mili* & cutis anserinae instar, sub prurigine & punctione intercutanea.
 - 5) Febris, quæ accedit, ordinarie mitior est: in aliis tertianæ, in aliis quotidianæ, in nonnullis vero acutæ schema exhibet.
 - 6) Hæ febres ad largiores sudores inclinant, foetore graui sese manifestantes.
 - 7) Sub febrium paroxysmis ingentes anxietates & artuum spatmi sese exerunt.
 - 8) Nonnullos sine febre occupat, ita vt ægri negotiis suis vacare possint, & nil, nisi pruricum sub cute, persentiscant.
 - 9) Quando autem paullulum incalescunt, ardore & sensu punctorio corripuntur, cum successu fere largissimi sudoris.
 - 10) Nonnulli grauitatem & perturbationem capitis sentiunt, ac somnolenti & tædiosi obseruantur; immo nonnumquam lipothymiis corripuntur, præsertim quando exanthemata nondum legitime effloruerunt.
 - 11) Vbi per aliquot dies exanthemata subsisterunt, decidunt, & æger plenariam recuperat euphoriam.
 - 12) In aliquibus autem, præcipue debilioribus, valetudinariis, & calido regimine viuentibus, continuat fere per annos, & licet paullulum remittat, leuissima tamen occasione recrudescit.
3. *Purpura urticata.*
- 1) Inuadit sæpius cum subtili sensu refrigerii in superficie corporis.
 - 2) Subsequitur moderatus calor.
 - 3) Hunc comitatur sitis, non tamen adeo intensa.
 - 4) Iungitur etiam aliqua capitis perturbatio aut lenior eiusdem dolor.
 - 5) Tandem cum multo pruritu & superficiali tensione & rigore hinc inde exanthemata tam in facie quam reliquo corpore erumpunt.

6) Hæc

- 6) Hæc exanthemata cutim superant, & cito in notabile augmentum adcreſcunt, ac papulas quasdam eminentes, paullo latiores, coloris expallido roſei, vrticarum læſiones referentis, offerunt.
 - 7) Nonnumquam cum tuberculis ſemi-eryſipelaceis, & aſperitate ſerpiginosa efflorefcit, & aliquo modo eryſipelatis indolem imitatur.
 - 8) Febris, ſi adeſt, mitioris indolis eſſe ſolet.
 - 9) Non tamen conſtanter permanent exanthemata, ſed diurnis in primis horis evaneſcunt, quibus etiam motus febriles remittunt.
 - 10) Circa veſperam vero, ubi febris reuertitur, denuo produnt, & eo tempore etiam pruritus moleſtus & ardens inſigniter adfligit.
 - 11) Totus morbus intra triduum aut quatrimum finem ſuum adſequitur, & ſi a febre immunis eſt, adhuc citius exitum ſortitur.
 - 12) Cum temperata diaphoreſi exit, & poſt ceſſationem exiliſſimæ ſquamulæ ab adfecta parte ſecedunt.
4. *Febris ſcarlatina.*
- 1) Incipit & hæc purpuræ ſpecies cum leni horripilatione, quam temperatus ſubſequitur æſtus, plerumque ſiti moderata, faucium ardore & virium deiectione ſtipatus.
 - 2) Adeſt etiam oppletio pectoris, reſpirationem difficilem reddens, cum tuſſicula ſicca.
 - 3) Accedit capitis grauitas vertiginosa aut dolor magis acutus.
 - 4) Die quarto tota facies intumeſcit, & erumpunt maculæ intenſius rubicundæ, primo parvæ, mox vero latiores redduntur & coaleſcunt, ac totam faciem ſumma rubedine tingunt.
 - 5) Circa hoc tempus in quibusdam, præcipue plethoricis, ſuperueniunt hæmorrhagiæ narium.
 - 6) Poſt ea hæ maculæ latæ etiam in pectore & dorſo, tandem in artubus prodeunt, & totam ſuperficiem tegunt.

- 7) Postquam duos aut tres dies ita substiterit, rubor ille insignis perit, facies derumescit, & squamulae decidunt.
- 8) Febris satis tranquille excurrit, & cum moderata diaphoresi salutarem euentum obtinet.
- 9) Alius ordinarie toto hoc tempore est clausa, vti etiam in reliquis speciebus, quae tamen sub finem morbi sponte aperitur.
- 10) De reliquo haec febris sereno & aestiuo tempore vltimius affligit.

IV. SVBIECTA.

1. Omnes haec purpurae species prioribus temporibus ita non innotuerunt, vti nunc ab aliquot hinc annis in Saxonia sese manifestant; in qua regione purpura, in primis *alba* epidemice grassari obseruata est.
2. Purpura, praesertim *alba*, ab anno 1652. in quibusdam dictae regionis locis commune symptoma puerperarum deprehenditur.
3. Vbi febres petechizantes grassantur, ibi non raro *alba* cum petechiis proueniunt.
4. Sicuti etiam cum variolis nonnumquam conspirare & symptomata ibi grauiora excitare solet.
5. Praeter ea haec mala & praecipue purpura rubra, chronica, benigna, inuadere obseruantur aetatem iuniorem praeter adulta.
6. Homines plethoricos, spongiosos, de temperamento sanguineo & phlegmatico multum participantes.
7. Otio deditos & dieta lauta vrentes, & ad iram pronos.
8. Laboriosi autem vix vmquam his exanthematibus adfecti inueniuntur, & sic cum scorbuto eadem fere fata subeunt, qui etiam otiosos frequentius occupat.
9. Feminae hystericae & delicatae praecipue obnoxiae sunt purpurae *rubrae*, & ante, quam erumpit, schemata suffocationis uterinae lipothymicae ludit, non autem transitoria, quae in suffocationibus hystericis vulgaribus deprehendimus; sed ad eruptionem vsque exanthematum continuantia.

10. Maxime omnium illis otiosis & delicatulis euenit, qui salvis rebus & tranquillis, regumentis copiosis ab aëre se præmuniunt, & hac ratione humores semper ad peripheriam corporis inuitant.
11. Febris *scarlatina* nonnumquam virgines emanatione mensium laborantes, post varia molimina ad eorum excretionem tendentia, inuadere solet.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* horum exanthe matum est materia subtilis fermentescens, plus vel minus maligna, & hac tenus in quibusdam locis epidemica, corruptionem sui generis specificam in corpore generans.
2. Causa *efficiens* est principium vitale, quod motibus, præter gradum naturalem auctis, miasma illud noxium, & effectum ab illo inductum, nempe materiam vere iam corruptam, discernere & per corporis peripheriam excernere intendit.
3. Causæ huius mali *occasionales* & *procatarticae* sunt:
 - 1) Aër fermentescentibus particulis grauidus.
 - 2) Contagium per alia corpora, eodem modo correpta.
 - 3) Sudores non tantum repulsi & impediti, verum etiam
 - 4) Per medicamenta exstuantia & regimina calida, præsertim in morbis petechizantibus & puerperiis coacti.
 - 5) Peruersa rheumatismi & febrium catarrhalium curatio per methodum nimis refrigerantem.
 - 6) Dieta crassa & dyspepta, præcipue in minus aduetis & otiosis.
 - 7) Euacuationes sanguinis *naturales* suppressa, e. g. mensium, lochiorum hæmorrhoidum.
 - 8) Vel *artificiales* neglectæ.
 - 9) Repentinæ & immoderatæ sanguinis commotiones & exstuationes, quibus ex ipsa humorum massa subtilis hæc & reliquæ mixtionis integritati inimica materia generatur.

VI. PROGNOSIS.

- 1- Purpura *alba* per se numquam periculo caret, in primis si

- constitutio est epidemica, & tunc sæpius plures iugulat.
2. Interdum tamen aliquo modo benigna obseruatur, præfertim quando tum temporis nullæ febres malignæ grassantur.
 3. Ita, quæ sine febre contingit, minus quidem periculosa, maioribus tamen anxietatibus & motibus spasticis stipata est, quam *rubra*.
 4. Quando purpura *alba* nimis languide erumpit, ita vt post discessum priorum noua exanthemata succedant, semper peioris est indolis.
 5. Recessio purpuræ *alba* sæpius est lethalis, vel tamen grauiora symptomata, aphthas, mentis alienationes, vel summas anxietates inducit.
 6. Purpura *alba* repulsâ quando iterum expellitur, & tamen symptomata, a recessione illa inducta, non mitigantur, omnino fidei est suspectæ.
 7. Quæ cum petechiis simul, præcipue mature, nempe tertio vel quarto die erumpit, est periculosa; melioris autem notæ, quæ petechiis demum innascitur.
 8. Purpura *alba*, lochiorum suppressionem excipiens, semper peior est quam reliqua.
 9. Purpura *alba* subiecta plethorica aut cacochymica corripuens, semper grauius adfligit, & maiori periculo exponit ægrotantes.
 10. Diarrhœa symptomata, quando vehemens est, recussionem exanthematum facile post se trahit, & hinc merito suspecta est.
 11. Purpura *rubra* plurimum benigna est, & raro grauiâ coniuncta habet symptomata aut mala consecutaria.
 12. Si vero constitutio est epidemica, sæpius eundem malignitatis gradum ac purpura *alba* obtinet, immo hanc interdum adhuc superat.
 13. Spongiosi longe facilius ferunt purpuram, quam qui strictioris sunt habitus.
 14. Purpura *rubra*, quando, regimine placido neglecto, recedit, tam præsentaneum quidem periculum, vti *alba*, non ad-

adfert, sequuntur tamen anxietates cum motibus spasticis & grauatione defatigatoria in omnibus corporis partibus.

15. Nonnulli inflammationes faucium, aphthas, & dolores anginodosos ex hac recessione incurrunt.
16. Alii tussi sicca vehemente, alii ardore vrinae, alii arthriticis malis, hemicrania & pleuritide spuria corripuntur.
17. Quæ vero symptomata, erumpente iterum purpura, ferre profus euanescent.
18. Purpura *urticata* & febris *scarlatina*, quando sibi relinquuntur, nihil mali portendunt, & sponte interdum iterum cessant.
19. Si autem imprudenter tractantur, in primis per regimen nimis calidum, aut per alia sanguinem commouentia, mala plerumque consecutaria habere solent.
20. Hæmorrhagia narium sufficiens, in febre *scarlatina* sub eruptione exanthematum contingens, morbum insigniter imminuit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Si vniquam alibi, certe in *purpura* methodus debet esse temperatissima.
2. Hinc essentias alexipharmacas, vtut temperatas, durante morbo hic excludimus, & solos pulueres febriles cum potionibus diapnoicis & emulsionibus adhibere commendamus.
3. Immo in purpura simpliciore, non maligna, sed chronica, ne antimoniata quidem fixa adhibenda esse censemus, quoniam in sensibilibus plus commotionis excitant, quam imperitus forte crediderit. *Conf. præfat. Illustr. Stahl.*
4. Quando diarrhœæ accedunt, puluis corticis cascarillæ ad grana decem pulueri febrili miscendus est.
5. Sudores spontanei, qui durante morbo non exigua incommoda adferunt, neque suppressendi, neque promouendi, sed prudente ratione moderandi vel tolerandi sunt.


6. In declinatione morbi essentia alexipharmacæ temperatæ cum levi limis laxantibus locum habent.
7. De purpura *urticata* & febre *scarlatina* non habemus, quod sæpe dicemus.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ tabula de febre catarrhali maligna de continentia tranquilla, placido regimine, & evitandis calidis medicationibus diximus, illa hoc loco quam maxime etiam sunt obseruanda.
2. Sigillatim irritatio *alui* hic tam periculosa est, quam in variolis & morbillis: hinc lenissima adeo clysmata non satis tuto applicantur.
3. Nec etiam, uti sub *methodo* iam diximus, locus concedendus est *alexipharmacis* calidis *diaphoreticis*, & aliis massam humorum commouentibus, siquidem sub hoc labore feruido plures generantur impuritates, & materia acris una cum febre augetur.
4. Et licet plethora commota his malis ordinarie ansam præbeat, *venæsectio* tamen instituenda non est, ne exanthematum recessio ad interiora sequatur.
5. Quando exanthematum recessiois metus subest, potus aquæ calidæ, e.g. théè commendatur, extra hunc autem timorem pro potu ordinario cereuisia dilutior, bene tamen defæcata, vñi esse potest.
6. *Regimen* coactum licet noxium sit, caueant tamen sibi decumbentes, ne exiguum etiam aëris accessum refrigeratorium admittant: hinc necessarium erit, per illos dies, quibus purpura durat, lectum non sternere.
7. Morbis faucium superuenientibus essentia *pimpinellæ albæ* per aliquot guttulas, sine vehiculo instillata, egregie legitur: ardorem quidem, sed etiam salutarem effectum hæ guttulæ, in ore detentæ & deglutitæ, inferunt.
8. *Scarificatio* repetita, &, rebus adhuc tranquillis, ad præcautionem instituta, vñum habet in illis, qui sæpius a purpura infestantur.
9. Vbi autem suppressæ sanguinis euacuationes subsunt, ibi illarum

illarum restitutio animo insideat, ad quam obtinendam præcipue pilulæ *Stablii* vel *Beccheri* egregie se gerunt, subiuncta pro rerum circumstantiis venæ sectione.

10. Rebus tranquillis transpirationem naturalem per vitæ genus placide laboriosum promouere, multo efficacius erit ad sanitatem tuendam, quam sollicita aëris per tegumenta exclusio; quæ potius hæc exanthemata ad peripheriam corporis inuitat. Tempore autem illo, quo efflorescunt hæc exanthemata, necessarium est, pectus ad umbilicum vsque a sensu frigoris defendere.
11. De purpura *alba* adhuc indicandum est, quod ad modum insidiosè nonnunquam se gerat, & variis suis schematibus multis modis Medicum decipiat. Aegri de nullis doloribus conqueruntur, bene ingerunt, dormiunt, sudant, & tamen orthostadii esse non possunt. Erumpente tandem purpura animam efflant, e. g. Studiosus quidam hoc malo corripiebatur, qui primis diebus nihil nisi lassitudinem accusabat, interim neque de cibo & potu sibi aliquid detrahebat, neque vigiliis multis vexabatur. Die nono purpura alba conspiciebatur; undecimo autem die nescio quo casu factum est, ut summa auiditate duplam cibi portionem deuorasset. Qua ingesta postulauit, ut sibi stratum adferrent, se iam esse moriturum, cui etiam parato membra sua reposuit, & statim ex hac vita discessit.



TABVLA LXXVI.

DE

VARIOLIS ET MORBILLIS.

I. DEFINITIO.

Variolæ & morbilli sunt febrium acutarum, exanthematicarum species, epidemice plerumque grassantes, vbi natura motibus secretoriis, & excretoriis, vltra gradum

naturalem auctis, materiam fermentescentem vlcerofam, ad peripheriam corporis propellere, & hac ratione eandem eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Variolæ ac morbilli quotannis fere pro diuerfa aëris constitutione epidemica variant, atq; hoc respectu sunt vel
 - 1) *Regulares & benigniores*, quæ stata & definita tempora feruant; vel
 - 2) *Irregulares & maligniores*, (secundum Sydenhamum) quæ ab hac norma deflectunt.
2. Vulgus variolas distinguit in *veras & nothas*; per *nothas* autem intelligit illas, quæ minus copiose prorumpunt, & vesiculam pellucidam, humore refertam, formant, sine accessu febris exquisitæ: german. Wind- und Wasser-Pocken, milde Blattern.
3. Variolæ ratione numeri sunt:
 - 1) Vel *paucæ ac distinctæ*.
 - 2) Vel *copiosæ confluentes*.
4. *Variolæ* differunt a *morbillis* suppuratione.
5. *Morbilli* differunt a *petechiis*.
 - 1) *Latitudine*, qua petechias superant.
 - 2) *Elevatione*, quæ in morbillis magis conspicua & notabilis est.
 - 3) *Inflammatione*, quæ in morbillis ad genium inflammationis erysipelaceæ proxime accedit.
 - 4) *Morbilli* etiam differunt a *purpura miliari*: in qua, in primis alba, sunt pustulæ exiguæ pellucidæ, ex maculis rubris ortæ: in rubra autem parvæ eminentiæ duræ, feminis milii instar.
 - 5) *A maculis scorbuticis*: quæ sunt latæ, coloris obscure rubicundi, plurimum absque febre.
6. Tandem *morbilli* sunt, vel
 - 1) *Sporadici*, qui paucos adfligunt & benigniores observantur; vel
 - 2) *Epidemici*, qui multos ex causa communi corripunt, & maligniores sunt.

III. SIGNA.

A. *Imminentium.*

- 1) Inuadunt *variola* sine horrore & frigore notabili, more februm continentium, in adultioribus autem non raro frigus, vel ad minimum leuis horripilatio accedit.
- 2) Oscitationes & pandiculationes concurrunt.
- 3) Adpetitus est diminutus.
- 4) *Morbilli* autem cum horrore plerumque incipiunt.
- 5) Cooritur, vel succedit, *astus*, qui est præter naturam, plurimum tamen lætis colorabilis, cum *capitis* gravatiua & vertiginosa perturbatione.
- 6) Concurrit apud plurimos tussis & pectoris notabilis oppletio.
- 7) Accedit tensio dorsi cum sensu leuiter compunctorio.
- 8) Multis eueniunt tormina abdominis leniora, aliquando fluxus alui, & non raro vomitus, præcipue infantibus, item hæmorrhagiæ narium largæ, circa & sub ipsam eruptionem; non minus conuulsiones, quæ variolarum eruptionem proxime præcedere solent. Hinc *Bagliuini* motus conuulsuos, qui febribus puerorum, variolas nondum expertorum, superueniunt, pro certissimo indicio habet, quod hæc exanthemata mox eruptura sint.
- 9) Speciatim in morbillis præcedit serosa excretio per nares & oculos, frequens sternutatio, tussis sicca, & versus quartum diem palpebrarum tumida eleuatio.

B. *Præsentium.*

- 1) Eruptio variolarum contingit inter tertium & quartum diem, & durat vsque ad septimum, tam in illis, qui paucas, quam qui copiosas accipiunt.
- 2) Placide succedit hoc eruptionis negotium, sine sensibilibus febris symptomatibus & sine sudore, intra limites liberæ tantum transpirationis. Nonnulli sub eruptione leui saluatione corripiuntur.
- 3) Conueniunt inter se variolæ & morbilli, dum stigmatum

tum rubicundorum schemate visui occurrunt, sed altero die mox elucescit, cui generi hæc efflorescentiæ accensendæ sint.

- 4) *Variola* enim pustulas formant, ad mediocris pisi disseci quantitatem accedentes.
- 5) A septimo ad vndecimum diem suppurasunt, sub ambiente circulo rubente, & inflammatione turgido cutis, præcipue in facie & manibus.
- 6) Circa vndecimum diem rupturam & puris effusionem subeunt.
- 7) Circa diem autem decimum quartum exsiccantur & delabuntur.
- 8) *Morbilli* autem cutis planitiem eminentia tantum lenticulari excedunt, sub macularum rubicundarum forma.
- 9) Deinde aliam mutationem non subeunt, sed aliquot dierum decursu ruborem sui minuunt, & sensim subsidendo cum aliquo pruritu evanescent, relictis squamulis furfuraceis sensim decidentibus.
- 10) Alius ordinarie est adstricta.

IV. SVBIECTA.

1. Quantum historiæ relationes docent, grassantur hæc mala frequentius inter gentes *Nigritarum* & *Casrorum*, atque tam adultos quam iuniores inuadunt. Hinc iusta subest suspicio, quod variolæ & morbilli apud istos populos morbi sint endemii, plus semel vnum indiuiduum per vitam infestantes.
2. Ex hac mundi plaga secundum omnem veri similitudinem per navigationem ad *Europæos* hi morbi transportati sunt: ita vt tantum non omnes illorum semel, dum vivunt, ab illis corripiantur,
3. Dantur etiam exempla, sed ad modum rariora, quæ bis vel ter ab his infestantur.
4. Sæpissime eueniunt infanti ætati, & plerumque tempore verno, interdum etiam autumnali, grassantur.
5. Post infantes puerilis ætas maxime illis exposita est.

6. Hinc

6. Hinc reliquæ ætates hos morbos rarius incurrunt, quia plerique homines eisdem vel infantili, vel puerili ætate perpeffi sunt.
7. De reliquo ad modum probabile est, quod tempore *Hippocratis & Galeni Europa* nostra a variolis & morbillis libera adhuc fuerit, alias de fonticis hifce malis conspicua monumenta more suo nobis reliquiffent. Papularum, teneræ ætati familiarium, *Hippocrates* quidem mentionem facit, sed in transitu solum, & ita ad notabiles hos adfectus denominatio hæc non potest applicari.

V. CAUSSÆ.

1. Causfa vera & genuina horum malorum est incognita.
2. Generatim quidem miasma subtile fermentescens potest accusari, siue ex macrocosmo susceptum, siue per contagium communicatum.
3. Quale autem specificum fit fermentum, quod morbos hosce tam notabiles, & ab omnibus aliis morbis per aliquot plane peculiare circumstantias distinctos producat, non potest determinari.
4. Vulgaris ætiologia ortum horum ducit a *venexatis qualitatibus sanguinis menstrui*, sed hæc iactata causfa multis difficultatibus laborat, præcipue quando consideratur, quod secundum veri similitudinem apud *Europæos* non semper cogniti fuerint.
5. Alii ad causas subtiliores confugiunt, & hæc exanthemata pro symbolo impuritatis spiritualis declarant; sed quo infirmo iudicio, ex circumstantiis, modo indicatis, colligendum est.

VI. PROGNOISIS.

1. Variolæ & morbilli, quando per se considerantur, plerumque salutariter exeunt, malus autem successus a causis accidentalibus plurimum dependet.
2. Larga horum exanthematum eruptio tam placide succedere obseruatur, quam pauca, & hæc non numquam æque funestum euentum adfert, quam illa, concurrentibus videlicet vtrimque causis accidentalibus.

3. Traditio illa popularis non prorsus contemnenda, quod, quibuscumque in pedum soleis nullæ pustulæ adparent, illi expositi sint periculo secunda, immo tertia vice has experiundi.
4. Ex historia practica constat, hos adfectus a grauidis in foetum propagatos fuisse.
5. Exanthemata hæc, quando intempestiue & impetuose extruduntur, vel inæqualiter efflorescunt, ordinarie solent recedere, & funestum exitum sortiri.
6. Vel, vbi omnino non recedunt, magnum tamen discrimen in suppuratoria, illa inflammatione subeunt, quo œconomia vitalis facile turbatur.
7. Quando nobiliores corporis partes occupant, scilicet oculos, aures, nares, fauces, his sæpius periculum minantur.
8. Variolæ generatim cum morbillis collatæ, quouis respectu sunt periculosiores, id est: benignæ variolæ longe deteriores sunt, quam benigni morbilli, & malignæ variolæ maius discrimen adferunt quam maligni morbilli.
9. Nonnumquam tamen morbilli malignius grassantur, & variolæ illo quidem tempore benignius se gerunt.
10. Variolæ, licet iam maturatæ, ruptæ, euacuatae, immo deficcatae sint, tantum tamen periculi adhuc fouent, vt ægri aërem frigidum negligentius admittentes, repente sæpius vitæ iacturam incurrant; quod a morbillis non timendum, qui etiam, quando semel effloruerunt, tam facile recedere non solent.
11. Tam certum etiam non est periculum mortis, si in morbillis recessio vel diarrhœa contingit.
12. Diarrhœa autem, præsertim torminosa, siue a medicamentis, siue a refrigerio extremorum concitata, cum recessione horum exanthematum obueniens, plerumque quidem est lethalis, hoc autem periculum, a diarrhœis metuendum, grauius tempore alio, alio mitius esse obseruatur.
13. Diarrhœa illa quasi purulenta, quæ circa maturationis tempus sæpius contingit, non deterreat Medicum; si tantum moderate procedat. *Vid. caut. num. 8.*

14. Variolarum sensim facta eleuatio, si debito tempore non succedit, areolæ circa pustulas palleſcunt, aut nigrefcunt, ipſæ etiam puſtulæ ſeſſiles, & in medio depreſſæ conſpiciuntur, aut mature ſubſident & dehifcunt, ac loco puris ſtigma ſanguineo-nigricans exhibent, infauſta & plerumque funeſta ſunt præſagia.
15. Quo magis autem variolæ ad rotunditatem adſurgunt, eo melioris notæ ſunt cenſendæ.
16. *Petechia* aut *exanthemata miliaria*, quando in variolarum interſtitiis occurrunt, inſignem malignitatem indicant, ſæpiſſime ſunt funeſti euentus, in primis ſi nigricantem colorem oſtendunt.
17. *Variola notha*, id eſt, quæ feſtinato ſucceſſu attolluntur, germ. *Spitz-Pocken*; item illæ grandes variolæ, quæ lim-pido humore cito turgent, & eundem intra paucos dies, ruptis veſiculis, effundunt, germ. *Wind-und Waſſer-Pocken*, longe benignius, quam veræ variolæ, ſe gerunt.
18. Variolæ *conſuentes* ſemper maius, quam diſtinctæ, periculum minantur, præſertim ſi regimen calidum præceſſerit.
19. Si in principio tertii diei iam erumpunt, ad irregulares & conſuentes inclinant, atque ita peioris ſunt indolis.
20. Hæc exanthemata ſemper tolerabilius & tutius infantibus cedunt, quam adultis.
21. Qui minus ſucculenti ſunt, illi felicius ea ſuperant, quam valde tales.
22. Tempore ſuppurationis noua plerumque febris inflammatoria ſuccedit, & hæc grauius ſæpe, quam quæ circa eruptionem fuit, periculum adfert: vnde ægri in declinatione morbi, vbi prima febris iam ſuperata videbatur, cum hac noua febre pereunt.
23. Plures moriuntur ob variolarum copiam, quam ob eandem inopiam; id quod contra vulgarem methodum expellendi probe notandum.
24. Symptomata grauiora, e.g. conuulſiones epileptica, quæ in principio, & ante eruptionem obueniunt, tantum periculi

riculi non minantur, quam quæ post efflorescentiam se manifestant.

25. Turgesfactio inflammatoria faciei & manuum, tempore suppurationis expectanda, si vel non succedit, vel iusto maturius subsidet, graue periculum minatur: licet enim variolæ non recedant, sequitur tamen iactatio corporis, delirium, suppressio vrinæ, mors.
26. Quando sanguis, per venæ sectionem emissus, crusta alba & crassa in superficie obductus est, (id quod in omnibus inflammatoriis morbis obseruatur) prædicat *Bagliuinus* variolas copiosas & valde periculotas.
27. Inuasio variolarum cum *horrore* deterioris quoque est ominis: & quo sensibilibior est horror, eo maior inflammatio visceris alicuius metuenda est.
28. Nimii *sudores* non sunt optimæ nota. Hac enim ratione humores, qui variolarum repletioni & maturationi destinati sunt, nimium effunduntur. Vnde exanthemata facile subsident & recedunt.
29. *Alui* adstrictio, modo cetera paria sint, nihil damni infert; proturbatio autem illius, temere suscepta, longe plus monstrat. *Conf. num. 12.*
30. Ex numero pauciorum, qui contra hos morbos medicamenta adhibent, plures moriuntur, quam ex numero plurium, qui nullis medicamentis vtuntur, sed & soli naturæ hoc negotium committunt.
31. Variolas nonnumquam excipiunt *apostasies* seu *metastases*, præcipue ad pulmones, vnde tussis post morbum superatum facile remanet.
32. Post exanthemata hæc, recte perfuncta, homines sentiuntur vegetiores, & fere omnes Europæi per totam deinde vitam ab illis, præcipue morbillis, satis securi sunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. In variolis & morbillis, placide, leniter & ordinate procedentibus, præstat ab omni medicatione abstinere, & consultorem magis, quam actorem agere nimis officiosum.
2. Quando autem omnino medicatio aliqua efflagitur ab

iis, qui salutare hoc consilium non capiunt, methodus sequens, præoccupandis malis symptomatibus destinata eligatur.

3. Iustum eruptionis tempus circumspicte obseruetur, nec vnquam aliquid intempestiue, vel medicamentis, vel regimine calidiore, promoueatur.
4. Tutissimus hic vbique, & præcipue etiam sub initium morbi, deprehenditur vsus *absorbentium* marinorum, cum antimoniato fixo coniunctorum: quo nomine laudantur oculi cancri, mater perlarum, conchæ præparatæ, cornu cerui, siue vstum, siue assum, antimonium diaphoreticum, bezoard. minerale; de quibus pulueribus grana XV. pro adultis, pro iunioribus pauciora, exhibentur, & post trium vel quatuor horarum interuallum semper repetantur. -
5. Vel loco pulueris *posiones*, ex aquis diapnoicis & dictis absorbentibus paratæ, propinentur.
6. Vbi *astus* insignis, & sanguinis *orgasmus*, eruptionem impediens, concurrat, ibi nitrum quoque & blanda acida, præcipue in adultioribus, locum habent, e.g. succus citri, clytus antimonii, tinctura flor. bellidis.
7. Tempus *eruptionis* quando accedit, iniungantur continencia quieta, & regimen leniter diapnoicum; de medicamentis autem siue emulsio, siue potio quædam lenissime diaphoretica propinetur, e. g.

Recip. Semin. card. Mariæ

aquileg. ana vnc. II.

aquæ sambuci,

flor. tiliæ,

scordii,

plantag. ana vnc. II.

Fiat s. a. emulsio addantur

conch. cum acido citri solut.

matr. perlar. ana drach. II.

antimon. diaphoret. drachm. I.

Edulcoretur cum saccharo ad gratum saporem,

K k k k

- rem, & post tres semper horas cochlear I. propinetur.
8. Sub ipsa *maturatione* cum pulueribus absorbentibus, & vrgente æstu, subinde nitratis, continuandum, interposita aliquando emulsione.
 9. Quando variolæ ad *maturationem* peruenerunt, spontanea exsiccatio expectetur, vitando vbique artificialia subsidia, nisi forsân oleum ouorum, leniter camphoratum adhibendum fuerit. *Vid. cautel.*
 10. Morbo feliciter *superato* primæ viæ leniter expurgentur; in quem finem laudatur extract. panchymagog. *Crollii*, cum aliquot granis mercurii dulcis commixtum.
 11. Denique conualescens *sensim* aëri adulescat, & quotidie essent. alexipharmac. aliquoties vsurpet. Sufficiant hæc de methodo fere superflua dixisse, magis autem necessaria est medicatio, vbi mala accidentia & symptomata superueniunt, e.g.
 - 1) Quando *conuulsiones* epilepticæ concurrunt, sequens puluis offeratur:
 Recip. Matr. perlar. scrup. II.
 antimon. diaphoret. scrup. I.
 cinnab. natiuæ præparat.
 lumbricor. terrestr. ana scrup. semis.
 M. dof. gran. V-X-XV-XX. bis per diem.
 - 2) In *recessione* variolarum essentia alexipharmaca *Stablii* refractis, sed repetitis, dosibus exhibeatur, sub regimine conueniente.
 - 3) Quæ essentia etiam locum habet, quando turgescit illa inflammatoria, ad suppurationem necessaria, emanet, vel iterum euanescit.
 - 4) In *diarrhœa*, præcipue torminosa, sed nondum adeo inualecente, nihil tutius & efficacius est, quam *nitrum* paucis granis, repetito, exiguo vehiculo, & coniuncto quodam absorbente, exhibitum.
 - 5) *Oculorum* pericula nulla re certius præoccupantur, quam per lintea spiritu vini camphorat. crocat. largiter imbuta,

buta, per auram fere reliccata, & oculis imposita; cavendo a luce fulgida, ploratu, trictione.

- 6) Conglutinatio *palpebrarum* referatur per modestum, visum olei ouorum, leniter camphorati.
- 7) *Dolor & ardor faucium* nimius mitigatur essent. alexipharmac. *Stahlii*, vel essent. pimpinellæ albæ, paucis guttis sine vehiculo adsumta. *Vid. cautel.*
- 8) Reliqua sub cautelis quærantur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Autocrazia* naturæ in nullo facile morbo tam conspicua est, quam quidem in variolis & morbillis: plurimi enim sine medicatione conualescunt. Hinc *Sydenhamus*, qui ad modum prudenter de variolis scripsit, nulla medicamenta contra easdem commendavit.
2. Vulgata praxis, cum alias *qualitati* humorum *corrigen*da plurimum inhiet, in variolis, vbi correctio locum haberet, inuerso ordine procedit, & expulsoriam euacuationem commendat.
3. Sed sponte currenti calcar adicere, proxima via est ad lapsum: hinc quouis modo cauendum, ne sub specioso prætextu, malignitatis & veneni de corde expellendi, quidquam stimuli adhibeatur.
4. Exfulent vbiq; medicamenta, sanguinem commouentia: exfulet itidem regimen sudoriferum coactum, sub ipso etiam tempore eruptionis institutum. Sufficit æqualis, temperata, & quieta corporis continentia; vitando vbiq; refrigerationem.
5. *Emulsiones* ex seminibus aquilegiæ, napi, nasturt. card. Mariæ, expulsionem promouendæ vulgo destinatae, non quidem reiciuntur, *raro* tamen, horum vel aliorum remedium vsus *necessarius* est.
6. *Vena sectio* in variolis & morbillis ne in adultis quidem, nisi insignis plethora concurrat, commendatur.
7. *Strictura alui*, in primis vbi nulla pathemata in abdomine sentiuntur, & reliqua bene succedunt, potius toleretur, quam acriore stimulo soluatur. Hanc enim alui occlu-

- tionem natura excitat, quo materia illa peccans eo magis, ad peripheriam transferatur : vnde exanthemata etiam copiosius efflorescunt.
8. *Diarrhæam* spontaneam per adstringentia, vti vulgo moris est, cohibere, vix citra eximiam periclitationem succedit: adstringentia enim efficaciam suam non solum in primis viis, sed vltcrius in partibus corporis interioribus exerunt. Speciatim tum sibi caueat Medicus a tali adstrictione, quando medio suppurationis tempore deiectiones aliquot purulentæ superueniunt; nisi enim cito & sæpe se inuicem sequantur, aut insigni conatu aliquid effatu dignum educant, extra periculum sunt.
 9. Methodus *Gundelsheimeri*, quæ alternis diebus lenè *emetico-catharticum* ex tartaro emetico & manna Calabrina, aut cassia exhibet, rationi quidem repugnare non videtur, quia laxans sordes biliosæ-mucidas ex primis viis subducit, & emetici motus, humores versus superficiem propellendo, variolarum recessiones impediunt, sed circumspeditione indiget, & discretione subiectorum. Hinc altera magis placida methodus, nempe correctoria huic euacuatoriæ præfertur.
 10. Vti methodus *euacuatoria* notabile damnum inductura esset, si nuda vomitoria, vel nuda laxantia propinarentur, sic etiam in methodo *correctoria* nimix doses absorbentium, in primis ineptiorum, tamquam noxiæ reiciuntur.
 11. Vitetur vsus *balsamicorum*, præcipue myrrhatorum, acidorum, aquæ fumarix destillatæ, vt & specificorum domesticorum, quæ plebs adhibere solet, e.g. vinum rubrum, decoctum lentium, excrementa ouina & alia expellentia fortiora cum hypocausto feruido.
 12. *Hæmorrhagia narium* larga, versus aut sub ipsam eruptionem contingens, innumeris exemplis nihil damni adfert; modo artificialia absint incitamenta, cohibitiones autem pessimum præbent euentum.
 13. *Faciem* a variolis defendere, irritum plerumque est conamen.

14. Negandum autem non est, quod vesicæ, aqua calida repleta, & collo atque pectori applicata, non solum exanthematum eruptionem in hisce locis adiuent, sed præcaueant etiam, ne facies nimium adficiatur.
15. Ad *souas* in facie præoccupandas mulieres varia sæpe tentant, sed cauendum, ne sub præmaturis talibus artificiis recessio variolarum contingat: ruptis autem papulis *oleum ouorum* lenissime camphoratum placidam consolidationem inuat, & minime periculum minatur. Sulphuris autem vsus est periculosus.
16. *Faucium* vitiis succurrit essent. pimpin. albæ, figuttæ aliquot bis vel ter per diem sine vehiculo deglutiantur; quæ ipsa essentia reliquas etiam circa caput stagnationes præoccupat. *Conf. tab. de scorb. caut.* vbi effectus huius essentiæ laudatur.
17. Quando pustulæ fauces iam obsident, *gargarismata* ex decocto auenaceo, adiecta modica nitri portione, etiam conueniunt.
18. Quando *narium* exulcerationes internæ concurrunt, succurritur illis per oleum ouorum, essent. succin. myrrh. & ol. terebinth.
19. Fabula est, quod *ex mercurio vita*, per simplicem cum nitro colliquationem proneniat medicamentum, quod, præter alias dotes, specificè etiam variolis superandis sufficiat.
20. Eiusdem fidei est *lotura* illa per *phlegma vitrioli* ex corona C. C. philosophice præparat. aut ex floribus aquilegiæ.
21. Nemo etiam prudens effectum illum expectet, quem aliqui iusculis *lentium*, cicerum, immo gran. ficuum in morbillis tribuunt.
22. Euenit nonnumquam, vt variolæ lento progressu erumpant, & priores ad marurationem iam accedant, quando posteriores demum efflorescunt; quo casu ægri facile securi redduntur, & superata potiore variolarum quantitate, paucas reliquias negligunt, & hinc frequenter conuulsiones experiuntur, immo ad mortem pro-

- perant. Clandestinatam hic malignitatem accusare, est quidem moris, sed non rationis.
23. Oppletio seu infarctus pectoris, tamquam commune variolarum symptoma, præcauetur per moderatum in hac regione calorem, alias tussis facile remanet.
 24. In nimia *tussi* conducunt absorbentia citrata, cum aqua veronic. chærefol. flor. sambuc. mixta.
 25. Remedia *præcauentia*, uti in aliis contagiosis summe incerta sunt, ita multo magis in variolis & morbillis.
 26. In *adultis* tamen, tam ad prophylaxin, quam melioris etiam totius morbi decursum, in primo principio lenes expurgationes primarum viarum, & in plethoricis venæ sectiones conducunt. Fortior vero alui euacuatio citiorem horum exanthematum inuasionem produxisse obseruata est.
 27. Qui *vicio* quodam *pectoris* laborant, illis confert radix pimpinellæ albæ, subiuncto dextro vsu corticis cæscarillæ.
 28. Sic etiam *vermes*, rebus adhuc saluis, remouendi sunt, turbas enim in variolis facile solent concitare.
 29. Hæc autem *præcauendi* cura in *teneriore* ætate dissuadetur, quia infantes felicius ordinarie hos morbos superant, quam adulti: hinc præstat iuuentutem hisce communibus fatis commendare, quam per totam vitam timori eandem exponere.
 30. Non minus dissuadetur alterum illud extremum, vbi infantes, quando exanthemata hæc *benignius* grassari obseruantur, in domus infecta transportant, vel transplantant.
 31. De *transplantatione* videatur *Vateri* tractatus vom *Blatter-Pestgen*. Hæc operatio, quoniam nuper in noua Anglia male successit, per publicum *Regis Britannicæ* edictum prohibita est, sed post modum renouata.
 32. Quando variolæ copiosæ, loco iustæ suppurationis, in *ulcuscula*, eaque profunda, abeunt, essentia alexipharmaca cum pulueribus absorbentibus & antimoniatibus fixis, coniuncto regimine diapnoico, adhibenda. Externe quid in hoc casu faciendum vel omittendum sit, circumstantiarum rationes prudentem Medicum docebunt.

TABVLA LXXVII.
DE
D Y S E N T E R I A.

I. **D**EFINITIO.

Dysenteria est fluxus alui valde torminosus, cum deiectione materiæ mucido-cruentæ conspicuus, & commotionibus febrilibus magis vel minus acutis, perpetuo coniunctus, ad miasma malignum eliminandum a natura excitatus. Deriuatur a *δυσ*, difficile, *έντερον*, intestinum, & *ένω*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Dysenteria est

1) vel *benignior*, quæ leniter incipit, & paulatim augetur, motibus qualibuscumque febrilibus, sed sine typo, succedentibus.

2) Vel *malignior*, quæ præcipiti progressu inuadit, & statim sub ipsa inuasionem febrem satis acutam, typicam, inflammatoriam secum ducit, reliqua etiam symptomata ita exasperata habet, ut ægri breui viribus deficiant

3) *Benignam* vulgo vocant dysenteriam sine febre, & *malignam* cum febre; sed minus distincte: nulla enim dysenteria ab omni febre immunis est; id quod ex *signis* subsequens magis elucescet.

2. Porro dysenteria est vel *epidémica*, vel *sporádica*

3. Diuiditur etiam dysenteria in *cruentam*, die rothe Ruhr, & *non-cruentam*, quam die weisse Ruhr adpellant.

4. Dysenteria non confundenda est cum fluxu illo, qui *Luteis Parisiorum* ita endemius esse dicitur, ut omnes aduenæ illum incurrere soleant. Gallis *le mal de Paris* audit, & sequentibus a dysenteria differt:

1) Cum diarrhœa quidem incipit ille fluxus, & sanguinis excretionem habet succedentem, sed non est contagiosus, nec ad dysentericam accedit malignitatem.

2) Quo-

- 2) Quolibet anni tempore indifferenter solet euenire, dysenteria autem numquam extra tempus exeuntis æstatis contingit.
- 3) Fluxus ille sæpius a febrilibus symptomatibus alienus est.
- 4) Ceterum incolæ causam huius fluxus *Sequana* flumio, quo tota ciuitas vitur, abscribunt.
5. Dysenteriam satis quidem graphice simulant *hæmorrhoides torminosa*, & impeditius emicantes, quæ etiam Medicis sæpe imponunt, a dysenteria tamen sequentibus facile sunt distinguendæ:
- 1) In dysenteria ordinarie aliquid spumidæ & vlcerosæ similitudinis adparet, in hæmorrhoidibus nihil huius reperitur.
- 2) Dysenteria est contagiosa: hæmorrhoides, impeditius etiam fluentes, non item.
- 3) Dysenteria ordinarium seruat annum tempus, hæmorrhoides autem promiscue obueniunt.
- 4) In dysenteria excretio sanguinis *augefcens* exasperat malum, in hæmorrhoidibus autem, quo magis fluxus sanguinis succedit, eo magis symptomata, præcipue torminosa, imminuuntur.
6. Differt etiam dysenteria a fluxu sic dicto *hepatico*, *Vid. tabul. de hæmorrhoidibus internis.*
7. Differt itidem dysenteria ab aliis alui fluxionibus, in quibus symptomata sunt mitiora, excretiones non sunt cruentæ, multo minus epidemica grassatio in illis deprehenditur.
8. Speciatim dysenteria *alba* non confundenda est cum excretionibus *cholericis*; cuius signa *tabula de febris biliosis* conferantur.
9. Ad differentiam etiam referri potest, quod dysenteria *Hippocrati* quamcumque acrem alui fluxionem designet.

III. SIGNA.

Dysenteria benignioris.

- 1) Mense Augusto, rarius circa Iulii medietatem, ægri corripuntur lubrica aluo, eo maxime tempore, quo cærala,

rafa, pruna molliora, & pyra præcocia, maturefcere incipiunt.

- 2) Hæc alui solutio magis magisque iu maiorem impetum excedit.
- 3) In abdomine exquisitæ torsiones, cum anxietate præcordiorum, & circa sedem morsus acres velut in horas inualescunt.
- 4) Accedit ordinariæ *tenesmus*, seu perpetuus alui deponendæ conatus, cum intercurfantibus horripilationibus vagis & phlogosis.
- 5) Increfcit languor corporis, adpeditus cadit, & adspectus in facie morbidus sensim adparet.
- 6) Reiiicitur materia tenuis, albuginea, leuiter flauescens, cum odore non tam foetido, quam ouo leniter olido simili.
- 7) Tandem hanc materiam comitatur sanguis diluitor, instar turbidæ carniæ loturæ, aut subcruenta mucida substantia, ac si intestina abrafa effluerent.
- 8) Cito increbescunt hæc pathemata, ita tamen, vt ægri non semper, sed tum demum decumbant, quando mali huius ferocia inualescit.
- 9) Numquam ab omni febre immunis est benignior hæc dysenteria, quo vehementius autem febris concursat, eo deterior materia peccans, & ferocius est malum. Ludit autem interdum schema modo quotidianæ, modo tertianæ intermittentis.
- 10) Sitis accedit satis mature.
- 11) *Vrina* imminuitur, & aliquando ad plenariam accedit suppressionem.
- 12) In progressu & declinatione morbi prociencia intestini recti facile subsequitur.

2. *Dysenteria malignioris.*

- 1) Præcipiti progressu obruuntur adflicti.
- 2) Sub ipso inuasionis tempore *febris* exquisita, & maxime ardens, statim adest, immo interdum præcedit.
- 3) Reliqua symptomata, quæ cum benigniore habet communia, magis sunt exasperata; præcipue tanta est an-

xietas præcordiorum, vt conuulsiones interdum & singultus superueniant.

- 4) *Agrypnia* propter dolores & deiectiones crebriores ad modum vrget.
- 5) *Vomitus* quoque in principio interdum adfligit, & sanguinem per eundem non nulli emittunt.
- 6) *Circa statum*, immo in *incremento* lingua adparet arida, torrida, nigra.
- 7) *Vires* breui tempore decrescunt.
- 8) *Aphsa*, præsertim si præpostera methodus accedat, non raro superueniunt. Non minus etiam *petechia* & *purpura*.
- 9) Excrementa *incruenta* magis, quam in *benigniore* conspiciuntur.

IV. SVBIECTA.

1. Dysenteria, quia *contagiosa* est, & epidemice grassatur, omnem sexum & ætatem occupat.
2. In primis autem inuadit plethoricos & caeochymicos, & præ aliis grauitur illos exercet.
3. Non tantum illos homines infestat, qui fructus fugaces ingurgitare solent, sed etiam, qui ab eorum vsu prius abstinentes viuunt.
4. Cholericis tandem & sanguineis omnium maxime per contagium hoc morbo corripuntur.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est fermentum subtilius, siue ex atmosphæra, siue per contagium, cum humoribus communicatum.
2. Specialissima autem indolis hoc fermentum præ omnibus aliis esse, exinde diiudicandum est, quia natura illud, instar purgantium, per intestina eicere adlaborat, vnde hic morbus a *Sydenhamo*, *febris ad intestina conuersa*, adpellatur.
3. Huius specificæ indolis rationem perspicere, nulla quidem spes adfulget, hoc tamen certum est, quod cum bile excrementitia concursans hoc fermentum talem cum illa corruptelam former, quæ catharticæ excretioni conueniat.
4. Hinc

4. *Hincbilis*, tamquam causa *concurrentis*, & fermento huic specifico maioris acrimoniae incrementum suppeditans, habenda est; id quod multae anatomicae observationes confirmant, praecipue a *Bontio* traditae, qui in folliculo fellis nullam bilem, sed multam materiam quasi chylosam in mortuo quodam dysenterico deprehendit.
5. Fermentum hoc specificum in sola indole fructuum dictorum hortensium frustra quaerimus: mense enim *octobre* etiam fructus eiusmodi & inprimis *vna* comeduntur, nulla autem tum dysenteria observatur, bene vero aliae alui fluxiones. *Conf. subiecta num. 3.*
6. Magistribuendum erit aëris constitutioni: aestate enim minus feruida, minus etiam dysenteria metuenda est; quo magis autem austrina aëris constitutio, id est, calor humidus regnat, eo crebrius occurrit dysenteria.
7. Specialiter ad hoc malum contribuit illa aëris temperies, quae declinante aestate, & incipiente autumno observatur, ubi frigoris & aestus frequentes vicissitudines occurrunt.
8. Reliquae causae aduentitiae & procatarticae sunt:
 - 1) Potus largior *frigidus*, vel *fermentescens* post ingurgitationem fructuum haustus.
 - 2) *Iracundia* vel *refrigeratio*, quando tali fructuum abusu superueniunt.
 - 3) *Status plethoricus* multum etiam ad hoc malum contribuit.
 - 4) Specialiter neglectus *evacuationum* sanguinis adsueta-rum.
9. Causa *formalis* est principium vitale, quod humores copiose versus intestina dirigit, ad materiam fermentescentem infringendam, & inflammatoriam eius potentiam praecipuam.
10. Aetiologia *vulgaris* causam adscribit acrimoniae causticae, intestina stimulantis, illorum tunicas rodentis, humores coagulantis, & sic stasim & corruptionem inducentis, quae aliquo modo vera quidem sunt, sed genuinam & primariam huius mali causam vix digito attingunt.

VI. PROGNOSIS.

1. *Dysenteria benignior* numquam quidem vacat omni periculo, ad plures tamen hebdomades, immo per tres menses durare, & æger interdum emergere solet.
2. Quo magis autem febris inflammatoria concurrit, eo magis pestilens fit morbus, & periculo plenissimus.
3. Qui nudo *contagio* malum hoc contraxerunt, febrem graviolem, prostrationem virium maiorem, & reliqua symptomata, magis exacerbata, experiuntur, quam qui a *materiali* occasione, e.g. fructuum ingurgitatione, ab hoc morbo infestantur.
4. Sponte sua non facile salutariter cessat & decurrit, sed sæpius decumbentem iugulat; præcipue *adultis* periculosius cedere observatur, quam iunioribus. Atque ita pertinet dysenteria ad pauciores illos morbos, in quibus natura arti cedere observatur.
5. *Tormina* quando repente evanescent, euphoria tamen non succedit, sed corporis & animi languor continuat, res est calamitosa.
6. Maxime omnium funesti prælagii deprehenditur *aphthodes* faucium inflammatio: siue a ventriculo sursum ascendat, siue per œsophagum deorsum descendat.
7. Corripiuntur enim hinc facile ægri extrema illa *atonia*, nempe paralyti musculorum œsophagi, ut cum sonitu descendat, quidquid liquiti adsumunt, es tollit bis in den Magen hinunter, omine plurimum funesto.
8. Dysenteria quando per *adstringentia*, ut plerumque fieri solet, tractatur, gravissimæ anxietates, ardores, convulsiones, præceps lethalis eventus, sæpissime inducuntur.
9. *Vomitus* dysenterix quidem non est familiaris, quando autem mature, & protinus post ingurgitationem fructuum præcipue horæorum, ante, quam alvus turbatur, largiter evenit, toti malo præoccupando, vel ad minimum imminuendo, conducere observatur.
10. Quando autem conatus magis, quam verus vomitus, & quidem ad modum sero accedit, læsio quædam in ventriculo præualefcens indicatur, & ita conamen illud vomendi a bono effectu alienum est.

11. Dysenteria *non-cruenta*, vulgo *alba* dicta, & abrasione veluti vlcerosa conspicua, longe periculosior est, quam *cruenta*, præcipue si deiectiones antea *cruentæ* sine euphoria cessauerint: nam in dysenteria *alba* maior est acrimonia acido-austera, quæ sanguinem in tene-rioribus intestinorum valis coagulat, & ita exitum ei præcludit, vnde post ea grauior inflammatio & cor-ruptio presso pede insequitur.
12. Quo minus materia excernenda succedit, eo grauior est *tenesmus*, quem externum frigus, & adstringentia interne adhibita, non mediocriter exacerbare solent.
13. *Appetitus* qualitercumque sibi constans, aut denuo sub-oriens, multo melior est, quam illius per plures dies amissio.
14. Dysenteria, quando feliciter superata est, relinquit in- testina firmiora, ita vt eius modi conualescentes post hæc aliis alui fluxionibus, vel torminibus, non tam facile obnoxii sint.
15. Dysenteria si funeste exit, quo magis eneruati fuerunt ægri, eo minus conuulsiones accedunt; vbi autem fluxus per adstringentia cohibitus fuit, ibi intereunt ægri conuulsionibus grauioribus, & quidem ordinarie diebus indicatoriis, vel criticis.
16. Prouentus eius modi materiæ, quæ carunculas aut glandulas æmulari videtur, non statim quidem fune- stæ, nec tamen melioris est prognoseos.
17. Quo magis *interne* ardores, & *externe* refrigerationes sentiuntur, eo grauior inflammatio metuenda est.
18. *Faucium* ariditas & ardor quando affligit, aphthas por- tendit perniciosas.
19. *Lingua* obscure rubicunda aut nigra ac tumida, pessimum indicat malum.
20. *Petechiæ* huic morbo superuenientes, exitum minantur funestum.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis

Duo inuoluit momenta, quæ vniuersum negotium ex-
hauriunt. 1. Ma-

1. Materia *corrupta crassior* & fœculentior est euacuanda; id quod obtinetur
 - 1) Per rhabarbarum siue in substantia, siue in infuso abunde saturato, vsurpatum,
 - 2) Per pilulas *Beccheri*, multo magis *Stahlîi*.
 - 3) Per clysteres, ex sero lactis paratos, &, secundum *Sydenhamum*, paucis horis aliquoties repetitos.
2. Materia *corrumpens specifica*, nempe subtilissima fermentatiua substantia, conueniente suæ speciei modo, eliminanda, & ita ab vltiore corrumpente progressione cohibenda est; id quod perficitur
 - 1) *Alexipharmaco-diapnoicis* remediis selectissimis, e. g. rad. pimpin. alb. gentian. ver. angelic. herb. scord. & millefol. item semin. fantonic. & tanacet. licet ex diuerso fundamento.
 - 2) *Decantatis specificis*, hepate serpentis, smaragdo præparata, priapo cerui, exsiccato sanguine leporis non vulnerati, sed capti & iugulati, radice ipecacuanhæ, & maxime omnium cortice *cascarilla*.

B. *Methodus specialis.*

1. Si auxilium Medici requiritur ante, quam febris notabilis accessit, & vitium in primis viis hæere censetur, medicatio sequente ratione instituat:
 - 1) *Curæ initium* fiat per laxans rhabarbarinum, adiecto nitro, quod sub initium huius morbi egregie se gerit, e. g.
 - a) Rec. rad. rhabarb. select. subtilissime præparat. nitri depurat. ana drachm. semis.
M. f. puluis, qui pro vna vice *mane* sumatur.
 - b) Vel propinetur dosis pilularum *Stahlîi*, quæ sapius solæ vniuersum malum auferunt.
 - 2) Huic laxationi *vesperi* subiungatur lene anodynum, subadstringentibus maritatum, e. g.
 - a) Recip. corall. præparat. gr. VI.
spec. de hyacinth. gr. V.
MP. de cynogloss. gr. I.
M. sumatur pro dosi.
 - b) Vel exhibeatur theriacæ *Andromach.* scrup. I.
 - c) Vel

- c) Vel post meridiem bis propinetur pulvis cascarillæ ad gr. X. XV.
- 3) Hæc methodus in tali mitiore malo sequente etiam die repetatur, immo, si opus videretur, duplicetur, ita vt pilulæ *Stæbliana* bis, & pulvis cascarillæ per diem porriganur.
2. Vbi autem malum *profundius* iam hæret, & febrilis commotio, vel statim sub initium, vel succellu temporis & neglectu auxilii, mature quærendi, ægrum vehementius occupavit, ibi motus febriles, qui miasma subtile fermentatiuum eliminare intendunt, magis respiciendi sunt & adiuuandi.
- 1) Mane itaque propinetur essentia alexipharmaca temperata, cum essentia cascarillæ vel millefol. saturata remiscenda, subiuncto regimine leniter diaphoretico.
- 2) Per diem vero bis vel ter exhibeantur pulueres præcipitantes cum antimonio fixo, & interdum specifico aliquo, e. g. hepat. serpent. cortic. cascarillæ, maritati. De *nitro* vid. eautelas.
3. Symptomata, quæ hunc morbum comitantur, congruenter sunt tractanda, in primis decocta mucilaginosa & gelatinosa cum potu calido & tranquilla continentia adhibenda.
4. Mitescente impetu medicationi tandem colophonem imponere conuenit cum stomachicis & ventriculi tonum restaurantibus. Huc pertinent: essent. absinth. card. bened. tanacet. galang. cort. aurant item fructus sorbi maioris exsiccati, miua cydoniorum, vinum generosum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Iudicio Medici relinquendum est, num sub mali initium *vomitorium* præscribendum sit.
2. Vbi a prægressa ingurgitatione fructuum fermentescentium, vel alia diæta inordinata dysenteria inducta est, ibi omnino locum habet; & in talibus circumstantiis specificum illud *Americanum*, nempe *radix ipecacuanne*, commode inseruire potest, dosis scrup. I. plus vel minus.
3. Quan-


3. Quando autem vomitorium illo tempore propinatur, quo febris inflammatoria iam inualuit, vniuerso morbi decursui magnum in eommodum adfertur.
4. Potus fere quilibet, præcipue frigidus, fouet, ad minimum exasperat hoc malum, ægro tamen ob febrem non potest denegari; modo calidus porrigatur.
5. Loco vero ordinarii potus plurimum conducit decoctum *femini carui* instar thée vsurpatum. Immo decoctum hordei, gelatina C. C.
6. Dysenteria hoc peculiare habet, vt moderatus potus generosi vini non solum non noceat, sed plerumque etiam, licet febris conspiret, bonum effectum præstare obseruetur.
7. Ad febrem hic magis, quam ad fluxum respiciendum est: illæ enim medicationes, quæ feбри conducunt, fluxum vero augent, e. g. potus largior, minimam noxam adferunt; quæ autem, fluxum inhibentia, sed feбри contraria, adhibentur, illa inducunt euidentissima damna.
8. Huius census sunt *adstringentia*, & sane deplorandi sunt errores, qui non solum per vulgus, sed etiam a Medicis ipsis in dysenteria committuntur, & quidem sub specioso illo prætextu, ac si fluxus alui a laxitate intestinorum dependeat, quæ proinde adstringentibus talibus corrigenda sit; cum tamen expressio, sub hoc fluxu contingens, repetitis *constrictionibus* absoluat. Tanto magis autem ab adstringentibus abstinendum est, vbi dysenteria, quod frequenter fieri solet, cum febribus epidemicis petechizantibus colludit.
9. *Subadstringentia* autem in mali mitioris initio, vel etiam in declinatione, bonum subinde effectum præstant.
10. *Opii* vsus summa cautione indiget; si materiales læsiones remotæ sunt, & tum aliquid opii placet, theriaca vel M. P. de cynoglossa aliis præfertur.
11. Quælibet *refrigerationes* hoc malum exasperant, hinc desidentibus aquam calidam supponere, & plantis pedum calidos lateres adponere, conducit; calor etiam moderatus vbique commendatur.

12. Ex hoc fundamento non possunt probari antiquorum *clysteres* re ipsa *frigidi*, quos pro ardore inflammatorio extinguendo passim commendant: sane enim vera refrigeratione tales ardores adgredi, cœptum est incon-sultissimum.
13. *Clysteres* etiam generatim in hoc malo eximium non habent effectum, immo ne quidem indifferentem usum; nisi quidem in principio, ubi terebinthinati esse debent, adhibeantur.
14. *Euacuantia* non alia, quam lenissima, laudantur, speciatim *rhabarbarum*, quod abstergit, & simul etiam aliquid adstringentis relinquit: hinc in substantia, non autem in extracto, febre adhuc exigua, ad gr. XXX. XL. usurpatum, usum suum præstat.
15. *Nitrum*, quod abstergentibus, vulgo accepta interpretatione, adnumeratur, per initia cum absorbentibus exhibitum, eximium leuamen præstat, & tantum abest, ut illo tempore noceat, ut etiam in progressionem morbi, si potulentis dilutum exhibitum fuerit, probetur.
16. *Correctio* materiæ, quæ hic commendatur, exoptatissima quidem esset via ad finem salutarem obtinendum; si modo remedia, quæ huic scopo satis facerent, proficerent.
17. *Absorbentia* certe pleraque, quæ pro materia corrigenda commendantur, nullius sunt pretii, præcipue in malo per contagium communicato.
18. *Corallia* aliis solent præferri, sed semper incertum est, num alio, quam absorbendi effectum, exiguum hic usum suppeditante, operentur.
19. Idem iudicium esto de bolaribus concretis, seu *terris sigillatis*, nisi enim hæc terræ adstringendo aliquid efficiant, de reliquo inutiles sunt, & intestina grauant.
20. Quid vulgo dicta *corallina* forte hic possit, cuiuslibet experientiæ relinquendum, cum in aliis intestinorum pathematibus non inefficax deprehendatur.
21. *Mitigantia*, obtundentia, & reliqua *pinguis* exigui sunt effectus: *oleum commune* multis est suspectum: *oleum lini*

- nullius specificæ & constantis efficaciam reperitur, cui
oleum ouorum multis respectibus præferendum est.
22. *Lac*, pro temperante illo & demulcente scopo, diu quidem laudatum, modus autem utendi, quando copiose ingeritur, suspectus immo interdum noxius est: in spissius enim coagulum hac ratione facile transit, & hoc tormina ac reliqua symptomata magis fouet, quam temperat. Si vero secundum *Sydenhamum* vni parti lactis, duæ partes aquæ simplicis addantur, felicius erit effectus.
23. Mitigans nullum *gummi Arabico*, largius exhibitio, par est.
24. *Specificæ* innumera fere in dysenteria laudantur, si modo effectus huc laudibus responderent.
25. *Volckamerus* pater in misc. N. C. semini *lapathi acuti cruenti*, vulgo sangu. dracon. præter effectum adstringentem, specificam adhuc in dysenteria efficaciam adscripsit.
26. *Priapum cerui*, *hepar serpentis* & *smaragd.* præparat. sub methodo iam quidem adlegauimus, faciunt autem quod possunt.
27. *Ab Hagedornio* & aliis *fungus sorbi aucupariæ*, vulgo *Eberasche*, extollitur.
28. De specifico *Americano* recentissimo, nempe radice *ipeca-cuanna*, multæ passim quiritationes, quod votis non semper respondeat, audiuntur: num inueterata radix vel utendi minor dexteritas, in culpa sit, incertum est.
29. Corticem autem *casçarilla* & febrî & dysentericæ salutariter conuenire, experientia testatur.
30. *Sympatheticæ* a quibusdam laudatur *caput mortuum vitrioli*, fellæ inponendum, sed quoniam adstringit, cautissime vsurpandum.
31. Ægri non ad quemuis conatum deponendi surgant, sed calide bibendo, & tranquille iacendo diaphoresin, ad modum sibi salutarem, expectent.
32. *CrySTALLUS montana*, minoribus & repetitis dosibus, sistit diarrhœas, habet enim subadstringentis aliquid: vnde cautius adhibenda, sine tamen periculo adstrictionis exhibe-

hibetur, si correctorium aliquod, nempe potiuncula quædam vel nitrum illi addatur. Conferantur, quæ de crystallo montana *tabula de febribus biliosis* dicta sunt.

33. In *suppressa* dynteria, si æger male inde habet, ad reuocandum fluxum commode datur puluis rhabarbari.
34. Alexipharmaca fortiora, vti in omnibus febribus acutis noxia sunt, & æstum nimium augent; ita hoc loco non commendanda sunt.
35. In complicatione dynteriæ cum *hamorrhoidibus cæcis* circumspeditione medica opus est. In hoc enim casu repetitus vsus laxantium, licet lenissimorum, non quadrat, vsus autem millefolii internus cum fumo muris marini, externe adhibito, commendatur. *Conf. cautel. tab. de hamorrhoidibus cæcis.*



TABVLA LXXVIII.

DE

P E S T E.

I. DEFINITIO.

Pestis est princeps febrium acutarum, epidemicarum, malignarum, vbi principium vitale per motus febriles summe subtilem, & ad corruptionem putridam inferendam ad modum agilem materiam, versus peripheriam corporis excutere, eliminare, & hac ratione periculum sphacelosa corruptionis auertere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Pestis a reliquis febribus epidemicis & malignis differt *gradu*, quo omnes alias longe post se relinquit.
2. Non minus etiam *per se* hac graduum malignitatis differentia grassatur, ita vt pro diuersitate annorum, temporum, locorum & situs urbium, alibi grauior, alibi mitior esse soleat; mitissima tamen pestis longe malignior est variolis, morbillis & petechiis, extra pestis tempus

graſſantibus: hæ enim febres, quomodocumque malignæ, tantam ſtragem nunquam edunt, nec tam breuibus & ſæuis lethalibus effectibus ſeſe exſerunt.

III. SIGNA.

1. *Vires* ſtatim ſub initium mirifice cadunt, ita, vt ægros pigeat ſe mouere: es ſcheinet ihnen nichts zu fehlen, als daß ſie nur ſo ungenein matt ſind.
2. Hanc repetitam, & quaſi ſpontaneam virium deiectionem confirmat *pulfus* ſenſibilis debilitatio: quod tamen ita non intelligendum eſt, ac ſi ad naturalem, vel adhuc inferiorem gradum accedat: rara enim in febribus auiſ eſt vulgare illud diſterium: *Vrina ſana, pulſus ſanus* & c.
3. Immo nonnumquam lipothymici plane adfectus occurrunt.
4. *Vigiliae* pertinaces citra perſpicuam cauſſam, e.g. doloris, inquietudinis, in plurimis obſeruantur.
5. Maniſtant *ſeſe mentis* vacillationes, lapſui memoriæ ſimiliores, quam veræ aberrationi.
6. *Frequentiffime* obſeruatür inſidioſa diſſimulatio ſymptomatum conſuetorum, & ſemidelira morbi neglectio, ita vt calorem, ſitim, & dolores vix perſentiant.
7. Quando autem grauiorum ſymptomatum repentinæ eruptiones contingunt, illæ potiffimam peruerſæ medicationi, e.g. opiatis, ſalibus volatilibus, cum regimine exhibitis, adſtringentibus, calidis elixiriis & c. adſcribendæ ſunt.
8. Ad indolem huius morbi magis pertinent exanthemata, mature erumpentia, e.g. *anthracum*, in partibus ſanguineis erumpentium & eximium ardoris ſenſum inuoluentium; item *bubonum, parotidum, vibicam, petechiarum*.
9. Animus ſub hoc morbo valde ita abiectus obſeruatür, vt etiam mature lethalem exitum ſibi infecti præſagiant.
10. Reliqua ſigna cum aliis acutis continuis & malignis hic morbus habet communia, e.g. inuadit cum horrore, ſuccedente leni æſtu; in nonnullis autem cum vomitu, vel diarrhœa, aut hæmorrhagis ſeſe maniſteſtat.

IV. SVBIECTA.

1. Quod pestilentia omnis generis homines, ætatem & sexum promiscue inuadat, per vulgus notum est.
2. Facilius tamen eidem obnoxii obseruantur homines timidi, otiosi, pensitabundi, plethorici.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est miasma fermentescens magnæ subtilitatis, ita vt halitus & vaporis forma per vniuersam sanguinis massam diffundi, ex illa autem, ob colatoriorum in corpore humano minus quadrantem proportionem, difficulter tæcerni possit.
2. Causa *efficiens* est principium vitale, quod per motus febriles hanc, molis quidem summæ exilis, agilissimæ autem indolis, materiam e corpore eliminare, & hac ratione imminentem putredinem præoccupare intendit.
3. Causæ *occasionales*, quæ pestilentem hanc materiam producere, & aërem ea inficere creduntur, sunt sequentes:
 - 1) Terræ motus, vapores tales noxios emittentes.
 - 2) Exhalationes putridæ corporum, post magnam stragem non legitime sepulcorum. Huc etiam pertinent reliquorum animalium, immo volatilium, corpora putredine adfecta.
 - 3) Effluuia venenosa, per nefandas hominum quorundam manus excitata.
 - 4) Cibus insolitus & naturæ aduersus, e.g. carniū equorum vel aliorum animalium; quale quid præcipue eo tempore contingit, quo vrbes obsidentur, vel fames per certas mundi plagas populos adfligit.
4. Certius est, pestiferam materiam & luem in Aegypto & Barbaria sedem quasi fixisse & exinde latius diffundi, sæpeque nobis per contagium affricari, de quo solide commentatus est beatus D. Kanold.

VI. PROGNOISIS.

1. Quoniam materia in peste peccans, per corporis nostri colatoria ob tenuitatem coerceri & ex sanguine secerni non potest, sed illorum colatoriorum poros semper

- iterum perrepat, non potest non funestus plurimum euentus succedere.
2. Trepidatio animorum, non solum sub ipso morbo, sed etiam ante illius inuasionem exorians, plurimum ad hunc infelicem exitum contribuit: trepidus enim animus trepidos etiam inuoluit motus vitales.
 3. Quo magis *leniora* sunt symptomata æstus, sitis, dolorum &c. eo malignior est pestilens materia.
 4. Omnium sæculorum vnanimis obseruatio conspirat, quod pestis *tribus modis salutariter* finiri soleat:
 - 1) largis sudoribus in ipso initio.
 - 2) Bubonibus.
 - 3) Anthracibus, sed vtrisque etiam his mature & satis prompte erumpentibus.
 5. Ex contrario peste *perire* obseruantur
 - 1) Quibus nulla talis excretio tempestiua obtingit,
 - 2) Velenicans iterum recedit,
 - 3) Vel plane ad interiora secretoria & excretoria organa defertur, vt diarrhœas, vrinas discoloras, vomitus, seu conatus vomendi diuturnos, hæmorrhagias, pleuriticos & anginosos morbos formet.
 6. *Medio* quasi inter hæc loco sunt *petechiæ* pestilentes, tardius erumpentes, valde liuidæ, saturatæ, copiosæ, & ægrum eruptione sua nihil subleuantes: hæc plerisque sunt funestæ, paucioribus salutariter eueniunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Materia maligna quia *corrigi* non potest, sed potius intra breue tempus intimam corruptionem inducere valet, omni modo ex corpore *expellenda* est.
2. Hæc autem expulsio vno, breui, atque forti impetu fieri non potest, sed placide ac assidue omnia hic sunt peragenda.
3. Quidquid sperare licet, *matura* excretioni *peripherica* inuitatur: nam materia maligna, vt sub halitus forma corpus occupauit, sic etiam per placidam, & continuam exhalationem iterum debet expelli. Hunc indicationi inferuiunt
 - 1) con-

- 1) continentia ægri tranquilla, & regimen non tam calidum, quam verum refrigerium arcens.
- 2) Sufficiens humectatio, e. g. potus tepidi ad instar thée e radice scorzoner. flor. galeg. & similibus, saporis non ita aduersis. Item prisana acidulæ.
- 3) Alexipharmaca temperata, e. g. mixtura simplex leniter saltem camphorata, essent. alexipharm. *Stabilis*, essent. pimpinell. alb. largiter saturata. Hæc refracta, sed repetita dosi exhibeantur.
- 4) Interpositis vbique pulueribus, ex nitro, antimonio diaphoretico, & absorbente quodam, paratis, ad suspectam & nimiam humorum commotionem mitigandam.
- 5) Huic mitigandi, & simul lenem diaphoresin promovendi scopo, etiam inseruiunt potiones ex aquis diaphnoicis, antimonio diaphoret. & absorbente aliquo, paratæ.
- 6) Reliqua sub *cautelis* videantur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Si vniquam alibi, certe in peste nocet methodus sic dicta *heroica*. Hinc non solum a venæ sectionibus, vomitoriis, & purgantibus, verum etiam a vehemente & copiosa *aquosi* sudoris expulsionem abstinendum est.
2. Sufficit auctior transpiratio cum leni madore conspicua: commotiones autem sanguinis impediunt liberam hanc diaphoresin. Vnde motus febriles in peste a natura merito leniores instituuntur, quam in aliis acutis.
3. *Sudor* sic dictus *Anglicus*, qui ante sesqui circiter sæculum grassabatur, exemplar huius rei præbet euentissimum: hoc enim morbo correpti raro tertium diem attingebant, sed plurimi intra 12-24. horas moriebantur; nulla medicatio, nulla prophylaxis locum habebat, sed vnice sudoris, non aquosi, sed nebulosi vehementis eruptio, quæ a sola decumbentis continentia expectanda erat.
4. Hæc continentia quieta est anima totius negotii, ad excretionem hanc vaporantem & diurnam obtinendam.

5. *Proportio*, quantum fieri potest, talis feruetur, vt sub initium ad modum placide hæc excretio diaphnoica instituat, & diuturniore demum successu sensum augeatur, ad 12-18-24. horas continuando.
6. *Antiquorum* diuinum remedium fuit *theriaca* sed bona magis intentione, quam salutarî effectû; sub promiscuo certe illius vsu, opii notabilis quantitas non potest non displicere.
7. *Recentiorum* famosæ tincturæ bezoardicæ, quatenus mixturam simplicem pro basi habent, laudem quidem suam merentur, *camphora* autem quantitas, quæ vulgo in illis recepta est, non potest adprobari, quia feruidos in corpore edit effectus. Subtripla illius portio sufficere posset.
8. Sic etiam *croci* & *myrrha* concursus copiosus has tincturas deturpat.
9. In pestilenti lue reiciuntur spiritus c. c. sal volatile viperarum, & omnia vrinosa volatilia *preparata*, non autem *simplicia*, e. g. c. c. viperæ.
10. *Nitrum* purum, moderatis dosibus vsurpatum, tantum abest vt in peste noceat, vt potius in illo, præsertim in fluxuum symptomaticorum metu, plus spei, quam in vilo alio specifico remedio, collocandum sit; habet in super generalem, licet lenem, efficaciam, subtiles corruptiuas fermentationes temperandi.
11. *Acida* hic illis præcipue subiectis commendantur, quæ sanguine fluidiore instructa, & a tussi vel aliis pectoris symptomatibus libera sunt; quo nomine præ aliis laudantur clyllus antimonii, acidum citri, mixtura simplex.
12. In potu affatim offerendo quouis modo caueatur, ne vel ventriculum, vel aluum, vel vrinam valde adficiat: nam omnes irritationes humorum & motuum ad interiora viscera periculum inferunt.
13. Vti in aliis febribus malignis *specificis*, vere talia, adhuc desiderantur, ita multo magis in peste. Laudantur a
qui-

quibusdam *ossa humana*, non cruda, sed putrefacta illa, quæ a cœmeteriis petuntur; & sane dignum est, ut inquiratur, an non eadem ratione ab homine, peste intermortuo, remedium contra hoc venenum impetrandum sit, uti hoc efficaciter a *cane rabido* contra hydrophobiam desumitur; item ad imitationem illius remedi, quod ab ossibus iumentorum impetratur, quæ a malo per *gramen ossifragum* illato, extincta sunt. *Vid. Flora Francica edit. nouiss.*

14. Licet eruptiones illæ pestilentes, nempe bubones & anthraces, ad chirurgiam magis pertinere videantur, Medicus tamen sequentia circa illas notet:
- 1) Regimen leniter, sed continuo diapnoicum plus ad eruptionem confert, quam vlla alia tentamina.
 - 2) *Discussio* anthracum atque bubonum pro re summe dubia atque difficili habenda, neque in vlllo medicamento, nisi in camphora, spes aliqua hic collocanda est.
 - 3) *Bubones* quid ad hunc scopum valeant, ab experientia demum exspectandum est: nam relationes ita variant, ut aliæ nimium quantum, aliæ plane nihil iisdem tribuere velint.
 - 4) Idem valet de *magnete arsenicali*, ab aliis laudato, ab aliis spreto; quamuis vtraque hæc non tam dissipare, quam solum mali impetum mitigare, seu venenum extrahere aut enervare credantur.
 - 5) *Quid de foliis hyosciami* ad dissoluendos carbunculos promittatur, in herbario *Pancoii* videri potest.
 - 6) Illud vbique sedulo cauendum, ne, loco discussionis, nuda repulsio suscitetur, quæ tanto certius in bubonibus funesta, quanto maiore leuamine illæ eruperunt.
 - 7) *Emollitio*, maturatio per emplastra & epithemata emollientia, si mature instituat, & facta apertione, putredo per infusionem balsamicorum præcaueatur, spem discussione facit maiorem.
 - 8) In anthracibus, præcipue circa partes teneriores eictis *ustio* per ferrum *candens* aliis medicationibus præfertur:

- fertur: Anthraces etiam recedentes nihil præsentius reuocat, quam cauterium tale eminus admotum; de qua re dignissima observatio apud *Sculterum* occurrit.
- 9) Vbi reliquæ circumstantiæ consentiunt, non improbandus est ausus quorundam chirurgorum, per *sectionem* bubones, mediocris adhuc molis, extirpare.
- 10) Conferantur tabulæ chirurgicæ de *carbunculis & bubonibus*.
15. Remedia prophylactica vti in aliis contagiosis summe incerta sunt, ita multo magis in peste. Animus, a timore mortis liberatus, maioris est efficacix, quam tot laudata elixiria, aceta alexipharmaca, pilulæ antipestilenciales & c.
16. Quando autem omnino consilia & remedia præcauendi scopo desiderantur, sequentia possunt suppetere:
- 1) Quo magis plethora adest, eo magis commendatur *vena sectio*.
 - 2) Mane exhibeatur dosis essent. pimpinellæ albæ, bene saturatæ, vesperi vero puluis bezoardicus.
 - 3) *Dieta* sit moderata, cibi aciduli.
 - 4) *Suffimenta*, e. g. per baccas iuniperi, frequentia iniungantur.
 - 5) *Motus* corporis placidus numquam prætermittatur, vt transpiratio naturalis vbique locum habeat.
 - 6) Qui cum peste infectis commercium habent, illi radicem pimpinellæ albæ eo tempore in ore detineant, & saluam perpetuo reiiciant.
17. Denique adhuc notari meretur, quod pestis varia subinde schemata exhibeat: modo enim vt febris continens, modo vt continua, præcipue inflammatoria, sese manifestat; quæ ficta schemata Medicum a methodo genuina non deducant.
18. De *amuleto Wedelii*, quod *arcanum duplicatum catholicum* vocat, atque radicem *colchici & plantaginis* continet, ipse auctoris *tractatus de colchico veneno* logi potest.
19. Quæ præteritis annis in quibusdam Gallix prouinciis maritimis regnavit pestis, illa induitiam Medicorum non
- medio-

mediocriter quidam exercuit, sed quid præsidii in arte fuerit, litteræ publicæ passim docuerunt. Cingulum, tinctoris cuiusdam nouum inuenrum, *ex mercurio, sulphure & aliis simplicibus* paratum, &, vti in scabie alias fieri solet, nudo corpori adligatum, efficaciam quamdam in quatuor personis habuisse, gubernator prouinciæ significauit.

TABVLA LXXIX.

DE

FEBRE QUOTIDIANA INTERMITTENTE.

I. DEFINITIO.

Febris quotidiana est species februm intermittantium, singulis diebus cum horrore & æstu subsequente recurrens, quibus motibus febrilibus natura, seu principium vitale, noxiā aliquam materiam in primis viis ordinariē hærentem, corrigere & euacuare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris quotidiana intermittens a quotidiana *continua* facile potest distingui. *Vid. tab. de febre catarrhali benigna.*
2. Quotidiana intermittens a tertiana *duplici* intermittente in eo quidem differt, quod quotidiana constans & vni-forme tempus inuasionis & durationis singulis diebus exhibeat, in tertiana autem *duplici* non singuli paroxysmi, sed alterni sibi respondeant, e. g. paroxysmus primi diei conuenit cum paroxysmo quarti, hæc autem diagnosi magnum in praxi momentum non inuoluit, Medicus enim rationalis respicit paroxysmos, quocumque tempore, & quibuscumque horis recurrentes:

III. SIGNA.

1. Febris *quotidiana* inuadit ordinariē tempore matutino, hora circiter sexta vel septima.

2. Cum frigore & horrore satis notabili, per horæ spatium circiter durante.
3. Vomitu quoque, vel diarrhœa spontanea, aut ambobus simul stipata.
4. Succedit æstus satis vehemens, cum siti, inquietudine, & capitis dolore.
5. Totus paroxysmus raro sex horas transcendit.
6. Æstus quando paullulum remittit, sudor spontaneus ordinarie subsequitur.
7. Singulis tamen diebus recurrit, tempore fere prorsus eodem, vel, vbi turbatur, plane diuerso, anticipando aut postponendo.

IV. SVBIECTA.

1. Febris quotidiana rarior est, quam reliquæ intermittentes.
2. Occupat magis phlegmatica, quam reliqua temperamenta.
3. Ætati senili præ iuuenili.
4. Item sexui feminino præ virili magis est familiaris.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *materialis* est materia viscido-mucosa, quæ in primis viis ordinariam sedem habet.
2. Cum hoc primarum viarum vicio sæpius conspirat plethora cum spissitudine sanguinis in vena portæ.
3. Causa *formalis* est principium vitale, quod motibus febrilibus materiam illam noxiam secernere & excernere intendit. Conf. *caussa* tabulæ sequentis.
4. Causæ *occasionales*, quæ primas vias deprauare, & sanguinem *spissum* reddere possunt, sunt sequentes:
 - 1) Dieta inordinata & cruda.
 - 2) Vita sedentaria otiosa.
 - 3) Animi mœrores continui.
 - 4) Temperamentum segnius phlegmaticum, vel sanguineo-phlegmaticum.
5. Causæ febris *quotidianæ* conueniunt quidem cum causis tertianæ, in quotidiana tamen qualitas vel quantitas materiæ peccantis maiore gradu subesse videtur; nisi quidem tertiana in quotidianam mutata fuerit per remedia commouentia.

VI. PRO-

VI. PROGNOSIS.

1. Febris quotidiana in longius quidem plerumque tempus protrahitur quam tertiana, ad indolem autem quartana non accedit.
2. Quo magis plethora cum spissitudine sanguinis concurrat, eo difficilius omnia in paroxysmis succedunt, & eo diutius durat uniuersus morbus. Natura enim quando obseruat, plethoram sub labore hoc febrili imminui, prius facile non desistit, quam quantitas sanguinis sufficiens hac ratione euacuata fuerit, licet vitium primarum viarum iam sublatum sit.
3. Quo magis *estuans* est hæc febris, eo magis ad *continuum* properat.
4. Vomitus & diarrhœa, quando expedite succedunt, sudor etiam lenis sub declinatione paroxysmorum erumpit, febris, tum ratione imperus, tum ratione tenoris, in dies ab vno paroxysmo in alterum decrescere obseruatur.
5. Quando autem debitæ excretiones non succedunt, & in primis sudor per incontinentiam supprimitur, atque insuper remedia adstringentia propinantur, tum facile obstructions viscerum, hepatis, lienis, item febres lentæ & hæcticæ, cachexia, & tumores œdematosi succedunt.
6. Calidioribus autem medicamentis si nimium sanguis exagitetur, febris hæc intermittens facile transit in continuum, præcipue inflammatoriam.
7. Conferantur ea, quæ tabula sequente sub *prognosi* dicta sunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. Materia viscido-mucosa in primis viis est corrigenda & *preparanda*; faciunt hoc
 - 1) *Incidentia*
 - a) digestiua salina: tartarus vitriolatus, nitrum antimoniatum.
 - b) Resoluentia acriuscula vegetabilia, e.g. radix ari, piper, zingiber, semen sinapi.
 - 2) *Herba capillares*, e.g. capillus veneris, trichoman. ce-

terach, & aliæ radices ac herbæ, quæ hepaticæ ac spleneticæ dicuntur, v.g. rad. taraxici, cichorii, herb. agrimon. centaur. min.

- 3) *Gummata* temperatiora: ammoniac. galban. sagapen. exclusa tamen myrrha, quæ nimis astuosa est.
2. Materia præparata, & mobilis facta, pro conditione circumstantiarum est *euacuanda*, siue per
 - 1) *Emetica*, siue per
 - 2) *Laxantia* blandiora, v.g. pilulas *Beccheri*, *Stablii*, *Quercetan.* tartareas *Bontii*; quin & per
 - 3) *diaphoretico-diuretica* temperata, v.g. rad. helen. vince-tox. pimpinell. alb. & ex his parat. essent.
3. *Symptomata*, nimis vrgentia, prudente ratione sunt miti-ganda.
 - 1) *Frigus* nimis vehemens & diurnum subleuant
 - a) *Linimenta* & *balsama* stomachica; quibus scrobiculus cordis & spina dorsi inungi potest.
 - b) Vel solus *spiritus vini* rectificatissimus, linteis quaduplicatis regioni epigastricæ applicatus.
 - 2) *Æstum, sitim, cephalalgiam* enormem moderantur
 - a) *Nitrosa* & *acida*, v.g. nitrum depuratum, spiritus vi-trioli, nitri, clyllus antimon. succus citri, quod acidum naturæ humanæ amicissimum est.
 - b) *Diluentia*, v.g. infusum thee, veronic. vel potus tenuior ordinarius, non nimis frigidus, neque etiam nimis calefactus.
 - c) *Continentia* tranquilla sub sudore, siue spontaneo, siue per temperata diaphoretica promoti. Hæc præcipue lenit æstum *proximi* paroxysmi, item languorem & fatigationem.
4. *Primæ viæ* sunt roborandæ; quod faciunt
 - 1) *amara*, non nimis ingrata, stomachica vulgo dicta, v.g. rad. gentian. rubr. summitat. centaur. min. tanacet. herb. card. benedict. absinth. scord. & hoc nomine ipsa essent. alexipharm. cum essent gentian. sociata.
 - 2) *Acida* temperata, & *martialia* correctiora, vbi speciatim
tinct.

tinct. vitrioli martis *Ludouici* laudatur, si languor stomachi post febrem superatam diutius perseveret. -

5. *Motus* in consuetudinem deducti, & sublata materia, adhuc perennantes, prudente modo cohibendi sunt; cui indicationi satis faciunt

1) *Anodyna*, sedatiua, v.g. pilulæ *Wildegansii* genuinæ, aut *Matthai* siue *Starkeyanæ* veræ, vespera, quæ paroxysmum præcedit, sumenda.

2) *Subadstringentia*, e.g. cortex chinæ, crocus martis antimoniæ. tenerior *Stahlii*, versus paroxysmum, non tamen *proxime* ante eundem, propinanda.

B. *Methodus specialis.*

1. Ante paroxysmum pulueres digestiuo-præcipitantes propinentur, e.g.

Recip. tartar. vitr.

conch. acido tartari saturat. ana M. dof. scrup. I.

2. Sub æstu sufficiens tepidus potus, qualiscumque dilutus, porrigatur, & quando sitis vehementer vrget, cum nitro temperetur, præcipue etiam continentia corporis tranquilla obseruetur.

3. Æstu vero remittente, madore spontaneo erumpente, exhibeatur essent. alexipharm. *Stahlii* ad gutt. XX-XXX. cum regimine ad modum moderato.

4. Horis vacuis continuentur pulueres digestiuo-absorbentes.

5. Versus somnum pilulæ *Beccheri*, vel aliæ laxantes, ex gummatibus & resinis paratæ, propinentur, vt circa sequentem paroxysmum effectum suum edant, & hac ratione materiam febrilem præscindant. Vix autem, & non nisi in febre languidiore, hæc laxantia sunt *necessaria*.

6. Denique, superato plurimum morbo, ad tonum ventriculi & viscerum restaurandum, essentia quadam stomachica in vsum vocetur, e.g.

Recip. essent. gentian. rubr.

centaur. minor.

galang. ana M. D. XXX. gutt. versus pastum.

Vel recip. tinct. martis aperitiu. *Ludouici* vnc. I.

essent. lign. aloes drach. II. M. D. gutt. XL - L


VIII. *CAF*-

VIII. CAUTE LAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE

1. Vulgaris methodus, qua febres intermittentes hodie tractari solent, duo extrema inuoluit: altera enim materiam peccantem cum *impetu* eliminare intendit, nempe per vomitoria; altera autem, per corticem illum Peruvianum, materiam potius supprimit & concludit, quam euacuat.
2. *Vomitoria*, empirice adhibita, saepe conatus tantum enormes, sine materiae peccantis successu, prouocant, agros inutiliter fatigant, & plethoricos vehementer angunt.
3. Quando *eucmetis* propinantur, praecipue eo tempore, quo iponte natura ad vomitum propendet, nempe versus paroxysmos, facile *hyperemesin* inducunt, & tamen sufficientem excretionem non praestant.
4. Tanto magis hoc contingit, si, quando febres diu durant, & in habitum iam deductae sunt, emetica exhibentur.
5. *Alteramethodus*, qua motus febriles, nullo habito respectu ad materiam peccantem, simpliciter cohibentur, siue per corticem Peruvianum, siue per alia adstringentia, grauiora adhuc damna inducere solet.
6. Nempe adstrictionem alicui pertinacem, in consuetudinem facile abeuntem, flatulentiam, angustias praecordiorum, post partum praecipue adfligentes.
7. Quo magis status plethoricus concurrat, eo certius post cibum phlogoses, faciei rubores, capitis grauitates, & hypochondriaca pathemata succedunt.
8. Porro: colica, icterus, tabes, cachexia, oedemata, hydrops, febres acutae inflammatoriae, anginae, febres lentae, hecticae, anomalae, & innumera fere alia mala.
9. De hoc damno, per corticem *china china* inducto, in recente adhuc memoria sunt duo *regia specimina*. Annis enim proxime praeterlapsis Hispaniae Regina post usum *china china* non solum dicta symptomata mox experta est, sed & ex vita mature excessit. Regem autem ipsum quot periculis exposuerit ineptum hoc medicamen, nouella Madritenses anno 1718. d. 19. dec. confirmant

sequentibus: Ob zwar unser König durch den Gebrauch der China de China das neuliche Fieber vertrieben, so hat sich doch an dessen Statt ein ausgehrendes Fieber eingestellt, welches ihn noch diese Stunde nicht verlassen wil, auch wil die Schwellst an dem einen Fusse im geringsten nicht abnehmen, ja es ist gar eine inflammation darzu geschlagen. Wiewohl nun das vomitiv und andere medicamenta eine gute Wirkung scheinen gethan zu haben, so ist man gleichwohl wegen des Königes Leben in grosser Bekümmerniß. Optandum sane esset, vt hæc *regia* exempla ab vniuersa schola medica altius considerarentur.

10. Reliquæ obseruationes & cautelæ videantur tabula sequente.



TABVLA LXXX.

DE

FEBRE TERTIANA.

I. DEFINITIO.

Febris tertiana est species febrium intermittantium, post tertium diem cum horrore & succedente æstu recurrens, quibus motibus febrilibus principium vitale noxiam aliquam materiam, in primis viis plurimum hærentem, præparare & euacuare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris tertiana est vel *simplex* vel *duplex*; quam differentiam *signa*, quæ inferius sequuntur, docent.
2. Tertiana *legitima* bene discernenda est a *spuria*, *sub-continua*, quæ plerumque frigus *lenius*, æstum vero vehementiorem & diuturnum, præter ea symptomata adhuc aliqua insolita, e.g. *tussim*, adfert, post paroxysmos etiam languorem, lassitudinem artuum, capitis grauitatem vertiginosam, sicientem calorem, somni inquietudi-

rudinem, languorem stomachi, iugiter perfeuerantia, relinquit.

3. Terciana probe etiam distinguenda est a febris illis acutis, præcipue *epidemicis*, quæ typum tertianarium simulant, quando in tempus vernum, & in corpus circa primas vias impurum incidunt: hæ enim notabilem continuitatis habent malignitatem, & non raro maculas petechiales, purpuram, & alia exanthemata pariturunt.

III. SIGNA.

A. Terciana simplicis.

1. Inuadit horis ante meridiem, a ientaculo vsque ad prandium, & quidem
2. qui ientare consueuerunt, incidunt in paroxysmum circa tempus ientaculi; qui autem huic non aduerti sunt, ab hora decima vsque duodecimam ordinarie a paroxysmo corripiuntur.
3. Incipit cum notabili horrore, qui ad membrorum concussionem frequentius excedit.
4. Sensus hic spastico-refrigeratorius primum ordinarie circa regionem lumborum sentitur, & inde per longitudinem dorsi versus scrobiculum cordis adscendit.
5. Succedit *nausea* cum angustis & anxietatibus præcordiorum.
6. Quo magis legitima est tertia, eo certius hæc nausea in ipsum *vomitum* transit, per quem modo tenax & mucosa materia, modo biliosa faburra, modo cibi adhuc indigesti, primis paroxysmis reiiciuntur.
7. In quibusdam fortes tantum vomendi *conatus* obtingunt sine notabili excretionem.
8. Vel loco vomitus diarrhœa sequitur, & quidem in subiectis minus vegetioribus, phlegmaticis, annosis, aut vbi faburra mucosa diu semicocta in primis viis hæsit.
9. Hæc symptomata quando per vnam vel alteram horam durauerunt, tum frigori remittenti succedit flaccida fatigatio & languor corporis vniuersi, præcipue vero artuum, cum molesto sensu contusionis, atq; verm albes

an dem Patienten zerschlagen wäre; exceptis illis, in quibus nausea diutius continuat.

10. Hunc languorem excipit æstus, qui plurimum lento interdum vero satis præcipiti cursu augetur.
11. Concurrunt dolores capitis, sitis & amarities oris.
12. Quam primum hic æstus paululum mitescit, mador quidam, seu lenis sudor erumpere obseruatur; non quidem semper prioribus, bene vero sequentibus paroxysmis.
13. Quo magis tranquilla continentia concurrat, eo citius æstus mitescit, & sudor succedere solet.
14. Totus paroxysmus vix infra 6. horas decurrit, sæpius ad octo, & quando vehementior est, ad duodecim horas sese extendit, has autem quæ excedit, pro *notha*, id est, vere pratico sensu, composita, ad continuum genium accedente, habenda est.
15. Repetuntur vero hæc omnia alternis diebus, ita vt ad minimum interuallum 24. horarum intercedere soleat.
16. Paroxysmi plerumque statò tempore & hora, nonnumquam vero anticipando, aut postponendo, recurrunt.

B. *Tertianæ duplicis.*

1. Hæc singulis quidem diebus recurrit, non singuli autem paroxysmi, sed alterni sibi respondent, e.g. primo die inuadit ante meridiem, secundo post eundem, tertio ante meridiem, quarto post eundem.
2. *Tertianæ anomala* nullum certum inuasionis tempus obseruant.

IV. *SUBIECTA.*

1. Tertianæ legitima occupat magis sexum virilem quam femininum.
2. Familiarior est ætati iuniori & iuuenili, quam annosiori, quæ facilius tertianas anomalas incurrere solet.
3. Item magis euenit personis vegetioribus, quam seniores & incuriosis.
4. Præcipue autem homines sensibiliores & nauseabundi facile tertianam incurrunt, quando post cibos, cum nausea adsumptos, conatus vomendi violenter supprimuntur.

V. CAVSSAE.

1. *Causſa materialis* eſt viſcida, lenta, mucida aut ſemi-concocta materia, plurimum in primis viis hærens; interdum vero, præcipue quando febris antea ſuppreſſa vel corrupta fuit, materia peccans in vaſis meſeraicis vel hepate obhæreſcit.
2. *Causſa efficiens*, eſt principium vitale, quod motibus hiſce febrilibus materiam dictam eliminare intendit.
3. *Causſæ occaſionales*, quæ primas vias deprauare ſolent, ſunt ſequentes:
 - 1) Diætâ inordinata, craſſa, & concoctioni refractaria.
 - 2) Præſertim quando cum nauſea cibi adiũmuntur.
 - 3) Vel commotiones animi vehementes ante, ſub vel poſt paſtum accedunt.
 - 4) Vitæ genus ſedentarium & otioſum.
 - 5) Refrigeratio in regione abdominis, præcipue circa tempus, quo cibus adiũmtus eſt: hac enim ratione concoctio impeditur.
 - 6) Scabies repulſa.
4. *Bilem* cum veteribus hic accuſare velle, irritum eſt: licet enim illa in febre tertiana ſæpius euomatur, hoc tamen reſorſionibus duodeni, quæ ſub hiſ vehementibus commotionibus contingunt, tribuendum eſt. Experientia docet, quod etiam ſani, vomitorio vtentes, bilem ſub vltimis vomitibus eiciant.

VI. PROGNOſIS.

1. Febris tertiana legitima, ſi inconditæ medicationes non admittantur, toto genere ſalutaris eſt; immo per vulgus conſtat, quod poſt legitimum huius febris decurſum ægri non ſolum priorem, ſed etiam firmiorem recuperent ſanitatem.
2. Hæc legitima tertiana frequentius ante ſeptimum paroxyſmum, raro autem ante quartum in ſolidum ceſſat; ſed nihil critici in hac febre obſeruare licet.
3. Quando diætâ conueniente, & regimine modoſto ſublevatur, numquam ruit in exitum periculoſum, & abſque artis auxilio feliciter ſolet decurrere.

4. Vbi vero per medicamenta calida sudor, præcipue sub æstu vehemente, immodeste concitatur, ægri valde debilitantur, & continuas tabidas sudationes, immo febres acutas, viscerum inflammatorias incurrere solent, & hoc tanto certius, quo magis temperamentum sanguineum vel cholericum, ætas iunior, & diætã vinosa concurrunt.
5. Quando autem tertianæ per *adstringentia* cohibentur, succedunt: lassitudo, fastidium, pressiones circa præcordia & hypochondria: porro obstructions hepatis, lienis, febres lentæ, hæcticæ, cachexia, præcipue in illis subiectis, quæ temperamenti sunt phlegmatici vel melancholici, aut ætatis prouectioris.
6. Vti in tertiana legitima *euacuationes* per vomitum vel diarrhœam, quando mature & vegete procedunt, salutariter succedere solent; ita harum excretionum retentiones morbum in longum tempus protrahunt, paroxysmos non decrecentes, sed æquali tenore recurrentes, inferunt, & vires notabiliter exhauriunt.
7. *Sudor* ille lenis, qui sub declinatione æstus erumpere solet, quo magis tranquilla continentia & placido regimine promouetur, eo certius *sensim* decrescunt paroxysmi & morbus salutariter finitur: atque hæc tardior febris terminatio melioris est fidei, quam quæ præcipiti gressu decurrit.
8. Quando error quidam siue in diætã, siue in medicatione committitur, succedens paroxysmus notabiliter exacerbatus obseruatur.
9. Nihil facile huius febris legitimum decursum vehementius turbare potest, quam insignis *plethora*; hæc enim, vbi concurrat, omnia symptomata exasperat; præcipue æstum infert grauiorem, & sudoris spontanei eruptionem multum impedit: ægerrime etiam tales ægri medicamenta calida, vel cohibentia tolerant: non raro enim in febres acutas inflammatorias per illa coniiiciuntur.
10. Paruum & breue frigus subsequente diuturniore æstu, siue excretionibus notabilibus, febrem designat irregu-

larem, & acuto typo, ad minimum composito, propinquam.

11. Tertianæ aliquando *contagiosa* velut adparet, sed non aliter, quam sub crassa conuersatione & contactu, e. g. quando in eodem lecto dormiunt, ex iisdem vasis bibunt; præsertim si vitium primarum viarum concurrat.
12. Insolita *voracitas* in hac febre, præcipue quæ paroxysmos antecedit, morbum protrahere obseruatur; vnde per vulgus passim audire contingit: die Fress- Fieber halten lange an, subiuncta interdum hac ratione: sie haben volles Nahrung.
13. Sic etiam auctior adpetitus, post febris decursum ordinariæ succedens, quando per ingestionem ciborum repletur, facile *recidivam* inducit.
14. Tertianæ, quæ verno tempore oriuntur, melioris genii sunt, quam quæ reliquis temporibus obtingunt.
15. Tumores œdematosi post tertianas tantum quidem periculum non inuoluunt, quam qui quartanas excipiunt; nisi tamen mature & conueniente methodo illis occurratur, hydrops tandem inducitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

Hæc prorsus conuenit cum illa, quam præcedente tabula de febre quotidiana indicauimus.

B. Methodus specialis exiguis tantum circumstantiis variat.

1. Vna vel altera hora ante paroxysmum exhibeantur digestiua cum absorbentibus maritata, e. g.

Recip. nitr. antimoniæ. vnc. semis.

conch. præparat. & acido tartari saturat. drach. II.

M. dof. scrup. I.

ita vomitus spontaneus plerumque subsequitur.

2. Sub paroxysmo potus sufficiens concedatur; modo non inebrians, non sæculentus, neque actu frigidus, aut nimis haustibus ingurgitatus. *Conf. cautel.*
3. Vbi æstus & sitis vehementius vrgent, potus pro sanguineis lenissimis acidis, pro cholericis autem & melancholicis nitro temperari potest.

4. *Æstu* mitescente sudor spontaneus promouetur per moderatam dosim essent. alexiph. *Stahlii*, subiuncto placido regimine.
5. Die vacua hæc essent. alexipharm. & pulueres digestiuo-absorbentes continentur, hac tamen discretionè:
- 1) Si nimio maior sit exæstiuatio febrilis, crebrius, sed refracta magis dosi, propinanda est essent. alexiph. ne motus in febrem lentam hecticam degenerent.
 - 2) Si vero æstus minor sit, digestiua crebrius, quam alexipharm. sunt exhibenda.
6. Eodem die vacuo lenes etiam laxationes conueniunt, absoluta autem non sunt necessitatis, nisi febris languescere, & in longum tempus durare soleat: quo casu pilulæ *Beccheri*, *Stahlii*, cum extract. panchymagogo *Crollii* pro re nata coniunctæ, laudantur. Item decoctum aliquod ex resoluentibus & laxantibus paratum; in quem finem conducunt: rad. cichor. tarax. herb. fumar. card. benedict. agrimon. rad. hellebori nigri, rhabarbar. fol. sennæ & similia.
7. Locum etiam habent stomachico-carminatiua, eodem die versus partem propinanda, ad tonum primarum viarum restaurandum, e.g. essent. gentian. rubr. absinthii composita, tinct. martis aperitiu. *Ludonici*, item essent. e rad. ari. herb. absinth. centaur. min. mastich. galang. cort. citri, aurant.
8. Denique ubi hæc omnia sollicitè obseruata sunt, & motus febriles nihilo minus perseverant, ibi *sistentia* conceduntur. Præ aliis laudantur
- 1) *Crocus martis* antimoniæ. tenerior *Stahlii* 3. 5. gran. pro dosi. Hic crocus aluum non adeo adstringit, uti china chinæ, & tamen æque præsentem efficaciam in sistendis motibus febrilibus exhibet.
 - 2) *Pilula Wildegansii* 4-5. horas ante paroxysmum ad gran. 3-4. exhibendæ: hæc non prima dosi, sed paulatim impetum paroxysmorum infringunt, & sæpe sudorem excitant.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ


1. Febris tertiana duplex aliam non exposcit methodum, sed

- peculiarem tantum ad paroxylimos respectum & adplicationem.
2. Quæ *precedente* tabula sub cautelis dicta sunt, illa hoc loco repetantur.
 3. Subiecta febris tertianæ quo magis sunt valetudinaria, tenera, & sensibilia, eo leniore methodo tractanda sunt.
 4. Absint in iisdem impetuosa *euacuantia*, multo magis autem motus febriles cohibentia; digerentibus potius per tempus aliquod insistatur, & lento demum gressu euacuantia in subsidium vocentur.
 5. Habent quidem in tertianis locum *vomitoria*, vbi cibus dyspeptus & malæ concoctionis, recenter febrem excitauit; stolidum autem est, naturam adhuc magis per artem excitare, si iam sponte ad vomitum inclinēt.
 6. Extra has circumstantias vomitorium exhibere vix vquam necessarium est: materia enim morbifera satis præparata & mobilis facta, commodius sponte naturæ reiicitur, siue per placidum vomitum in ipsis paroxysmis, siue magis tacite per ordinarias aluinas excretiones.
 7. Quod si tamen omnino in robustioribus, vel etiam segnioribus vomitorium aliquod præscribere placet, ad negotium eo citius & facilius expediendum, sollicitè obseruetur, quod, secundum *Hippocratem*, non *cruda*, sed *concocta* mouenda sint; sin secus, grauiata tantum vomendi conamina succedere solent, quæ vires prosternunt, debitos motus turbant, & ita vniuersum negotium difficilius reddunt.
 8. Febres tertianæ, per *adstringentia* suppressæ, vti non raro occurrunt; ita certior illarum medela non obtinetur, quam per paroxysmorum febrilium reuocationem; quæ per pilulas *Becheri*, *Stablii*, vel alia moderata, & tamen efficacia, laxantia commode obtinetur.
 9. Quam primum per lenia talia laxantia febris reuocata est, symptomata per suppressionem inducta, e.g. tensiones & pressiones circa præcordia & hypochondria, lassitudo, fastidium, tumores œdematosi &c. citius ordinariè mitefcunt.

10. Post felicem febris tertianæ decursum appetitus moderandus, refrigerium, præcipue humidum, euitandum, & ad tonum ventriculi restituendum, tonico-stomachicis continuandum est; subiuncto motu corporis moderato.
11. Vbi autem hæc febris, minus feliciter decurrens, tumores œdematosos relinquit, ibi salia digestiua, lenia tonico-martialia, stomachica & blandissima laxantia conueniunt; abstinendo a salibus volatilibus, acrioribus alcalicis & purgantibus fortioribus.
12. Digestiua *salina*, e. g. tartar. vitriol. arcan. duplicat. nitr. antimoniæ. longe hic præferenda sunt *vegetabilibus*, e. g. rad. ari, zedoar. piperi, zingiberi, &c. hæc enim segniora non solum obseruantur, verum etiam per sal suum volatile, quod sub acrimonia sua fouent, astui febrili nocumentum aliquod adferunt.
13. Quando autem febris lentescit, & ita minor æstus præsto est, vel subiectum phlegmaticum occupat, tum hæc vegetabilia & alia *amara* laudabilem operam præstant; in primis laudatur *centaurium minus*, &c, febre subacta, carduus benedictus, qui ad tonum roborandum eximia virtute præditus est.
14. *Extracta* horum amarificantium decoctis & infusis præferenda sunt, præcipue in subiectis sensibilibus, in quibus infusa talia, copiose adsumenda, per nimiam suam amaritiam facile æstum hecticum inducere solent.
15. Sal digestiuum *Syluii* non commendatur, multo minus salia volatilia vrinosa.
16. Medicatio per *arsenicum* non decet viros sinceros.
17. Saburra ad primas vias congesta, aliis febribus concurrens, tertianarii typi complicationem haud raro adfert; quod tanto magis obseruandum, quo sæpius tales febres anomalæ in nostris climatibus occurrunt. Faciunt hoc præcipue febres epidemicæ, paullo lennōris indolis, veno tempore obuinentes. *Vid. differentia, item tabula de febre catarrhali maligna.*
18. Ex omnibus febribus *duæ* sunt, quarum causa materialis

ob loca satis commodam proximam *correctionem* paulo magis admittit: nempe febris cholericæ & tertiana; cauendum tamen vbique, ne intentione corrigendi absorbentia nimis copiose ingerantur.

19. *Efflorescentia ulcerosa* in externo oris ambitu non tantum tertianis intermittentibus, sed & tertianis continuis, & aliis acutis, cum magna anxietate cardialgica coniunctis, imò in vermibus etiam sunt familiares. Hoc tamen loco mentio illarum fieri debuit, quia potissimum sub febre tertiana obseruantur. Quod hæc fiant in febribus minus benignis & in longum tempus se se extendentibus, vulgo quidem adseritur, docet autem experientia, ipsas benignas tertianas eius modi efflorescentiis sæpius esse stipatas.
20. *Vena sectionem* in febribus intermittentibus adhibere absolum est: facile enim typum intermittentem in continuum mutant.
21. Potum quando etiam sub *frigore* ægri efflagitant, ille tanto modestius & magis tepidus porrigendus est.
22. Denique ad *recidivam* tertianæ febris præoccupandam, adhuc notandum, quod annuo recursu primæ viæ per lenia laxantia euacuari, & per stomachica roborari possint; subiuncto regimine diætetico exquisito.
23. Laudant quidam symptheticam febrium curationem per *cancrum fluuiatilem*: iubent nimirum segmenta vnguium ægri cancri chelis adligare & deinde cancrum in fluuium demittere, daß das Fieber mit dem Krebsse fort schwimme. Sed sine omni effectû sæpe tentatum est.



TABVLA LXXXI.

DE

FEBRE QVARTANA.

I. DEFINITIO.

Febris quartana est species febrium intermittentium, quarto quo-

quouis die cum frigore & succedente aestu inuadens: quo labore febrili principium vitale materiam aliquam noxiam, circa viscus aliquod hypochondriacum harentem, corrigere, remouere, & hac ratione visceris læsionem auertere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris quartana est vel *simplex*, vel *continua*.
2. De *simplex* hac tabula, de *continua* autem infra agitur.

III. SIGNA.

1. Quartana legitima præ aliis intermittentibus typum suum exactissime seruat: vix enim alio tempore, quam post meridiem, circa horam quartam vel quintam inuadit.
2. *Frigus* quod format, ad horrorem quidem & artuum succussionem non accedit, est tamen satis sensibile, & ad duas circiter horas extenditur.
3. Præcedit & concurrit *languor* corporis & animi.
4. *Vomitus* non facile exoritur, nisi febris a manifesta ciborum inconuenientium ingestione initium sumserit.
5. Neque *diarrhæe* ordinariæ eueniunt, notabiliter potius aluus non solum die febrili, verum etiam reliquis vacuis constricta obseruatur.
6. *Calor*, qui frigori lento gressu succedit, non tam vehementia, quam odiosa siccitate, immo mordaci ariditate, patienti molestus est: vnde etiam vix vquam sudor succedere solet.
7. *Æstus* hic ad quatuor vel sex horas, raro diutius sese extendit, nisi forte primo & secundo paroxysmo.
8. Durante ita calore vertiginosa capitis perturbatio cum dolore obtuso, non exquisite lancinatorio, adfligit.
9. Superato paroxysmo redit quidem æger ad mediocrem orthostadiam, & succedentibus vacuis diebus in eodem statu perseverat; manet autem aliquod animi fastidium & sensus profundus contusionis & contractionis, quem dolorem Medici vocant *osteocopon*.
10. Quarto quouis die recurrit paroxysmus, & quidem statis præcisè horis, raro postponendo, rarius anticipando:

quam primum enim anticipat, iusta statim *continuitatis* suspicio fouenda est.

IV. SVBIECTA.

1. Quartana præcipue occupat ætatem consistentem, & proVectiorem.
2. Quando autem ab auctoribus, e. g. *Sydenhamo* & *Sennerto*, traditur, quod infantilis etiam ætas hac febre occupetur, hoc epidemicae indoli tribuendum est.
3. Temperamentum melancholicum præ omnibus reliquis huic morbo succumbit.
4. In primis tales personæ eundem incurrunt, quæ sub vitæ genere otioso, sedentario & speculabundo, frequentes animi mœrores & sollicitudines experiuntur.

V. CAVSSAE.

1. Causa *materialis* huius febris est materia viscida, tenax, plerumque in visceribus hypochondriacis, cum *vena porta* connexionem habentibus, stabulans, e. g. in hepate, liene, glandulis melsaraicis: rarius in primis viis.
2. Causam circa viscera hypochondriaca hædere, satis confirmat nexus reciprocus, quem hæc febris cum ictero, cachexia, tumoribus œdematosis & asciticis fouet: modo enim quartana his, modo hæc quartanæ succedunt: modo complicantur. *Conf. prognosis. num. 9.*
3. Causa *efficiens* est principium vitale, quod motibus talibus lentis lentescens stagnantem materiam resolueret intendit, ad obstructions, scirrhus & salino-acres corruptions in dictis visceribus præcauendas.
4. Causæ *occasionales* & procatarticae sunt:
 - 1) Febris tertiana vel quotidiana, male curata.
 - 2) Obstructions euacuationum sanguinearum consuetarum, e. g. mensium, hæmorrhoidum.
 - 3) Diæta cruda cum potu parciore.
 - 4) Refrigeratio abdominis, præcipue post pastum, aëre humido existente.
 - 5) Tempus autumnale: vnde quartanæ dicuntur febres autumnales.

6) Vitæ

- 6) Vitæ genus sedentarium, otiosum, speculabundum præcipue cum mobili permutatum.
- 7) Abusus *acidorum*, spissitudinem humorum inducens.
- 8) Abusus *spirituosorum*, qui orgasticam sanguinis commotionem excitat.

VI. PROGNOSIS.

1. Motus & decursus huius febris plane respondet quantitati & qualitati materiæ peccantis, quæ exiguæ quidem molis, difficillimæ tamen, ob tenacitatem, resolutionis est.
2. Hinc quartanæ ad plures hebdomades, immo menses sese extendunt, & ita sæpius contumaces reperiuntur, vt diu pro scandalo Medicorum habitæ sint.
3. Concurrente autem methodo conueniente, & agri patientia, hæc febris, licet sibi relicta pertinax sit, & non facile sponte sua ad tranquillitatem redeat, feliciter tamen profligatur.
4. Immo in iunioribus, labori alias adsuetis, intra duas interduim hebdomades soluitur.
5. Si autumno inuadit, non raro ad vernale tempus sese extendere obseruatur, bis die Bäume ausschlagen, vernalis autem quartana breuioris est periodi.
6. Quartana post annum decursum facile *recidiuam* sffit; immo si magis suppressa, quam legitima methodo superata fuit, tam longam periodum non exspectat, sed breui sæpius iterum recrudescit, cui rei facile ansam præbet repletio ingentis adperitus, post suppressionem per *chinam china* excitati.
7. Ad nullam excretionem notabilem hæc febris ordinarie inclinât, vt sub *signis* iam indicatum est.
8. Quando autem per vomitoria, purgantia fortiora, sudorifera, salia volatilia vrinosa, adstringentia, venæ sectionem, tractatur, facile in typum acutum, vel malum chronicoteron, febrem lentam, hæcticam, transmigrat.
9. Quartana legitime superata soluit prægressos hypochondriacos morbos; incongruenter autem suppressæ scirrhus hepatis, lienis, glandularum mesaraicarum, tumores

- res œdematosi, hydrops, hæctica, asthma siccum, tussis sicca, iſterus, præcipue niger, succedunt.
10. Tumores œdematosi, qui post quartanam sequuntur, longe contumaciores sunt illis, qui durante adhuc febre obueniunt. *Conf. cautela.*
11. Quæ de appetitu fortiore, seu potius voracitate, ante vel post paroxysmum vrgente, præcedente tabula diximus, valent etiam de febre quartana: nempe portendit talis edacitas febris plurimum diurnitatem.
12. *Scabies*, quæ interdum febre quartanæ superuenire solet, felicem febris decursum promittit: materia enim, ad peripheriam translata, in scabiem fœtidam mutatur, & sic vere consumitur; quando autem ad pedes deiicitur, tumores duriores, & non raro pessimi moris vlcerationes format.

JII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Collectio & infarctus materiæ tenacis & mucosæ circa viscera hypochondriaca hærens, *incidendus & resolendus* est. Faciunt hoc
- 1) *Salia digestiua*, e.g. arcan. duplicat. tartar. vitriolat. nitr. antimoniac. Item: sal. absinth. centaur. min. card. benedict. tartar. tartarifat. terra foliata tartari.
 - 2) *Gummata* temperata: ammoniac. sagapen. sarcocoll. (nayrrha iusto æstusior est.)
 - 3) *Radices* incidentes, e.g. rad. ari, gentian. rubr. pimpinell. alb. vincetox.
 - 4) *Herbæ* resoluentes amaræ, e.g. fumar. epithym. capill. vener. præcipue centaur. min. item absinth. adianth. alb. marrub.
 - 5) *Diluentia*, in primis etiam ob aluum adstrictam, & spissitudinem sanguinis.
1. Materia hac ratione resoluta, correctæ & præparata, per aluum & vrinam *euacuanda* est. Præstant hoc
- 2) *Laxantia*, præcipue melanagoga, cum *epicrasi* ordinata, coniunctis nempe modo commendatis resoluentibus radicibus & herbis, quæ vim diureticam exhibent.
- 2) Vel

- 2) Vel pilulæ ex gummi ammoniaco, extractis amaris, aloë, extract. hellebor. nigr. mercur. dulc. & resin. scammon.
 - 3) Item pilulæ tartareæ *Quercetani* vel *Sylvii*.
 - 4) Præ omnibus pilulæ *Stablii* vel *Beccheri*.
3. *Tonus viscerum* est restaurandus; cui scopo inferuiunt stomachica, tonica, neruina, præcipue essent. rad. gentian. rubr. centaur. min. card. benedict. absinthii composita, tinct. mart. aperitiu. *Ludouici*.
4. *Motus* denique, si re vera in consuetudinem degenerati obseruentur, sistendi sunt. Præstant hoc
- 1) Electuar. cort. chinæ chinæ 3. 4. horas ante paroxysmum exhibitum.
 - 2) Crocus martis antimoniatus tenerior *Stablii*, dicto tempore ad gran. 4. 5. propinatus: non prima dosi, sed sensim motus sistit, & hinc cortice Peruuiano securior est.
 - 3) Crocus martis cachecticus *Zwelferi*.
 - 4) Nonnunquam amuletica efficaciam præstant, e. g. adpensio araneorum, emplastra *epicarpia*, die *Puls. Plaster*, per *Helmontium* & *Kræpfelium* commendata.
- B. *Methodus specialis*.
1. Vna vel altera hora ante paroxysmum propinetur scrup. I. salis alicuius digestiui, præcipue tartar. vitriol. legitime parat. omisso, vel parca dosi adiecto, absorbente, ne materia magis lentescens reddatur.
 2. Durante æstu tranquilla continentia seruetur, & sufficiens, tepidus, dilutus potus porrigatur.
 3. *Primo die vacuo*
 - 1) *Mane* essent. alexipharm. cum essentia quadam stomachica remixta, exhibeatur, e. g.
 Recip. essent. pimpinell. alb.
 scordii ana drach. II.
 gentianæ rubræ vnc. semis. M. dof.
 XXX. gutt.
 - 2) Versus prandium repetatur.
 - 3) Post meridiem salia digestiua aliquoties exhibeantur.

4. *Altero die vacuo*

1) *Mane pilulæ Beccheri, Stablii, vel alia lenia laxantia, cum aperitiuis & stomachicis maritata, forma infusi propinentur, e. g. recip. rad. ari, gentian. rubr. p̄imp. alb. vincetox. ana vnc. semis, herb. centaur. min. absinth. fumar. ana manip. semis, fol. fennæ drach. VI. rhabarb. elect. vnc. semis, fibr. helleb. nigr. drach. II. tart. vitriolat. vnc. semis, incif. contuf. fiant speciēs, cum libr. I. aquæ feruentis bulliant, & remotis ab igne addantur vini libr. II. dof. vitr. I.*

2) *Circa vesperam pulueres digestiui bis exhibeantur.*

5. *Vbi tumores œdematosi, vel plane hydropici cum quartana iam complicati sunt, ibi pilulæ Stabliæ vel Beccherianæ singulis vacuis diebus propinari possunt.*

6. *Die febrili ante meridiem essent. alexipharmaca, versus autem & post meridiem vsque ad nouum insultum digestiua exhibeantur.*

7. *Hæc methodus per aliquot hebdomades continuetur, & si tum febris cedere recuset, & motus illi, remota materia, in habitum obfirmati adpareant, ægri autem diebus intercalaribus ad plenariam ephoriam, & ad legitimum vsum rerum *non-naturalium* peruenisse videantur, tum vera *sistentia* conceduntur: quo casu crocus martis antimoniatu tenuior, tempore superius indicato exhibitus, satis efficax apprehenditur.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Quartana vti in se lento progressu & motu leniore gaudet: ita commotiones artis impetuosiores ægerrime tolerat.*

2. *Hinc emetica & cathartica drastica, item alexipharmaca sub paroxysmis, præsertim cum regimine sudorifero data, grauiora damna inducunt, & totum febris genium turbant.*


3. *Præcipue in plethoricis sudorifera talia vertiginosam capitis perturbationem, & alui adstrictionem pertinaciorrem relinquunt: vnde febris exasperatur, & æger facile in lentam ac hecticam febrem conicitur.*

4. *Idem*

4. Idem de *venesectione* iudicandum est; nocent, quidquid dicant antiqui, præcipue *Arabes*.
5. *Absorbentia*, siue solitarie siue cum aliis affatim ingesta, lentorem materiæ febrilis augent, ita vt facile typum quartanæ in lentum vel sub-continuum transmutent.
6. *Olea volatilia* aromatica, quæ ab aliquibus commendantur caute sunt adhibenda; in phlegmaticis quidem robustioribus, & minus raræ texturæ, *oleum piperis* aliquid præstat, in aliis autem subiectis hæctica facile inducitur.
7. Tensiones & pressiones in sinistro hypochondrio, quando concurrunt, adhibeatur methodus, quæ tabula de *infarctulienis* commendata est, speciatim essent. adianthi albi cum tinct. martis *Ludouici* remixta, & versus pastum exhibita, egregie conducit.
8. *Externe* in tali casu, vti & in doloribus præcordiorum, emplastrum saponatum *Barbette*, largiter camphoratum, locum habet.
9. Vix dicendum est, quam salutariter se commendent pilulæ *Beccheri* correctæ in tumoribus, huic feбри superuenientibus: præstant enim exempla, vbi febris quartana, tumore per vniuersum corpus non mediocriter stipata, intra tres hebdomades solis hisce pilulis & pulueribus digestiuis feliciter sublata est.
10. Quod ad diætam attinet, abstrahatur a cibis crudioribus, præcipue si voracitas accedat; ex contrario adhibeantur, lentorem humorum corrigentia, e.g. emibammata ex succo cochlear. sinap. raphan. mariu. nasturt. &c.
11. *Nuxvomica* penetrantissima amaritie gaudens ad tenaces collectiones & infarctus, auctore *Ludouici*, commendatur.
12. Dantur interdum aliæ adhuc species febrium intermittentium, e.g. quintana, septimana. Sic etiam notum fuit exemplum, in quo die solis & mercurii schemata febrilia tantum adparebant; cuius rei genuina causa hæc videbatur, quod profligata ante annum in hoc agro febris, quæ mercurii die initium sumserat, solis die altera vice recurrerat. Vnde post annum interuallum his-

ce duobus diebus motus tales aliquoties sese manifesta-
bant. Tractantur autem methodo eadem.

13. Conferantur etiam *cautela*, quæ præcedente tabula indi-
cata sunt.



TABVLA LXXXII.

DE

FEBRIBVS COMPOSITIS EX ACVTA
PERIODO.

I. DEFINITIO.

Febres compositæ ex *acuta* periodo sunt complexus vario-
rum motuum, e duabus acutis concurrentium, quibus
principium vitale & quantitatem sanguinis imminue-
re, & qualitatem eius corrigere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres mirum in modum inter se complicantur, & hæc
complicatio vniuersum sæpe negotium satis reddit in-
tricatum & ambiguum.
2. Duplicis autem in genere generis sunt febres ita compo-
sitæ :
 - 1) aliæ enim ex *continente* & *continua*, & sic ex duabus acu-
tis componuntur, quæ in regionibus nostris septen-
trionalibus satis sunt frequentes; licet vulgo parum
attendantur.
 - 2) Aliæ ex intermittente & continua coalescunt, & longe
rariores sunt compositis primi ordinis.
3. Compositæ ex duabus acutis triplicis iterum generis sunt:
 - 1) Modo enim febris *consiens* ad plethoram imminuen-
dam instituitur, in executione autem illius scopi im-
pedimenta qualitatis sanguinis, præcipue spissitudi-
nis obiciuntur, vt, tamquam ex accidenti, stasis in-
flammatoria, & ad hanc discutiendam, febris *continua*
simul introducatur. Huc pertinet antiquorum *syno-
chus*

chus putrida, ob putridam qualitatis corruptionem, quam veteres in sanguine agnoscebant, & vel ex vrina foetida ominabantur, ita denominata. Ad hunc censum etiam referri possunt febres anginodes, phrenitis, immo non raro etiam alia febres inflammatoriae, e. g. hepatitis.

- 2) Modo febris *continua* primas partes sortitur, cui deinde febris *continens* accedit, vti v. g. febris synocha simplex contagiosis malignis superuenire obseruatur.
- 3) Modo *continua* cum alia continua complicatur, e. g. febres biliosae cum aliis acutis, in primis contagiosis.
4. De compositis, ex acuta periodo prouenientibus, hac tabula agemus, de aliis autem compositis, quae ex continua & intermittente coalescunt, duabus sequentibus agetur.

III. SIGNA.

1. Quando *continua continenti* superuenit, tum sub initium morbi signa synochae offeruntur, nimirum febris sine horrore statim cum aestu inuadit, successu tamen morbi typus febris *continua* notabiliter intercedit, & sic haec complicatio schema mixtum exhibet, quod saepe confundit illos, qui hodie febrium concursus non animaduertunt.
2. Vbi autem *continens* ad *continuum* accedit, ibi etiam sub initium signa continua pura adsunt, deinde autem continentis indoles interludia sua profert; praecipue maiorem calorem, quam qui alteri febrī conuenit, excuscat.
3. Sic etiam se res habet, quando *continua* cum alia *continua* complicatur, e. g. febres biliosae cum petechizantibus, ibi enim utrarumque febrium signa sese manifestant.

IV. SVBIECTA.

1. Febres, ex acuta periodo compositae, illis hominibus eueniunt, qui non solum insigniter plethorici sunt, verum etiam vitio simul qualitatis sanguinis, praecipue vero illius spissitudine, laborant.
2. Hinc tales compositae febres tam frequenter in regionibus nostris septentrionalibus occurrunt; rarius autem

continentes simplices inueniuntur : vnde etiam tam raræ apud nos sunt *simplices crifes*, siue per hæmorrhagias, siue per criticos sudores, contingentes.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *materialis* harum febrium est vitium quantitatis & qualitatis sanguinis.
2. Causa *finalis* est duplex respectus seu intentio principii vitalis, nempe quantitatem sanguinis imminuere, & qualitatis aliquod vitium corrigere.
3. Sic v.g. in concursu continentis & continuæ quantitas sanguinis insigniter exagitur: sub hac exagitatione ob sanguinem spissum facile exoritur stasis inflammatoria: hæc stasis discutienda alios deinde motus expolcit, quam qui in febre *continente* obseruantur.
4. Eadem ratio est, vbi natura miasma aliquod periculosum, vel aliud qualitatis vitium per febrem *continuum* expellere intendit, sub hoc autem labore abundantiam sanguinis non exigua impedimenta adferre experitur, ibi mirum non est, si motus febris *continentis*, euacuationem sanguinis respicientes, immo ipsæ hæmorrhagiæ, concurrant.

VI. PROGNOISIS.

1. Si quidquam aliud, certe complicatio duarum acutarum salutarem febrium decursum sufflammare potest.
2. Motus enim, qui in hisce febribus occurrunt, sibi inuicem plane sunt contrarii, typus est inconstans, es wechselt so oft in einem Tage mit dem Patienten; & sic neutri febrium satis fieri potest.
3. Ita v.g. fortior impulsus sanguinis progressiuus, conquassatorius, resolutorius, qui in febre *continente* necessarius est, aduersatur motibus placidis secretoriis & excretoriis, febre *continue* propriis & necessariis.
4. Item quando in febre continente humores die critico in vnum locum ad intimiores nobiles partes, præcipue ad caput, alibi ad vterum, alibi ad alia viscera abdominis, coaceruantur, hæc quidem directio hæmorrhagiæ formula

mulatur, quoniam autem hac ratione miasmata maligna ad has partes simul compelluntur, lethalis saepe ventus introducitur.


VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Venæ sectio vel instituat, vel prætermittatur, secundum indicationes, infra sub *cautelis* legendas.
2. Vbiq̄ue vtilissima est artificialis promotio & conseruatio liberi motus humorum ad peripheriam, citra tamen sanguinis exagitationem, vt nempe diapnoica solum excretio obtineatur.
3. Præcipue facta venæ sectione hæc methodus diapnoico-diaphoretica summæ necessitatis est, & versus dies *criticos* paullo exactior esse debet, ne illo tempore congestio & conatus hæmorrhœos ad caput contingat, & ægrum iugulet.
4. Præter ea hæc febres tractantur, vti aliæ acutæ, nempe per temperatam essentiam alexipharmacam, & pulueres nitroso-absorbentes cum diaphoretico fixo remixtos; interpositis ante meridiem potionibus diapnoicis, & post meridiem emulsionibus ad gratum acorem iucundis.
5. Quoniam autem constantem typum non seruant hæc febres, Medici primarium officium erit, quasuis per diem mutationes sollicitè obseruare, & modo dicta medicamenta iisdem prudenter substituere.
6. Aluus per totum morbi decursum aperta seruetur clysteribus, tertio semper die repetendis.
7. Continentia tranquilla tam corpore quam animo vbiq̄ue iniungatur, cum potu sufficiente & satis diluto.

VIII. CAVELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ

1. Licet rationi ad modum consentaneum sit, in hisce compositis acutis abundantiam sanguinis per proximam viam, nempe per venæ sectionem, ventilare, & sic toti illi contentioni satis facere; certa tamen regula, vbi sanguinis educatione absolute opus sit, non potest constitui; excepto solo casu eminentis ad modum plethoræ. Hinc totum negotium iudicio Medici relinquendum est.

2. Quando autem venæ sectionis necessitas iudicata fuit, necessarium est, vt illa in principio principii, & quidem paullulum largiter, instituat, ac deinde versus ipsas crises vena frontis aut raninarum secetur, vel per Ægyptiacam narium scarificationem seu incisionem scopo proposito consulatur.
3. Remedia calida & validiora vti in aliis acutis, ita tanto magis in hisce compositis, abesse debent, quia vel solum intemperans regimen eximias in iisdem turbas concitare obseruatur.
4. Obseruare contingit in praxi clinicâ, quod interdum præcedant congestiones rheumatico-arturiticæ cum notabili tumore circa artus manuum & pedum. Has congestiones excipit hæmorrhagia narium facis larga & per aliquot dies continuans sub commotionibus febrilibus *continentis* schema exhibentibus. Tandem succedit febris *continua* typica. Has anomalicas complicationes & hunc metaschematisinum motuum nemo prudenter tractabit, nisi qui rationalem naturæ intentionem prudenter æstimare, & finem horum motuum considerare, didicit.



TABVLA LXXXIII.

DE

FEBRE TERTIANA CONTINVA.

I. DEFINITIO.

Febris tertiana continua est species februm compositarum, inuoluens paroxysmos, tertianæ intermittenti similes, cum calore nihil intermittente, sed frequenter ita excedente, vt ab vno paroxysmo ad alterum sese extendat.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres ex *intermittente* & *acuta* compositæ distinguendæ sunt

sunt ab illis, quæ ex *duabus acutis* complicatæ obueniunt, de quibus præcedente tabula iam actum est.

2. Tres autem species illarum compositarum obseruantur, quæ sub schemate intermittentis & acutæ coalescunt:
 - 1) *Febris quotidiana continua*, quæ, quoniam cum febre catarthali benigna prorsus quadrat, immo vnam eandemque speciem constituit, superius iam pertractata est. *Vid. tab. LXVII.*
 - 2) *Tertiana continua*, quam hæc tabula exhibet, & veterum tertianam *extensam* includit.
 - 3) *Quartana continua*, quæ sequente tabula explicabitur.

III. SIGNA.

1. *Tertiana continua* exhibet paroxysmum, tertianæ intermittenti similem, nempe cum *frigore*, vel tamen *horrore*. Singuli paroxysmi plurimum recurrunt.
2. Huic succedit *æstus*, per initia satis vehemens, deinde sensim languescens, semper tamen vsque ad succedentem nouum paroxysmum naturalem gradum superans.
3. *Adpetitus* maxime iacet.
4. *Vires* deficiunt.
5. *Somnus* est inquietus.
6. *Cephalalgia* est continua.
7. *Sitis* cum siccitate oris perpetuo vrget.
8. *Pulsus* velocitate iugiter perennat.

IV. SVBIECTA.

1. Tertianam continuam incurrunt, quibus tertiana simplex peruersis medicationibus, vel malo regimine, suppressa fuit.
2. Sigillatim quibus calida alexipharmaca versus paroxysmum propinata fuerunt, vel sub æstu per refrigerium sudoris successus fuerit retropulsus. Item quibus in tertiana simplice vena secatur.
3. Eueniunt etiam illis, quibus aliæ excretiones repente suppressæ sunt, e.g. post scabiem retropulsam, tumores ad interiora repressos.

V. CAUSÆ.

1. Causa *materialis* est miasma tenuius, malignum, indolis fermentescentis.
2. Delitescit autem prava huius materiæ indoles, & tegitur quasi sub schemate tertianæ intermittentis.
3. Natura enim, tamquam causa *efficiens*, crassiore saburra in primis viis prægrauata, occasione huius adgreditur causam manifestius vrgentem, & hac ratione febrem intermittentis & crassioris indolis format.
4. Causas *occasionales* & *procatarcticas* præcedente membro iam nominauimus, quibus accensendus adhuc est aër fermentescentibus talibus particulis grauidus. *Vid. differentsia tab. de febris biliosis.*

VI. PROGNOSIS.

1. Vti quotidiana, sic etiam tertiana continua epidemica quadam larua interdum prouenit, & tum indolem suam, per se satis deteriorem, magis adhuc manifestat, & exanthematibus non raro stipata obseruatur.
2. Quando mitius tractatur, transit facile in febrem tertianam intermittentem, & hac ratione legitimæ methodo cedere obseruatur; nonnumquam autem in hecticam ex hac tertiana simplice transmigrat, præcipue si nimis absorbentibus tractata fuit.
3. Vbi autem præpostera calida medicatio & peruersum regimen accedit; ibi non raro in acutam impetuosam, præcipue inflammatoriam febrem æger conicitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Versus paroxysmum exhibeatur puluis antifebrilis cum sale quodam digestiuo, ob saburram in primis viis, coniunctus, e.g.
 Recip. antimon. diaphoret.
 conch. acido tartari vel citri saturat.
 nitri depurat.
 tartar. vitriolat. ana dosis scrup. I
2. Sub æstu sufficiens potus iniungatur.
3. Remittente autem calore natura ad excretionem diapnoicas

cas


cas manu quasi ducatur, essentiam alexipharmacam paruis dosibus exhibendo, & intra quatuor vel quinque horas repetendo.

4. Versus nouum autem paroxysmi impetum pulueres temperantes aliquoties iterum propinentur.
5. Vbi vitus fortior, plethora insignis, & temperamentum sanguineum concurrunt, ibi acida laudabilem vsum præstant, e.g. spiritus vitrioli, clyssus antimonii sulphuratus, spiritus sulphuris per campanam, & in primis acidum citri.
6. In nimis feruentibus itaque paroxysmis iulapia, cum his acidis remixta, adhibeantur, & pulueres etiam temperantes aliquoties interponantur.
7. *Aluus* omni modo aperta seruetur, non vero stimuletur.
8. Quo magis autem impetus senescit, eo commodius lenes laxationes ante dictis subiunguntur, ita quidem, vt effectus laxantium in paroxysmi initia incidat.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. In his & reliquis compositis quam maxime caueatur, ne *lenior*, quem interdum hæc febres simulant, Medicum securum reddat, vel etiam confundat, aut malignam illam labem negligendo, respectum solum habeat ad crassam materiam, in tertiana simplice peccantem, & hanc vomitoriis, purgationibus, ac sudationibus adgrediatur.
2. *Ægerrime* enim compositæ febres eius modi commotiones vehementes tolerant, & non raro per easdem in plane malignas transmutantur.
3. Præstat itaque moderata methodo incedere; & licet tertiana tantum simplex, vel continua ex simplice recens nata subesse, & emesin efflagitare videatur, fortioribus tamen hisce commotionibus non opus est: nemo enim hominum in statu tali facile moritur, ex aduerso si error in diagnosi contingat, præpostera remediorum tentatio graua damna infert.
4. Ipsæ *diaphoreticæ* commotiones, si intempestiua & immoderata sint, in vehementem acutum typum præsentissime febrem coniiciunt.

5. *China china* vti in tertiana simplice *exiguum*, ita in continua plane nullum vsum obtinet.
6. Symptomata acerbiora *opio* non nisi fucantur, debito autem vfu nitrosorum, & iusto excretionum conuenientium successu in solidum mitescunt.
7. *Ad recidivas* hæ compositæ inclinant: hinc opus est, vt æger, superato licet morbo, medicamenta antifebrilia per aliquod adhuc tempus continuet, & sensim aëri adfuescat.



TABVLA LXXXIV.

DE

FEBRE QVARTANA CONTINVA.

I. DEFINITIO.

Febris quartana continua est species febrium compositarum, quartanarium quidem typum seruans, sed calorem suum ab vno paroxysmo vsque ad alterum extendens.

II. DIFFERENTIA.

1. *Quartana continua* ab intermittente facile, & vel ipsa denominatione, discernenda est.
2. Licet ad hecticam febrem motibus suis lentis propius accedat, typus tamen quartanarius differentiam satis docet.

III. SIGNA.

1. Exhibet paroxysmum, quartanæ intermittenti similem, nempe paroxysmus quarto semper die cum pandiculationibus, horripilationibus plus vel minus stupatis recurrit; tam statas autem horas non seruat, vti quartana simplex, sed anticipare interdum obseruatur.
2. *Æstus* succedit satis aridus, molestior primo die, mitior sequentibus, paullulum tamen maior naturali calore, ita vt æger extra lectum diu subsistere non possit.
3. *Sitis* cum oris siccitate, & spumida pauca salina, continuo molesta est.

3. *Sitis*

4. *Apetitus* est valde languescens, frigida & falsa magis, quam alia desiderans.
5. Concutrit adfectio capitis magis temulenta, quam cephalalgia.
6. Ad somnum quidem valde propendent ægri, ob perennem autem corporis & animi inquietudinem, somnus ad modum est turbatus, & nihil reficiens.
7. *Vrina* ad hæcticorum urinam fere accedit: est enim rubicunda, crassa, & roseum deponit sedimentum.

IV. SVBIECTA.

1. Quartanam continuam incurrere solent homines, qui in quartana simplice ineptis medicationibus tractati sunt, e. g. calidis alexipharmacis, versus paroxysmum exhibitis, item adstringentibus.
2. De reliquo eadem subiecta occupat, quæ tabula de quartana legitima indicauimus, nempe personas
 - 1) consistentis & prouectioris ætatis,
 - 2) temperamenti melancholico-phlegmatici,
 - 3) otiosas, speculabundas, frequentibus animi mœroribus expositas.

V. CAUSSAE.

1. *Causa materialis* quartanæ continuæ conuenit quidem cum causâ quartanæ intermittens, est nempe materia viscida & tenax, in visceribus hypochondriacis stabulans, in continua tamen eminentior haud dubie subest gradus, ita vt infarctus simplex in obstipationes scirrhusas iam transiisse videatur.
2. *Causa efficiens* est principium vitale, quod motibus febrilibus lenissimis & lentis lentescentem talem materiam resolvere & vltiorem noxam, ab illa expectandam, præoccupare intendit.
3. *Causæ occasionales & procatarticae* conueniunt potissimum cum iis, quæ tabula de quartana simplice indicatæ sunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Quæ de *pertinacia* quartanæ intermittens tabula de quartana sub prognosi iam diximus, ea magis adhuc valent de quartana continua.

2. Ad hecticam indolem, vti proxime accedit, ita etiam in *veram* talem prorsus facile transit, præcipue, vbi adstringentibus tractatur; quo casu hydrops etiam introduci solet.
3. Quando autem per remedia calida, vel vomitoria, hi motus lentescentes excitantur, tum febres acutæ inducuntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Versus paroxysmum exhibeantur salia digestiua, e.g. tart. vitriolat. vel arcan. duplicat. cum exigua portione alicuius absorbentis, cum acido citri saturati.
2. Quam diu æstus vrget, continentia tranquilla commendetur, & sufficiens potus offeratur.
3. Sequentibus autem diebus, quibus calor paullulum remittere obseruatur, propinentur lenia laxantia, cum resoluentibus, aperitiuis, sic dictis hepaticis & splenicis, siue coniungendis, siue subordinandis, e. g.
 - 1) Ante meridiem bis exhibeatur essent. alexipharm. cum essent. centaur. minor. vel gentian. rubr. remixta.
 - 2) Post meridiem adhibeatur decoctum aliquod ex radice cichorii vel taraxaci, cum sero lactis paratum.
 - 3) Versus somnum propinetur dosis pilularum *Stablii* vel *Beccheri*.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Repetantur hic, quæ tabula præcedente, item de quartana simplice sub *cautelis* dicta sunt.
2. Quartanæ continuæ minime omnium tolerant commotiones artificiales per vomitoria, purgantia, diaphoretica, venæ sectiones.
3. Cauendum, ne per absorbentia, ad quæ & lapis *bezoar* referendus est, copiose adsumta collectio illa viscida & spissata adhuc magis augeatur.
4. Febris quando feliciter superata est, non statim ab omni medicatione ægrotus desistat, sed per aliquot adhuc septimanas digestiua & stomachico-tonica vrsurpet, alias motus facile recrudescunt.

TABVLA LXXXV.

DE

FFBRIBVS CORRVPPTIS,

ITEM DE

FEBRIBVS NONDVM TYPICIS.

I. DEFINITIO.

1. *Febris corrupta* est febrium tam intermittantium, quam acutarum confectarium, quod partim ex malo earum regimine, partim ex ineptis artificiis provenit, indolem ac typum ordinarium prorsus omittit, & ægros cum Medico ad modum diuexat.
2. *Febres nondum typicae* sunt motus febriles, modo auctiores, modo leniores, qui vero, licet pleraque symptomata febrilia habeant coniuncta, talem tamen scenam adhuc ludunt, vt cognitu sit difficile, num ad febres acutas, an vero ad intermittentes sint accessuræ.

II. DIFFERENTIA.

1. *Febris corrupta* differt a febribus tam *intermittentibus*, quam *continuis* ratione typi & symptomatum.
2. Ratione *euentus* differt ab aliis febribus in eo, quod curationem plurimum reddat difficilem & intricatam.
3. In se vero spectata hæc febris corrupta, est vel *acuta*, vel *intermittentis* indolis.
4. *Febres nondum typicae* differunt a *commotionibus febrilibus*, strictiore sensu sumtis: hæ enim satis quidem vehementer inuadunt, post vnum autem alterumue insultum iterum euanescent; illæ autem tam diu oberrant, donec tandem typum febris vel intermittentis, vel continuæ ordinariæ ostendant.
5. Differunt denique hæ febres nondum typicæ ab *ephemera plurium dierum*, vt *commotiones febriles*, ab *ephemera simplice*. In ephemeris enim omnia sunt acerbiora & motus febriles æquali tenore & ordine procedunt, donec

iusto suo termino notabilissimas excretiones exhibeant.

III. SIGNA.

1. *Febris corrupta:*

- 1) Motus febriles, ob typum antea turbatum, adeo confuse procedunt, ut ad certam febrium speciem referri amplius non possint.
- 2) Symptomata sunt acerbiora.
- 3) Vires insigniter imminutæ.
- 4) Animus valde abiectus est & morosus.

2. *Febrium nondum typicarum.*

1. Corripitur æger insultibus febrilibus, iam fortioribus, iam lenioribus, modo hoc, modo alio die, hodie cum horripilationibus, cras sine iisdem, post aliquot autem dies hæ anomalix ad typum ordinarium accedunt.
- 2) Hinc & symptomata febrilia primis diebus vix possunt dignosci, ad quam febrium classem sint referenda.

IV. SVBIECTA & CAVSSÆ.

1. *Febris corrupta.*

- 1) Febribus vel intermittentibus, vel continuis correpti, quando præposteris medicaminibus tractantur.
- 2) Vel quando ipsi ægroti regimen, febribus conueniens, non obseruant.

2. *Febrium nondum typicarum.*

- 1) Sunt omnia illa subiecta, quæ *tab. de febribus in genere* adducta sunt.
- 2) Præcipue vero sensibilia, hæsitantia & ad animi commotiones prona.

V. PROGNOISIS.

1. *Febris corrupta* maiori plurimum periculo exponit ægrotantes, quam ordinaria, quia omnia omnino symptomata magis vrgent.
2. Diutius quoque insistit, & difficilius curatur.
3. Grauius adhuc periculum portendit illa, quæ excretionibus, febri nondum corruptæ debitis, caruit.

4. Febris

4. Febris *acuta* corrupta, omnium periculosissima est, & conveniente licet modo iterum fuerit tractata, sæpissime tamen exitum nanciscitur lethalem.
5. Mitior sententia ferenda de *intermittentibus* corruptis, quæ curationem sæpius admittunt.
6. *Febres nondum typicæ* facile grauiiores inferunt morbos, si circumspècta cura non tractantur.

VI. METHODVS MEDENDI CVM CAUTELIS.

A. In febris corruptis.

1. Nihil hic melius est, quam veram methodum antifebrilem denuo amplecti, & cum tranquillitate ac patientia eandem profèqui: in talibus enim corruptis febribus solidum leuamen tam promte non succedit; quæ *prognosis* omni modo obseruanda est.
2. Per initia præstat puluerulenta absorbentia & diaphoretica magis exhibere, quam essentiam alexipharmacam.
3. Quando autem sensibilis in melius conuersio obseruatur, cum præstat essentiam illam sæpius, sed non auctis, puluerulenta autem rarius, propinare.
4. Si *alvus* non bene succedit, extractum panchymagog. *Crolii* paucioribus granis, vel pilulæ *Beccheri* aut *Stahlii* adhibeantur; quæ laxantia in corruptis & suppressis *intermittentibus* præcipue conducunt, & non raro paroxysmum reuocant, vt deinde ex fundamento curari possit.
5. *Absorbentia* autem acido citri saturata, aliis nudis hic in primis sunt præferenda: magis enim diuresin & diaphoresin promouent.
6. Sic etiam essentia alexipharmaca cum multa essentia scordii remiscenda est. Vulgaris essentia *Stahlii* hæc est:

Recip. radic. imperator.

helen.

angelic. ana vnc. semis.

pimpin. alb.

vincetox. ana vnc. I.

aliquando addit radic. valerian.

carlin.

rarius radic. recent. fraxinell.

Incis. contus. f. l. a. essentia.

7. Hanc essentiam temperat cum essent. scordii, ita ut modo partibus æqualibus, modo duabus scordii illam permisceat.
8. Quoniam autem radices imperat. angelic. & helen. calidiores sunt, vulgari huic essentiæ sæpius præfert, & illius loco exhibet essentiam pimpin. alb. cum essentia scordii æquali pondere remixtam.

B. Infebribus nondum typicis.

1. In recte administrandis talibus malis, quorum genius nondum satis perspectus est, præstat ab omnibus commotionibus abstinere, nempe a vomitoriis, purgantibus, sudoriferis fortioribus, venæ sectione: pessimum enim est conamen, genus morbi non respicere, & tamen remedia generosiora, sine quocumque specioso prætextu, arripere.
2. Tutissimum est hic agere, quod generatim in omnibus aliis febribus locum habet, nempe materiam corrigere & lenibus excretionibus eminus quasi viam ostendere.
3. Adhibeantur itaque primis diebus pulveres nitroso-temperantes cum antimoniali fixo coniuncti, & his leniter diaphnoica interponantur, e.g. in iunioribus aquæ diaphnoicæ cum absorbente quodam & antimonio diaphoretico remixtæ, item in adultioribus essent. alexipharm. temperatissima, exiguis dosibus propinanda.
4. Hæc methodus valet, etiam, vbi in primis viis materia acrior & cholericodes præsto esse coniicitur.
5. Idem agere conuenit, quando calor non plane nimius, sed potius clandestinus, cum lassitudine & ingente virium deiectione sese manifestat.
6. Quando autem febris qualemcumque typum seruat, Medicus illum sollicite animaduertere debet, observando, quo diei vel noctis tempore peius se habere sentiat ægrotus.
7. Ante omnia inquirat Medicus in principium febris, num cum frigore, eoque maiore vel minore, num mane, circa ortum solis, vel vesperi inuasit.
8. Hac ratione certior factus tractat morbum, ut moris est,
nem-

nempe versus illud tempus, quo exacerbatio sentitur, exhibet nitroso-temperantia, cum antimoniali fixo remixta, & his insistit, vel lenissima diapnoica liquida interponit.

9. Mitescente autem paroxysmi impetu, lenia alexipharmaca propinat, & vsque ad nouum fere paroxysmum, refractis dosibus, eadem porrigit; quo noui insultus tempore temperantia absorbentia & antimonialia fixa repetit.
10. Ceterum de *corruptis* febribus adhuc adiicimus, quod res consideratu digna sit, eius modi aleam, periculo sæpius plenam, in se suscipere. Hinc necesse est, ut circumspecta prognosi ante nos præmuniamus, quam therapiam adgredimur.



TABVLA LXXXVI.

DE

O E D E M A T E.

I. DEFINITIO.

Oedema est pallidus & indolens partis alicuius tumor, ab impedito libero progressu seroso-lymphalis humoris coortus. Deriuatur ab *οἰδήμ*, tumeo.

II. DIFFERENTIA.

1. Oedema differt ab *ascite*, *anasarca* & *leucophlegmatia*.

1) *Gradu* tumoris: oedemate enim tantum artus, in ascite autem non solum artus, sed & abdomen, in anasarca & leucophlegmatia vniuersum corpus tumore adficitur.

2) *Ratione causarum*: hydropici adfectus sedem primariæ causæ circa viscera formant, oedema autem simplex a causis magis externis & aduentitiis dependet: licet enim materialis causæ hydropis etiam oedema, quod in hydrope inseparabile existit, proferat, immo sim-

plex, particulare œdema, cito & copiose se diffundens, hydropem ipsum inducere possit, est tamen ingens differentia causlæ antecedentis, concurrentis & succedentis.

2. Oedema facile potest discerni a *cachexia*, quamvis enim œdema cachexiæ auctioris passim vestigia legat, manet tamen insignis differentia inter œdema simplex, particulare, quod artus tantum occupat, & inter symptoma illud œdematosum cachecticum, totius corporis depravationem inuoluens.
3. Differentiam œdematis a *podagrico* tumore sequentia docent:
 - 1) Sensus dolens, in œdemate nullus, in podagra autem fatis sensibilis est, & molestus.
 - 2) Status antecedens: tumores enim podagrivi obveniunt illis, qui motibus hæmorrhoidalibus obnoxii fuerunt, vti & seminis post varia rheumatica pathemata, quæ omnia ab œdemate simplici, insensibili, aliena sunt. Hæc differentia ad prognosin & therapiam multum valet.

III. SIGNA.

1. *Tumor* fatis est notabilis & pallidus.
2. Digito quando comprimitur, subsidet & scrobiculum in loco compresso format, qui sensim iterum explanatur.
3. Occupat hic tumor extremos potissimum artus, præcipue pedes,
4. in illo videlicet casu, vbi solus, simplex, & sine alio morbo existit.
5. Quando autem hydropis consecutio & symptoma est, vel cachexiæ superuenit, tum latius in corpus se diffundit.
6. In œdemate simplice nullus *dolor* præsto est, vti sub *differentia* iam obseruauimus, immo citra omnem sensum euenit; in malo autem præualecente tensio notabilis cum grauitate interdum sentitur.
7. Tactu *frigidus* est tumor hic œdematosus, licet æger nullum ibi frigus molestum sentiat.

3. *Alnus* vaga, nempe modo siccior, modo laxior obseruatur.
9. *Vrina* vel constanter pallida, vel obsoleto rubore imbuta & crassa, medio quasi colore inter aurantium & cereuisiarium dilutum; vtriusque autem quantitate parcissima.
10. Si ad summum peruenerit, nitet præ nimio infarctu cutis, & tunc quidem ad minimum tumor hinc inde rufescit, ita vt tenerissima etiam vascula sanguinea in conspectum prodeant.

IV. SVBIECTA

Tumoribus œdematosis præ aliis obnoxii sunt:

1. Homines phlegmatici habitus, sexus vtriusque.
2. Viri post hæmorrhoidum, & feminae post mensium suppressionem.
3. Ætas paullo annosior.
4. Feminae grauidæ, præcipue vltimo tempore gestationis.
5. Vterque sexus, quando diu & profunde crura aquæ frigidæ immergit, præcipue femininus, sub fluxu mensium in lauandis linteamentis occupatus.
6. Vulneratos etiam œdemata facile incurrere, si vulnera refrigerantibus tractantur, *Paracelsus* non friuole adnotauit.
7. Incidunt etiam in tumores eius modi seroso lymphales, qui tumoribus calidis, phlegmone, immo erysipelate, non nimium feruido, adficiuntur; per discutientia autem, valde efficacia, e.g. per spiritum vini camphoratum, subtiliores sanguineas partes velociter repellunt.
8. Specialiter *febricitantibus* apostasi quadam, nunc ad vtrumque, nunc ad alterutrum pedem œdema tale diffunditur; quod, licet a ceteris rubro perpetuo, & calore paroxyzante differat, molle tamen est, &, discussis volatilibus sanguineis particulis, sinceram œdematis faciem induit.
9. Specialissime tales tumores illis succedere obseruantur, qui in acutis febribus salia volatilia, e.g. spiritum cornu cerui, copiose ingerunt.

10. Dantur & exempla, in quibus œdema oboritur post nimis diuturnam tensoriam femorum pressionem, intercepto nempe libero fluxu humorum ex inferioribus partibus crurum; quale quid facile ab equitatione, in primis super equo lati dorfi, contingit.
11. Denique œdemata etiam incurrunt, quibus scabies ineptis remediis repellitur.

V. CAUSSAE.

1. Causa *continens* & *proxima* est mucida humorum spissitudo, & motus tonici relaxatio.
2. Non semper autem argui potest simplex vitium humorum, sed subsunt interdum *actiua* pertinaces congestiones, præcipue in œdemate diuturno & habituali, cuius indolis maxime omnium sunt tumores, post febres, per apostasin formati, ubi, secundum antiquorum sanum sensum, materia peccans ex partibus nobilioribus ad ignobiliores proicitur.
3. Immo causam antea passiuam non raro excipere solet actiua, nempe ob consuetudinem & frequentem œdematis discussionem.
4. Causas *occasionales*, & procatarticas, quæ vel vitium humorum inducere, vel motum tonicum relaxare possunt, sub descriptione *subiectorum* iam indicauimus.

VI. PROGNOISIS.

1. Omne œdema pertinax est, & quo plures causæ in illo conspirant, eo contumacius deprehenditur.
2. Melioris adhuc spei & restitutionis sunt, quæ œdemata a pure externis causis, e.g. contusionibus, refrigerationibus humidis &c. originem ducunt.
3. Sic etiam œdema post scabiem, non ita pridem repulsam, inductum, conueniente methodo facilius adhuc dissipatur.
4. Quo magis ab absctico tumore adhuc distat, eo minus periculum inuoluit, & contra.
5. Artus œdematosi, sic extra lectum non perpetuo, nec insigniter frigeant, neque in lecto constanter & notabiliter aestuant, spem faciunt discussionis. 6.

6. Insignes tales tumores, quando non *discutiuntur*, sed ad interiora viscera *repelluntur*, varia fontica mala eueniunt, nempe inflationes abdominis & præcordiorum, immo non raro verus hydrops introducitur.
7. Oedema in summo gradu constitutum, nitente scilicet & rubescente cute, adfligente etiam intimiore sensu ardoris, si febris acuta vel hæctica exacerbata concurrit, corruptionem gangrænodem, sphacelosam, mortem, minatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. Mucida humorum spissitudo est *corrigenda*; in quem finem laudantur:
- 1) *Salia* media & alcalica fixa, e.g. tartarus vitriolat. arcan. duplicat. nitr. antimoniât. tartar. tartarifat. arcan. tartari, sal. absinth. centaur. minor. card. benedict. genistæ, ononid.
 - 2) *Gummi-resina*, e.g. ammoniaci, galbani, hederæ, iuniperi, myrrhæ, succini.
 - 3) *Radices* alexipharmaco - diureticiæ, præcipue rad. pimpinell. alb. quæ valde temperata, & tamen tenuium partium est ad penetrandum, item rad. vincetox. enul. imperator. irid. Florent. ari, gentian. rubr. angelic. petasitid. bardan. cichor. tarax.
 - 4) *Herba* antiscorbuticæ & amaricantes, e.g. cochlear. trifol. fibrin. fumar. centaur. min. item marrub. alb. capill. vener. cuscut. hyssop. epithym.
 - 5) *Ligna* antiuenerica, e.g. sassafars fantali, iuniperi.
 - 6) *Composita*, tinctur. antimonii tartarifatæ, cum spiritu lumbricorum volatili remixta, tinctur. salis tartari, essent. succin. pimpinell. alb.
 - 7) *Aromatica* peregrina & nostratia, e.g. zingiber, piper, costus, cardamom. caryophyll. cinnamom. sem. ammios, anisi, cumini, coriandri, fœniculi, anethi, baccæ iuniperi, lauri, cort. citri, & in potu, aurantiorum. Item raphanacea, alliacea, cepæ, squilla, dracunculus, esculentus, asparagus, endiuia, petroselinum tam vul-

gare,quam Macedonicum, piperitis, nasturtia,thlaspi.

2. Correcta materia est euacuanda, siue per laxantia cum epicrasi, siue per pilulas *Beccheri*, stimulo quodam adiutas, siue in robustioribus per paululum fortiora phlegmagoga.
3. *Motus* tonicus est roborandus:
 - 1) *Interne* per martialia, e.g. tinctur. mart. tartarifac. *Ludovici* cum essentia adianthi albi remixtam, item per tinct. vitrioli martis *Zwelferi*, crocum martis antimoniac. aperitiu. *Stahlii* &c.
 - 2) *Externe* per frictiones, motum corporis ambulatorium, continuatum, ligaturam cum fascia ampla, per decocta vel infusa, halius forma adhibenda, vel etiam proxime applicanda, e.g. recip. chelidon. mai. raphan. recent. sedi vermicularis murarii, fol. bardanae, petasitid. fiat decoctum cum vino, utpote roborandi virtute praedito. Laudant etiam oleum bufonum. De ligatura autem legantur cautela, quae *tabula chirurgica* de tumoribus oedematosi num. 29. tradita sunt.
4. Ulcerationes oedematis, quando eueniunt, sunt consolidandae; quod per liquamen myrrhae obtinetur.

B. *Methodus specialis.*

1. Pro gradu & diurnitate morbi per aliquod tempus adhibeantur resoluentia, attenuantia, aperitiua & digestiua, sub methodo generali denominata.
2. Deinde subiungantur laxantia, ad euacuandos praeparatos humores, & eliminandas sordes primarum viarum, e.g. Recip. extract. panchymagog. *Crollii* drach. I
hellebori nigri scrup. I.
Mercur. dulc. drach. semis.
Resin. ialapp. gr. XV.
Ol. anisi gutt. VI. M. f. pilulae, de quibus quarto semper die grana XV - XX. propinentur, intermediis autem diebus pilulae *Beccheri* vel *Stahlii* adhibeantur.

3. Vel

3. Vel mox sub initium lenia laxantia cum resolventibus possunt coniungi, & ita in forma decocti aut infusi applicari.
4. His satis peractis tonica adhibeantur, & externa simul in subsidium vocentur. *Vide cautelas.*
5. Vbi œdema post febres remansit, laxantia amara, condita aromatica, per aliquod tempus continuentur, ut vel febris reuocetur, vel materia relicta mature tollatur, coniuncto externorum usu.
6. Si mensium vel hæmorrhoidum vitia in caussis sunt, & tumor adhuc vacillans existit, ita ut modo redeat, modo dilitescat, generali medicationi commode venæ sectio in pede præmittitur, illo videlicet tempore, quo tumor delitescit, & vasa conspicua sunt.


VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Pro felice œdematis tractatione bene obseruetur, quod *discussio* placida & paulatim facta longe differat a *repulsione*, quæ breui tempore vno impetu peragitur.
2. Repulsio hæc subitanea, teste quotidiana experientia, asthmata, hydropem, acutos inflammatorios, suffocatiuos, spasticos, ileodes, aliosque anomalos adfectus circa abdomen adfert, hinc quam maxime caueatur a repellentibus, refrigerantibus, humectantibus frigidis.
3. Oedema, quando ab internis causis ortum est, nisi interna medicatio præmittatur, externa remedia facile recessionem suscitant, & infelices illos effectus, de quibus modo diximus, producant. *Conf. tabul. chirurg. de tumoribus œdematosis.*
4. Valet hoc præcipue in illis casibus, vbi œdemata a mensium vel hæmorrhoidum suppressione nata sunt; in quibus sane ad externa remedia prius non properandum est, quam hæc excretiones ad debitum successum redactæ sunt.
5. Omnium autem sensibilissimi obseruantur habituales tumores, & qui post febres *per apostasin* efformati sunt. Hi, neglecta sub initium legitima *discussione*, quando firmiorem

- orem sedem in membro aliquo iam constituerunt, deinde autem vel sponte euanescunt, vel arte dissipantur, pericula non exigua portendunt.
6. Vnde omnia adstringentia, repellentia, aquæ aluminosæ, fabrorum, balnea sulphurata, pinguis vnguinosa caustissime sunt adhibenda. *Saponata* autem mature adplicata, vsum habent.
 7. Vix etiam *emplastica*, præsertim acriora, possunt admitti: vel enim plane non, vel nimis tenaciter adhærent, & sic varia incommoda important.
 8. Vti humida frigida, & simplices inertes humectationes parti adfectæ grauius detrimentum adferunt, ita etiam nimis calida, neque interne, neque externe quadrant.
 9. *Thermarum* vsus cautelam postulat: qui vegeti & integris visceribus instructi sunt, continuato illarum vsu interdum a tumore liberantur; minus autem sanis, tenerioribus, præcipue feminis, thermæ tumoris incrementum, & non raro mortem adferunt.
 10. Nocent autem præcipue thermæ vitriolicæ & aluminosæ indolis, vti & aliæ aquæ minerales talis profapiæ, arte calefactæ, & pro lauacro adhiberi solitæ.
 11. *Acidularum* vsus cum primis in œdematibus inueteratis, non solum ambiguus est, sed & in hæmorrhoidariis certissime nocet.
 12. Aqua extinctionis *calcis viuæ*, limpida licet, in œdematosis tumoribus, hydropicis, in primis cum hectica complicatis, latius & largius adplicata, effectum edit quodam modo repellentem, & hinc non promiscue adhibenda est; rubores autem ardentes, qui huic tumori interdum superueniunt, certissime mitigat, neque in tali casu tam præsentis periculi ferax obseruatur. *Vid dissertat. de adstringentium cuncto vsu.*
 13. *Camphora* autem cutim quasi siccam & densam reddit, & varia hinc incommoda relinquit.
 14. Oedemata, qui nimio infarctu contingunt, & cutis rupturam minantur, vel etiam per minores papulas seri effusionem moliantur, non sunt toleranda: liber enim

exitus facile adfuefcit, cohibitus autem inaufam recessionem inducere valet; vnde interne per congrua laxantia, & externe per temperata balsamica, succurrendum est.

15. Vbi œdema, quod ab externis cauffis ortum fumfit, iam inveteratum est, & partis adfectæ *debilitas*, in ætate præfertim adultiore, concurrat, ibi præstat manum detrahere, quam vel in cassum laborare, vel fortioribus motibus repulforiis damna illa inferre, quæ num. 2. indicata sunt.
16. *Scarificatio* nullius vsus est, facile enim sphacelum inuitat, vel ad minimum vulnuscule, per illam inflicta, ægerri-me consolidantur.
17. In *ulceratione* œdematis, *theriaca* periculofum ardorem excitat, *emplastica* adfluxum augment, *essentia* myrrhæ iusto ardentior est, & sic *liquamen* tantum illius, *oleum per deliquium* dictum, tamquam temperatum balsamicum, commendatur.



TABVLA LXXXVII.

DE

C A C H E X I A.

I. DEFINITIO.

Cachexia est flaccida corporis constitutio, in externis maxime partibus conspicua, a mucido-feroso lymphæ vitio & motus tonici remissione, originem ducens. Derivatur a κακός, malus, & ἕξις habitus.

II. DIFFERENTIA.

Differt cachexia

1. ab hydrope vbi ante omnia præiudicata illa opinio remouenda est, quasi cachexia primus hydropis sit gradus: hunc enim errorem sequentia refutant;
1. Licet cachexia in hydropem aliquando transeat, immo proxima quasi ad illam dispositio sit, sæpe numero ta-

men citra talem hydropis consecutionem corpus obsidet.

- 2) Hydrops sæpe grauissimus, maxime in maribus, sine prægressa cachexia exoritur.
 - 3) Methodo medendi etiam non plane conueniunt, vti collatio vtrorumque adiectuum demonstrat.
2. Ab *anasarca*, & *leucophlegmatia*.
- 1) In *cachexia* inflatio corporis est flaccida, mollis, pendula, in *anasarca* autem tumor ita durus existit, vt etiam ad nitorem cutis sese extendere, & crepaturæ quasi metum incutere solear.
 - 2) Non est de essentia cachexiæ, in vlla corporis parte verum œdematosum tumorem formare, in *anasarca* autem hoc semper contingit.
3. Ab *ascite*.
- 1) *Ascites* inferiores tantum corporis partes occupat, cachexia autem totum corpus æqualiter obsidet.
 - 2) *Cachexia* a fluxibus sanguinis diuturnis passim originem ducit, *ascites* autem vix vmquam, nisi aliæ causæ, præcipue adstrictiones, concurrant.
4. Ab *œdemate*, vti præcedente tabula demonstratum est.
5. Ab *ictero*, qui, quamuis etiam totum corporis habitum occupet, non tamen illius substantiam profundius intrat, sed fibrosæ texturæ in superficie tantum adfricatur; cachexia autem ita intimius fibris sese insinuat, vt velut imbibitæ turgescant; Germani dicunt: aufgequollen und gedunsen aussehen:
6. A *cholorosi* virginum cachexia non aliter differt, quam genus a specie.
7. Quo modo cum *cacochymia* partim conueniat, partim ab illa differat, tabula de *cacochymia* indicauimus.
8. Cachexia est vel *simplex*, vel *composita*, quæ cum aliis morbis e.g. scorbuto, complicatur.

III. SIGNA.

1. Ad cachexiam dignoscendam nulla subest difficultas, nam signa eius externe sese manifestant.

2. Pri-

2. Primo enim per extremitates corporis, facie, manibus, pedibus, cruribus, solito magis turgescere conspiciuntur ægri.
3. Cedit calor naturalis, quem sensus quidem frigidulus excipit.
4. Concurrit languor quidam & grauitas per vniuersum corpus, præcipue sub adscensu altiorum locorum, cum fastidio ipsius animi ac torpore.
5. *Appetitus* est vagus & inæqualis, ab alimentis repentina euenit obsaturatio, immo fastidium.
6. Post cibos grauatiua pathemata ventriculi, tensiones & pressiones flatulentas persentiscunt, quæ omnia infidam designant concoctionem.
7. *Aluus* obseruatur inconstans: modo enim segnior, modo indigestorum ciborum reiectione, seu lienteria, conspicua est.
8. Ad somnum quidem inclinant ægri, ab illo autem non reficiuntur, sed magis delectantur; de qua re notabilis tunc relaxatio post eundem testatur.
9. *Urina* est pauca, modo cruda & subtrubida, modo limpida, semper tamen pallido aut subliuido colore conspicua.
10. *Pulsus* est languidior, quam statui naturali conuenit.
11. *Sanguis*, si quacumque occasione in conspectum venit, pallidus est, & sero abundat.
12. Persentiscunt etiam ægroti angustias præcordiorum, cum respiratione difficili, præsertim post corporis motionem.
13. Intercurrunt subinde volatici calores, capitis frequentes perturbationes, modo vertiginosæ, modo dolentes, in primis autem somnolentæ.
14. Tumor œdematodes, licet non semper adsit, non ita raro tamen coniungitur, sed minime alibi, quam in artubus, & præcipue pedibus, quibus stantibus adparet, iacentibus autem recedit.
15. Conspirat sensus duritiei, pressionis, constrictionis sub hypochondrio dextro, aliquando sinistro, aut sub umbilico introrsum.

16. *Abdomen* non semper quidem & constanter inflatum ac durum, aliquando tamen inæqualitate, tactu sentienda, intus obsessum est.
17. Hæc omnia quando ingrauescunt & diutius perfenerant, cachexia tandem transit in hydropem; de qua re sub *prognosi* plura dicemus.

IV. *SVBIECTA.*

1. Cachexia euenit corporis laxa textura instructis, quæ sunt temperamenti sanguineo phlegmatici.
2. Familiarior est hic adfectus sexui feminino, quam virili, tum ob molliorem texturam & crasin sanguinis minus *γλυσχροάν*, tum ob alias causas, infra adlegendas.
3. Specialiter autem illis feminis euenit, quæ intra mensium periodum adhuc constitutæ sunt; nam post finem mensium in ascitem magis, quam cachexiam prolabuntur.
4. Longe frequentius illæ feminæ cachexiam incurrunt, quæ defectu mensium, quam quæ excessu illorum laborant. & talis adfectus *chlorosis virginum* vocatur, quia illis præ maritatis proprius est.

V. *CAVSÆ.*

1. *Interna.*

- 1) Causa *antecedens* est commotio & restagnatio sanguinis abundantis circa viscera, præcipue venæ portæ, connexa.
- 2) Hæc sanguinis coaceruatio impedit lymphæ secretionem a sero, propius iam ad excretionem disponendo.
- 3) Hoc seri excrementitii cum lymphâ diuturnius commercium causam *magis propinquam* inducit, nempe pulposam, mucidam, lentam spissitudinem, instar tragacanthæ solutæ.
4. Quæ mucido-viscida humorum constitutio sensim obstruit glandulosa colatoria, tam per hepar, quam mesenterium, vt secretioni lymphæ a sero adhuc magis imparia euadant.
- 5) Vnde tandem spissitudo illa seroso-lymphalis per vniuersam massam sanguinis inualescens, circulationem seri & lymphæ difficilem reddit.

6) Hic

- 6) Hic stagnatorius infarctus, partim a vitio humorum, partim etiam a vitio viscerum colatoriorum, inductus, est causa *proxima* & *continens* cachexiæ, qui infarctus post ea cutim, tamquam latissime patens colatorium seroso-lymphaticum in leuem tumorem atollit, quam reliqua symptomata insequuntur.
2. *Externa, aduentitia, & occasionales:*
- 1) Habitatio in conclauibus humido-frigidis.
 - 2) Motuum corporis voluntariorum insignis neglectus, seu vita otiosa.
 - 3) Cum primis, si victus vappidus, mucescens, potus autem largior atquosus accedit; quæ vero diæta in laboriosis numquam cachexiam per se adfert; in his enim transpiratio & urinæ excretio abunde succedunt.
 - 4) Abusus potuum spirituosorum, sanguinem turgefaciendo, & sic infarctum eius per viscera inducendo.
 - 5) Vbi insuper spiritus ardentes, nimium ingurgitati, ipsa humorum coagulatione obstipationes tales producunt.
 - 6) Adstringentia tali tempore ingesta, quo sanguis in organo constitutus est, e. g. in febribus & hæmorrhagiis.
 - 7) Refrigerationes diurnæ.
 - 8) Scabiei repulsio intempestiua.
 - 9) Præcipue euacuationum sanguinearum consuetarum suppressio, maxime mensium: rarissime enim femina cachectica illibato mensium successu occurrit.
 - 10) Vbi primatum ducunt menses per malam diætam, aut alienarum rerum ingurgitationem, obstructi.
 - 11) Rarius aliæ potentiores, repentinæ mensium cohibitiones.
 - 12) Proflutiones sanguinis impetuosa non ita facile aut frequenter cachexiam inducunt, vt vulgo creditur, sed potius diurna largi profluuuii continuatio, ob subsidentiam vasorum, & difficilem sanguinis boni, propter crassam diætam, restaurationem.

- 13) Dispositio proxima hæmorrhoidalis, quæ in senioribus tacitis moliminibus sese exferit, vel fluxus adfectus, aut suppressus, vel inordinate & nimia copia procedens.
- 14) Motus arthritici, & in primis podagrici, variis artificii ad interiora repressi.
- 15) Salium volatilium abusus, qui febricitantes ad tumores cachecticos disponit.
- 16) Addephagia puerorum.

VI. PROGNOSIS.

1. *Plenaria* cachexia, seu vniuersalis crasseos humorum deprauatio, meatum infarctus, fibrillarum turgida inflatio, maxime omnium viscerum obstipatio, est sane malum magis pertinax, quam vt tam facile possit superari.
2. In *iunioribus* quidem, infra tricesimum annum adhuc constitutis, tam obstinatos mores & graues successus non exhibet, quin frequentius congruæ continuatæ medicationi cedat.
3. *Annosiores* autem, & magis senescentes quando plenaria cachexia corripuntur, priores frequenter hæcticam & hydropem, non tam anasarcam, quam ascitem: posteriores autem tantum hydropem incurrunt. Cachexia autem repulsa catarrhum suffocatum facile inducit.
4. Vbi cachectica tantum *dispositio* adest, quæ præcipue iunioribus virginibus, ob mensium retardationem, euenit, ibi non ita difficulter malum collitur; nisi intempestiua & aliena artificia, aut malum regimen aliquid damni inducant.
5. Sed quo citius, eo certius curatur; quo longius autem durat, eo longiorem ad minimum expolit medicationem.
6. *Chlorosis virginum*, quæ medium quasi locum inter *dispositionem* cachecticam, & cachexiam plenariam occupat, est malum plerumque chronicoterum, & sponte non facile

cile euanefcit, nisi vitæ generis insignis mutatio, præcipue transitus in statum matrimoniale, intercedat.

7. Molesta quidem est hæc *chlorosis*, tetro colore, animi & corporis languiore, cordis frequente palpitatione, sed non præsentis periculi; tandem autem flauum ad spectum, hepaticæ obstructionis indicem, exhibet, & in plenariam cachexiam, immo hecticam, transit.
8. Cachexia per multos sæpe annos contumaciter durat; & licet œdemata etiam in tibias & pedes passim se extendant, non tamen semper verus inde hydrops inducitur; quæ prognosis vulgarem illum errorem, quem sub *differentia num. 1.* iam deteximus, magis adhuc refutat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Cachexia eandem fere exposcit methodum, quam præcedente tabula de *œdemate* tradidimus, nempe humorum correctionem, viscerum refectionem, præparatorum humorum euacuationem, & denique toni restitutionem; variat autem pro causarum differentia, & hinc methodum specialem sequente ordine tradimus:

1. Ad mucido-tenaces humores incidendos, & eosdem ad excretionem præparandos, per octo vel quatuordecim dies exhibeantur resoluentia, & digestiua, pro temperamenti diuersitate eligenda ex illis, quæ præcedente tabula sub methodo generali iam denominata sunt.
2. His vel coniungantur, vel interponantur, aut subiungantur euacuantia, e.g. fiant noduli ex resoluentibus & laxantibus phlegmagogis: ialapp. fol. fenn. agaric. mechoacan. rad. ebuli, quæ mitior est, quam sambuc. addito his iusto tempore stimulo colocynthiaco.
3. Vbi malum a cohibitione febrium inductum est, ibi pilulæ amaræ, *Beccheriana*, *Stahlianæ*, & alexipharmacorum vsus cum dictis laxantibus coniungi possunt.
4. Quando autem subest mensium defectus, siue sponte siue arte inductus, tum post dicta corrigentia & aperientia adhibeantur emmenagoga & pediluuiâ, respiciendo ad illud tempus, quo menses expectandi sunt. *Conf. tabul. de mensium suppressione.*

5. Vbi

5. Vbi ab hæmorrhoidum suppressione cachexia inducta est, ibi, facta sufficiente correctione, hirudines ad intestinum rectum adplicentur, aut venæ sectio in pede, maxime tempore æquinoctiali, instituat
6. Si post nimias diuturnas hæmorrhagias hoc malum exortum est, in paroxysmo temperantia, analeptica, tonica, extra hunc autem corrigentia, sed lenissima propinentur, ne per calida sanguis organicus magis exciteur; quo autem casu ad euacuationem sanguinis per venæ sectionem respectum simul habere conuenit.
7. His omnibus decenter obseruatis, & peractis, *tonica* adhibeantur.
- 1) *Interne.*
- a) *Martialia*, e.g. tinct. martis tartarifata *Ludouici*, tinct. vitriol. martis *Zwelferi*, eiusdem crocus martis cachecticus, crocus martis antimoniatu tenuior *Stahlii*, limatura martis cum tartaro tartarifato.
- b) *Specifica hepatica*: agrimon. scolopendr. nard. celtic. flor. schoenanth. rad. curcum. lign. santalorum.
- 2) *Externe*: balnea calida sicca, frictions, in feminis, mensium defectu laborantibus, pediluua ex aromatico-neruinis, fol. asari, lapathi, tabaci, ari, flor. chamomill. *Conf. cautel.*
8. *Dieta* conueniens vbique obseruetur, abstinendo a cibis crassis, acidis, salsis, potu aqueo frigido, item spirituoso; cauendo etiam a refrigeratione pluuiosa, & nimis humidis: hæc enim tonum relaxant, fibras emolliunt, & serum inspissant; eligendo cibum mollem, mediocriter aromatizatum, embanunata sinapios, raphan. marin. & subinde haustum vini generosi, quod digestionem egregie promouet. Omnibus autem hisce præfertur *motus corporis* placidus & perennans, ceu præstantissimum remedium aperiens & tonicum.
9. Ne adfectus recrudescat, interdum lenia laxantia possunt adhiberi, e.g.

Recip.

Recip. extract. panchymag, *Crollis* scrup. II.
fumar.

centaur. min. ana scrup. semis.

gumm. ammoniac.

galban. ana scrup. I.

myrrh. scrup. semis.

mercur. dulc. gran. XV. M. f. pilulæ, dof. scrup.
I. singulis fere mensibus propinentur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Ventilationes* sanguinis, iusto tempore institutæ, præcipue in pedibus, egregie subleuant, & non raro spontaneas hæmorrhagias reuocant: modo caueatur, ne, dominante adhuc feri vappidi intemperie, sanguinis, vt talis, qualiscumque fiat iactura.
2. Euitetur error ille communis, qui omnes cachecticos pro pure phlegmaticis declarat, & hinc calida, aromatica, præcipue olea destillata, promiscue & audacter exhibenda censet: hæc enim in sanguineis, sanguinem exagitando, notabile damnum inferunt.
3. Speciatim *myrrha*, *sabina*, *crocus*, & alia drastica pellentia, quando feminis cachecticis extra instantium mensium tempus exhibentur, illas in ascitem coniiciunt: fauent enim magis expulsionis sanguinis, quam illius attenuationi.
4. *Euacuatio* humorum præparatorum commodissime fit per aluum; lenta tamen repentinæ præferenda est, nisi ex accidentalibus causis saburra primarum viarum *turgeat*: sic omnia ad naturæ ductum circumspecte instruenda sunt.
5. Vbi acres stases & oppilationes viscerum iam in suspicione sunt, ac motus febriles hectici conspirant, ibi tanto magis a crudioribus hydragogis commotionibus abstinendum, & res per lenia digestiua, aperientia, salia colligantia, essent. alexipharm. temperat. expedienda est.
6. Quando cachexia repulsæ scabiei succedit, ad specialem huius causæ correctionem respiciendum est. *Conf. tabul. de scabie.*

7. In chronicis morbis, a serosa colluue pendentibus, non ingens medicamentorum farrago, sed selectus & subordinata, tempestiua illorum applicatio commendatur.
8. In primis, neglecto tali selectu, *absorbentia* terrea ad cachexiam, qua talem, inepte propinantur: largiter enim ingesta, dyscrasiam seri reddunt tenaciorem; in ataxiis tamen primæ coctionis, per acidorum abusum inductis, sine noxa concedi possunt, licet tales casus rarius contingant.
9. *Fumaria* non tam in alia, quam forma extracti, aut infusi propinanda est; humoribus autem ipsis tantopere non succurrit, vt hinc effectus quasi supersticiosus, quem vulgus ipsi tribuit, exspectandus sit.
10. De ligno *guaiaco*, quod tantopere in cachexia laudatur, legi potest edit. nouiss. Flor. Francic. Sed non exhaurit negotium vniuersum.
11. *Semina diuretica* caute sunt adhibenda, præstant his salia digestiua enixa, tincturæ alcalinæ.
12. *Bafo*, extus & intus adhibitus, diuresin quidem mouet, sed nullius specialis efficacix obseruatur.
13. *Adstringentia, martialia, salia volatilia* vrinosa, prius non adhibenda sunt, quam post debitam & sufficientem humorum resolutionem, alias periculum inferunt, & speciatim copiosius propinata, hydropem accelerant.
14. Ad tumores pedum inter *topica* vñum habent acria aperientia, e.g.
 - 1) Hyeme cortex raphani nigri, plantis pedum suppositus.
 - 2) Æstate chelidonium maius, leuiter conuassatum ad plantas, immo taleolos vsque adplicatum.
 - 3) Sedum murarium.
 - 4) Decoctum tabaci.
 - 5) Spiritus lumbricorum terrestrium, qui tumores incipientes dilcutit, præcipue si malum a spiritus ardentis abusu proueniat.
15. *Camphora* autem cutim exsiccat, & reliqua topica impedit.
16. *Balnea sulphurea, aluminosa, adstrictoria*, cachexiam a interiora magis repellunt, & in stasin hydropicam de-
voluunt. Conf. *cantel. pr. accedentis tabula.*

TABVLA LXXXVIII.
DE
HYDROPE VNIVERSALI.

I. DEFINITIO.

Hydrops est tumor plus vel minus vniuersi corporis, pallidus, & tactui frigidus, a vitio lymphæ, & vasorum, illius repurgationi inferuentium, subnatus. Deriuatur ab ὕδωρ, aqua, & ὀπτομαι video.

II. DIFFERENTIA.

1. Hydrops quo modo a cachexia differat, præcedente tabula fufius indicatum est.

2. Est vel *vniuersalis* vel *particularis*.

1) *Vniuersalis* tres habet species:

a) *Anasarca*, quæ valde raro contingit, vniuersum corpus occupat, & licet easdem cum ascite causas communes habeat, hæc tamen intercedit diuersitas, quod aquæ in ascite non ita facile in superiores partes diffundi possint, quam diu æger erectum situm profequitur.

b) *Ascites*, seu *utricularis*, abdomen potissimum occupat, & frequentius quidem quam anasarca occurrit, respectu tamen aliorum morborum ad rariores etiam adfectus referri potest.

c) *Tympanites*, vbi abdomen instar tympani expansum est, ascite simul concurrente. Etiam hic morbus oppido raro contingit.

2) *Particularis*, ad quem sequentes species referuntur:

a) *Hydrocephalus*, seu hydrops capitis.

b) Hydrops *pectoris* & pericardii.

c) Hydrops *omentalis*, vbi serum omento, tamquam sacco, inclusum detinetur.

d) Hydrops *ouarii* muliebris.

e) *Hydatiæ*, seu vesiculæ aquosæ, in hepate, liene, aut alio quodam viscere obuinentes.

- f) Hydrops supremæ regionis *medullæ spinalis*, secundum *Wepferum*.
 g) *Hydrocele*, seu tumor scroti, humore aquoso formatus.
 3) Vniuersalem hæc, particularem autem sequens tabula exhibet.

III. SIGNA.

1. Generalia.

- 1) Tumor præternaturalis, pallidus, turgidus.
- 2) Tactu frigidus & mollis, vt cutis scrobiculum, per digitum impressum, aliquamdiu retineat, qui sensim iterum explanatur.
- 3) Lento gradu ordinarie hydropici tumores eueniunt, aliquando autem cum impetu quasi, & intra paucas hebdomades præualefcunt.
- 4) *Aluus* est liquida, lubrica, mucida, rarius adstricta.
- 5) *Vrina* ad proportionem potus parcissima, per initia tenuis & aquosa, successu autem temporis crassitiem & ruborem exhibet.

2. Specialia.

1) *Anasarca*.

- a) Oedematosus tumor, per vniuersum corpus se diffundens, ad proportionem membrorum fere æqualis, & tanto infarctu habitum corporis tumefaciens, vt cutis ad nitorem extendatur, & rupturæ quasi merum iniiciat.
- b) Durior hic tumor est, & quando premitur, impressi digiti vestigium *tardius* iterum euanescit.
- c) Sub initium diu sæpe mobilis est, & qui vesperi, maxime post multas corporis exercitationes, ingens erat in pedibus, mane notabiliter recedit.
- d) Est incrementi vel languidi, vel repente inualefcens: priori modo subsistit interdum medio quasi tumoris gradu, quem veteres *phlegmatiam* adpellarunt; vbi inflatio valde quidem conspicua, mollis tamen & satis laxa reperitur.

e) *Ad-*

- e) *Adpetitus* valde est languidus.
 f) *Ad motum* sunt lasi.
 g) *Ad sudorem* ad modum difficiles.
 h) Conqueruntur, maxime post pastum, de angustiis præcordiorum, & difficili respiratione.
 i) *Somnus* est grauis & delasians.
 k) *Vrina* tenuis, aquea, non tamen diaphana.
- 2) *Ascitis.*
 a) Notabilis tumor, totum abdomen distendens.
 b) Hic tumor primo sæpius in pedibus sese exserit, vnde magis magisque per femora ad ipsum abdomen adscendit.
 c) Frequenter pedetentim, interdum autem satis cito augefcit, & denique totam cauitatem ita extendit, vt ad scrobiculum cordis vsque conspiciatur.
 d) Aliquando ingens, aliquando satis parca quantitas aquæ in abdomine reperitur, prout magno impetu effusio facta est, vel hydrops longius durauit.
 e) Subsistit hic tumor, cum insigni plerumque pertinacia: noctu quidem, lecti calore, paullulum subsidet, interdiu autem redit, erectis nempe, ambulantibus vel sedentibus, agris.
 f) Quo magis inualefcit, & ab Jomen distenditur, eo certius adpetitus & vires cadunt, fitis autem inexplebilis accedit, habitus corporis superioris contabescit, & tussis cooritur, quæ, quo sicciior, eo vehementior obseruatur.
 g) In vtroque sexu hic tumor genitalia occupat, speciatim in viris *hydrocele* prouenit, & *exomphalos*, seu protuberantia vmbilici, non raro iungitur.
 h) Reliqua signa lassitudinis, somni grauioris, &c. cum anasarca habet communia.
 i) *Vrina* est crassa & rubicunda.
- 3) *Tympanitis.*
 a) *Tenter*, licet minus, quam in ascite, molis habeat, ita tamen vehementer tenditur, vt, digito percussus, tamquam tympanum resonet, & leuem murmurationem

tionem,sonitum,ac rugitum quasi exhibeat. *Vid. obseruat. Lommii.*

- b) *Ructus* sæpe concurrunt, qui, quando emittuntur, aliquid tantulum subleuant ægrotum; quo magis autem suppressi manent, eo sensibilius æger affligitur, ita vt vix stragulum impositum tolerare queat.
- c) *Pedes* non æque adeo, vti in reliquis hydrophis speciebus, tument.
- d) Reliquum corpus extenuatur.
- e) Scrutinio anatomico venter, vel etiam intestina flabibus distensa reperta sunt, vnde hydrops siccus solet vocari.

IV. SVBIECTA.

1. *Anasarca.* Hanc præcipue incurrunt homines,
 - 1) qui in febribus tractantur variis ineptis artificiiis.
 - 2) Quibus *scabies* per sulphurata, pingua saturnina, intempestiue repulsa est.
 - 3) Cachectici tam in anasarcam, quam ascitem, passim prolabuntur.
2. *Ascitis.*
 - 1) *Ætas* iuuenilis & media promte & impetuose ascitem incurrit; seniores autem rarius huic malo subiacent, & quando omnino id contingit, magis lento gradu, quam præcipiti insultu ab eodem occupantur.
 - 2) *Sexus* sequior, vti cachexiæ, sic etiam asciti, magis obnoxius est, quam virilis.
 - 3) Item temperamentum sanguineo-phlegmaticum præ reliquis temperamentis.
 - 4) Speciatim feminae, quibus menses imminuti, vel plane suppressi sunt.
 - 5) Viri post fluxus, immo motus tantum, hæmorrhoidalis cohibitionem.
 - 6) In primis, quando in vtroque sexu hæ sanguinis euacuationes fuerunt largiores, & consuetudine in habitum quasi antea deductæ.
 - 7) Aliquando etiam ascitem incurrunt, qui hæmorrhagiis *dinturnioribus* exhausti, nec analepticis & congruo regimine

gimine debite refocillati sunt; idque tanto certius, quo magis adstringentium abusus eius modi hæmorrhagiis oppositus fuit.

- 8) *Febricitantes*, qui inconuenienter & præmature per chinam chinæ, seu alios cortices adstringentes, martialia &c. tractantur.
 - 9) Quibus metastasis febrilis, erysipelas, vel phlegmone repellitur.
 - 10) Quorum diæta crassa crassis humoribus generandis apta est.
 - 11) Qui *thermis* & *acidulis*, item spirituosis potionibus, abutuntur.
 - 12) Qui luxationibus, contusionibus, & immodestis refrigerationibus obnoxii fiunt.
 - 13) Tandem etiam *gravidarum* oedemata asciti interdum ansam præbent.
3. *Tympanitis*. Huic malo præ aliis subiacent
- 1) *Flatulenti*, diuturnis ventriculi ac intestinorum inflammationibus vexati.
 - 2) In primis femina, abortum passa, aut in puerperiis male tractata, item mensium vitio laborantes.
 - 3) Viri post hæmorrhoidum suppressionem.
 - 4) Interdum etiam illi tympanitidem incurrunt, qui, sub diuturnis febribus, peruersis medicationibus tractantur.
 - 5) Denique qui *vermibus* obsessi sunt.

V. CAUSSAE.

1. Hydrops, in primis ascites, easdem, quas cachexia, causas sequitur. *Conf. tabula antecedens.*
2. Vitium autem *organorum* & viarum, quæ humorum repurgationi inferunt, in ordine cauſandi prius est, quam vitium *humorum*.
3. Licet enim vitium organorum probabiliter sæpius initia sua sumat a vitio humorum, incrementa tamen velocia, & inemendabilis huius mali perseveratio magis dependent a vitio organorum.

4. Et sic dyscrasia humorum est causa *generalis & remota* ad productionem hydropsis.
5. Causa autem *specialis & magis propinqua* est depravatio organorum, siue ab humorum infarctu, siue ab aliis causis inducta.
6. Hæc organorum vitia occurrunt
 - 1) Modo in *mesenterio* & pancreate, vbi sæpe glandularum induratio & scirrhi, rarius autem infarctus & extensio, reperiuntur.
 - 2) Modo & præcipue in *hepate*, quod viscus in aliis, ordinarie in iunioribus hydropicis in globum quasi collectum, constrictum, & exarefactum, in aliis, præsertim senioribus & annosis, insigniter inflatum & expansum deprehenditur.
 - 3) Ad hæc organorum vitia pertinet etiam vasorum lymphaticorum *ruptio*, cui tamen non adeo facile subscribendum est, nisi vbi diuturnior illorum extensio iam in conspicuas bullas, *hydatides* dictas, excreuit.
7. Causa *immediata & proxima* est stagnatorius feri & lymphæ infarctus, partim a vitio humorum, partim a vitio organorum inductus.
8. Causæ *occasionales & procatarticae*, quæ humorum & organorum vitium contrahere possunt, in descriptione *subiectorum* obiter quidem iam indicatæ sunt, quoniam tamen præcipue & magis efficaces illarum peculiari adhuc nota accusandæ sunt, illas sequente ordine recensemus:
 - 1) Quæuis artificia, quæ sanguinem in orgasmum & turgescensionem perducunt, viis exitui non exacte respondentibus.
 - 2) Frequentissime omnium molimina sanguinis excretoria, exitum non inuenientia, e.g. mensium, hæmorrhoidum.
 - 3) abusus adstringentium, turgente eodem tempore sanguine, e.g. in febribus & hæmorrhagiis.
 - 4) Enormes & diuturnæ hæmorrhagiæ.
 - 5) Largior potus aquæ frigidæ, corpore excalesceto, vnde stri-

stricturæ hepatis repentinæ & coagulationes subitaneæ feri & lymphæ, per hepar & glandulas meseraicas oriuntur.

- 6) Refrigeratio humida, minus adsueta, spissitudini humorum & lentori efficacem præbet occasionem.
- 7) Denique notandum, quod importuniores & quasi violentæ aduentitiæ causæ sæpius inducant hydropem, quam segniores illæ in œconomia ipsius corporis subnatæ. Huius census sunt: contusiones, conquassationes, venena pro medicamentis exhibita &, omni iure immodicæ crebræ potationes *spirituosorum*, immo, obstructis præcipue visceribus, aquosorum, e.g. acidularum.
9. Defectus *bilis* non est causa hydropis, uti vulgo creditur, sed potius productum consecutivum vitii illius organorum & humorum.
10. Quod hydrops frequentissime ab infimis corporis partibus incipiat, vera causa est decubitus lymphæ serosæ, hinc inde per peripheriam corporis stagnantis, & ex *gravitatis* nudo motu ita subsidentis, non autem ob caloris defectum, & inutilium particularem depositionem ad partes ignobiliores.
11. De reliquo certum est, tumorem asciticum non solum formari ab aqua extravasata, & in abdominis cavitate contenta, sed etiam a sero illo, quod in mesenterii & intestinorum glandulis stagnat. Hæ enim glandulæ in sectione asciticorum valde turgidæ cernuntur. Hæc etiam ratio est, quod abdomen atrophicorum infantum ab obstructis hisce glandulis tumidum conspiciatur.

VI. PROGNOSIS.

1. Hydrops est morbus satis pertinax.
2. Quando a vitiis *humorum* inductus est, facilius adhuc restituitur, quam si originem duxerit a vitio organorum.
3. Hinc *anasarca*, & reliqui vniuersales tumores, *leucophlegmatia*, *cachexia*, in quibus viscera nondum adeo obstructa & læsa sunt, longe meliorem spem restitutionis faci-

- unt, quam *ascites*, siue solitarie eueniat, siue cum *anasarca*, vti interdum contingit, complicetur.
4. Ipsa sana ratio diætatur, quod deprauationem illam organorum, & præcipue hepatis metamorphosin, quam caduera secta monstrant, in integrum restituere, negotium sit omnium difficillimum.
 5. *Ascites* in ætate iuniore & vegeta, lentoque sui progressu, quando mature tractatur, melioris est prælagii, maxime si nulla hæctica, aut magna respirandi difficultas, tussis sicca, facies liuida, concurrant.
 6. Quo magis autem, præcipue in ætate paullulum prouectiore, *ascitici* de virium labe, orthopnoea, ardore interno, æstu inconsolabili, conqueruntur, eo propinquior est exitus lethalis.
 7. Vasa lymphatica quando perrupta sunt, illorum consolidatio vix vmquam expectanda est; nisi forsan in feminis admodum robustis, sub mensium reuocatione, aliquid sperare liceat.
 8. *Oedemata* quando recedunt, symptomata exasperantur, nempe maiorem ægri persentiunt angustiam, duriorum abdominis inflationem, dolores colicos, ardores febriles, adpetitus & virium prostrationem, vomendi conatum; quæ omnia reuertentibus illis mitescunt.
 9. *Oedemata* rupta temporarium quidem leuamen, sed funestum etiam plerumque euentum adferunt.
 10. *Vrina* quo magis crassa & rubicunda conspicitur, eo minor eluctandi spes adfulget: nam hæctica complicata signum est.
 11. *Alui* obstructio omnia symptomata exasperat, aquosæ vero per illam excretiones, constantibus sibi viribus, vtiles sunt.
 12. *Tympanites* vera prognosi raro differt ab *ascite*, sæpe enim in hunc adfectum definit, lethali plerumque euentu:
 13. Quando vero febribus male tractatis succedit, nonnumquam admittit restitutionem, licet non adeo maturam, præcipue in robusto indiuiduo & vegeta ætate.
 14. Hæctica in tympanite consumptio, tussis sicca, cachecticus vul-

vultus, tumorum pedis incrementum, statum conclamatum significant.

15. Infantilis & iuuenilis ætatis tympanites ad atrophiam spectat, & eiusdem cum illa est prognoseos. *Conf. tabula de atrophia.*
16. Denique de *paracentesi* notandum, quod nouus aquarum prouentus fere semper repullulet, quidquid vanæ pollicitationes in contrarium adducant. *Conf. cautel.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Viscera integritati suæ sunt restituenda; id quod negotium difficillimum est.
2. Vitium humorum mucido-viscidorum est *corrigendum.*
3. Effusi hi & restagnantes humores, qui tumorem constituunt, post sufficientem correctionem sunt *euacuandi*: licet autem correctio, & euacuatio materiæ, viscerum tentandæ restitutioni postponantur, vrgente tamen casu ordine medendi priores sunt.
4. Denique *tonus* partium, per tumorem hæctenus eneruatarum, est restituendus.

B. Methodus specialis.

Anasarca & ascites sequente methodo tractentur.

1. *Correctio* humorum eo diutius perpetuetur, quo magis hydrops inueteratus est, vt sufficiens resolutio & attenuatio obtineatur, & euacuatio deinde eo feliciter succedat. Præ aliis humores corrigunt:
 - 1) *Radices*: vincetox. pimpinellæ albæ, ari, zingiber. taraxic. bardan. petasid. helen. raphan. gentian. rubr. quæ omnia, licet etiam per diuresin *euacuent*, plus tamen incidendo & corrigendo præstant.
 - 2) *Herbæ*: absinth. centaur. min. fumar. card. benedict. tanacet. item antiscorbutica acriora.
 - 3) *Salia media & alcalica* fixa, e.g. tartar. vitriolat. nitr. antimoniat. arcan. duplicat. sal absinth. centaur. min. card. benedict.
 - 4) *Gummi-resina*, v. g. ammoniac. sagapen. galban.

- 5) *E compositis*: tinct. antimon. rartarifat. essent. alexipharm. *Stahlii*, cum essentia succini remixta &c.
2. Hæc eadem remedia referendis etiam visceribus adhiberi possunt, sed prouido selectu: nam quo magis adest phlegmaticus & mucidus status, eo acriora & amariora medicamenta indicantur, & quo magis sanguineum temperamentum concurrat, eo temperatiora remedia requiruntur; *hepar* autem siccum & exarefactum tanto difficilius reddit negotium. Solantur hic
- 1) *Humectantia*, emulsiva, speciatim herba & flores bellidis.
 - 2) *Sapo philosophicus*, & chymico-medicus saponis visus, quorum vtrorumque efficacia hic non reiicienda est.
 - 3) Item *uictura* in iunioribus, immo, tumore plurimum imminuto, *equitatio*, præcipue si cum hydrope tali a primo initio tussis sicca & vehemens, hæcticæ indicium iuncta fuerit.
3. Correctis satis humoribus, ad serum extrauasatum & restagnans *euacuandum* adhibeantur
- 1) in *robustioribus*.
 - a) *Hydragoga fortiora*, e. g. ialappa, gummi guttæ, elater. semen carthami, herb. soldanell. rad. ebuli & sambuci, cort. med. sambuci, succus radice irid. nostr. extract. & succ. esulæ, electuar. hydragog. *Syluii*.
 - b) Coniunctis *diureticis* & *diaphoreticis*, quo nomine laudantur succus raphani expressus, in recente malo cum saccharo crystallifato edulcoratus, lixiuium a *Sydenhamio* commendatum, essent. alexipharm. decocta lignorum, præcipue essent. ligni fallasras.
 - 2) In *tenerioribus* & in præualecente hydrope:
 - a) *Mitiora* laxantia cum epicrasi, e. g. pilulæ ex amaribus extractis, aloë, gummi heder. iunip. pilulæ *Beccheri*, *Stahlii*, maiore dosi sumendæ, vel paululum acuendæ.

b) Con-

b) Coniunctis itidem diureticis & diaphoreticis, modo dictis, cum sudatione in stuphis laconicis, pro tolerantia & conditione ægri; commodior autem est sudatio in anasarca quam alcite.

4. Euacuatis ita humoribus *tonica* tandem adhibeantur, & diæta euchyala cum motu corporis succutatorio, vestura, vltiori viscerum apertioni prospiciatur. Præstant hoc.

1) *Condimenta* aromatica temperata, præcipue zingiber conditum.

2) *Martialia*, cum salibus digestiuis coniuncta.

3) *Salia volatilia*, e.g. spiritus C.C. cum alcalicis fixis, v.g. tinct. antimon. vel tartari, æquali pondere remixta. Item spiritus lumbricorum, cum tinctura quadam alcalica coniunctus, quæ mixtura etiam, maxime in iunioribus, malo adhuc recente, & magis anasarcode, euacuantibus mox coniungi potest.

5. In *tympanite* sequente modo medicatio instituat:ur:

1) *Resoluentia* & carminatiua per 2 - 3. hebdomades præscribantur, e.g. digestiua, catarrhalia, gummi-resinæ, extracta gentian. centaur. min. quibus limatura martis pro tono addatur.

2) Tribus diebus præterlapsis interponantur lenia *laxantia*, e. i. alapp. mercur. dulc. pilul. *Beccheri*, coniunctis diureticis, superius commendatis.

3) Tandem *tonica* propinentur, v.g. tinct. vitrioli martis, vel alia supra laudata.

C. *Methodus specialissima.*

1. Quando *defectus* & suppressio mensium hydropem qualemcumque induxit, post debitam correctionem crasesos, lenia emmenagoga laxantibus misceantur. Conducunt hic præcipue pilulæ *Beccheri*, *Stahlii*, quæ continuo vsu seroso lymphalem colluuiem eliminant, & etiam fluxum mensium reducant.

2. Si manifeste ab hæmorrhoidum suppressione hydrops proveniat, hirudines ad intestinum rectum adplicare conuenit.

3. Vbi autem hydrops ab *excessu* hæmorrhagiarum obortus est, balsamico analepticis æger reficiatur, & tonica coniungantur.
4. In caullis febrium, peruerse tractatarum, magis conducunt antifebrilia.
5. In hydrope, per scabiem repulsam inducto, interne antiscabiosa adhibeantur. *Conf. tab. de scabie.*
6. Febriles hecticodes æstuationes quando accedunt, nitrum, cum sale digestiuo coniunctum, propinetur.
7. *Tympanites*, a febre intermittente suppressa originem ducens, exposcit maturam huius reuocationem per digestiua salina & amara cum laxantibus,
8. Quando *aluus* sicca & stricta est, soluat per clysteres emollientes carminatiuos; toti vero abdomini imponatur emplastrum saponatum *Barbette*, tamquam egregium resoluens, vel linimenta ex oleis carminatiuis.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Ante omnia euitetur irritum illud conamen, quod, neglecta humorum correctione & præparatione, statim ad evacuantia accelerat; quæ methodus ad modum est periculosa: licet enim tumor euanescat, hectica tamen inducitur, immo sphacelosa plane corruptio inde subnasci solet.
2. Hinc etiam ipsa *diuretica*, salina drasticotera, spiritus acidi non promiscue adhibeantur, alias non tam corrigunt materiam, quam per vrinam expellunt.
3. *Salia volatilia*, quando sub initium pro scopo attenuante & aperiente propinantur, tum viscera indurata adhuc magis constringuntur.
4. *Sulphura spiritiuosa*, e.g. vinum generosum, spiritus vini, item salia volatilia *oleosa* aromatica, quando inmodeste exhibentur, facile calorem hecticum inducunt, cum oris siccitate & corporis inquietudine.
5. *Sulphur* minerale externo vsu nocet: pauca autem illius grana, cum aliis congruis remediis mixta, & propinata, non reiiciuntur.

6. *Acidularum* vsus mortem accelerat.
7. *Thermæ* etiam improbantur: licet enim illæ, quæ *calcaria* sunt indolis, tutiores existant, quam *aluminosæ*, melius tamen est, prorsus ab illis abstinere: nimia enim humida tonum partium magis relaxant.
8. *Lignosa antiueneræ* ad correctionem non commendantur.
9. *Amara*, vt simile est vero, viscerum magis reserationi & restaurationi, quam humorum correctioni inferuiunt.
10. *Zingiber* remedium hic valde efficax est, magis autem corrigendo materiam & adficiendo vias, quam, secundum antiquos, *hydragoga* temperando. Certe egregie fundit, & incidit serosam sanguinis tenacitatem. Idem hoc præstat *radix ari*, quæ *zingiberi* acrimonia similis est.
11. Ex *antiscorbuticis* raphanacea, præcipue *radix armoraciæ*, vino infusa, præmissis præmittendis, eximie se gerit. Reliqua, ipsa etiam *cochlearia*, incerti hic sunt effectus.
12. *Prouidus hellebori albi* vsus, non *emeticus*, sed alterans tantum, vti alias in chronicis, ita & hic laudatur ab experientia. Abigitur autem vis emetica per coctionem.
13. *Mercurius vita* anceps est, & vomitus periculosos suscitatur.
14. *Crysallos luna* pro scopo diuretico nemo peritus facile probabit.
15. *Cantharides* prouide ad modum in vsum vocandæ sunt, facile enim renes & vesicam adrodunt.
16. *Pilulæ* ex amaris extractis, e.g. *centaur. min. absinth card. bened. fumar. & euacuantibus*, v.g. *gran. vno vel altero euphorbii, ialappæ vel gummi guttæ*, adiect. *gum. galban. sarcocoll. paratæ*, & per plures dies continuatæ, egregium vsum præstant, in primis quando diuretica lenia, quæ humores excretioni etiam aptos reddunt, interponuntur; quo nomine laudantur tincturæ *alcalinæ*, e.g. *antimonii acris, salis tartari*, cum essentia *succini* coniungendæ. Item essent. *lignorum*, speciatim essent. *saffras* aromatizata; laudatur etiam *gummi iuniperi*, quod nonnulli ipsi *succino* præferunt.

17. *Carthamus*, & illius semen, item etiam rad. *jalappa*, & ex antiquorum censu *foldanella*, seu brassica marina, satis temperate; *gummi* autem *guttæ*, cortex *ebuli* & *sambuci* fortiter euacuant.
18. Non dubitandum, quin illa feri portio, quæ in abdomen effusa est, satis fluxilis sit, ut non indigeat præparatione ad absorptionem in vasa, commode tamen resolutentia & incidentia præmittuntur, ut viscera expurgentur, & ad transmittendos humores apta reddantur.
19. *Venaesectio* in nulla hydropis specie probatur, multo minus, ubi malum altiores iam egit radices.
20. *Scarificationes*, ad serum in externis partibus euacuandum institutæ, valde improbantur: superficiales enim parum euacuant, & nihilominus difficulter consolidantur; profundiores autem sphacelofam corruptionem inducere valent.
21. *Paracentesis* plures inuoluit difficultates, constantem tamen efficaciam non præstat; & licet in illis, quorum viscera adhuc illæsa sunt, & ubi malum a causa quadam externa originem duxit, solidum auxilium adferre possit, raro tamen necessaria est.
22. *Vesicatoria* etiam plus incommodi, immo periculi, quam auxilii adferunt.
23. *Saliuatio mercurialis* nullo modo probatur: hæc enim non corrigit seroso-viscido-spissos humores, sed lympham falsam, coagulatam; & quoniam in hydrope per via meatuum sudoriferorum libertas, quam saliuatio requirit, ob humorum spissitudinem, ægre obtinetur, grauia inde damna, stases, paralyfes, introduci possunt.
24. *Sudationes* vsus omnino suppeditarent, præcipue in anasarca, & ubi malum a causis externis, illæsis adhuc visceribus, inductum est, si modo absque sanguinis commotionibus impetrandæ essent: his enim accedentibus res est valde anceps, præsertim quando sudor plane non succedit.
25. Ad hanc sanguinis exæstuationem euitandam, remedia externa, pro scopo sudatorio, magis comendantur, e.g.

- 1) Inuentio *Borrichii*, qui multis vesicis, aqua calida repletis, agrum fouere iubet.
- 2) *Stupha sicca*, saluo capite, præeuntibus plebeiis, qui clibano corpus intrudere, caput autem libero aëri exponere obseruantur.
- 3) Quid ad hunc finem folia *fraxini* siccata, & externe circumdata, valeant, experientia relinquitur; vbique autem notandum, quod hæc omnia irrita sint, nisi interna remedia debite præmittantur & subiungantur.
26. *Cânstca* acriora, externe adhibita, materiam siue ad interiora repellunt, siue, cute disrupta, eandem cum variis incommodis contumaciter deinde emanare faciunt. Commodissime hinc illa topica adplicantur, quæ tabula de *ædemate* sub methodo generali commendata sunt.
27. In *tympanite* fortiores euacuationes minus, quam in *ascite*, locum habent; leniores autem per aluum, vrinam, & sudorem vsus suum præstant.
28. *Tympanitem* spasms accensere, contra rationem est: in adfectibus enim flatulentis remissio potius, quam rigida intensio occurrit.
29. *Tonica* prius non adhibeantur, quam post sufficientem correctionem & euacuationem humorum, alias maior hepatis obstipatio inducitur, & omnia exasperantur.
30. Denique adlegamus *puluerem* illum *hydragogum*, cuius mentio facta est in dissertatione *Stahl*i de hydrope pag. 32. 33. qui, ad octo grana quotidie propinatus, satis *blande* euacuat & tumores profligat, euidente testimonio, quod copiosa vehemens humorum euacuatio negotium *medelæ* non semper exhauriat.
31. Licet enim per fortia purgantia aqua sæpius notabiliter educantur, non raro tamen exempla occurrunt, in quibus nil præstant, quamquam repetitis dosibus propinentur; immo damnum inferunt, nam intestina valde irritant, tonum viscerum debilitant, vasorum lymphaticorum rupturam promouent. Nimia seri glutinositas, vel abundantia quæ purgantium particulas obtundit

aut diluit, effectum catharticum non raro etiam frustratur.

32. Ratione *modi & viarum*, per quas purgantia aquas asciticorum euacuent, auctores dissentiunt. Recentiores sequentia de hoc statuunt: Purgantia stimulant intestina, hinc primum emulgetur serum, quod in glandulis micioribus *Petierianis* continetur. Horum enim vasa excretoria immediate in intestina hiant. Glandulæ mesenterii ob connexionem simul stimulantur, quoniam autem valvulæ vasorum lacteorum obstant, serum suum in cavitatem intestinorum immediate effundere non possunt, sed in chyli receptaculum mittunt: Vnde in massam sanguinis recipitur, post ea in glandulas intestinorum deponitur & euacuatur. Hac ratione vasa sanguifera a notabili serosa hac excretionem quodam modo vacua redduntur, & serum subtile, quod in cavitatem abdominis stagnat, per poros in venas recipitur, ad cor fertur, per arterias ad intestina ducitur, & ibidem ex glandulis emulgetur.



TABVLA LXXXIX.

DE

HYDROPE PARTICVLARI.

I. DEFINITIO.

Hydrops particularis est tumor tactu mollis, & pallidus, in certa quadam corporis parte contingens: a vitio modo humorum, modo organorum inductus.

II. DIFFERENTIA.

1. *Septem* species hydropis particularis præcedente tabula iam indicatæ sunt, & sub signis potissimum repetentur.
2. *Hydrocele* bene distingui debet a *pneumatocele* seu hernia ventosa, quam differentiam sequentia docent.

1) Quan-

- 1) Quando tumor in loco obscuro ad lumen candelæ adspicitur, tum hydrocele, minorem pneumatocele autem maiorem offert perspicuitatem.
- 2) Hydrocele vbi manu tangitur, pondere grauis, pneumatocele autem longe leuior est.
- 3) Hydrocele consistentem, pneumatocele autem ætatem magis infantilem & puerilem occupat.
- 4) Hydrocele, nisi ascites concurrat, lento ad modum gressu, pneumatocele autem repente, incrementum sumit.
- 5) Hydrocele sponte sua rarius imminuitur, & si quid imminuatur, in reliqua parte sensibilis laxitas & inanities conspicitur; pneumatocele autem frequentius alternare obseruatur: modo enim tumor est remissior, modo intensior, nulla tamen partium laxitate sed æqualitate vbique conspicuus. *Conf. tab. thirurg. de herniis.*

III. SIGNA

A. Hydrocephali.

1. Tota superioris capitis regio, a fronte iuxta tempora ad occiput sursum versus, dimenso quasi circuitu, in molem aliquando stupendam extumescit.
2. Quæ inflatio sublucida est, præcipue quando candela post eandem tenetur.
3. Aliæ partes, e.g. labia, nasus, præcipue etiam oculi, ordinariam suam seruant magnitudinem.

B. Hydropis pectoris.

Certiora de hoc signa non prostant, quod enim de fluctuatione sub decubitus mutatione memoratur, aut, quia talis adfectus etiam alterutrum tantum latus occupare potest, de graui impedimento respirationis, quando æger in latus sanum recumbit, adlegatur, non sufficit ad diagnosis certiore.

C. Hydroceles.

1. Tumor scroti, tactu plurimum mollis, interdum tamen plane rigidus, plerumque sine doloribus,

2. ad anferini oui magnitudinem, immo maiorem aliquando excedens.
3. Latus illud scroti, quod hoc mole diu oneratur, densius redditur.
4. Aliquando iungitur asciti, aliquando solitarie euenit, & tum lentius solum augetur.

D. De reliquis speciebus, e. g. ouarii muliebris, hydatid. certiora signa non prostant.

IV. SVBIECTA.

1. *Hydrocephalus* sæpe infantibus post laboriosum partum euenit, vbi tumor statim post exclusionem initia sua manifestat.
2. *Hydrocele* crebrius occurrit in asciticis, & deinde etiam in illis subiectis, quæ externam scroti contusionem, compressionem, vel alium violentum contactum, quod proce notandum, experta sunt.

V. CAVSSÆ.

1. *Hydrocephali.*

- 1) Hic vix non semper *violentam* causam habet externam, nempe si infans, sub partu, capite ex vtero promineat, tum spastica vteri contractio massam humorum ad caput violentius restringit.
- 2) Et sic causa *proxima* & *continens* est infarctus œdematosus a distensione partium non solum exteriorum supra caluariam, sed & ipsius substantiæ cerebri, inductus.

2. *Hydroceles.*

- 1) Causa *continens* est dilatatio meatus illius, qui ex abdomine in scrotum tendit.
- 2) Causa *occasionalis*, quæ huic dilatationi viam sternit, est clamosa eiulatio: vnde humor ille pedetentim in scroti cavitatem, & distensas partes delabitur.

VI. PROGNOISIS.

1. *Hydrocephalus*, quando intra leniorem adhuc gradum subsistit, non ita difficulter iterum tollitur; inualescens autem periculo non caret: nam grauis cerebri peruersio non facile ad legitimam structuram reducitur.

2. Hy-

2. *Hydrocele.*

- 1) Ab externis violentis causis inducta, facilius dissipatur.
- 2) Ad altiorem autem pueritiam continuata sæpe cachexiam conciliat.
- 3) Ipsa autem portio aquosa, in hunc locum collecta, per multos annos sine corruptione, teste experientia, durare potest.
- 4) Quæ vero *hydrocele* internæ causæ certum debet, & cum ascite complicata est, illa difficillime est restitutionis: nisi enim ascites funditus extirpetur, hydrocele minime cedit.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*1. *Hydrocephalus* sequente ordine tractetur:

- 1) Nutrici, vel, si fieri possit, infanti, per aliquod dies exhibeantur lenia laxantia, inter quæ præstant phlegmagoga.
- 2) Externe *fotus* discutientes adplicentur, ex radice iridis Florentinæ, & reliquis anticatarrrhalibus, vti & herbis, floribus, ac seminibus coronariis, carminatiuis.
- 3) Reliquo tempore emplastrum saponatum *Barbette* per aliquot subinde horas imponatur.

2. *Hydrops pectoris* rarior est, & generalem illam exposcit medicationem, quæ præcedente tabula indicata est. Licet autem paracentesis hic æque ac in anasarca locum habeat, eiusdem tamen cum illa est considerationis & difficultatis. *Conf. cautela tabulæ antecedentis.*3. *Hydrops pericardii* rarissimus adfectus, & in artificum magis inuentis, quam naturæ operibus quærendus est.4. *Hydrocele* sequente ratione tractetur:

- 1) *Interne* adhibeantur lenes euacuationes cum epicrasi, e. g. rad. irid. nostrat. sem. carthami. cum herbis resolventibus, amaris; vbi autem vires constant & ascites complicatur, ibi fortiores euacuationes locum habent, nempe illæ, quæ sub ascite memoratæ sunt.

2) *Externe.*

- a) *Discussio* promoueat per neruina carminatiua, in

sacculo, vino calido imbuto, per aliquot dies adplicanda. e.g.

Recip. rad. i. i. d. Florentin.

caryophyllat.

vincetox.

bryon.

sigill. Salomon. ana vnc. semis.

Herb. chærefol.

bardan.

rorismarin.

geran.

puleg. ana man. I.

flor. chamomill.

melilot. ana pug. II.

fem. cumin.

petroselin.

ammios, ana drach. II. M.


b) Ad *repulsionem* efficax est sulphur, in lixiuio calcis vi-
væ adhibitum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Vbi visceris alicuius labes in hydrope particulari concurrat, ibi eadem difficultas, quæ hydropem vniuersalem premit, in medicatione obseruatur.
2. Eius modi hydropes particulares, quando febribus succedunt, vti febres tractantur: nempe digestiuis & aperientibus; quo casu vsus martialium, & salium volatilium, cautissimus esse debet.
3. Non friuole, sub *methodo* hydrocephali, emplastri saponati adplicatio certis horis, pro vna vice, circumscripta est: si enim nimis diu impositum manet, pustulæ enascuntur.
4. Cauendum etiam est, ne sacculi, calide adplicati, diuturniore mora refrigescant.
5. Hydropes particulares, qui in *pectore* contingunt, magis pro congestionibus & stagnationibus sanguinis, serofas secessiones generantibus, quam pro causis vitiosis lymphalibus, reputandi sunt; non aliter ac mors anxia *poly-*

pum generat, qui hinc pro causa ipsius morbi & mortis non ita libere, ut fieri solet, pronuntiandus est.

6. *Hydrocele* sæpe discutitur morbo interno manente: vnde discussioni simplici tanta opera non erit impendenda, sed lymphæ potius correctio necessaria est; quæ autem folliculæ tractationem requirit, euitando ubique impetus sudoriferos & purgatorios.
7. *Camphorata* sanguineas quidem portiones discutunt, sed tum seroso-mucidæ partes magis inspillantur: hinc nihil præsidii ad hydrocelem in illis quærendum est.
8. Potus calidi sedulo adhibeantur, frigus autem & frigida euitentur, quia magis inspillant.



TABVLA LXXX

DE

ICTERO.

I. DEFINITIO.

Icterus est bilis excrementitiæ per vniuersum habitum corporis diffusio, modo ab obstructione ductus cholodochi, modo, & frequentius quidem, ab hepatis constrictione, transitum bilis ad folliculum & intestina intercipientem, originem ducens. Deriuatur hæc denominatio vel ab *ictis*, viueria, cuius oculi tali colore tincti cernuntur, vel ab *ictero*, aue nempe illa, quæ germ. *Gold-Hämmerche* vocatur. Dicitur etiam *aurigo* ab auri calore; item morbus regius.

II. DIFFERENTIA.

1. Icterus est vel *flauus*, vel *niger*; quam differentiam subsequencia signa, & causæ docebunt. De *flauo* magis valet definitio.
2. Porro icterus est vel *idiopathicus*, qui sine alio morbi progressu per se exoritur; vel *symptomaticus*, qui aliis morbis, e.g. febribus biliosis, succedit.

3. Dif-

3. Differt verus icterus a colore illo icterode, quo infantes statim post partum tincti obseruantur: hic enim color nullius est considerationis, & post meconii debitam excretionem sponte sapius euanescit.

III. SIGNA.

1. *Flauis.*

- 1) Inuadit cum insigni lassitudine, quam interdum leuis horror præcedere solet, præcipue, vbi excandescencia animi huic malo ansam dedit.
- 2) Hanc lassitudinem excipit specialissimum signum, omnibus ictericis familiare, nempe strictura & compressio sub scrobiculo cordis.
- 3) Vnde anxietas repentina, & angustia præcordiorum, interdum plane suffocatiua, ad minimum cum difficili respiratione.
- 4) Immo omnes icterici, quos cito, licet non tanto impetu, adfectus obruit, sentiunt etiam pressionem talem sub hypochondriis, ordinarie versus latus dextrum.
- 5) Melius habent, si erecto corpore sedeant, quam sub decubitu vel obambulatione.
- 6) Iungitur interdum *febricula* quædam, nempe calor solito maior, præcipue quando cum aliquo horrore malum inuadit, uel post versationem in libero aëre frigus aliquod in partibus externis persentitur.
- 7) *Aluus* modo segnior, modo laxior est, cum pallidis plurimum, interdum etiam lientericis, excrementis.
- 8) Sub his omnibus *flauedo* in peripheria facis mature sese manifestat; primo quidem in oculis, deinde autem per totum corporis habitum.
- 9) *Vrina* flauedinem exhibet saturatam, & quando agitur parietibus vitri hunc flauescentem calorem adfigit; immo si pauca tantum illius guttæ linteo vel chartæ adspargantur, flauedine illa tinguntur.
- 10) *Adpetitus* plerumque languet, & vbi omnino ægri aliquid cibi adsumunt, statim pressionis illius circa scrobiculum persentiscunt incrementum.
- 11) *Somnus* est inquietus, interdum multus & profundus.

12) Cum

12. Cum his omnibus conspirat *animi* languor & fastidium.
2. *Nigri.*
- 1) Maior gradus *languoris* corpore & animo.
 - 2) *Color* est nigricans non solum in oculis, superficie corporis, urina, sed etiam ipsa subinde saliva, quæ ad minimum saturata flavedine reicitur.
 - 3) Concurrit *calor* hecticus cum inquietudine, tabe & appetitus maiore defectu.
 - 4) Tensiones & pressiones, quæ in ictero *flauo* latus dextrum ordinarie occupant, hic in sinistro sentiuntur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Generatim omnis ætas, vterque sexus, & quodlibet temperamentum ab ictero corripitur.
2. Speciatim tamen *cholericis* præ aliis huic adfectui obnoxii sunt, & ætas præcipue iuuenilis ac senilis.
3. *Specialissime*, qui causas occasionales subsequentes incurrun.

V. *CAVSSÆ*

1. A viciata bilis eccrifi hoc malum provenire, certissimum est, vnde autem hoc vitium oriatur, per individua non semper liquet.
2. Negari quidem non potest, quod interdum obstructio ductus cholidochi hoc vitium inducat, frequentius tamen in constrictione hepatis quærendum est, quæ strictura transitum bilis ad vesiculam illius & intestina intercipit.
3. Causæ *occasionales* & *procatæctica* sunt:
 - 1) Puerorum addephagia, vel alia crassa atque incondita diæta.
 - 2) Repentina repressio hæmorrhagiarum, e.g. mensium, hæmorrhoidum, quo casu icterus non raro hepatem præoccupat, vel interdum hanc ipsam consequitur.
 - 3) Suppressio febrium intermittentium, præcipue quartanarum.
 - 4) Excandescencia animi, in primis suppressa.
 - 5) Symptomatice interdum icterus febribus biliosis supervenit. *Conf. Hippocrat. aphor. 62 sect. IV.*

- 6) Emetica fortiora, præcipue in sensibilibus cholericis.
 - 7) Immodestus potus frigidus, corpore calente.
 - 8) Scirrhus hepatis constitutio.
 - 9) Calculus in cystide fellea.
4. Causa *icteri nigri* in chronico & contumaci lienis vitio magis consistit.

VI. PROGNOSIS.

1. Icterus in iunioribus facilius tollitur, quam in annosis; raro etiam illos cum tanta vehementia inuadit.
2. Quando cum magno impetu occupat ægrum, periculum subest febris acutæ vel lentæ hæcticæ.
3. Icterus, quando febris acutæ, quarto circiter die, vel ante eundem, & quidem cum magno insultu accedit, ingens vitæ periculum portendit. *Vid. caut. num. 16.*
4. Quo magis viscerum obstipatio, a febris intermittentibus suppressis inducta, præualefcit, eo maioris periculi est, febris autem cohibita quando reuocatur, spem facit restitutionis.
5. Qui bis vel ter ictero corripiuntur, in consuetudinem quasi huius morbi ita deducuntur, vt deinde sæpius illi obnoxii fiant.
6. Icterus quando difficilem respirationem, anxietatem, pressionem circa præcordia, phlogoses, oppletionem pectoris quasi asthmaticam diu & pertinacius fouet, tum siue hæctica, siue ascites, cum vel sine tumore pedum, succedit, & emaciatio atrophica sequitur.
7. Color *flauus*, si in ictericis repente in album iterum transit, pessimum est præsagium: scirrhosam enim hepatis constitutionem designat.
8. Fluxus hæmorrhoidalis, ictero superueniens, spem facit felicis huius mali solutionis.
9. Sic etiam bonæ notæ sunt largiores illi sudores, qui flauedine sua indusia tingunt.
10. Icterus, qui in adultis a spirituoforum abusu exoritur, ob coniunctam hepatis ariditatem, indolis est deterioris.

11. Fit interdum, vt febris *quartana* ictero superueniat, conatu quidem non culpando, effectu tamen non sufficiente. Sic etiam icterus interdum succedit quartanæ, per chinam chinæ suppressæ, qui, quo contumacius inuadit, eo maiorem hepatis obstipationis & præsentis hæcticæ metum infert.
12. Verbo: icterus *leuior* non adeo periculosus, modo caueatur, ne alius peior adfectus concurrat: præualefcens plurimum est lethalis: si non exçernatur bilis, degenerat facile in febrem acutam: vbi nimium effunditur, abit in febres biliofas: quando ab hepatis constipatione bilis retinetur, transit in hæcticam.
13. Icterus *niger* difficulter sanabilis est, præcipue si senes inuadat, aut diutius iam occupauerit: hæctica tabe ægri tales plerumque moriuntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMDIA.

A. Methodus generalis.

1. Mucosum & tenax coagululum, quod vel hepar, vel ductum cholidochum obstruere, & sic bilis ad intestina transitum impedire solet, est *incidendum & resoluendum*; quo scopo commendantur:
- 1) *Radices* catarrhales, e.g. helenii, vincetox. pimpinellæ albæ, ari, item gentian. rubr. cichor. tarax. aristoloch. vtriusque, quinque aperientes.
 - 2) *Herba* centaur. min. absinth. card. benedict. marrub. alb. capill. vener. cuscut. epithym. immo fumarina vsum hic habet abstergentem.
 - 3) *Semina* dauci, fœniculi & coriandri, etiam bene se gerunt.
 - 4) *Salia digestina*, e.g. tartar. vitriolat. nitr. antimoniât. arcan. duplicat. cum quantitate nitri, arcanum tartari, recte præparatum, tartarus tartarifatus, recte præparatus; item salia ammoniacalia regenerata.
 - 5) *Gummi resina*, e.g. ammoniac. galban. sagapen. sarcocoll.
 - 6) *E compositis* tinctura antimonii tartarifata, tinct. tartari.
 - 7) *Specificæ* laudantur: rad. curcumæ, chelidon. mai. herb. abrotan. sem. aquilegiæ, nasturtii, napi, lumbrici ter-

restres, millepedes cum croco vel in succo, vel electuario, vel tragea, fel animalium.

2. *Motus constrictor* in hepate & ductu biliario sunt leniendi, emolliendi, & relaxandi, vt bilis legitime e massa sanguinea possit scerni, & ad intestina deduci. Ad lenem talem relaxationem & deiectionem expediendam rhabbarum præcipue commendatur vel in forma pulueris, vel si adrideat, in forma infusi, coniunctis foliis senæ, rad. polypodii, & resoluentibus modo commendatis.
3. Portio autem illa, ad superficiem corporis iam diffusa, est iuuanda, vt *excernatur*; vbi commode antimonium diaphoreticum cum sale quodam digestiuo, & absorbente remixtum, adhibetur.
4. Denique *tonus* partium naturalis est restituendus; in quem finem conducunt martialia tenuiter resoluta, v.g. crocus martis aperitiuus *Stahlii*, & lenia tonica ex vegetabilibus, e.g. rad. fragar. rub. tinctor. caryophyllat. herb. agrimon. scolopendr. adianth. alb.

B. *Methodus specialis.*

1. Vbi malum adhuc recens est, ter vel quater per diem exhibeantur salia digestiua, cum nitro combinata.
2. In suspitione iracundiæ prægressæ his pulueribus absorbens aliquod modica portione remisceatur.
3. His digestiuis interponantur lenia laxantia, e.g. puluis rhabbari drach. semis vel scrup. II. cui pro lenissimo stimulo scammonium, bene correctum, adiiciatur.
4. Vel ex herbis & radicibus resoluentibus, ac dictis laxantibus, nempe rhabarb. fenn. polypod. fiat nodulus, vino immittendus, de quo expresso mane, item versus prandium & coenam haustus sumatur, ein *Spitz-Glas voll*, & mox deinde scrup. I. de puluere digestiuo salino singulis vicibus subiungatur. Hac ratione recentior adhuc icterus satis promte expeditur, immo in herba quasi suffocatur.
5. Ad excernendam autem illam portionem, quæ ad superficiem iam diffusa est, pulueri digestiuo salino versus summum grana VI. antimonii diaphoretici misceantur.

6. *Quan-*

6. Quando hæc per aliquot dies continuata sunt, & icteri decrementum obseruatur, faceffente nempe sensim colore ex oculis, & reliquis corporis partibus, tum tenuiora martialia salinis digestiuis ad gr. II-IV. pro dosi immisceri, & bis per diem, nempe versus prandium & cœnam, propinari possunt, qua ratione naturalis tonus reducitur, constrictio remittitur, & aluus simul leniter promouetur; repetendo tamen subinde laxans rhabarbarinum; vel si forma liquida pro tono roborando magis placeat, loco pulueris essentia quædam stomachica amara, e.g. centaur.min. gentian.rubr. cum tinct.mart. *Ludouici* propinetur.
7. Vbi etiam icterus altius iam hæret, ibi eadem blanda ualeat methodus, quæ autem diutius est continuanda; quo casu inter remedia resoluentia præcipue locum habet radix curcumæ ad scrup. I. propinata: præmissa, interposita, vel subiuncta, semper leni laxatione.
8. Regimen æquale & leniter diaphoreticum ubique conseruetur.
9. Quo magis *commotiones febriles* cum siti concurrunt, eo magis nitrum & antimon. diaphoreticum cum salibus digestiuis debent coniungi.
10. In *iunioribus*, supra puerilem ætatem, quia icterus facile cedit, vix opus est multis medicamentis, sed sufficiunt leniter discutientia & ad superficiem expellentia; ubi essent. alexipharm. bis vel ter per diem exhibita, & versus noctem puluis salinus absorbens cum antimon. diaphoret. gr. VI-VIII. sub initium satis faciunt.
11. Denique, quia icterus facile *reuertitur*, præoccupando inferunt lenes euacuationes cum epicrasi, aliquoties per annum repetendæ, e.g. fiat vinum medicatum ex herb. rad. resoluentibus. rhabarb. polypod. fenn. & singulis anni quadrantibus per aliquot dies exhibeatur.


VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Icterus non tolerat fortiores commotiones sed omnium excretionum lenem exposcit promotionem.

2. Exsulent itaque *vomitoria*: licet enim per eadem sincera tandem bilis eliciatur, folliculus tamen fellis sub huius commotionibus fortius comprimitur, & quia obstructio quædam a mucoso & tenaci coagulo, aut strictura intestini duodeni versus ductum cysticum, præsto est, maiores effusiones & diffusiones bilis per massam sanguineam contingunt, unde non solum insigniores angustia & cardialgia, sed febres plane acutæ, aut lentæ hecticæ inducuntur.
3. Eodem etiam loco collocanda sunt *purgantia* fortiora; immo ipsa *laxantia*, paullulum efficacia, non conducunt, exceptis illis, quæ sub methodo commendata sunt, quibus iure adhuc adnumeramus sal Anglicanum, ob virtutem, quam præstat. leniter resoluentem & euacuantem.
4. Sic etiam coactæ *sudationes*, per calida diaphoretica & regimina producta; vniuersum malum exacerbant.
5. *Martialia* legitime vsurpata, nempe aperientibus & resoluentibus subiuncta, vti egregie se gerunt, ita notabiliter malum exasperant, quando præmaturo adhibentur.
6. In eligendis medicamentis aperientibus & resoluentibus, temperamenti rationem habere conuenit: nam in cholericis salia digestiua, item succus cichorii, taraxaci, & mitiora antiscorbutica magis conueniunt, præcipue ubi febris complicatur; in aliis autem fortiora resoluentia, e.g. gentian. rubr. centaur. min. locum habent.
7. *Sapo purus* tuto interne sumitur, & in resoluendo ac abstergendo mucos non est contemnendus. Dos. drach. semis ad drach. I. impurus autem catharses, & in primis nauseam, producit. *Conf. method. tab. de hydropse vniuersali.*
8. *Concha vsta* in ictero aliquando exhibuerunt effectum, a gran. XXX. ad XL. propinata.
9. *Balnea*, ad calorem flauum abluendum, præscribere, labor est superuacaneus.
10. Ab anicularum friuolis, nauseabundis experimentis, passim celebratis, e.g. stercore gallinaceo, & aliis absurdis, cauendum est.

11. *Lumbrici* terrestres non plane frustra, ad propellendum icterum, a quibusdam specificè laudantur: vbi insuper vstulati, non autem ambusti ad nigricantem colorem, conducere perhibent. Possunt vel per se, & quidem sine omni periculo, vel cum momento nitri, propinari; quod tanto commodius est, quia liquamen eorum, nitro imbutum, diutius conseruatur.
12. Laudant de reliquo Practici remedia acriuscula, & præcipue illa, quæ flauo simul colore prædita sunt, e.g. rad. chelidon. maior. curcum. croc.
13. *Paracelsus* præcipue radicem *curcumæ*, quæ penetrantis est acrimoniæ, tamquam specificum commendat: neque etiam contemnenda est, licet adeo insignis efficacia ei non adscribenda sit.
14. Radix *chelidonii maioris* pro specifico quidem venditari non potest, præmissis tamen abstergentibus, & leniter expedita aluo, quod in omnibus specificis obseruandum locum habet.
15. *Sympathetica* experimenta in ictero rarius effectû respondent; interdum enim nihil, interdum vero contrarium agunt, e.g. ouum in vrina ægri coctum, & aceruo formicarum, ad consumptionem, impositum. Non temere talia exhibenda sunt, præcipue in sensibilibioribus, qui graua subinde pericula per illorum vsum incurrunt, maxime si apospasmata a corpore humano putrefactioni aut vstioni exponantur.
16. *Crisis icterica*, quæ in febribus biliosis interdum adparet, non adeo magnam inuoluit considerationem, mature enim plerumque iterum cedit. *Conf. prognosis num. 3.*
17. Quæ subiecta *flauedine* faciei, & præcipue oculorum, facile suffunduntur, hepatis debilitatè laborant: hinc ad visceris huius vitium semper respiciendum est, quoties aliis morbis corripiuntur.
18. Maxime si sordes biliosæ ad renes deuoluantur, & sabulum ibi generent, vel coagula lymphalia scabiosa producant, tum sane cautiùs eccrises tales tractandæ sunt, ne regurgitatio versus hepar, iam labefactatum, incitetur.

19. Icterus, a *suppressis febribus*, hæmorrhagiis, & doloribus podagricis repullis exortus, vti semper periculosior est, quam qui a diætæ vitio originem duxit, ita etiam longe cautiùs & moderatiùs est tractandus.
20. *Dista crassa viscida fugiatur*, eligendo aromatica illa hortensia, leni diuretica virtute prædita, e.g. petroselin. asparag. cichor. intyb. nasturt. beccabung. quibus reliqui cibi quasi condiantur. Vinum rubellum, sub adstringentis efficaciam, vbi intemeratum haberi potest, etiam conducit.
21. *Aluus* minime obstructa sit, numquam autem notabili stimuli soluat.
22. *Motus corporis*, quantum pro rerum circumstantiis obtineri potest, iniungatur.



TABVLA XCL

DE

S C A B I E.

I. DEFINITIO.

Scabies est morbus cutaneus, e stasi & corruptione materiæ seroso-lymphaticæ originem ducens: modo lenioribus, modo grauioribus corruptelarum effectibus, pro diuersa massæ sanguinæ constitutione, stipatus.

II. DIFFERENTIA.

1. Scabies est vel *benigna* vel *maligna*.
2. *Benigna*, quæ etiam *simplex* dici potest, est
 - 1) Vel *humida*, vel *sicca*.
 - 2) Item vel *chronica*, per multos annos durans, vel *periodica*, modo euanescens, modo recurrens.
 - 3) Porro: vel *superficialis*, a contagio communicata, vel *profunda*, per totam humorum massam intimius diffusa.

3. *Maligna* varias complectitur species, e.g. scabiem *ferinam* seu *scorbuticam, veneream, lepram.*
4. Scabies maligna *complicata* dici meretur, v.g. scabies luis venereæ complicata est cum aliis malis effectibus, symptoma quoddam, seu schema latioris illorum efficaciam sistit, sic etiam lepra & impetigo, vbi totius cutis textura vna peruertitur. *Conf. cautela.*

III. SIGNA.

1. *Generalia.*

- 1) Pustulæ euidentes, quæ per vniuersum corporis ambitum, excepto fere capite, oriuntur, & in corruptelam ulceroso-saniusam transeunt.
- 2) In artubus, qui aëris accessui præ aliis patent, pustulæ tales primo proueniunt, & deinde magis magisque ad reliquas corporis partes transferuntur.
- 3) Superficies corporis solito turgidior est, in primis in illis locis, vbi *copiosius* pustulæ efflorescunt.
- 4) Pustulæ hæc pruritus aut salino-rosium ardorem inferunt, maxime per noctem, ita quidem, vt & quietem turbent.
- 5) Intra paucos dies ruptæ, vel scalpendo concerptæ, formant vlcusculum, quod tamen plus vel minus facile desiccatur, & iterum coalescit, citra omnem cicatricem relictam.
- 6) Occupat enim scabies, in primis *benigna*, summam tantum cutis superficiem, ita vt materia inter cutem & cuticulam resideat: vnde cutis, non altius corrosa, tanto citius cuticulæ consolidationi locum præbet.

2. *Specialia.*1) *Benigna.*a) *Humida.*

- α) Pustulæ multo humore turgidæ, & ruptæ tandem, copiosam saniam effudentes.
- β) In ambitu harum pustularum rubedo inflammatoria conspicitur, & quo magis adparet, eo maior suppuratio contingit.

Aaa aa

γ) Do-

- γ) Dolorem magis & ardorem, quam prurimum, inferunt, profundiores quoque vlcerationes moluntur.
- b) *Sicca.*
- α) Pustulæ exiguæ molis, pauco mucido, & fere lucido sero refertæ.
- β) Prurimum magis quam ardorem inducentes.
- γ) Non adeo profunde exulcerascetes.
- 2) *Malignæ.*
- a) *Ferina, seu scorbutica.*
- α) Hæc sicca, squamosa est, & sub hisce squamulis stigmata cruenta exhibet.
- β) Cutis circumiacens modo liuido, modo roseo colore, ob sanguinem altius, quam decet, ipsi sese insinuantem, est conspicua.
- γ) Grauior hic præsto est pruritus, qui, quoties refrigeratio vel calor solito maior accedit, intolerabilis fere obseruatur.
- δ) Vbi autem eschara, & ipsa cuticula, quod facile contingit, scalptione abraditur, cutis sub cruenta quidem adparet, vix autem quidquam cruoris, sed lymphæ tantum serosa, subflua emanat, quæ vero facile in eandem squamosam escharam coalescit.
- b) *Veneræ.*
- α) Hæc etiam ordinarie magis sicca quam humida est, & segnius serpit.
- β) Occupat vel vniuersum corpus, vel particularia solum loca, e.g. femora, scrotum, faciem.
- γ) Sub initium sui prouentus noduli plerumque diu sese manifestant.
- δ) Deinde autem crusta succedit, quæ per multos sæpe dies pertinaciter adhæret, & non facile abscedit.
- ε) Dolor est rodens, maxime si scalptione irritetur.

- ζ) In reliquis partibus etiam dolores profundi, & quasi infixi sentiuntur, qui nocturno tempore magis exacerbantur.
- η) Concurrunt sæpe fluor albus, in feminis, gonorrhœa, in viris, tumores bubonodei, & in infantibus excoriationses, immo excrementiæ circa anum verrucosæ, cristatæ.
- c) *Lepra.*
- α) Hic caput præcipue adffigitur, dolores sunt acutissimi, & capilli cum cute decidunt.
- β) Sanies alba prorumpit.
- γ) Vniuersa cutis textura est immutata, tenuibus squamis cuticula obfessa, &, elephantorum instar, aspera, vnde etiam *elephantiasis* vocatur.
- δ) Præter ea sensus fere expers est.
- ε) Facies est inflata.
- ζ) Dentes nigricant.
- η) Anhelitus est graueolens, immo fœtidus.
- θ) Tumores bubonodei hinc inde per corpus proueniunt, qui in vlcera fœtida maligna transeunt.
- ι) Tandem frustra de facie cadunt.

IV. SVBIECTA.

1. Scabiei *benigna.*

- 1) *Humida*, sunt homines temperamenti sanguinei, habitus corporis spongiosi, item phlegmatico-sanguinei, quibus facilius non solum euenit, sed etiam perunacius adhæret.
- 2) *Sicca* sunt homines temperamenti melancholici, cholericici, vel melancholico-cholericici, habitus corporis siccioris.
- 3) Præter ea scabiem facile ineurrunt, qui diætâ crassa, aqualimosa, salsa, potu austero, præcipue vino acido copioso vtuntur.
- 4) Item qui inter aërem humido-frigidum & nebulosum diu versantur.
- 5) Porro qui vitio hepatis laborant, vel febre quartana

diu occupati sunt. *Confer. prognosis tabula de febre quartana.*

- 6) Quibus serum falsum per ordinarias vias non excernitur, e.g. in recessione & suppressione urinae.
 - 7) Huc etiam pertinet fonticulorum, & ulcerum manantium repentina suppressio.
 - 8) Scabiem etiam experiuntur, qui scarificationes adfueras neglexerunt.
 - 9) Denique otiosi, & vitae sedentariae addicti.
2. *Maligna: scorbutici, venerei &c.*

V. CAUSSAE.

- 1) Scabiei *simplicis & benignae*.
 - 1) Causa *proxima* est stasis humorum lymphatico-ferosorum, in corruptionem abeuntium.
 - 2) Causae *procatarticae & occasionales* partim ex illis, quae in descriptione *subiectorum* diximus, partim ex sequentibus colligendae sunt:
 - a) Aëris ambientis inusitata temperies, in primis frigidum-humida, liberam exhalationem impediens, & humoribus in superficie collectis, ad corruptionem ansam praebens.
 - b) Ciborum atque potuum mutatio per hebdomades & menses.
 - c) Sed plethoricis hic euentus saepius contingit.
 - d) Facillime & frequentissime a contagio initia sui sumit, per mantilia, vestimenta, lectos, cochlearia, pocula, vel alia, quae scabiosis vsui fuerunt.
 - e) Crisis morborum nonnullorum, e.g. quartanae intermittentis.
 - f) Vfus largior salis exasperat quidem scabiem, ad excitandam autem illam exiguum momentum adfert, defectus potius salis in cibis oleraceis ad scabiei generationem multum contribuit.
2. Scabiei *maligna seu complicata*.
- 1) *Ferina* causa est scorbutus;

2) *Ve-*

2) *Veneræ* autem a speciali lymphæ corruptione, in malo gallico præsentè, originem ducit.

VI. PROGNOSIS.

1. Scabies benigna *humida*, omnium est mitissima, & legitima methodo tractata, facile adhuc profligatur; quoniam autem ad insignes vlcerationes tanto pronior est, quo magis humida existit, non raro talis vlcerosa constitutio retardat medicationem.
2. Benigna *secca* maiorem quidem molestiam facessit, quam humida, conuenienter tamen tractata haud ita longius curationem moratur.
3. Scabies, præcipue humida, saniosa, suppurascens, quando per remedia inepta externa, e.g. vnguenta sulphurata, mercurialia, cingula mercurialia, adstringentia, refrigerantia, repellitur, quod hodie vsitatissimum est, infausta symptomata inducuntur, nempe angustia præcordiorum, cardialgia, asthmata, catarrhi suffocatiui, febres intermittentes, immo acuta inflammatoria, vtrinque typi ordinarie anomali, cachexia, œdemata, anasarca, deliria, conuulsiones, &c.
4. Scabies *superficialis*, recenter per contagium communicata, melioris est curationis, quam *profunda*; quæ, utpote per vniuersam humorum massam dissipata, maiorem exposcit circumspeditionem.
5. Sic etiam scabies *chronica* difficilius curationem recipit quam *periodica*.
6. Vbi visceris alicuius vitium concurrat, ibi tristior est prognosis.
7. Scabies *maligna*, vi ipsius vocis, maiorem inuoluit difficultatem; quod sane experientia confirmatur, & ratione; indolis enim est fermentalis, & ita radices suas ægrius extirpari possunt.
8. Præcipue valde rebellis est scabies *ferina* seu scorbutica; vbi tamen notandum, quod vitæ genus & conditio maiorem difficultatem, quam ipsius morbi indoles, adferat: pauperes enim, qui legitima tractatione carent, a scabie mali moris plurimum infestantur.

9. *Veneræa* omni quidem iure ad scabiem malignam refer-
tur, prognos̄is autem illius multo benignior est: iusta
enim methodo tractata certius & citius, quam quæcum-
que fere alia scabies percuratur, & quando etiam reced-
dit, minoris tamen est periculi.
10. Vbi autem intimior vlceraatio iam induc̄ta est, ibi maio-
res occurrunt difficultates.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. *Corruptio* humorum pro differentia specierum est corri-
genda.
- 1) In scabie *benigna* corruptionem seroso - lymphalem
corrigit:
- a) Alexipharmaco-diuretica, e. g. essent. alexipharm.
Stahlii, pimpinell. alb. fumar. enulæ.
- b) Succinata, v. g. essent. succini.
- c) Tinct. alcalin. e. g. antimon. tartari.
- d) Decocta lignorum, essent. lign. sassafras.
- e) Absorbentia salina, nempe ocul. cancr. conch. præ-
parat. cum acido citri vel tartari saturat.
- f) *Acrimoniam* scabiosam specificè inuertunt: sulphur
cum nitro, & arcan. duplicat. balsam. sulph. cum
oleo amygdalar. dulc. tinctur. sulphur. antimon.
crud. gr. V. VI.
- g) *Externe* abstergunt & specificè corrigit:
- α) Vnguenta *mercurialia*, e. g.
Recip. mercur. vii. vnc. semis.
saturni drach. II. fiat amalgana, terr. tri-
poli drach. I. l. a. cum vnguent. rosar. su-
bigantur.
- β) Lixiuia sulphurata.
- γ) In *sicca* scabie magis loc. habent balnea abster-
gentia ex rad. bardan. oxylaphath. fontibus mi-
neralibus:
Item ex lixiu. sulphuris cum calce viua parata.
- 2) In scabie *maligna*, & quidem
- a) *Ferina*. α) *In-*

α) *Interne* conducunt succi recentes antiscorbuticorum, quorum vsus per aliquod tempus continuandus est; item essent. scord. fumar. ꝑcum spiritu cochlear. parat.

β) *Externe* mercurialia & balnea abstergentia pariter locum habent. Præter ea mundificandi scopo commendatur succus vel decoctum tabaci, ad consolidationem autem oleum ouorum, myrrhæ per deliquium, hyperic. *Ardorem* vero mitigat camphora, emplastr. de spermate raiarum.

b) *Veneræ.*

α) *Interne* conueniunt antiueneræ illa remedia, quæ tabula de lue venerea commendata sunt, coniuncto regimine diapnoico continuato.

β) *Externe* vnguentum mercuriale, modo descriptum.

γ) In malo profundiore *saluatio*.

2. Humores correcti sunt *euacuandi*; id quod obtinetur

1) Per laxantia phlegmagoga, & præcipue mercurium dulcem.

2) Per blanda diaphoretica & diuretica.

B. *Methodus specialis.*

1. In scabie *benigna*.

1) Sub *initium* propinetur purgans aliquod mediocris efficaciam, ad sordes crassiores, præcipue primarum viarum, eliminandas, e. g.

Recip. extract. panchymag. *Crollii*.

mercur. dulc. ana gr. VIII.

resin. ialapp. gr. IV.

ol. anis. gutt. I. M. f. pilul. pro vna dosi adultis exhibendæ.

2) *Sequentibus* diebus ad correctionem humorum exhibentur:

a) Mane, versus prandium & cœnam mixtura quædam, sanguinem mundificans, e. g.

Recip. essent. pimpinell. alb.

succin.

scord. ana dos. pro adult. gutt. 30-40.

b) Ver-

- b) Versus somnum pulvis quidam salino - absorbens, cum antimoniato fixo coniunctus; cui etiam sensim aliquid florum sulphuris addatur.
- 3) Hæc quando per sex circiter dies continuata sunt, superius purgans reperatur, & deinde corrigentia per aliquot dies de nouo propinentur &c.
- 4) Hac medicatione, per quatuordecim circiter dies patienter continuata, citra externorum remediorum vsum, scabies sæpe profligatur.
- 5) Quando autem sola *interna* non sufficiunt, tum vnguentum aliquod mercuriale, vel alia remedia *externa*, superius descripta, locum habent, e.g. vesperi ad pisi vel fabæ magnitudinem iuncturis, præcipue carpi, tarfi, tale vnguentum tepide illinatur, per 10-12. dies continuetur, & mane semper per saponem abluatur, seruato vbique regimine temperato; vitando frigus, cibos falsos, & scalpionem, vtpote maiorem adfluxum & ardorem concitantem.
- 6) Sub vsu huius vnguenti laxatio per mercurium dulcem aliquoties iteretur.
- 7) De reliquo essentia alexipharmaca, siue sola, siue cum aliis conuenientibus remixta, semel; vel, si insignia circa pectus aut abdomen incommoda sentiantur, bis de die propinetur, coniunctis absorbentibus fixis, etiam aliquoties per diem exhibendis, vitando sulphurea & alia calidiora.
8. In *infantibus* autem, quibus vnguenta mercurialia, ob illorum incontinentiam, tuto adplicari non possunt, remedia interna tanto diutius propinanda sunt: nempe bis per diem essent. alexipharmaca, subiuncto absorbente aliquo fixo, & interdum laxante conueniente.
- 9) Ad pruritus mitigandum setarum modestus vsus conceditur.
- 10) In *recessione* scabiei conueniunt:
- a) Mercurius dulcis ad gr. IV-VIII. pro adulto, nempe non laxatiuo, sed alterante scopo exhibendus.
- b) Vel

- b) Vel si non ad manus sit, flores sulphuris 4-6. gran. pro dosi, ad 3-10. dies continuando, satis faciunt.
Conf. cautel.
- c) Effentia alexipharmaca, coniuncto pulvere ex arcano duplicato, antimon. diaphoret. conchis præparatis.
- d) Vbi calor febrilis ægrum iam occupauit, ibi loco sulphuris nitrum adiciatur.
2. In scabie *maligna*, & quidem
- 1) *Ferina*: hic remedia interna, sub methodo generali commendata, exhibeantur, & per aliquod tempus illorum vsus continuetur; deinde etiam externa, ibidem laudata, in subsidium trahantur; cauendo, ne *scalis* externis remediis malum repellatur. In statu autem inueterato, vbi capilli iam excidunt, insanibilis plurimum est morbus.
 - 2) *Venerea*:
 - a) Interne mundificantia lignosa præmittantur.
 - b) Externe tandem mercurialia subiungantur.
 - 3) *Leprosa*, furfuracea: hæc similis indolis est in fundamento generali caussarum & tractationis.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Scabies, quo magis ab *externa* contagii causa originem duxit, eo citius & tutius specifica mercurialia & sulphurata possunt adplicari.
2. Quando autem *cacochymia* in caussis est, tum prius catharsis & mundificationi insistendum.
3. Visceris alicuius, e.g. hepatis, labes *obstructoria*, quando in subiecto quodam, præcipue aductiore, concurrit, tum medicatio blande & lento gradu instituenda est. Conueniunt in tali casu rad. eichorii, tarax. herb. hed. terrestr. bellid. min. agrimon. pilul. *Beccheri*.
4. Methodo superius præscriptæ scabies simplex ordinariè intra duas, tres, aut ad summum, quatuor hebdomades cedit; illa autem methodus, quæ in *sulphuris* interno vsu consistit, ad 5-6. hebdomades extenditur.

5. Scabies per sulphuris vñum *externum*, vel alia adstringentia repellentia, v.g. aquam extinctionis fabrorum, præsentissime quidem repellit, sed non eadem velocitate iterum expelli potest. Quæ damna vero ex hac repulsi-
one fluant, sub *prognosi* indicauimus; inprimis sulphurea in scabie venerea pessima symptomata inducunt.
6. Quando autem expulsiō illa per medicamina impetum facientia, & regimina sudorifera, tentatur, tum exagitatio humorum inducitur, & graua facile pericula succedunt: hinc sulphuris vsus internus, etsi maxime etiam huic expulsiōni inferuire videatur, ad modum tamen modeste adhibendus & cum puluere absorbente coniungendus est.
7. Scabiei repulsiō non facile timenda est ab aqua extinctionis calcis viuæ, nisi valde frigida corpori calenti adhibeatur. *Conf. dissertat. D. D. Stahlæ de adstringentium cauto vsu.*
8. Scabies *seguis* repulsa tumores œdematodes, immo, in seniore præsertim ætate, vniuersales gignit, & quidem sine omni vestigio acrimoniæ falso-rodentis; in quibus tumoribus sulphur cum puluere absorbente ter per diem exhibitum, bonum effectum præstat. Mirabilis sane est effectus, quem sulphur exserit: *externe* enim adhibitum scabiem & alia vlcerosâ inquinamenta præsentissime repellit, licet in aliis malis tam euidentem adstringendi efficaciam non monstret; immo si per vñtionem in exiguo tantum loco signum veluti datur, per totum habitum corporis effectus se diffundit; *interne*, quando adhibetur, contrarium quidem præstat, expellendo nempe ad superficiem, proportionem autem non seruat, exoptat enim vsum continuum, notabilem insuper quantitatem, non vbique tutam & probatam.
9. *Sudationes* in scabie minus conueniunt, nisi ad modum modeste instituantur, transpiratio tamen semper libera conseruetur, præsertim sub vsu vnguentorum mercurialium, alias nodi sub brachiis facile proueniunt.

10. Omnia itaque calida, sudorem fortius concitantia, improbantur: unde etiam *lignosa antiuenera* nihil eximii præstant, quibus potius præferuntur temperata alexipharmaco-diuretica, præcipue rad. pimpinellæ albæ.
11. Maxime omnium scabies in *senioribus* cautissime tractanda est, quia facile febres inflammatoriæ, vel tertianæ nothæ succedunt; id quod etiam in pueris aut infantibus, febre tertiana notha infectis, quam non raro achores aut scabies præcesserunt, attendendum est.
12. Longa autem euacuatio, præparatio & purificatio humorum; a veteribus commendata, non necessaria sunt, quamquam ad diapnoën conseruandam inferuiant.
13. *Essentia myrrhæ* licet, præmissa diaphoresi leniore, infantibus conueniat, feminis tamen insignes sanguinis turgesfactiones facile concitare solet.
14. Acrimonia in vlcusculis scabiosis quidem conceditur, falsum autem est, quod ab illa pruriginosus ille sensus & ardor, vnice & absolute dependeat, alias hæc incommoda semper deberent adesse, quæ tamen eo tantum tempore sentiuntur, quo corpus vela calefactione & expansione humorum turgescit, vel aura frigida cito illi admittitur.
15. Hæ circumstantiæ satis demonstrant, sensum hunc, reuera fremebundum & subtilissime tremulum; a tonico spastica subtili crispatura, & vibratili motitatione tenerimarum fibrarum dependere, & acrimoniam esse potius effectum illius causæ antecedentis.
16. Quæ obseruatio hunc usum exhibet, ne efficaciæ *absorbentium* nimium tribuamus: horum enim usu nulla scabiei medela absoluitur, abusu autem primæ viæ onerantur, mucus incrassatur, & obstructions augentur.
17. In scabie *sicca* loco essentiarum in cholericis commendantur succi vel decocta herbarum, cum decocto hordei, vel alia humectantia, gelatinosa, qua ratione debilitati simul occurrunt.
18. Succulenti, scarificationibus adueti, aut erysipelaceis commotionibus vexati, si in scabiosas impuritates incidunt, subleuantur sæpe scarificatione.

19. Materię ad modum salinę & fermentescētes scabiem corpori conciliare deprehenduntur, e.g. succus betulę, maiore quantitate haustus, quam commode iterum potest euacuari; item thermię *Wolkensteinenses*, das *Wiesen-Baad*, corporibus, in primis floridis, scabiem inducere solent: vnde fermentalis scabiei indoles & contagii facilitas concluditur.
20. Scabies in *lue venerea* & *scorbuto* est tantum symptoma quoddam, accidentaliter concitatum: nam mille scorbutici, vel *lue gallica* correpti, occurrunt, vbi nullus scabiem vniuersalem experitur, bene vero, si materia illa ad superficiem quidem propulsa, sed non expulsa sit, vnde ibi demum vicerofam talem subit corruptelam.
21. Immo ipsa *lepra* non est ipse morbus, sed effectus vltior morbi cuiusdam; quod monstrat dyscrasia sanguinis leproforum.
22. Vera *mercurii* indoles parum perspecta est, vnde etiam ab eius efficacia, quam in scabie exferit, nullus aditus patet, ad definiendam materialem crasin scabiosę corruptelę.
23. Paucis: Scabies *simplex* constanter tollitur
- 1) transpiratione moderata.
 - 2) Mercurio moderate & minore dosi interne & externe adhibito.
 - 3) Sulphuris vsu interno, vix vnquam externo.
24. In scabie autem magis *refractaria* mercurii dulcis duo grana cum puluere absorbente exhibeantur, & per quatuordecim dies continentur, & quidem cum hac discretionē, vt is, qui domi se continere possunt, mane, aliis autem versus somnium, illa dosis propinetur. Sic sensim enanescit scabies, & hæc methodus etiam in *venerea* locum habet.

TABVLA XCII.
DE
S C O R B V T O,

I. DEFINITIO.

1. Scorbutus est corruptio lymphatico sanguinea, semiputrida, a peculiari humorum dyscrasia, siue vniuersali, siue magis particulari, originem ducens; ad quam corrigendam, & impeditum sanguinis cursum promouendum varii motus discussorii pressorii, spastici a natura instituuntur. Deriuatur a *Vandalorum scorbocyck*, morbum abdominis significans; qua adplicatione, infra dicitur.

II. DIFFERENTIA.

Scorbutus differt

1. a *malo hypochondriaco & melancholico*; ad quam confusio- nem euitandam sequentia notentur:
 - 1) Dolores *spastici* vtrique quidem malo communes sunt, sed in *scorbuto* spasmi aliquo modo physicam etiam habent rationem, nempe acriores humores; in malo autem *hypochondriaco* oriuntur illi prorsus a morali intentione, expellendi, propellendi, discutiendi, humores.
 2. In *scorbuto* sanguis, stricte dictus, est grumosus, & cum parte seroso-lymphatica non satis subactus: in *hypochondriaco* autem malo humores simplici magis spissitudine peccant, & gelatinosam facile subsistentiam subeunt.
 - 3) *Corruptiones* ex stasi hypochondriaca magis simplices sunt, in scorbutica autem corruptione vlcera maligna & foetida proueniunt.
 - 4) Ob hanc semiputridam corruptionem scorbutici defectiones virium, horrores, trepidationes naturæ, ad lipothymiam vsque, experiuntur, quæ omnia in statu

hypochondriaco non æque occurrunt, si hystericas suffocationes excipiamus.

- 5) Quando scorbutus cum malo hypochondriaco omnino conspirat, cum indolem suam contagiosam non exserit, vt facit sibi soli relictus.
2. *A lue venerea*; quæ differentia, quando non obseruatur, incredibile damnum parit, vti sub *cautelis* audiemus. Hinc signa scorbuti cum signis luis venereæ omni attentione sunt conferenda; quorum euidentissima, quæ pro cynosura esse possunt, explicabimus:
 - 1) *Scorbutus* spontaneo prouentu sæpius generatur, non tam insigniter contagiosus est, & contagium ipsius ferre per os, numquam autem per genitalia, propagatur; *lues autem venerea* non nisi contagio exoritur, quod contagium scorbutico longe ferocius est & genitalibus potissimum in alia subiecta transfertur.
 - 2) *Scorbutus* gingiuas magis occupat, & dentes reddit cariosos; *lues autem venerea* tonsillas potius, vuulam, infundibulum, nares, ossa palari, vlceroso ardore, adrosione, erosionem, proutem & potenter corripit.
 - 3) *Scorbutus* vlcera sanguinolenta, ichorosa, leniter manantia, *lues autem venerea* cruitosa, glutinosa, siccam escharam formantia, gignit; *illa* quidem foetida, *hæc* vero nauseosa, & situlentum nidorem spirantia.
 - 4) *Scorbutus* maculas, *lues venerea* collectiones nodosas producit.
 - 5) *Scorbutus* dolores habet acutiores, astuosos, transitorios & remittentes, *lues autem venerea* rodentes, morsicantes, terebrantes, statarios, & licet per diem mitescant, noctu tanto magis exacerbantur.
 - 6) *Scorbutici*, in lecto decumbentes, sat bene se habent, *lues autem venerea* correpti incrementum dolorum inde persentiscunt.
 - 7) *Scorbutus* conspirat plurimum cum pathematibus viscerum, præcipue abdominalium, *lues autem venerea* exteriores corporis partes magis infestat, circa interiores autem vix effatu dignas molestias producit.
 - 8) *Scor-*

- 8) *Scorbutici*, in statu mediocri adhuc constituti, motum corporis possunt perferre, *lue venerea* correpti, incommoda inde sentiunt.
- 9) *Vrina scorbuticorum*, siue tenuis, siue crassa existat, est colorata, in *lue* autem *venerea* minus colorata, subturbida, sedimento tenace, mucido & grandinoso quasi, conspicua.
3. *Macula scorbuticæ* differunt a maculis illis latis & diffusis flauo-fuscis, quas vulgo *Leber-Flecken* adpellant: hæ enim in partibus magis solidis hærent, & per fluidas non oberrant, & licet propensionem ad scorbutum designare videantur, verus tamen scorbutus hæc maculas non exhibet.
4. Sic & scorbuticæ maculæ a *lentiginibus*, *Sommer-Flecken* facile discerni possunt.
5. Ad differentiam etiam referri potest *scelotyrbe*, tamquam species scorbuti, vbi ægri de dolore medullæ ossium conqueruntur, & sensim consumuntur.

III. SIGNA.

1. Cum aliis morbis *communia*:
 - 1) Insolita, insignis plane *lassitudo*, & virium defectio.
 - 2) *Dolores* modo grauius & obtusi, modo acutiores, subtiles, æstuosi, transitorii tamen, vagi, volatici, per paroxysmos quasi recurrentes, & in artibus præcipue sese exerentes.
 - 3) Nonnumquam plane arthriticæ indolis hi dolores reperiuntur, & frictioni per excutiam ad tempus cedunt.
2. *Specialia* & magis *propria*:
 - 1) Magna propensio ad vertigines syncopicas, atque ipsas lipothymias, & hoc quidem, quando erigere sese in lecto, aut locum mutare volunt, parum autem sentientes, si decubitus tranquillum seruent.
 - 2) Proximum pathema, & essenziale quasi, constituunt *macule*, quæ ingrauescente morbo, in artibus præcipue, erumpunt: in cholericis rosei, in melancholicis autem liuido-fusci coloris.

3) Hæ

- 3) Hæ maculæ in *tibiis* non solum maiores, verum etiam cum duris tumoribus, diu tamen sine spontanea corruptione permanentibus, adparent.
 - 4) Coniunctis ordinarie anxietatibus præcordiorum, flatulentia, adperitus imminutione.
2. *Specialissima.*
- 1) *Stomacace*, seu gingiuarum eximia laxitas, promptissima illarum cruentatio, & lenta ulceroso-faniosa colliquatio, quæ vicinas etiam, præcipue oris interni partes, tanquam proximas, tentat, sed tantum anteriores; posteriores autem, nempe fauces, tonsillæ, vuula, infundibulum in luc venerea, non autem in scorbutico infestantur.
 - 2) *Stomacace* autem est partim *comitans* scorbuti symptoma, partim *antecedens*, & sic dispositio proxima ad eundem.
 - 3) Qui *stomacace* laborant, ieiuni sputatores obseruantur, & intus labiorum vlcuscula ipsis erumpunt.
 - 4) Dentes denudantur, liuescunt, carioli redduntur, cui statui vacillatio & casus denticum accedit; immo ipsa sæpe maxilla carie infestatur.
 - 5) *Lingua* & *fauces* anginode æstu obsidentur.
 - 6) Graueolet *anhelitus* & foetet *saliva*.
 - 7) *Ulcerata* aliquando format scorbutus, præcipue circa os externum, foetida, sanguinolenta, ichorosa, liuescentia, nigricantia, tenuiter manantia.
 - 8) *Vrina* est tenuis, simulque colorata, vel, si crassa adpareat, fusca magis nigricans, fortiorem odorem spirans.
 - 9) *Excrementa alui* sunt tenuia, tincta, nigricantia, foetida, interdum autem aluus plane adstricta est.
 - 10) *Quidquid* interdum *euomunt*, ad modum tenax obseruatur.
 - 11) Exspuunt aliquando materiam, interueniente tussi, viscosam, nigricantem, suberuentam.
 - 12) *Sanguis*, per venæ sectionem emissus, de dyscrasia humorum testatur: serum enim superflans, loturæ carni-
um

um simile est, & rubicunda portio in fundo coagulata ac viscida adparet.

- 13) Concurrent interdem hypochondriaca pathemata, qui status mixtus medicationem notabiliter reddit difficiliorem.
- 14) Ira & terrore facile scorbutici percelluntur, immo tam mirificas *animi & corporis* commotiones subinde incurrunt, vt fascinationis suspicio apud imperitos foveatur.
- 15) *Arthritici dolores*, quando concurrunt, ambulant per partem in partem.
- 16) *Motus febriles*, si accedant, nullum seruant typum.
- 17) *Paralyfes etiam particulares, spuria* contracturæ, ariduræ, tumores œdematosi, hydropici, adfectibus scorbuticis nonnumquam se iungunt.
- 18) Aliquando narium *hemorrhagias* experiuntur, quibus per adstringentia sedatis vehementes spastici dolores succedunt.

IV. SVBIECTA.

1. Scorbutus posterioribus demum seculis ad nos peruenit, ab illo nempe tempore, quo aromata in Germaniam transportata, & abundantius vsurpata sunt.
2. Occupat sapius ætatem *iuuenilem & senilem*, non æque iuniorem, nisi a causis externis manifestis.
3. *Desides*, torpidos, & vitæ sedentariæ deditos.
4. Præcipue populos septentrionales in *maritimis* locis, immo etiam meridionales istos, qui maribus, vel ipsi occano vicini sunt.
5. Aliquando etiam *hypochondriacos*, in primis quando sudationibus intempestiuis tractantur, item *quartanarios*.

V. CAUSSÆ.

1. Causa materialis *proxima* est grumosa coagulatio sanguinis stricte dicti, cum reliquis humoribus non decenter mixti & subagitati.
2. Vnde motus sanguinis progressiuus per subtiles meatus impeditur; id quod ansam præbet stagnationibus, stasibus, corruptionibus sanguinearum grumosarum particularum.

Ccc cc

3. Causa

3. *Causa efficiens* est conamen naturæ, per motus varios spasticos, tensorios, pressorios, hanc corruptionem præoccupare: dolores enim illi, qui aliquo modo etiam physice ab acribus humoribus fouentur, tantæ considerationis non sunt, vt hinc ad ætiologiam vulgarem, nempe acrimoniam salinam, scorbuticam, stimulantem, vellicantem, rodentem, vrentem, excurrere necesse habeamus; cum primis quia acrimonia & spissitudo humorum non æque in vno subiecto conueniunt: acria enim sunt incidentia, & hinc scorbutici coaguli remedia obseruantur.
4. *Causæ occasionales*, quæ humores ad hanc coagulationem & spissitudinem disponunt, sunt sequentes:
 - 1) Aër frigidus-humidus, rarius calidus-humidus, & salis iniquationibus refertus.
 - 2) Habitatio humido-frigida.
 - 3) Diæta crassa, salsa, e. g. caseus, pisces, caro fumo indurata; sic etiam diæta acida, humoribus inspissandis & coagulandis apta, præcipue quando accedit abusus aromatum, & spirituosorum, per quem nimia commotio in spisso tali sanguine excitatur.
 - 4) Defectus motus voluntarii, & inde existens plethora, prima scorbuti fundamenta ponunt: vnde ipsi nauæ longe rarius a scorbutico infestantur, quam reliqui in nauibus otiosi.

VI. PROGNOSIS.

1. Scorbutus, quo magis recens est, eo facilius tollitur; & licet natura subinde satis trepidet, facile tamen iterum se colligit, præcipue si iusta methodo incedatur.
2. Præualefcens autem & inueteratus scorbutus, est malum ad modum contumax & diuturnum.
3. Scorbutus per contagium communicatus, si mature illi occurratur, facilius cedit, quam si ex corrupta sanguinis massa pullulet.
4. Quo magis vitæ genus laboriosum est, eo felicius & citius hoc malum superatur.

5. Vbi

5. Vbi viscerum obstipationes occurrunt, ibi restitutio in integrum non ita facile exspectanda est.
6. Scorbutus, si cum malo hypochondriaco conspirat, hoc sublato, tollitur.
7. Quando malum ab aëre impuro, humido-frigido, exortum est & fouetur, tum non ita promte extirpatur: facile enim a fermentali quasi inquinamento, quod in humoribus remanet, recrudescit. Hinc, nisi per longinquam therapiam correctoriam, & diætæ mutationem, tota sanguinis massa in meliorem crasin redeat, malum difficulter eradicatur.
8. Symptomata tamen ita sæpe tolerabilia sunt, vt, excepta dentium & gingiuarum læsione, reliqua vitæ munia satis integra persistant.
9. Scorbutici iuuenes, quibus maculæ rubenres passim in corpore erumpunt, pulmonum erosionibus facile obnoxii obseruantur, & ita vix vñquam senium attingunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In *dispositione* tantum scorbutica, seu *incipiente* adhuc scorbuto.

1. *Resolutio* sanguinis per generaliora catarrhalia, quæ humores spissos & viscidos incidunt, intendatur, ac illorum vsus per aliquod tempus continuetur. Talia sunt: rad. pimpinell. alb. helen. ari. dictam. alb. valerian. vincetox. petasitid. imperator. herb. absinth. abrotan. centa. min. fumar. in forma essentia, extracti, infusi.
2. Coniungatur potus sufficiens, & assiduus corporis motus.
3. In casu *mixto*, vel adhuc dubio, nempe in concursu luis venereæ, tincturæ alcalinæ, item temperata illa radix sarsaparillæ, essent. pimpinell. alb. succini, in vsum trahantur, & omni cautela adfectus talis mixtus tractetur, abstrahendo a fortioribus commotionibus & remediis vehementibus.

B. In *vero scorbuto*.

1. Hic præmittantur generaliora, modo commendata, & lenis transpiratio semper conseruetur.
2. Deinde specialia antiscorbutica, quæ sanguinem grumo-

sum attenuant & corrigunt, adhibeantur; progrediendo a mitioribus ad acriora, nisi forsan necessitas cunctari interdicit, v. g.

- 1) In *sanguineo-cholericis* temperatiora & acidula conducunt, nempe acetosa, acetosella, succus citri, ribium, berberum, &c.
- 2) In *phlegmaticis* magis profunt acriora & penetrantiora: cochlear. nasturtiorum genera, raphanacea, raphanus niger, hortensis, armoracia, sinapi, cepæ, allium, quod fortius est.
- 3) *Melancholicis*, vt & phlegmaticis, conueniunt magis amara, scilicet beccabunga, fumaria, trifolium fibrinum, chelidon. min. flores acaciæ recentes, sedum minus, rad. cichor. herb. chærefol.
- 4) Ex his omnibus succus recens efficacissimus est, deinde infusa cum recentibus herbis parata, & amara etiam in extractis.
3. Continuentur hæc remedia per aliquod tempus, immo ordinarium cibum ingrediantur, e. g. lactucarum, embammatum, succorum, iusculorum forma.
4. Alius per *laxantium* leniorum interpositionem aperta seruetur. Hic conueniunt laxantia cum epicrasi, nempe cum antiscorbuticis conuenienter maritata. *Paracelsus* commendat saniculam, pyrolam, centaurium minus. Magis autem vsum habent laxationes in scorbuto cum malo hypochondriaco complicato.
5. Lenia etiam *diuretica*, quæ humores corrigunt, & serum per vrinarias vias eliminant, antiscorbuticis coniungantur; quo nomine laudantur salia media, tartar. vitriolat. arcan. duplicat. arcan. tartari, tartarus tartarifatus, qui simul aluum leniter abstergit, nitrum antimoniatum, immo nitrum ipsum egregie conducit, inspissando nempe serum ichorosum, & euacuando illud per vrinam.
6. Vbi *æstus* febriles concurrunt, ibi nitrum cum præcipitantibus marinis, ocul. cancr. conch. præparat. matr. perlar. exhibeatur.

7. In

7. In *stomacace* conducunt :

1) *Interne* supra dicta, præcipue succi recenter expressi, cochlear. cum beccabunga, vel nasturt. cum acetos. item lapathum palustre, quod pro veterum *herba Britannica* habetur, mansa, immo deglutita. De hac herba Britannica legi meretur curiosus *Muntingii* tractatus.

2) *Externe* : balsamica, mundificantia, subadstringentia & tonica, essent. succin. myrrh. item myrrha in substantia, sang. dracon. cum tinct. gummi laccæ, spirit. salis dulcis, mel rosatum, rad. bistort. tormentill. herb. auricul. muris, plantag. ceruicar. acidum citri; alumen vstum & crudum cum gargarismatibus, item aqua prunellæ, saluix, pyrolæ, e.g.

Recip. essent. myrrh. drach. III.

succin. drach. II.

tinct. gummi laccæ.

sang. dracon. ana drach. I.

spirit. cochlear. vnc. semis M. pro collutione & absterfione gingiuarum.

8. *Macula*, si præsto sint, non reprimantur, sed discutiantur :

1) *Interne* per lenem transpirationem, essent. alexipharm. catarrhalia lignosa, maxime per essent. ligni sassafras, item per nitrosa.

2) *Externe* per spiritum vini camphoratum, spiritum formicarum volatilem.

9. *Hæmorrhagia* narium, quando accidunt, moderantur

1) per temperantia, nitrosa, & lumbricantia ex decocto auenaceo cum nitro, item per emulsita.

2) per tonica coralliata, gemmata, lenia anodyna, e.g. corall. præparat. spec. de hyacintho, M.P. de cynogloss.

3) per externa reuellentia, nempe clysteres, frictiones.

10. Tandem, correctione satis peracta, & consumpto maximo morbi impetu, tonus partium roboretur; in quem finem laudantur

1) *Martialia*: tinct. vitriol. martis *Ludouici*, tinct. martis cydoniata *Zwelferi* &c.

- 2) *Salia volatilia* cum alcalibus fixis coniuncta, e.g. mixtura tonico-neruina *Stahlii*, quæ simul resolutorium spissorum humorum edit effectum, & etiam in aliis cacochymicis vlcerosis adfectibus vsûm habet. Miscuantur autem part. II. tinctur. alcalinæ cum part. I. spiritus C.C.
11. Et quoniam scorbutus natales suos plurimum debet plethoræ, necessarium est, vt præcauendi scopo venæ sectiones circa æquinoctia instituantur.
12. De reliquo autem *air* humido-frigidus, fuliginosus, vbi fieri potest, in calidum, siccum & purum mutetur: vitando diætã crassam & salsam, & adhibendo condimenta resoluentia, nempe sinap. armorac. cepas, zingib. pip. alliam, sed moderate.

VIII. CAVTELAÆ ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Antiquorum *cacochymia*, & hodiernorum *scorbutus* æqualia habent fata, nam nomen suum omnibus illis morbis dare debent, vbi causæ morborum & symptomatum nullo alio vocabulo exprimi possunt, & sic tamquam asylum ignorantia hæc nomina consideranda veniunt.
2. Vandalorum quidem *scoorboyck* habet adhuc demoninationem alicuius morbi, nempe abdominis, sed nomen latinum, inde mutuatum, *scorbutus* scilicet, nihil aliud quam statum morbosum significat, & idem est, ac si diceret: der Patient ist krank. Hoc verissimum est, scorbutum apud nos quidem sæpissime falso accusari.
3. Confusio *scorbuti* & *luis venerea* quouis modo caueatur: nam error hic ingentia damna inducere valet, e.g.
- 1) *Antiscorbutica acriora* magis adhuc exagitant & corrumpunt salinas seri corruptiones, in malo venereo præfentes.
- 2) Scorbutus non admittit fortiora abstergentia & colliquantia, sed temperantia, & leniter refrigerantia exposcit; quorum omnium contrarium in malo gallico obseruatur: in hoc enim temperantia & refrigerantia nocent, & sine acrioribus abstergentibus & colliquantibus nil obtinetur.

- 3) *Mercurialia*, si in scorbuto ad *saluationem* adhibentur, emergunt inde *stases*, *inflationes*, *inflammationes*, *putridæ corrosivæ* plane *anomalæ ulcerationes*; quibus *noxiiis effectibus* vix *tempestiuum auxiliium* adhiberi potest, quin os aut reliquum vultum *deformatum* relinquunt, vel penitus *ægrum iugulent*.
- 4) Immo *mercurialia*, quæ tantum ad *laxandi scopum* in scorbuto *propinantur*, *dentium lapsum* tanto citius *promouent*, & quia totum *corporis systema* penetrant, nullam autem *directam efficaciam* in *sanguinem congruatum* exferunt, in scorbuto, tamquam *noxia*, *prorsus reiciuntur*.
4. Vbi autem *lues venerea* complicata est cum scorbuto, *hic*, nisi *summo gradu* constitutus, quasi *prætermitti*, & *illa* magis in *tractatione* respici debet; *subleuant* autem *utrumque* malum *remedia* sub *methodo* *lit.* A num. 3. *commendata*.
5. *Correctio* *sanguinis congruati* omnino *præmitti* debet *euacuationi*, & sane in scorbuto *methodus placida*, ac *continua*, quæ magis ad *exitum humores disponit* quam *stimulat*, maxime *necessaria* est: vnde *fugiantur* in *paroxysmo purgantia*, *vomitoria*, quæ *hyperemeses* facile *inducunt*, *sudationes*, *venesectiones*, quæ *vagas translationes* & *plurimas turbas* excitant.
6. *Speciatim regimen sudoriferum* coactum in scorbuto *creat anxietates*, *palpitationes*, *cephalalgias exæstuosissimas*: *sudor enim* in quibusdam *scorbuticis* *difficuler succedit*, & licet in aliis *promte & affatim succedere* soleat, *aqueosa tamen hæc excretio* nihil *utilitatis* adfert: *utiliores sunt fomentationes*, *balnea ex aqua dulci*, ad *sumum autem rei* nihil *faciunt*.
7. *Vomitus* *sponste* interdum *euenit scorbuticis*, qua *euacuatione frustra* quasi *femi-ficci glutinis*, quæ *vix pedibus conteri* possunt, *subinde reiciuntur*, *arte autem* hunc *vomitum* *promouere* non *æque integrum* est, *præstat potius*, *viscidam illam materiam* per *salina præparare*, & *euacuationem naturæ* *commendare*.

8. Spontaneæ *diarrhœæ* cauto moderamine indigent: quando enim per adstringentia improvide cohibentur, cardialgia, anxietas, infarctus lienis, tormina, inflatio abdominis, colica conuulsiua, succedunt.
9. Sic etiam *hæmorrhagia* narium, per talia remedia cohibetæ, varia incommoda inferunt.
10. Idem sentiendum est de *macularum* repulsione; quæ vehementes anxietates tam præsentius inducit, quam eruptio illarum easdem soluere obseruatur.
11. Calida acria sulphurea non ita efficaciter corrigunt, sed, sulphuream solum sanguinis partem adgrediendo, maculas augment, & hæmorrhagias narium enormes, dolores capitis arthriticos, febres, anxietates, inflationes lienis &c. producant.
12. *Anodyna* vires & adpetitum magis exstinguunt, vertiginem cient, excretiones supprimunt, & post exiguum tantum leuamen dolores grauiore inuitant.
13. *Lipothymia* scorbuticæ per aquas cephalicas spirituosas, hißige Schlag Wasser, statim occurrere, & hac ratione sanguinem concitare, tanto magis improbat, quo minus periculum adfectus tales lyothymici inuoluunt.
14. Vti breuis medicatio scorbutum non facile superat, sic etiam a continuo remediorum vsu abstinendum est: facile enim medicamentis ita adfuescunt scorbutici, vt nullas amplius ab illis subleuationes, sed grauia potius symptomata experiantur.
15. Inter antiscorbutica *sedum vermiculare* specificum emeticum prædicatur, de quo notatu digna obseruatio actis N. C. inserta est, quod scilicet in expeditione Danica multi per illud, in forma decocti exhibitum, a *paralyse scorbutica* restituti sint, euacuato per vomitum mucosissimo ad modum viscido.
16. *Cochlearia*, in tota substantia adsumpta, præsentaneum scorbutici leuamen adfert; *Spiritus* autem cochleariæ, cum regimine sudorifero vsurpatus, concitat facile sanguinem, infert anxietatem, æstuosam cephalalgiam, & macu-

maculas nimium expellit : vnde sane *syrupus scelerotyrbicus Foresti* ex cochlear. & beccabung. paratus, longe tior & efficacior est, quam talia spirituoſa. In ſtomacace autem externe locum habet ſpiritus cochleariæ.

17. *Trifolium fibrinum*, quod *Simon Pauli* in ſcorbuto magnopere commendat, licet in forma decocti multas ſanguinis commotiones, & pathemata hypochondriaca torminoſa concitet, laude tamen ſua non proſuſ priuandum eſt, modo prouide, moderate, in ſubſtantia, ſucco, aut inuſo, adhibeatur.
- 18) *Aromata*, modice uſurpata, plurimum valent ad ſcorbuti energiam præoccupandam & reſoluendam ; quo nomine zingiber & piper pro condimento in cibis bene ſe gerunt, licet enim acria ſint, ſanguinem tamen non ita commouere obſeruantur : ab uſu autem reliquorum aromatum acriorum, organiſum facile inducentium, cauendum eſt.
19. *Armoracia* radix recens, aceto imbuta, coctæ præferenda eſt : hæc enim omnem fere acrimoniam amittit. Idem contingit in *cepis*, aqua feruida imbutis, aut cum butyro frixis : vnde exiguum poſt ea præſtant effectum.
20. *Nitrum*, moderate exhibitum, in ſcorbuto, præcipue recentiore, eximium habet uſum, minuit enim acrimoniam humorum.
21. Si vitioſa ſcorbutica humorum craſis a prægreſſis morbis reſidua fuerit, præſtat materiæ malignæ percuratiorem abſoluere, e.g. vbi reliquiæ a variolis reſtant, ibi eſſentia pimpinellæ albæ magni faciendæ eſt, quæ etiam grauiæ incommoda, ab eius modi decubitibus iam inducæta, proſtigit.
22. In aliis autem febrilibus reliquiis eſſent. alexiph. *Stahlii*, per octo circiter dies continuata, certiffimum ad plenariam reſtitutionem edere ſolet effectum.
23. In ſtomacace reliquis mundificantibus commode, non tamen perpetuo, admifcetur *aluminis uſti* in momentum, ſi nempe vlceratio quædam fungoſa ſubſit ; quo caſu ole-

um etiam *philosophorum*, & *cera* non inefficax est, modo recte tractetur.

24. *Alumen* autem *crudum*, adstringendi scopo, gargarismatibus additur.
25. *Spiritus vitrioli* non profusus quidem reiicitur, quia dentibus non adeo infestus est, quam *spiritus nitri* & *salis*, tutior tamen est *succus citri*, moderate vsurparus.
26. *Tabaci* succus, decoctum, immo, quibus non aduersatur, commansio traumaticum exhibet effectum.
27. Robustiores in nauigationibus, quamdiu cepis, & in primis allio potiuntur, ac laborem perferunt, vel profusus liberi manent a scorbuto, vel sub ipso a talibus ingens solatium experiuntur.
28. Et sane prudens moderamen & continuatio motuum voluntariorum longe efficacius corrigunt, quam quælibet optima medicamenta, excepto illo casu, vbi gingiuarum & aliarum partium vlceratio concurrit. *Conf. disertat. D.D. Stablii de motus voluntarii vsu medico*



TABVLA XCIII.

DE

FLVORE ALBO.

I. DEFINITIO.

Fluor albus est excretio materiae mucidae, plus vel minus corruptae, in sexu feminino per vaginam vteri contingens, & non raro crttas periodos obseruans.

II. DIFFERENTIA.

1. Fluor albus diuiditur in *benignum* & *malignum* seu *venereum*; quam differentiam *signa* subsequencia accuratius indicabunt.
2. Differt fluor albus a malo illo refractario, nempe *ulceratione* vteri interna, vbi ichor & semi purulenta materia excernitur, & quidem perpetuo, sine periodo, concurrenti-

rentibus profundis in inguine ardoribus, totum sæpius crus eiusdem lateris in consensum trahentibus, accedente etiam febre hectica cum corporis extenuatione; quale quid in fluore albo non obseruatur: & licet in *venereo* etiam aliquid vlcerosi sine dubio occurrat, hoc tamen non in ipso vtero, sed illius vagina circa glandulas prostates, seu collum vesicæ quærendum est.

III. SIGNA.

A. *Benigni.*

1. Excernitur per vaginam vteri materia simpliciter albuginea & quasi limpida.
2. Quæ materia per se nequaquam lædit vel adrodit; quando autem sub labore corporis genitalia atteruntur, fluxus non solum copiosius succedere solet, sed etiam aliquando sub hoc attritu partes læduntur.
3. Adfligit hæc excretio vel continuo, vel plerumque statis magis temporibus, idque mensium præcipue periodo, ita vt paullo ante vel post illos erumpat, vel, cessantibus mensibus, eorum tempora occupet.
4. Patiuntur ægrota, instantibus mensibus, modo circa lumbos & os sacrum, modo circa sinum, dolores vrentes, tendentes, & quasi rumpentes, de reliquo autem lassitudinem artuum accusant.
5. Durat sub his circumstantiis mensium fluxus plerumque per pauciores dies, cui statim succedit hic fluor albus, prioribus diebus copiosius, posterioribus autem paullo remissius, donec sensim iterum cesset.

B. *Maligni seu venerei.*

1. Materia, quæ excernitur, est discolor, flauescens, viridescens, saniosa, acris, adrodens, excorians, inflammans & exulcerans: tum orificium & labia pudendorum, tum contiguas interdum femoris regiones.
2. Quo diutius iam duravit, eo magis discolor & squâlidus faciei aspectus, cum liuido oculorum circuitu adparet.
3. Concurrit perpetua quasi lassitudo, & fatigatio totius corporis,

poris, præcipue regionis lumbaris, cum insignibus, simul doloribus.

4. Cardialgiæ frequentes, quasi suffocatiuæ.
5. Difficilis respiratio cum palpitatione cordis.
6. Vniuersi habitus corporis leucophlegmaticus status, aliquando etiam œdemata pedum.
7. Febres lentæ, & plerumque anomalæ.
8. Fluor non periodicus, sed magis continuus, aut valde vagus ac inconstans, iustam contagii suspicionem iniicit, & hinc pro maligno magis, quam benigno, reputandus est.

IV. SVBIECTA.

A. Benigni.

1. Euenit hic fluor illis sæpius feminis, quarum menses non legitime & satis ordinate fluunt maxime autem, vbi prorsus iam cessarunt.
2. Accidit præcipue viduis, mensium facile turbas incurrentibus.
3. Rarius euenit *virginibus*, nisi temperamentum eminenter sit phlegmaticum, vel vbi vehementes pruritus venerei in illis obseruantur.
4. In puerperis sub finem fluxus lochialis eadem quidem materia excernitur, quæ autem pro negotio vteri repurgatorio merito habetur.

B. Maligni.

Hic euenit illis, quæ vel ipsæ malo venereo infectæ sunt, vel per commercium cum maritis suspectis inquinantur.

V. CAVSSAE.

1. Causa *proxima benigni* est specialis congestio humorum mucido-ferosorum ad partes glandulosas vteri: vnde tonus in hisce partibus nimium relaxatur.
2. Causæ magis *remota & occasionales* sunt:
 - 1) Temperamentum phlegmaticum.
 - 2) Status cacochymicus vniuersi sanguinis.
 - 3) Diætâ crassa, cruda & adpetitus incongruens, ad frigidos cibos magis intentus.
 - 4) Diuturna habitatio in loco & aëre humido-frigido.

5) Vi-

- 5) Vita sedentaria.
- 6) Frequens abortus.
3. Causa *maligni* fluoris est inquinamentum seu infectio venerea & sic cum gonorrhœa virulenta multum habet conuenientiæ.

VI. PROGNOSIS.

1. Fluor albus *benignus*, respectu ad medelam minime *benignus* est, sed curatu difficillimus, & quo diutius inualuit, eo difficilius profligatur; id quod adeo verum est, ut, nisi vitæ genus mutetur, medicationi vulgo receptæ vix vquam constanter cedat.
2. Quod ad reliquam autem sui indolem attinet, satis *benigne* se gerit: sunt enim feminæ multæ, quæ per plures annos ad senectutem vsque, fluore hoc sine notabili incommodo laborant; rarius etiam ita inualefcit, ut insigne corpori detrimentum inferat, præter adspæctum pallidum & tumidum, quem phlegmaticis inducit, ac artuum grauitatem.
3. Quando autem fluxus, ita adfuetus, vel sponte subsidet, vel arte imperita cohibetur, grauiæ ordinariæ pathemata succedunt, præcipue dolores arthritici vehementes, anomali.
4. Fluor *malignus* aliquando citius adhuc, quam alter *benignus*, per antiueneræ, mundificantia, & denique sistentiæ superatur; id quod probe notandum est.
5. *Malignus* tamen totam facile sanguinis massam inquinamento suo occupat, & si ex contagio mariti natus sit, prius non tollitur, quam hic restitutus est.
6. Quando per inepta remedia cohibetur, grauiora adhuc symptomata, quam post *benigni* suppressionem, inducuntur: eueniunt enim vari decubitus helcodes, vlcerosi, scabiosi.
7. *Vterque* fluxus, præcipue autem *malignus*, vbi inualuit, feminas plerumque reddit steriles.
8. *Vterque* fluor, refractarius, ita, licet debita medicatione tollatur, sæpe tamen per paroxysmos quasi redit, ut ter

vel quater medela repetenda veniat, eoque magis, quo diutius fluxit, & quo seniores subiecta occupauit.

9. *Benignus* ille, qui cum negotio mensium conspirat, non adeo magni momenti est, periculosior autem, si menses iam cessent, vbi adfluxus & effluxus materiae viscosae, acris, increbescere obseruatur.
10. *Habitualis* eius modi decubitus impuritatum ferosarum ansam etiam subinde praebet, vt vterus, ob nimiam relaxationem, prolabatur.
11. De reliquo in gracilioribus hecticam cum tabe corporis, in habitioribus autem cachexiam, oedemata & hydrophem, temporis successu inducit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMDIA.

Vtrique fluori eandem methodum & remedia adhibere velle, absolum est: diuersae enim causae diuersas exposcunt medicaciones.

1. *Methodus benigni.*

- 1) Vbi notabilis plethora concurrit, ibi corpus ad curam disponatur venae sectione in pede, ne natura ansam arripiat sanguinem in serum conuertendi & per haec loca euacuandi.
- 2) Deinde abstersio materiae & euacuatio sensim instituat per remedia vterina temperata, lenia emmenagoga & vterum repurgantia; qualia sunt:
 - a) *Succinum*, cuius essentia omnibus aliis praefertur.
 - b) *Myrrha*, quae moderatius exhibenda est.
 - c) *Terebinthina*, siue cocta siue cum mastiche sociata.
 - d) *Salina* digestiua, cum ipso adeo *nitro*, cuius energia hic non reicienda est.
 - e) *Radices*: pimpinell. alb. vincetox. helen. ari., imperat. leuistici.
 - f) Ex *herbis*: melissa & abrotan. vtpote notabiliter repurgans ac roborans.
 - g) *Gummi-resina*: ammoniac. sagapen. galban.
- 3) His abstergentibus & praeparantibus praemittantur & interponantur lenia laxantia, vbi conueniunt:

a) Pi-


- a) *Pilulæ Stablii vel Beccheri*, quibus cum essentia succini coniunctis omne illud præstatur, quod vix ab alio medicamento expectandum est.
- b) *Radix bryonia* præ aliis simplicibus hic vsus habet, quando laxationes cum epicrasi instituuntur, vbi cum radicibus rhabarb. hellebor. nigr. & abstergentibus modo commendatis, pro vino medicato commode præscribitur.
- 4) Denique subiungantur *tonica*, quæ partes laxas & enervatas roborent; in hunc finem laudantur:
 - a) Martialia probatiora, nempe tinct. mart. aperit. *Ludouici*, crocus martis antimoniat. *Stablii*.
 - b) Neruina & aromatica, e.g. puleg. serpill. rosmarin. thym. origan. rad. cyper. rotund. cost. ver. zedoar. lign. aloës, cort. citri, aurant. ex quibus infusa vel decocta ad internum vsus, externe autem balnea præparari possunt.
2. *Methodus maligni.*
 - 1) Primæ viæ repurgentur per mercur. dulc. cum ialapp. vel extract. panchymag. *Crollii* coniunctum.
 - 2) Virus specificum contagiosum inuertatur & expellatur per balsamica, abstergentia, diuretica mitiora, e.g. fiat mixtura ex essent. succin. myrrh. pimpinell. alb. tinct. antimonii tartarifat.
 - 3) Moderatum regimen, ad debitam humorum crasin faciens, imponatur.
 - 4) Tandem, correcta probe materia, *os sepia*, ad remanentem fluxum coercendum, in vsus vocetur; *conf. methodus tabula de gonorrhœa maligna*, cum qua fluor malignus, vti in causa vlcerationis, sic etiam medica tractatione prorsus conuenit.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Bagliuini* libr. II. praxeos medicæ cap. VIII. iudicat, quod fluor albus habendus sit *venerens*, si fluentibus mensibus proueniat, simplicem autem fluorem esse, qui tempore mensium pereat, & his desinentibus reuertatur.
2. Morbus hic pertinax, etsi plane superatus videatur, pro genio

- genio tamen suo nonnumquam recrudescit; hoc autem Medicum non deterreat, qui potius omni animo eandem medicationis viam iterum ingrediatur, & profligato malo, etiam ad prophylaxin interdum medicamenta exhibear.
3. Illud autem certum est, quod sub optima etiam methodo nihil stabile obtineatur, nisi vita per matrimonium & imprægnationem, vel etiam neglectis libidinosis cogitationibus, in integrum mutetur, aut recens ad modum malum fit, aut denique venerei quidquam sub initium implicitum fuerit, utpote a quo fluore facilius, quam a benigno, liberantur.
 4. *Cantharidum* vsus longe hic nocentior est, quam in gonorrhœa: unde *provida* etiam illarum applicatio vix non semper grauius mala inducit.
 5. *Vrtica mortua* seu *galeopsis*, flore albo, a quibusdam pro specifico laudatur, sed ante, quam commendetur, vltioribus experimentis subiicienda est, quia ab aliis frustra adhibita fuit. Vxor fide digna enarrauit mihi, quod se & duas sorores a fluore albo liberasset per vsus *florum galeopsos*, cum pauca portione *florum alborum ononydis*. Adseueravit intra quatuordecim dies vniuersum malum fuisse sublatum, licet in se per 5. annos & in sororibus non minore tempore durauerit. Flores autem hosce modo cum pane butyro illito largiter comedisse, modo spiritu frumenti extraxisse, edixit.
 6. Nec *abrotanum*, licet notabiliter ad repurgationem & roborationem faciat, pro specifico, cui fidere liceat, habendum est.
 7. Ab *adstringentibus*, nisi præmissis præmittendis, & tandem maxime opportune, immo moderate adhibendis, plane abstinendum, & exoneratio potius adiuuanda est.
 8. *Suffitus* ad partem adfectam adhibiti, effectum aliquem discussorium præstare subinde obseruantur. Inseruiunt huic scopo gummata, e. g. mastich. oliban. tacamahac. item aromata; speciatim autem a quibusdam fumus anti-

- timonii, interueniente tubulo ad genitalia admissus, laudatur.
9. Quod ad diætam attinet, euitare debent cibos nimium aromatizatos, acidos, crassos, aërem humido-frigidum, & animi mœrores.
10. Præ omnibus *motum* corporis placidum & contiuum commendatum sibi habeant: licet enim fluxus sub initium motionis augetur, in progressionem tamen notabiliter minuitur.
11. *Vena sectio* adueta numquam prætermittenda est; quo autem in loco instituenda sit, pro ætatis differentia discernitur: quæ enim intra fluxus menstrui periodum adhuc constitutæ sunt, illæ venæ sectionem in pede admittunt; quibus vero menses iam cessarunt, illis vena in brachio commodius secatur.
12. Quæ de *regimine diaphoretico* tabula sequente cauetur. 32. diximus, illa etiam hoc loco post materiæ correctionem possunt adplicari. Certe si in vlla methodo spes, in hac erit querenda, quia adfluxum, consuetudine confirmatum optime auertit,



TABVLA XCIV.

DE

G O N O R R H O E A

I. DEFINITIO.

Gonorrhœa est inuoluntarius & perpetuus fere spermatis per genitalia effluxus, modo ab atonia partium, semen continentium, modo a pruriginosa fermenti venerei stimulatione, & subsequente erosione glandularum, originem ducens. Deriuatur a γόνι, genitura, & ῥέω, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Gonorrhœa est vel *benigna* vel *maligna* seu *virulenta*.

Ecc ee

2. Be-

2. *Benigna* caret exulceratione, *virulenta* autem hanc semper inuoluit.
3. *Benigna* non confundenda est cum illa excretionis rario-re specie, vbi sperma quidem prorumpit, sed numquam nisi sub membri erectione aut valida fæcum alui reniten-tium pressione.
4. Sic etiam *benigna* discrepat a *pollutione nocturna*, de qua pau-cis sequente tabula dicemus.
5. Dantur casus, vbi per multos menses, immo, totum an-num, hæc excretio leniter procedit, sine ardore vrinæ aut alio incommodo sensu, vbi etiam materia colore in-signiter non mutata, neque aduerso odore prædita est. Hæc quam diu talis indolis existit, medium quasi lo-cum inter benignam & malignam occupat.
6. Vbi autem mox vehementes ardores & rosiones sentiun-tur, & materia copioso profluxu excernitur, ibi *virulen-ta* accusanda est, quamquam materia nondum adeo corrupta adpareat.
7. *Virulenta* differt quoad gradus, vti subsequencia *signa* do-cent, & reliquam simul differentiam ostendunt.

III. SIGNA.

1. *Benigne.*

- 1) Hæc excretio, quæ tamen ad modum rara est, conspi-rat sæpe cum excretionem vrinæ, vbi interdum sub ini-tium emissionis, interdum sub vltima compressione, vel fæcum alui narum reiectione, materia spissa, mu-cido-alba, spermatica, expers tamen alieni coloris & ardoris, excernitur.
- 2) Sæpius etiam extra mingendi tempus perpetuus velu-ti, & exiguus mador, seu substantia submucida, intra & iuxta præputium reperiunda, concurrir, quæ pres-sione aliqua ex vrethra tanto magis erumpere solet.

2. *Maligna seu virulenta.*

- 1) Hæc, quando *leuioris* adhuc gradus est, profert materi-am mucidam, ab albo colore iam notabiliter receden-tem.
- 2) Concurrir ardor, vel prorsus inflammatio præputii.

3) Qui

- 3) Qui ardor præcipue etiam circa radicem penis sub emissionem urinæ sese exferit.
- 4) Semper autem contagium venereum præcessit.
- 5) In *graviore* malo materia magis magisque corrupta apparet, tæti, flavo-viridescens coloris, & putridi fœtoris.
- 6) Quo magis in præputio & scroto crassus tumor, ardor, fissuræ, acæ serum plorantes, superueniunt, eo peioris indolis est gonorrhœa.
- 7) Interdum acris illa materia ipsam glandem corrodit, inflammat, & post fissuras in membro vlcera apostematodea inducit.
- 8) Non raro superueniunt bubones glandularum inguinalium, maxime si arte incondita malum tractetur.
- 9) Conqueruntur de lassitudine artuum & virium decremento infecti.
- 10) Adspectus faciei pallidus, & ambitus oculorum liuido colore conspicuus est.

IV. *SVBIECTA.*

1. Gonorrhœæ *virulente* subiecta vix alia sunt, quam quæ cum venereis inquinamentis turpe commercium habuerunt.
2. *Benigna* plurimum etiam illos homines occupat, qui venere abutuntur, inter ea tamen innocentius etiam aliquando euenit, vbi atonia & relaxatio partium aliunde inducta est.

V. *CAVSSAE.*

1. *Benigna.*
 - 1) Causa *proxima* est atonia partium, fœmen continentium.
 - 2) Causæ *antecedentes*, quæ talem atoniam inducere solent, sunt vel veneris abusus, vel adfectus chronici, partium tonum relaxantes.
2. *maligna* seu *virulenta.*
 - 1) Causa *antecedens* est fermentum venereum.
 - 2) Causa *propior* est stasis inflammatoria humoris lymphatici in glandulis, præcipue prostaticis.

- 3) *Causa proxima* est erosio & exulceratio harum glandularum, vnde materia perpetuo quasi effluit, quæ sub initium tenuiorem, progrediente autem tempore crassior & purulentam faciem exhibet.
- 4) *Causa occasionalis* tantum non vnica est coitus impurus: nam infectio per vestimenta, lectos &c. alias potius iniquationes scabiosas, vlcerosas, verrucosas pruriginosas, ad modum vrentes, & crustaceam excoriationem formantes, in membro virili, præcipue præputio, item in perinæo & circa femora concitat.

VI. PROGNOSIS.

1. Gonorrhœa *benigna* magnæ non est considerationis & facile medicamentis auscultat: hinc minime conuenit cum fluore albo *benigno*, vti ex contrario *maligna* gonorrhœa cum fluore *maligno* easdem causas & medicationes inuoluit.
2. *Virulenta* sub initium leuioris periculi existit, & quando mature illi occurritur, æger etiam ab impuris rebus venereis abstinet, facile adhuc perfanatur.
3. Quando autem diutius hoc malum durauit & ætatem præcipue senilem occupauit, contumacissimum est.
4. Gonorrhœa *virulenta*, licet primus & lenissimus gradus luis venereæ dici mereatur, in hanc tamen *per se* raro transit.
5. Quando autem per *adstringentia* hic fluxus præmature cohibetur, tum non solum dolor premens in pectine, æstus & lancinatio profundior circa perinæum, vlcera glandis, scroti, verrucæ ani, bubones & alia grauiamala subsequuntur, sed etiam corruptela illa per totam sanguinis massam facile diffunditur, & formalem lucem veneream, in primis si regimen sudoriferum accedat, introducit.
6. *Bubones* quando superueniunt, adfectus maiore difficultate & periculo stipatus est.
7. Extirpatur quidem vniuersum hoc malum, sub iusta & conueniente methodo & medicamentis, ob glandularum

rum tamen proſtatarum vlcerationem exiguo tempo-
re non abſoluitur ſanatio.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Methodus benigna.*

- 1) Ad lympham repurgandam præmittantur anticatar-
rhalia , e.g. eſſent. ſuccin. alexipharm. pimpinell.
alb. &c.
- 2) Interponantur lenes laxationes per pilulas *Beccheri*,
Stahlîi.
- 3) Subiungantur lenia tònica, & præcipue temperantia
nitroſa.
- 4) Commendetur parcior diætã, & placidus corporis mō-
tus.

2. *Virulenta.*

- 1) Præmittatur, & ſub reliqua medicatione aliquoties ad-
huc repetatur, euacuatio cathartica per mercurium
dulcem, ialappam, extract. panchymagog. *Crollii*,
- 2) deinde ad materiæ virulentæ correctionem & mundi-
ficationem respiciatur. Commendantur in hunc ſi-
nem baſamica temperatioſa, pro temperamento-
rum diuerſitate ſeligenda, nempe eſſent. ſuccin.
myrrhæ, alexipharm. pimpinell. alb. lignorum deco-
cta & eſſentiæ, terebinth. coct. ſpiritus terebinth. bal-
ſam. ſulphur. terebinthinat. baſam. peruuiã. de co-
paiua, gummi iuniperi, maſtich. item tinct. antimo-
nii acris, ſaliſ tartari. e.g.

Recip. eſſent. ſuccin.

pimpinell. alb. ana. vnc. ſemis.
tinct. antimon. taratarifat. drach. II.
baſam. de copaiu. drach. ſemis. M. dof. 40:
gutt. ſingulis diebus bis vel ter ſumen-
da, & per quatuordecim circiter dies,
ſed ſine regimine ſudorifero continuan-
da. Conf. cautelæ, num. 7. vbi ſpeci-
aliſſima methodus commendatur.

Vel pro magis *phlegmaticis.*

E e e e 3

Re-

Recip. essent. myrrh.

succin.

tinctur. salis tartari, ana vnc. semis,
spirit. terebinth. drach. semis. M.

- 3) His ad ardoris inflammatorii mitigationem interponantur nitrosa cum sale digestiuo & solutione conchar. maritata.
- 4) Quando sub hac medicatione fluxus insigniter minuitur, materia etiam effluens longe purior & feminali proxima obseruatur, tum denique specifica reprimentia locum habent, inter quæ caput effert *os sepiæ*,
e. g.

Recip. ossis sepiæ scrup. II.

balsam. de copaiu. scrup. I. misc cum aliquot granis corticis aurantiorum, & diuidatur in duas partes.

- 5) Sub vsu huius specifici, immo post totius mali sublationem, per aliquod tempus adhuc continuentur essentia balsamica, superius descripta.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

- 1- Est quidem gonorrhœa virulenta, vti sub *prognosi* paucis iam diximus, primus tantum gradus ad luem veneream, interim tamen tantæ sæpius pertinaciæ, vt medicationem, luis venereæ grauioribus symptomatibus parem, in primis saluationem, contemnat, & hoc quidem ob loci, quem occupat, nempe glandularum, conditionem.
2. Sane qui simplicis vlceris indolem & tractationem perspectam habet, ille facile consentiet, quod absouum sit, repentinas medicationes polliceri, multo magis in illas incumbere.
3. Licet autem perfecta restitutio aliquot hebdomadam tempus exposcat, potest tamen ager consueta sua negotia commode expedire; modo tranquille & placide omnia instituantur, alias segnius curatio procedit.
4. Irritum est cœptum illorum, qui *balsamica externe* adhibere commendant: si enim segnia sint; parum efficiunt, quando autem penetrantiora, e. g. balsam. sulphuris, ol.

tere-

terebinth. succin. iunip. in meatum vrinæ instillantur, aut per syringam aliquot tantum guttulæ immittuntur, æger in ardorem, & anxiam dolorum exacerbationem conicitur, vehementes etiam inflammationes & tumores penis, brachii infantilis instar. contingunt.

5. Immo balsamica *internæ* non promiscue, sed cum respectu ad temperamentum & tempus adhibenda sunt: quando enim terebinth. ballam. Peruvian. de Copaiua, essent. myrrh. in malo adhuc recentiore, acriore & ardentiore propinantur, incrementum potius, quam leuamen, ardoris reportatur; immo, sub optima etiam methodo adhibita, *peculiaris* efficacia hisce per experientiam assignari non potest.
6. Hinc balsamum *Indicum album*, seu de *Copaiua*, licet tamquam specificum ad sistendam gonorrhœam laudetur, & etiam methodice exhibeatur, effectui tamen non respondet: *mundificandi* intentione aliquid præstat.
7. *Tinctura antimonii* acris, vel etiam *salis tartari*, eximie hic sunt efficacie, bis vel ter ad 30. 40. guttas exhibendæ. Misceatur, vel quod melius, interponatur essentia pimpinellæ albæ, & intra aliquot dies essentia succini cum essentia pimpinellæ coniungatur, vbi etiam vsus essentia succini sensim augeri, immo illa sola exhiberi potest, ita vt mane & hora tertia post meridiem tinctura quædam alcalina, versus meridiem verò & vesperam essentia succini, primis diebus cum essentia pimpinellæ remixta, deinde vero sola, exhibeatur.
8. Si vrens & ardens dolor ægrum vehementer adficit, melius est initium facere ab vsu essent. pimpinellæ, sequente die tincturam alcalinam, & tertio essentiam succini coniungere.
9. In vrgente tali ardore *nitrum* præsentissimæ efficacie deprehenditur.
10. *Bartholinus* & *Ammanus* vsum essentia cantharidum magnis encomiis ornant, & in pertinaci ac inueterata gonorrhœa vno impetu virus expellere dicunt; sed moment, vt abunde diluatur, e.g. cum essent. cantharidum drach.

- drach. I. misceri debent vini Rhenani vnc. III. propinando quotidie mane cochlear I.
11. Sed præstat ab his, minus tutis, prorsus abstinere, quam semel infeliciter adplicare, maxime vbi præsidia, nempe lac & nitrosa, aduersus malos effectus per illa inductos ignorantur: nisi enim ad modum circumspecte, & prudente plane subordinatione adhibeantur, cantharides vehementer, præcipue in feminis, stimulant, & insignes dolores, immo inflammationes renum, vel mictum cruentum inducunt.
 12. Methodus *Sydenhamii* per diurnas *purgantium* continuationes gonorrhœam expugnare docet; sed, licet fluxus interceptio per talia frequentia & valida purgantia obtineri possit, speciatim tamen hic non conuenit: vnde generali huic medicationi specialis præferatur.
 13. Eodem intuitu *venæ sectio* ad hoc malum, *in se* consideratum, non necessaria, immo ne utilis quidem est, sed soli plethoræ, vbi concurrit, & insuper gonorrhœæ magis *benigna* & simpliciori, quam *virulenta*, conuenit; immo *venæ sectio largior* mialma venereum in humores transfundere potest, maxime si substiterit, vel cohibitus sit fluxus.
 14. *Antiuenerea calida*, quando cum regimine sudorifero exhibentur, noxium illud virus per vniuersam sanguinis massam diffunditur, præcipue vbi in fluxu nude suppresso propinantur: sufficit lenior diaphoresis per diluta decocta lignorum.
 15. Damna, quæ per intempestiuam huius fluxus suppressionem inducuntur, sub *prognosi* num. 5. indicauimus: hinc maxime cauendum est, ne ante sufficientem specificæ corruptelæ correctionem & mundificationem methodus talis cohibitoria eligatur.
 16. Ad hunc errorem euitandum notetur, quod, quamdiu fluxus cum vlllo, quantumuis leuissimo, sensu & considerabili quantitate perennat, correctio & repurgatio factis nondum facta sit, sed tum demum, vbi materia benignioris coloris, leui quantitate, & leni solum madore adparet:

paret: quo casu *os sepiæ* ad grana X - XX. per aliquot dies, coniunctis & subiunctis leniter absterluus, secure propinatur.

17. Quando autem per os sepiæ fluxus, vti interdum contingit, non potest profligari, cum pilulæ *Blancardi* vsui esse possunt.

Recip. gummi elemi

mastich. ana drach. II.

terræ catechu scrup. I. f. l. a. cum balsamo

Indico pilulæ dof. scrup. semis.

18. Raro autem cohibitio talis directa necessaria est, & quando per adstringentia mineralia & vegetabilia segmiora illa tentatur, debita secretiones & excretiones impediuntur, & damna, superius adlegata, infliguntur.

19. Fluxus *recenter* suppressus, & grauioribus symptomatibus stipatus, commode reuocatur per essentiam alexipharm. *Stablii* saturatam, cum essentia pimpinellæ albæ seorsim iunctam & per 8 - 14. dies continuaram: præmissa vel interposita alteratione, aut, si mauis, laxatione, per mercurium dulcem.

20. Vbi autem, contingente tali suppressione, fermentum venereum per rotam humorum massam iam diffusum fuit, ibi catarrhalia & lignosa cum regimine æque ac in ipsa lue venerea requiruntur.

21. De *osse sepiæ*, tamquam specifico cohibente, adhuc notamus, quod a quibusdam, *absorbendi* scopo, aduersus ardorem ventriculi adhibeatur: hoc, si præsentem gonorrhœa aut fluore albo contingat, grauia symptomata inducit.

22. Admiranda est indoles vlcerationis in gonorrhœa præsentis: per duos enim vel tres annos durare, & tamen curari potest; cum ex contrario similes vlcerationes, venereæ nempe indolis, alias partes glandulosas, e.g. oris interni, vuula, satis promte erodant & depascant; cuius rei nulla alia ratio suppetit, quam liber in illis locis effluxus, qui impedit, quo minus in *profundum* glandulæ erodantur.

23. *Experientia* testatur, quod inquinamenta hæc venerea variis schematibus per tacita & nihil suspecta commercia & contagia sæpius, latiusque disseminentur, quam in suspicionem veniant.
24. *Prostant* exempla, vbi post annorum etiam decursum non solum ægri notabilia iterum incommoda sentiunt, verum etiam, contracto matrimonio, cum vxoribus simile quiddam, nempe fluorem album, communicant. Hinc quæuis intemperantia, in primis autem venus, ad quam insignes stimulos, durante gonorrhœa virulenta, sentiunt, vitentur alias facile malum recrudescit.
25. *Botalli* consilium, vrinam intra præputium aliquamdiu retinere, & hac ratione partem læsam abstergere, in recentibus adhuc inquinamentis & leuioribus glandis erosionibus locum habet.
26. *Glandis adrosio* vsus etiam capit ex adplicatione olei ouorum, tanto magis si gutt. I. cum olei philosophorum gutt. I. misceatur, quod lenissimum septicum est, & fungosæ excrescentias, consolidationem impediens, egregie aufert.
27. *Inflammati*o & inflatio præputii, quando leuior adhuc est, præsentissime discutitur per spiritum vini camphoratum, ope penicilli pictoricii parce adhibitum: cauendo, ne in partem erosam guttula forte incidat.
28. Si vero tumor magis inualuerit, refrigeratio aliqua locum habet; in quem finem vnguentum album largiter camphoratum, item oleum ouorum cum myrrha, in ouo ad duritiem cocto colliquata, commendantur.
29. *Caruncula* in vrethra tolluntur remediis venereis absumentibus, quibus, si plurima portio sublata sit, ad fundum extirpandum, aliquid mercurii præcipitati additur; sed aptum requiritur instrumentum, per quod adplicari possit. Recip. dracon. mitigati. i. e. mercurii. dulc. drachm. I. antim. crud. drach. ij. tut. præparat. drach. semis. M. f. pulu. subtiliss. temperetur cum oleo amygdal. dult. illinatur candelæ cereæ & adplicetur carunculæ.

30. *Bubones* ulceraſcentes, niſi & internis antiueneris, & externo prouido mercurialium uſu, tractentur, inſignes corruptiones & fiſtuſoſas eroſiones formant. *Conf. tabula de lue uenerea.*
31. Hi, aliquamdiu tolerati, ſi poſt ea diſcutiantur, vel introrſum repellantur, intimæ humoris infectionis periculum certiffimum adefi, niſi gonorrhœa largiter inter ea ſuccedat.
32. Nota ſunt exempla, in quibus non tantum materia affaſtim correcta fuit, ſed & quæcumque ſiſtentia irrita fuerunt. *Regimen autem diaphoreticum* breui malum ſuſtulit. Hoc enim, uti ante materiae correctionem noxium eſt, ita poſt eandem adfluxum mera moruum conſuetudine ſubnixum auertit.

TABVLA XCV.

DE

POLLVTIONE NOCTVRNA.

I. DEFINITIO.

Pollutio nocturna eſt inuoluntaria feminis excretio, ſomni tempore contingens.

II. DIFFERENTIA.

1. Pollutio nocturna a *gonorrhœa* temporis, qualitatis & ſymptomatum ratione facile poteſt dignoſci.
2. Ipa ſa autem pollutio nocturna ſuos habet *gradus*: in aliis enim ſingulis fere noctibus hæc excretio contingit; in aliis autem poſt vnus vel alterius hebdomadis interualum tantum occurrere obſeruatur.

III. SIGNA.

Iuuenes ſanguinei, plethorici, otioſi & lauta diæta vtentes præ aliis huic ſunt expoſiti.

IV. PROGNOSIS.

1. Hæc pollutio quando *raro* contingit, œconomia animalis

sine damno est, atque ad naturales excretiones potest referri. Morali autem respectu multum negotii facessit iis, qui altius considerant, quod & illa peccata, quæ *præter voluntatem* nostram fiunt, non nisi *per mortem summi sacerdotis* veniam impetrare possint. Ios. cap. XX, 6.

2. Quando autem singulis fere noctibus hæ pollutiones contingunt, tum ipsum etiam corpus per illas debilitatur, homines euadunt discolors, nonnullis oculi rubent, aut aliis catharrhalibus malis infestantur, ad minimum liuore cincti sunt, & tandem in gonorrhœam degenerant hæ excretiones.

V. METHODVS MEDENDI ET REMDIA.

1. Immoderatus progressus huius excretionis non medicamentis sed labore, eoque placido & sufficiente coniuncto victu parciori, retardatur.
2. Quando autem indiuidui quædam circumstantiæ remedia omnino efflagitant, largior *nitri* vsus, ad scrup. I. versus somnum sine multo vehiculo exhibendus, optime se commendat.
3. Venæ sectiones in plethoricis circa æquinoctia numquam sunt prætermittendæ.

VI. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quamquam motus corporis in iis, qui illi non sunt adfueti, pollutionem nocturnam primum magis augere quam eandem imminuere soleat, certum tamen est, quod illius placida continuatio aliam rerum faciem sit monstratura.
2. *Saturnina* externe adplicanda mirum quidem in modum a nonnullis extolluntur, sed quis non videt, hæc fontem mali non attingere, nedum exhaurire.
3. Sic & reliqua, quæ vulgo commendantur, remedia, suspecta sunt: vel enim non iuuant, e. g. rad. nymphææ, semen agnicasti; vel, nimium vsurpata œconomiam animalem offendunt.
4. *Stimulantia* tam physica quam moralia quouis modo sunt euitanda.

TABVLA XCVI.
DE
LVE VENEREA,
SEV
MALO NEAPOLITANO.

I. DEFINITIO.

Lues venerea est humorum lymphatico - salivalium viscosa corruptio, quæ primo stases, & tandem erosiones partium, maxime exsanguium & glandulosarum inducit, & per contagium communicatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Lues venerea differt a *lepra*.

1) *Lepra* non ita prompte est contagiosa.

2) *Deſtuum capillorum* & gonorrhœa utriusque quidem morbo sunt communia, illud autem in lue gallica longe copiosius contingit, & hæc magis virulenta est.

3) *Ulcera* in leproſis sunt tantum superficialia, & non æque circa genitalia eueniunt; in lue autem venerea nodosa & profunda ulcerationes, immo osium adrosiones obseruantur.

4) *Leprosi*, licet acu pungantur, insensibiles tamen existunt.

2. Differentiam luis venereæ a *ſcorbuto* tabula XCII. fusius indicauimus.

3. Lues venerea *in se* differt *gradu*.

1) In aliis fermentale inquinamentum adhuc in humoribus solis oberrat, & symptomatibus aliquo modo tolerabilibus stipatum est. In hoc gradu sanus esse adſpectus, & alios fallere potest.

2) In aliis autem partes *ſolidas* iam occupauit, cum atrocioribus pathematibus; quæ differentia ex *ſignis* illuſſet. *Conf. tabul. chirurgica de ulceribus venereis.*

III. SIGNA.

1. Gonorrhœa adest virulenta aut vlcuscula circa genitalia, plerumque post impurum congressum, rarius per vestimenta, lectos, &c. in sexu feminino loco gonorrhœæ virulentæ fluor albus malignus occurrit.
2. Hæc labe per longum tempus has partes priuatim quasi obsidere solet, sine vlteriore per reliquum corpus progressionem.
3. Quam primum autem gonorrhœa vel fluor albus incondite tractantur, & hac ratione humores impetuosius commouentur, inquinamentum illud satis prompte per reliquum corpus dissipatur.
4. Quando autem gonorrhœa, citra talem humorum exagitationem, simplicius tantum supprimitur, tum statim accedunt bubones venerei, nempe oppletiones & tumores duri, *inguinalium* glandularum, fungi & excreſcentiæ verrucosæ, neque raro fistulæ vesicæ.
5. Vbi vero fermentale inquinamentum in humorum massam alius diffunditur, ibi varia pessima symptomata & effectus oriuntur.
6. Adficit nempe noxia talis materia partes exsanguis, glandulosas membranaceas, immo ipsa ossa.
7. Vnde corruptelas gignit non purulentas, nec proinde insigniter inflammatorias, sed vlcerosas, non tam corrodenre, quam ardente molestia, in primis nocturna, stipatas.
8. Quo intuitu hæc vlcera ossibus etiam adrosionem seu cariem inducunt.
9. Concurrunt dolores spastici, tensiui, vibratiles, rodentes, terebrantes, falsi, qui nocturno tempore exacerbantur, & in cranio, occipite, femore, lumbis, perinaeo, inguinibus, præcipue sese manifestant.
10. Quamdiu inquinamentum solidas partes nondum corripuit, sed per humorum massam adhuc oberrat, conquerruntur solum de generalioribus incommodis, lassitudine grauatiua, torpore, dolore obtuso, valde tamen molesto & in medullis quasi partium residente.

11. Ostendunt colorem liuido-pallidum, in primis per oculorum orbitam, & ita conspectum referunt quasi squalidum ac pallidum.
12. Manus habent calentes & somnum inquietum.
13. Eueniunt magis magisque pathemata, acrius insistentia, aut ad certum aliquem locum tendentia, cum doloribus constantioribus & acrioribus, donec tandem languidissimo successu, nisi ars intercedat, transitus fiat in vlcerationem, eamque lentam, viscosam, valde ardentem & rodentem.
14. Hinc erosio, præcipue in collo, vuula, naribus, faucibus, cuius rei prodromus est raucedo, contingit.
15. Collectiones etiam vlcerosæ, lentissimæ hic illic adparent, quæ variis nominibus veniunt, nempe steatomata, atheromata, melicerites, gummata gallica, Spect. Beulen, adpellantur, prout materiam vel sebi, vel puliculæ, vel mellis instat &c. continent.
16. De quibus anomalis collectionibus vlcerosis, in primis steatomate & atheromate, notabile est, quod ab exigua magnitudine ad nucis auellanæ molem excrescant, & peculiari tunica inclusæ deprehendantur. *Conf. tabul. chirurg. de tumoribus tunicatis.*
17. Accedit vlcerosis hæc corruptelis *fætor* valde nauseosus, qui in malo, profundius radicato, etiam per halitum diffunditur.
18. *Vrina* minus colorata, subturbida, sedimento mucido, tenace, & grandinoso quasi, conspicua est.
19. Tandem tabidam, phthificam seu hæcticam extenuationem hoc malum format, & infectum post longos cruciatus extinguit.
20. Mares hæmorrhoides verrucosas, fissiles, manantes, vlcerascentes, sæpe incurrunt, rarius feminæ, quibus autem interdum cancrosa vteri adrosio miseram denique mortem arcessit.
21. Sanguis, quando grauius infectis emittitur, refrigerescens, manifestos lentores, immo grandinosas, albidas, glutinosas concreciones ostendit.

IV. SVBIECTA.

1. Probabilissimum est, quod lues venerea, *Americanorum* morbus endemius, per nauigationem ad *Europæos* transportata sit; abunde enim constat, hoc malum bello Hispanico cum Gallis *Neapolim* primum peruenisse.
2. Omnis quidem ætas & sexus hoc malum, accedentibus causis occasionalibus, incurrere potest, plurimum tamen iuuenes libidinosi, vtriusque sexus, iustissimam hanc salacitatis suæ pœnam luere coguntur.
3. Dantur autem & alii, qui innocente modo ab hac lue corripuntur, nempe contagio per lectos, pocula, halitus inspirationem, fellas, ephippia, &c.
4. Cum infantibus nonnumquam hæreditate, vel a nutricibus infectis communicatur; quod tamen rarius contingit.

V. CAUSSÆ.

1. Causa *proxima interna* est subtile fermentum venereum, cum corpore communicatum, quod tenacem humorum inspissationem & corruptionem inducere solet, testante sanguine, per venæ sectionem emisso.
2. Causæ *externæ & occasionales*.
 - 1) Nulli homini euenit, nisi absolute per contagium.
 - 2) Sæpissime per impurum congressum, a quo primum gonorrhœa, aut vlcuscula in genitalibus oriuntur, & deinde, post peruersam præcipue tractationem, hoc inquinamentum in totam sanguinis massam diffunditur.
 - 3) Infectio quidem per vestimenta, lectos, cucurbitulas, nouaculas, &c. etiam contingit, sed benignior & fere superficialis obseruatur.

VI. PROGNOISIS.

1. Lues venerea est morbus lentæ & diurnæ indolis, hinc ad plenam eius eradicationem tempus requiritur.
2. Quando malum humores tantum occupauit, citius adhuc profligatur; vbi autem ossium & glandularum profundæ adrosiones iam præsto sunt, ibi tardius & difficilius succedit medicatio.

3. Qui

3. Qui mercurialem salivationem sine successu adhibuerunt, vel ex alia causa in idem malum relapsi sunt, illi in repetendo curationis tentamine maiori periculo exponuntur.
4. Corpora succulenta, perspirabilia, minore periculo & molestia pyalismum tolerant, quam sicca, tenera, densiora.
5. Quando alii morbi cum lue venerea complicantur, e.g. scorbutus, tum difficilior redditur restitutio.
6. Viscerum autem læsio vbi concurrat, ibi status est conclamatus.
7. Quo profundius ossa iam erosa sunt, eo magis post medicationem recidiva metuenda est, vel malum plane insuperabile obseruatur.
8. Infectio per vestimenta, lectos &c. vti benignior est illa, quæ per impurum congressum inducitur, ita etiam multo facilius extirpatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Fermentum noxium venereum est *expellendum*.
2. Effectus ab hoc fermento inducti, nempe lymphæ tenax, viscosa, mucida sunt *corrigendi*.
3. Reliqua symptomata, nempe vlcera, bubones, excrescentiæ, scabies &c. sunt *auferenda*.
4. Ad hos scopos obtinendos duo prostant subsidia, therapia scilicet *sudatoria* & *salinatio*, illa in malo adhuc leuiore, hæc in prouectiore adhibetur.

B. Methodus specialis.

1. Corpus ante omnia in vtraque cura *preparandum*, & sordes primarum viarum expurgandæ sunt; in quem finem mercurius dulcis, cum extracto quodam purgante in pilulas redactus, optime conuenit.
2. In *recentiore* malo, & primo leuiore gradu ad inquinamentum expellendum sufficiunt lenia catarrhalia alexipharmaca, e.g. propinetur mane ad 30 - 40. gutt. essentiæ pimpinellæ albæ, bene saturatæ, & regimen sudoriferum coniungatur.

3. Quando contagiosum fermentum *diutius* cum sanguine iam remixtum fuit, partes autem solidæ nondum adroscæ sunt, tum resoluentia fortiora, diuretico, diaphoretica adhibeantur: Conducunt hic tinctura antimonii acris, decocta ex lignis guaiac. sassafras, iuniperi, pini, fraxin. rad. sarsaparill. chin. pimpinell. min. bardan. vincetox. petasitid. herb. saponar. e.g.

Recip. rasur. lign. sassafras vnc. II.

quaiaci.

rad. chin.

sarsaparill. ana vnc. I.

cinnamom.

fem. foenicul. ana drachm. I.

incis. contus. f. species ad decoctum saturatum.

Vel pro pauperibus.

Recip. lign. pini

iuniperi ana vnc. II.

rad. pimpinell. alb.

bardan. ana vnc. I.

herp. saponar. man. L

fem. anisi drach. II.

Hæc decocta, coniuncta per duas vel tres quotidie horas sudatione in stuphis, mane exhibeantur, & pro re nata ad 2-4. hebdomades continuentur.

4. In *summo* huius luis gradu, nempe in statu inueterato symptomatibus fixis, osteocopis, tumoribus duris & ulcerationibus ad ossium adrosionem progredientibus, cura sudatoria non sufficit: hinc ad *saliuationem* per mercurialia confugiendum est, vt lymphæ specifice quasi fermento coagulata, & partibus solidis infixæ, resoluatur & eliminetur. Instituitur autem saliuatio vel per interna mercurialia, nempe mercurium dulcem, vel per unguentum aliquod mercuriale, externe adhibitum.
5. Præmittatur autem saliuationi laxatio superius commendata, & deinde, vt corpus reddatur perspirabile, decoctum lignorum per 4-8. dies exhibeatur.

6. Post

6. Post ea successiue mercurius adplicetur, e.g. vnguentum quoddam mercuriale, primo die carpis, secundo tarris, tertio his & simul furis, pro diuersis mali gradibus & robore ægri (quod tamen non ex lassitudine, sed ipsius indiuidui tota constitutione metiendum est) tam diu illinatur, donec oris interni & glandularum saliuarium intumescencia, dentium vacillatio, tamquam prodromi saliuationis, subsequantur.
7. Succedente saliuatione non statim ab inunctione abstinetur, sed leniter & circumspecte illa paululum continetur.
8. Si *internis* mercurialibus saliuationem suscitare libet, post corporis per laxans & decoctum lignosum factam præparationem, exhibeatur mercurius dulcis, incipiendo a gran. 4-6. & sensim vsque ad scrup. semis adscendendo. Vesperis hæc commode propinantur, subiunctis mane diaphoreticis lignosis.
9. *Durante* saliuatione ori & faucibus sollicitè succurratur per frequentem vsu gargarismatis, ex rad. pimpinell. alb. bardan. helen. vincetox. irid. Florentin. ari, herb. saluix, hyssop. flor. chamomill. sem. fœnugræci; quibus, si opus sit, addatur pro emollitione *ficus*, pro ardore temperando *nitr. & album gracum*.
10. Adrosæ fauces subleuantur etiam essentia succini, pauca essent. myrrhæ, & vna vel altera gutta essent. ligni quaiac. cum aqua destill. rosarum: in malo prouectiore adduntur olea destillata caryophyll. cinnam. cum oleo ovorum vel ol. amygdal. dulc. temperanda.
11. *Vlcerum* venereorum tractatio ad chirurgiam spectat, mundificantur autem vel per essentiam balsamicam, modo dictam, vel per decoctum lignorum, cum exigua portione tincturæ antimonii remixtum.
12. *Nodi gallici* resoluuntur: *externe* emplastr. *Vigonis*, aucta mercurii dosi in duplo vel triplo, vnguento mercuriali, item lamina saturni mercurio illita: *interne* mercurio dulci &c.

13. *Excreſcentias fungoſas abſumit externe mercurius præcipitatus, interne illas reſoluit mercurius dulcis. Pulvis ſtypticus, quem Carolus Muſitanus commendat, conſtat ex alumine vſto & puluere ſabin. ana, qui pulvis excreſcentiæ bis per diem adſpergitur.*
14. *Scabies venerea, vbi coniuncta eſt, paret etiam vnguento mercuriali; & mundificationibus internis. Conf. tabula de ſcabiæ.*
15. *In bubonibus venereis, ſi gonorrhœa ſuppreſſa ſit, hæc reuocanda & corrigenda per catarrhalia diuretica, e.g. eſſent. alexipharm. pimpinell. alb. ſuccini, pyrolæ, decocta antiuenera, mercur. dulc. Externe diſcutit emplaſtr. diachylon cum gumm. vnguent. mercuriale. Maturatio autem promouetur per emplaſtr. de melilotto. Dolores ſopit. emplaſtr. Vigonis, amalgama iouis; & denique apoſtoma mundificatur per eſſentiam baſſamicam lignorum. Conf. tabul. de gonorrhœa.*
16. *Finita denique medicatione aluus laxante quodam repurgetur.*

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Breui tempore in hoc morbo nihil obtinetur, ſed diuturnior medicationis continuatio neceſſario requiritur, quod adeo verum eſt, vt etiam malum adhuc leuius, neglecta iuſta medicamentorum continuatione, facile re-
crudelſcat.
2. Hæc continua medicatio commode fieri poteſt cum omnibus remediis, quæ huic malo opponuntur, excepto ſolo mercurio, nullam enim inſignem mutationem, nedum detrimentum, corpori adferunt, ſi proportio exhibitionis gradui & decremento morbi reſpondeat; vbi autem proportio illa non obſeruatur, ibi calidiora, e.g. lign. guaiaci, ſaſſafras, nimis diu continuata, incommoda, immo damna, inferre poſſunt.
3. Temperamentorum diſtinctio hic omnino uſum habet: ſubiectis enim frigidis decocta, ex peregrinis calidioribus parata, iuncta etiam eſſentia lignorum, egregie conueni-

veniunt; sicciorebus autem & cholericis hæc diluadentur, & temperata magis, e.g. rad. sarfaparillæ, chinæ, cum noltratibus etiam temperatis, quæ virtutes suas tacite quidem, sed satis efficaciter, præstant, commendantur.

4. Diuerfa tractatio diuerfo luis gradui debetur: quamuis enim fortior methodus, quæ grauius malum superat, cenferi videatur, ac si leuiorem morbum tanto facilius profligatura fit: hictamen regula illa: *quod potest minus, potest etiam minus*, non absolute vera obseruatur: neque etiam consultum est, leuiori malo operosius, immo non omni periculo carens, remedium opponere.
5. Quem ad modum enim validiora remedia mercurialia causam morbi, teneriorem adhuc & subtiliorem, non satis adsequi & subigere possunt, sed potius vltimis ipsius corrupti corruptelis & morbi productis magis quadrant: ita leniora e lignosis præsidia, quæ subtilioribus huius indolis corruptelis efficaciter opponuntur, grauiori atque crassiori materiæ minus sufficere, non solum experientia, sed & sanæ rationis dictamen, confirmat.
6. *Lignosa*, in malo iam magis effero, absolute necessaria sunt, cum moderata, sed assidua, commotione sudatoria; quæ tamen in mitiore morbo sub medicamentis huius classis penetrantioribus, quibus rad. pimpinell. alb. optimo iure accensetur, non æque requiritur.
7. *Sudatio* sub multis tegumentis non est consulta, cui illa præferenda, quæ fit in lecto libero, mit Spriegeln, spiritu vini accensio.
8. *Diuresis* sub diaphoresi non negligenda est: materia enim crassa, mucido-salina per sudorem non eliminatur. Vnde tincturæ alcalinæ, e.g. tinct. antimonii. bene acris, huic scopo egregie satis faciunt.
9. *Amara*, in primis *fumaria*, inquinamentum humoribus penitus insinuant, & corruptelas reddunt feruidiores.
10. *Acria antiscorbutica* maiorem acrimoniam corruptelæ venereæ superaddunt. Hinc in complicatione luis venereæ cum scorbutico caute & placide omni gerantur: in statu dubio profunt decocta temperata lignosa cum tin-

- cturis alcalinis, item catarrhalibus, essent. succini &c. donec alterutrius maior vis & corruptela innotescat.
11. Quando sub salivatione corporis & animi debita continentia prætermittitur, tota laboriosa operatio non solum irrita, sed & periculosa, immo sæpe funesta, observatur.
 12. *Vena sectio*, ad præcautionem instituta, molestias in pyralismo subeundas, quodam modo subleuat, præcipue in plethoricis.
 13. *Vires* præ omnibus considerandæ, num ad salivationem, quæ graua symptomata. v.g. tumores faucium, vacillationem, immo adrosionem & casum dentium, ardores pruriginosos, dolores capitis, agrypniam &c. infert, sufficient.
 14. Differentia autem habeatur inter illum virium defectum, qui ab indiuidui statu, & inter eum, qui a morbi crudiore coagulo, profundius & longius iam inhabitante, dependet. Hic si cuneus mitior adhibeatur, & curatio ob virium defectum iusto maturius abrumpatur, irritum est negotium vniuersum: præstat potius ibi analepsi gelatinosa vires reficere, & medicationem legitime continuare.
 15. *Diarrhœa sanguinolenta*, sub pyralismo coariens, non est melioris notæ, & æger ad medicationem talem molestam perferendam vix sufficet. Expostulat autem diarrhœa clysteres lenientes, e decocto hordei & lacte cum oleo amygdal. dulc. & vitellis ouorum paratos.
 16. Omnia illa subiecta ad salivationem perferendam inæpta sunt, quæ vitio aliquo viscerum, in primis pectoris, laborant.
 17. Quando autem dolores sub salivatione mitescunt, immo evanescent, vlcera exsiccantur, & bubones pereunt, cum de felici curæ successu non dubitandum est.
 18. Salivatio per externa mercurialia præferenda est illi, quæ per interna excitatur, nisi forte hæc illis succurrere debeant.

19. *Vnguenta* mercurialia præstant emplastris segnioribus, ex mercurio & gummi-resinis præparatis.
20. *Suffimigium* per mercurium, vel cinnabarin, prunis iniectam, penetrans quidem est, sed incertæ efficacæ; caput etiam, & pectus a fumo tali, nisi in stupha adhibeatur, facile offenduntur: vnde præstat inunctio partium exsanguium, tendinosarum; vbi spinæ dorsi parcendum, ne stupores & paralytes introducantur.
21. *Aqua mercuriali* extrinsecus vti, periculosum est.
22. *Vfus mercurii corrosiui*, quem *Blancardus* loco mercurii dulcis commendat, turpethi mineralis, arcani corallini, non suadetur, cum tutiora & meliora nobis suppetant.
23. In *gargarismatibus*, si adstringentia adhibeantur, saliuatio impeditur. Sic etiam acida & refrigerantia eandem præpediunt.
24. *Saliuatio* ad minimum sufficiens sit, ne repetitio cum maiore periculo necessaria euadat; satis autem est, quando post materiam fluidiorem, mucosam similem, spissa foetida saburra magis magisque eiicitur: desistendum, si tormina, vomitus, diarrhœa, spasmi, stupores superuenerint, & diapnoicis insistendum: in primis autem ab vfu mercurii interno tum desistere conuenit, quia hæc accidentia hunc magis, quam externum vsum comitantur.
25. *Saliuatio spuria*, seu *sputatio* per medicamenta ærea, ab *Heluetio* commendata, satis quidem efficax, sed periculo stipata est: graues enim ventriculi & intestinorum perturbationes, nauseam diurnam & flatulentias generat, immo multi inde in hydropem coniiciuntur. Proprie enim non est saliuatio, sed tantum sputatio ex ventriculo & faucibus scaturiens, a constrictis partibus externis, & repulsione humorum versus stomachum proueniens. Vnde nausea continua. *Glandula* autem *saliuales* nullo modo adficiuntur.
26. *Ulcera* externorum venereorum tractatio sine præmissa interna & iusta medicatione intuta est, & nullius etiam effectus; speciatim adstringentia materiam gumma-

- tum Gallicorum repellunt, vt deinde ossa adrodere soleat.
27. Si vna saluatione malum non penitus extirpetur, tum repeti illa potest, maxime si prior libere successerit, & æger sit robustus.
 28. Quando autem malum quibuscumque methodis non cedit, tum iusta suspicio subest, quod in illo loco, vbi profundiores ardores sentiuntur, ossis adrosi corruptio hæreat, & chirurgicam manum exspectet, v.g. cranium adrosi dolores capitis continuos per aliquot sæpe annos excitat, & omnem medicationem internam adspernatur.
 29. Vbi vires præsto sunt, ibi saluationi laxatio ex mercurio dulci, vel clystere, interponatur, prætermissa illo die inunctione.
 30. In saluatione nimia sulphur adhibere, aut regimen sudoriferum, minus conuenit, alius potius leniter laxetur, & inunctio, vti modo dictum, illo die omittatur, ac, quod reliquum est, naturæ commendetur.
 31. *Essentia pimpinella* albæ optime se gerit in turbis & molestiis, a mercurio subnatis; eiicit quoque, si quid forte mercurii in corpore adhuc latet, deglutiendo gutt. 12-15. sine vehiculo, quæ ardorem quidem fremebundum, mox autem sine noxa euanescentem, excitat.
 32. *Radix china Thonerus* tamquam specificum commendat, id quod vsus docebit.
 33. Lenis *diaphoresis* sub ipsa saluatione non solum conuenit, sed etiam quodam modo necessaria est, neque facile timendum, vti auctores quidam, alii ex aliis, mutuo transcribunt, ne ipsa saluatio per eandem sufflaminetur, vtpote quod non, nisi *confertim* instituta & continuata, efficere solet.
 34. Itaque regimen directe sudatorium, (non autem lenior diaphoresis) vti saluantem mercurii effectum impedit, ita, quamdiu mercurius in humoribus oberrat, nudæ evacuationes diaphoreticæ metum faciunt, ne *partibus* altius sese impacturus sit: vnde grauissima pathemata,

- nempe paralyfes, tremores, dolores fpaltici, ariduræ, inducuntur.
35. Maiore adhuc circumfpectione indiget enchirefis illa, hodie circumgeftata, quæ mercurium *non faliantem* præparare & exhibere docet: faliffimum enim eft, illum non mouere faluationem, fed in eo tantum enchirefis confiftit, vt cum regimine fudorifero exhibeatur; quo intuitu *quilibet* mercurius, nifi enormibus plane dofibus ingeftus, faluatorium effectum amittit.
36. In malo grauiore, maxime fub faluatione, *diata* fit tenuis, euchyma, non autem aromatica, liquidorum præcipue ciborum, quos dentium, ad mandendum ineptorum, eonditio etiam expofcit, cum potu hordeato, diluto lignorum decocto, aut cereuiffia optime defæcata: falfa fane & acida adfumta mercurium deteriozem reddunt, cruda vero & craffiora vias & ipfas excretionem temerant.
37. In primis æger iuftam *caloris* conferuationem cordi habeat: abftinendo a motu inquieto, in grauiore malo certiffime noxio, item a liberi aëris, maxime frigidi, admiffione, quæ faluationem reprimat, & damna fere irreparabilia adfert.
38. Chirurgorum *feptica metallica* nocent, & ad malos in offibus euentus sæpe contribuunt.
39. *Bubones* venerei non fponte tendunt ad fuppurationem, & hinc ad gonorrhœæ reuocationem fufficiens tempus concedunt. Empl. de galban. matricale cum fuccino, per terebinthinam foluto, mixtum mirifice *bubones* refoluit, & materiam hanc per gonorrhœam, vel fluorem album eliminat. Dicitur alias *unguentum Paracelfi*, quod in vulneribus venenatis commendat.
40. *Mercurii dulcis* dofes ad grana 20. immo 30. augere, vti vulgo commendatur, neque neceffarium, neque confultum ducitur.

TABVLA XCVII.

DE

VITIIS SVDORIS.

I. DEFINITIO.

Vitia sudoris *triplici* respectu consideranda veniunt:

1. Velenim sudores sunt *nimii*, qui matutino præcipue tempore post horam tertiam, in aliis periodice, in aliis fere quotidie, erumpere solent.
2. Vel adsueta sudores sunt *suppressi*, vnde varia pathemata succedunt.
3. Vel dantur subiecta, in quibus singularis plane ad sudandum *difficultas* obseruatur.

II. SVBIECTA.

1. *Nimii sudoris.*

- 1) Homines plethorici, temperamenti sanguineo-phlegmatici, spongiosi, qui, quando leuiter solum corpus mouent, sudorem copiosum statim experiuntur.
- 2) Talia subiecta ad sudores etiam nocturnos, præcipue circa æquinoctia inclinant.
- 3) Hæctici, quando ad mortem properant, copiosos tales sudores incurrunt.

2. *Suppressi sudoris.*

- 1) *Infantes*, quando, sudore madentes, per imprudentiam matrum vel aliarum aëri exponuntur.
- 1) *Adultiores*, qui consueta huius excretionis tempora negligunt, vel corpus in sudore constitutum immoderatus refrigerant.

3. *Difficilis sudoris.*

- 1) Difficultas sudandi in illis præcipue corporibus apprehenditur, quæ dyscrasia humorum lenta, mucida, spissa, laborant.
- 2) Non minus etiam in subiectis teneris, sensibilibus, macilentis, ebullitioni sanguinis obnoxiiis:

III. CAVS-

III. CAUSSAE.

1. *Nimii sudoris.*

Hecticos sudores, in quibus *passivus magis* fluxus occurrit, si excipiamus, reliquæ sudoris copiosi excretiones pro causa *efficiente* agnoscunt principium *actiuum* vitale, quod plethoram, tamquam causam *materialem*, facta sanguinis in serum resolutione, imminuere intendit.

2. Cautiæ sudoris *suppressi & difficilis* ex iis elucescunt, quæ præcedente membro de subiectis dicta sunt.

IV. PROGNOSIS.

1. Sudor *nimius*, sibi relictus, licet vires aliquo modo exhauriat, tanti tamen non est periculi, quam si vere cohibeatur.

2. Quando autem talis sudor copiosus, cum hectica coniunctus est, statum conclamatum designat.

3. Sudores *suppressi* pro ætatis & subiectorum diuersitate modo adfectus cutaneos, scabiem, crustam lacteam; modo catarrhales, coryzam, grauedinem; modo congestiones, febres, inflammationes, immo conuulsiones, inducunt.

V. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quam diu sudores tolerabiliter adhuc procedunt, licet *nimii* videantur, leniter potius promouendi quam supprimendi sunt: hinc tranquilla corporis continentia, moderatus calor, & sufficiens dilutus potus, ne sanguis multa sudatione spissescat, commendantur.

2. Quando autem sub hisce sudoribus vires nimium concidunt, temperantia nitrosa per diem, & gemmata cum leni anodyno versus somnum locum habent, e. g. exhibeatur ter vel quater puluis antispasmodicus, cum absorbente quodam citrato remixtus, & versus noctem huic pulueri grana IV. specierum de hyacintho cum gran. I. M. P. de cynoglossa adiiciantur.

3. Sudores *hectici* tractentur secundum methodum, quæ tabula de febre hectica indicata est.

4. In sudoribus *suppressis*, & pathematibus anxietatis, immo

febrilium commotiouum, succedentibus, sequens medicatio instituat:ur:

- 1) Ante omnia nitrum cum absorbente quodam & antimonio diaphoretico singulis ternis horis exhibeatur, in primis si Medicus mature vocatus sit, ad summum post duodecim horas: hac enim ratione deterior successus sæpius præoccupatur.
 - 2) Quieta corporis continentia iniungatur; quæ quantum ad sudoris reuocationem contribuat, experientia confirmabitur.
 - 3) Potus calidus thée, coffée, vel infusum herb. scordii, præcipue illis, qui huic rei adueti sunt, propinetur, interposita subinde refracta, sed repetita dosi essentia alexipharmacæ *Stablii*.
 - 4) Aluus, si nulla adsit febris maligna, exanthematica, vel leni clystere, vel alio laxante balsamico remedio aperiat.
 - 5) Vbi autem per eius modi suppressionem sudoris verus iam morbus inductus est, ibi ad hunc potissimum in medicatione respiciatur.
5. Qui *difficulter* vel *plane non* sudant, iis *radix ari* cum vino, vel etiam cochlear. I. aceti exhibeatur, & calidus haustus ei superingeratur; sub quo remedio, si modo in lecto vel alias quietam continentiam seruent, eximio sæpius sudore adficiunt. Reliqua cum sudorum suppressorum tractatione conueniunt.


VI. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Sudores *copiosi*, licet per aliquot menses continuent, numquam tamen Medicum eo perducant, vt per adstringentia hanc excretionem cohibeat: graua enim symptomata, quæ presso pede sequuntur, longe maioris sunt considerationis, quam virium aliqua debilitatio, per illos sudores inducta.
2. Ad sudores suppressos *reuocandos* remedia calida, sanguinem exagitantia, & regimen calidum, minime conueniunt, e.g. alexipharmaca acria, olea destillata siue volatilia, siue empyreumatica.

3. Tan-

3. Tanto magis autem excalefactoria diaphoretica eius modi subiectis nocent, quæ ad sudandum difficilia sunt: sudor enim non procedit, hinc orgasmus sanguinis augetur.
4. Ad hoc incommodum euitandum eximie inseruit, remedia talia refracta & repetita dosi exhibere, e.g. essent. alexipharm. ad gutt. XX. post 4-6. horas repetendo: interposito puluere ex antim. diaphoret. cum absorbente, & si lentor humorum præsto sit, sale digestiuo; præfente autem sanguinis orgasmo nitrum coniungendum est.
5. *Vena sectio* tempestiua & opportuna multum prodest ad promouendos sudores, de qua re videatur dissertatio D. D. *Stahlii de vena sectione in acutis.*
6. In chronicis malis *balnea* egregie conducunt ad sudorem eliciendum: humidus enim illorum vapor, corpori adlabens, aperit poros; quando autem caput a calore in balneis adfligitur, & hinc maiores versus caput congestiones & sanguinis ebullitiones oriuntur, *stupha sicca* seu *balneum Laconicum* locum habet, sed neque ibi nimio sicco calore corpus calefaciendum est, effectus enim non semper obtinetur, & sic, commotis humoribus, pathemata exacerbantur.
7. Præstat autem puram aquam dulcem ad balnea adhibere, quam vinum, quod tonico potius scopo inseruit; ab aceri vero adstringentibus caloribus & vaporibus cauendum est.
8. *Frictiones*, tum in balneis, tum in *stupha sicca*, siue manibus siue pannis mollioribus peractæ, poros relaxant, & hinc sudorem egregie promouent; quæ frictiones in ipsis etiam lectis, adparente aliquo madore, locum habent, quando exanthemata non bene procedunt; cauendum tamen, ne sub hoc actu frigore corpus percellatur.
9. Sic etiam in promouenda sudatione ab omnibus *adstringentibus* abstinendum est, e.g. a rad. bistortæ, tormentalis, immo in sensibilibioribus ab ipsis coralliis, multo

- magis a terris sigillatis in febribus, quo nomine etiam pulvis *pannonicus ruber* suspectus est.
10. In talibus casibus, in primis febribus, *theriaca* a gran. XX. XXX. versus noctem dari potest, nisi paroxysmus in illud tempus incidat; quo casu aliquot horas ante vel post præcipuum eius impetum exhibenda erit; *extra-ctum* autem *theriacale* moderatissime sumendum est, plurimum enim de *opio* participat.
11. Ad promouendam sudationem multum etiam conferunt *vesica*, aqua calida repletæ, & pedibus, axillis, scrobiculo cordis, inguinibus, adligatæ. Sic etiam propior pedum calefactio admota lagena vsu suum præstat.
12. Si sudores in *infantibus* repellantur, mox male se habent, & æstu febrili, immo conuulsionibus subinde funestis, corripiuntur; quo casu in moderato calore seruentur, absorbentia fixa ipsis propinentur, nutriti vero essentia alexipharm. ad gutt. 30 - 35. exhibeatur. Conducit quoque frustulum camphoræ collo adpendere.



TABVLA XCVIII.

DE

STRANGVRIA, DYSVRIA,

ET

ISCHVRIA.

I. DEFINITIO.

1. *Stranguria* est difficilis vrinæ excretio, guttatim tantum contingens, & dolore spasmodico circa sphincterem & collum vesicæ stipata. Deriuatur a $\sigma\sigma\alpha\gamma\zeta$, gutta, & $\upsilon\rho\omicron\nu$, vrina.
2. *Dysuria* est difficultas mingendi, cum ingente nisu & pressione coniuncta, aliquando a renum, aliquando a vesicæ vitiis originem ducens. Deriuatur a $\delta\upsilon\varsigma$, ægre, & $\upsilon\rho\omicron\nu$, vrina.

3. *Ischu*.

3. *Ischuria* est urinae per aliquot subinde dies suppressio, ita ut ne quidem stimulus ad eam excernendam ab ægro sentiat. Derivatur ab *ἰσχύς*, validus, & *ἔρον*, urina.

II. DIFFERENTIA.

1. Hæc urinae vitia non nisi *gradu* differunt:
- 1) In *stranguria* mingendi difficultas tolerabilior est, & sensum magis frigoris, quam ardoris inuoluit, & licet guttatim tantum procedat, ratione tamen temporis & quantitatis celerius accopiosius excernitur, quam in *dysuria*.
 - 2) *Stranguria* est quasi medium quid, & morbus ex *ischuria* & *dysuria* compositus. De reliquo est vel transitoria, vel durabilis; Item vel idiopathica, vel symptomata nephriticorum.
 - 3) *Ischuria* diuisio in *propriam*, in qua urina ob vesicam nimium repletam & accedentem spasmodicam tensionem suppressa dicitur, & *impropriam*, vbi nulla talis urinae abundantia, sed alia impedimenta subesse putantur, in praxi habet utilitatem.
2. Cum hisce malis non debet confundi *simplex* urinae imminutio, quæ vel post largos sudores, vel diarrhœas, vel exiguum potum contingit, & sine doloribus ordinarie manifesta est.

III. SIGNA.

1. *Stranguria*.
 - 1) Frequens irritatio ad mingendum.
 - 2) Excretio urinae modo guttatim, modo paullulum notabilius procedit.
 - 3) *Inter* mingendum sensus magis frigescens, *post* mictum vero ardor sentitur.
 - 4) Succedunt reliqui corporis frequentes horripilationes.
2. *Dysuria*.
 - 1) Difficultas mingendi, ita ut æger cum ingente nisu & pressione urinam exprimere cogatur.
 - 2) Dolores summe æstuantis, non solum *sub* urinae excretionem

tione adfligentes, sed etiam post eandem aliquamdiu perseverantes.

3. *Ischuria.*

- 1) Urinæ excretio per aliquot dies plane cessans, vix accedente aliqua ad eandem inclinatione.
- 2) Vbi a vitio vesicæ malum dependet, ibi æger defensu pressionis & tensionis in regione pubis conqueritur.
- 3) Quando autem renes vel ureteres in culpa sunt, tum dolores lumbares, ischiadici, interdum cardialgici, immo ipse vomitus, iunguntur.
- 4) Si tumori inflammatorio originem debet, dolores sunt lancinantes, æstuosi, & calor corporis præternaturalis.

IV. *SVBIECTA.*

1. *Stranguria.*

- 1) Hanc plerumque incurruunt homines, qui uno eodemque tempore potum variant, vel talem faculentum & fermentescentem bibunt; quo etiam mustum referendum est.
- 2) *De potu versus somnum vid. cautel.*
- 3) Qui abdominis refrigerationem immodestam admittunt.

2. *Dysuria.*

- 1) Hæc corripit ordinarie nephriticos vel calculosos, nonnumquam etiam illos, qui sub stranguria nominati sunt, vel cantharides adhibuerunt, unde erosio colli vesicæ exorta fuit.
- 2) Conspirat etiam subinde cum motibus spasticis, in statu hysterico occurrentibus.

3. *Ischuria.*

- 1) Huic obnoxii sunt homines potissimum plethorici, sanguinei, ætatis maxime iuuenilis & virilis.
- 2) Qui calidis, spirituosis & diureticis abutuntur.
- 3) Qui subsequenteribus causis aduentitiis obnoxii fiunt.

V. *CAVSSAE.*

1. *Stranguria.*

- 1) Causa proxima est spasmodica colli & sphincteris vesicæ

cæ constrictio, ad excutiendum aliquid circa hæc loca molestum.

- 2) Hinc fermentescens vrinæ acrimonia, quæ vulgo hic adlegatur, hoc negotium non exhaurit.
- 3) Causlæ *occasionales* & *procatartica* in descriptione subiectorum iam indicatæ sunt; quibus in symptomatice stranguria adhuc accedunt nephritica pathemata.

2. *Dysuria.*

- 1) Dysuria interdum a renum, interdum a vesicæ viciis dependet, & pariter pro causlâ *proxima* spasmodicam colli & sphincteris vesicæ constrictioem agnoscit.
- 2) Causlæ vero *occasionales* & *procatartica* in *subiectis* denominatæ sunt, quibus adnumeranda est diætâ salsa, acris, cruda, aromatica.

3. *Ischuria.*

- 1) *Hippocrates* iam obseruauit, ischuriam seu vrinæ suppressionem sæpius a plethora prouenire; cuius rei *Rincrius* duo habet exempla.
- 2) Facta scilicet vndecumque ebullitione sanguinis, congestio fit ad renes, hinc oppletio meatuum exoritur, cui facile accedit spastica sphincteris vesicæ contractio.
- 3) Causlæ *procatartica* & aduentitiæ sunt:
 - a) Calculus, sabulum, vermis, grumus sanguinis, vel purulenta quædam materia, collum vesicæ obstruens.
 - b) Caruncula venerea, tumor inflammatorius.
 - c) Grauiditas, tempori partus adpropinquans.
 - d) Tenesmus ob connexionem intestini recti.
 - e) Copiosus potus, neglecta dehinc mictione.
 - f) Violentiæ externæ.

VI. PROGNOSIS.

1. *Stranguria* simplex & idiopathica plus incommodi, quam periculi, inuoluit.
2. Quo sæpius autem recurrit, eo certius nephritidem calculosam prænunciat.
3. Senibus periculosior est, quam iunioribus. Conferatur *Hippocrat. aphor. 44. sect. VI.*

4. *Dysuria* eiusdem fere cum *stranguria* est prognoseos.
5. Quo diutius dolores infestant, eo magis febris vel conuulsio pertimescenda est.
6. *Ischuria* autem longe periculosior existit, maxime si iam per aliquot dies durauerit; ante septimum enim diem nisi collatur, febris inflammatoria succedit, quam præceps sæpe sphacelus & mors cum singultu & conuulsionibus excipiunt.
7. Disponit etiam *ischuria* ad hydropem, sicut vicissim hydropici hoc symptomate anguntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Stranguria* & *dysuria* vna eademque methodo tractantur, nempe
 - 1) *Acrimonia* materiæ fermentatiuæ in sanguine oberans, & nouos ardores, facta circa renes congestione, inducere valens, est obtundenda.
 - 2) Motus *spastici* sunt desulcendi.
 - 3) Vtræque hæ indicationes nullo remedio præsentius & tutius expediri possunt, quam nitro, siue solo, siue cum sale abstersiuo, vel absorbente acido semifaturato, & portiuncula cinnabaris, remixto, ac sæpius per diem ad scrup. I. exhibitio.
 - 4) Conducunt etiam emulsiones ex semin. card. Mariæ, bardan. papau. alb. ol. amygdal. dulc. cum saccharo cand. Item pilulæ ex terebinth. coct. gummi Arabico, decoct. hordei cum rad. glycyrrhizæ, scrup. althææ, potus calidus dilutus: subiunctis tandem roborantibus ex cortice aurant. nuc. moschat, gemmat.
 - 5) *Externe* conducunt.
 - a) Seuum hircinum, vmbilico calide illitum.
 - b) Cepæ tostæ, cum butyro frizæ, & regioni pubis applicatæ.
2. *Ischuria*, pro diuersitate caussarum, diuersas requirit medicationes.
 - 1) Ante omnia aluus aperiatur per clysterem emollientem, ex veronica paratum: hac enim soluta, spes maior est ad vrinæ prouocationem.
 - 2) De-

- 2) Deinde, ad stasim inflammatoriam in abdomine præocupandam, & materiam peccantem temperandam, exhibeantur nitrosa, absorbentia, & cinnabarina.
- 3) His præmillis respiciantur causæ specialiores.
- 4) Vbi plethora, orgasmus sanguinis, & illius ad renes congestio peccat, ibi, nisi prædicta sufficiant, venæ sectio in pede instituat, externe autem vnguentum *Comitissæ* camphoratum adplicetur.
- 5) Quando spastica renum & vreterum constrictio hoc nialum fouet, relaxantia in vsum veniant, e.g.
 - a) *Interne* puluis antispasticus sæpe repetitus, laxantia fennata, passulata, cum semin. carminat.
 - b) *Externe* balnea, linimenta oleosa paregorica ex vnguento *Comitissæ*, refrigerante *Galenî*, cataplasmat. emollient. fotu carminatiuo lumborum.
- 6) Si *calculus*, mucus tenax, grumus sanguinis, vermis, vrinæ prouentum impediat, præter clysterem & pulverem antispasmodicum, cateter adhibeatur; vel, calculo vrethræ impacto, iniectione oleorum in eandem aliquid tenetur.
- 7) *Nephritis* quando in causis est, hæc primario respiciatur, & secundum methodum, tabula de nephritide commendatam, tractetur.
- 8) *Caruncula* venerea, si obsistat, methodo chirurgica septicis ahsumatur, & in grauiore malo cura venerea coniungatur.
- 9) Tumor inflammatorius, si collum vesicæ obsideat, discutientibus & resoluentibus internis ac externis solvatur.
- 10) Erosione aut vlceratione præsentente, balsamica vsui sunt, præcipue pilulæ, ex terebinthina cocta paratæ.
- 11) In *infantibus* ischuriam expediunt: lapis percar. præparat. solutio conchar. & catarrhalia, nutricibus propinanda.
- 12) Deinde quando vrina aliquo modo succedit, lenia diuretica subiungantur, e.g. sem. dauci, bardana,


næ, violarum, bacc. alkermes, succ. raphani; interpositis subinde laxantibus.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In omnibus vrinæ vitiis *caussa antecedentes* probe explorentur, quia peritæ prognosi & tutæ tractationi inferuunt.
2. Si vsquam alibi, certe in hoc lumborum & renum malo ab *opio* abstinendum est. Calculo autem in vesica hærente & grauius vrgente, M.P. de cynoglossa locum habet, coniuncto vsu clysterum & pulueris antispasmodici.
3. *Diuretica*, vere stimulantia, præcipue ante materialis causæ & spasmodorum remotionem vsurpata, augment adfluxum humorum, dolores & anxietates.
4. *Emulsiones* ex aquis diapnoicis, discutientibus, amygdal. & sem. card. Mariæ, lappæ maior. vsum habent, quando per ipsa initia malum pertinacius se gerit, & aliis medicamentis non statim obsequitur.
5. *Clysteres* emollientes, ex herbis & radicibus leniter lubricantibus & carminatinis, cum multo sale & oleo anethi, chamomill. parati, ad vrinam leniter expediendam non contemnendi sunt. Pro vno clystere salis communis vncia semis sumatur; si vero sal geminæ magis placeat, drachmæ II. sufficiunt.
6. *Nitrum* tantum hic præstat, quantum ab vlllo alio medicamento expectari potest, modo in substantia exhibeatur: acidum enim illius spiritum intra corpus sumere, non adeo consultum est, siquidem in maiore copia corrosivus, in minore vero inefficax deprehenditur. Sic etiam *dulcis nitri spiritus* est satis potens diureticum, & ad vrinam excernendam multum stimulat.
7. In viarum vrinariarum, vti & pectoris chronicis pathematibus, *vrina* tempore exacerbationis est tenuis, clara & sanis sæpe simillima, extra paroxysinum autem turbida adparer.
8. *Virga aurea Gesneri*, & *hedera terrestris*, tamquam specifica passim quidem commendantur, sed conspicuam efficaciam non exhibent; quod si tamen ex herbarum tali-

um traumaticarum censu aliquid tentare placeat, viæ prius & excretiones expediantur, alias, si speratum speciale effectum non exhibeant, generalem adstrictorium tanto certius exserunt, & hac ratione incommoda augent.

9. Semen *violarum Crato & Hoffmannus* singulari encomio efferunt.
10. Syrupus *althææ*, cum cochlear. vini sumtus, præsentem opem ferre laudatur: id quod remedium *Argentorati* v-sitatissimum est.
11. *Talis leporum*, forma pulueris adhibiti, in spasmodica renum constrictione specificè laudantur.
12. *Testæ ouorum* calcinatæ in vino Rhenano exhibitæ, eximiæ virtutis prædicantur, *vid. praxis Barbette*, alius autem semper prius soluatur.
13. *Stranguria* auscultat sæpissime folis diluentibus calidis, e. g. tnée, coffée, tanta copia adhibitis, donec lenis diaphoresis succedat, coniunctis, si necessarium videatur, temperantibus, nitrosis.
14. In *dysuria*, a cantharidum vsu inducta, lac calidum copiosum bibatur. Illustris *Boyle* saponem Venetum in hoc casu maxime extollit.
15. *Vena sectiones* tempestiuæ frequentes commotiones præoccupant.
16. Notus est vir quidam 30. circiter annorum, qui per integrum annum frequente *stranguria* vexabatur. Adhibebantur multa remedia, sed sine effectû. Tandem interdicebatur ei potus, qui versus somnum illi familiaris erat, a quo tempore omnis stranguria euauit, licet per diem eadem cereuisia semper vsus fuerit.



TABVLA XCIX.

DE

INCONTINENTIA VRINAE.

I. DEFINITIO.

Incontinentia vrinæ est inuoluntaria huius liquoris excretio, vel continenter vel per interualla contingens.

II. DIFFERENTIA.

1. Incontinentia vrinæ duplici modo consideranda est:
 - 1) Alia enim in dormientibus tantum ex peruersa consuetudine contingit.
 - 2) Alia vero a paralytica sphincteris vesicæ læsione dependet: hæc continuo quidem, sed guttatim solum procedit, & hinc *stillicidium* vocatur.
2. Diuiditur etiam in
 - 1) *Idiopathicam*, a modo dictis causis dependentem, &
 - 2) *Symptomaticam*, moribundis aut prægnantibus, sub tussi, sternutatione aut cachinno, euenientem.

III. SIGNA.

1. Hæc per se factis sunt manifesta, & ex iis, quæ sub *differentia* dicta sunt, magis elucescunt, nempe
2. In aliis vrina nocturno tempore præter voluntatem notabili quantitate excernitur.
3. In aliis autem, qui paralyti sphincteris vesicæ laborant, vrina dies noctesque per stillicidium procedit.

IV. SVBIECTA.

1. *Infantes* quando dormiendo vrinam emittunt, pro morbo non reputatur.
2. Vbi autem hæc actio ex immorigera consuetudine in ætatem puerilem & ulterius transit, grauiore momento æstimanda est.
3. *Stillicidio* vrinæ laborare obseruantur:
 - 1) Puerperæ, ruditer in partu tractatæ, in primis primiparæ *seniores* post dystociam.
 - 2) Paralytici annosiores.
 - 3) Calculosi, præcipue post imperitam lithotomiam.
 - 4) Hæmorrhoidarii, vel a suppressione fluxus huius consueti, vel ex fistulis hæmorrhoidalibus, ad vesicæ cololum vsque serpentibus.
 - 5) In apostemata vesicæ, lapsus, contusiones externas circa hæc loca deuoluti.

V. CAUSSÆ.

1. Causſa miſtionis ſub ſomno in mala conſuetudine ſæpius quærenda eſt, accedente dormientibus iſtis phantaſtico mingendi deſiderio. Interdum autem vitium ali- quod veſicæ, e.g. concretio, reperitur,
2. Cauſſa vero ſtillicidii vrinæ eſt vel paralyſis ſphincteris ve- ſicæ, vel violenta partium continentium læſio, diſſectio, laceratio, ruptura.
3. Cauſſæ *occaſionales* & *violente externa*, in deſcriptione ſub- iectorum denominatæ ſunt.

VI. PROGNOſIS.

1. Miſtio nocturna, quæ dormientibus ex peruerſa tantum conſuetudine euenit, nec adeo inueterata eſt, ſæpius ad- mittit curationem.
2. In febre *acuta* inuoluntaria talis miſtio ſignum eſt agoni- zantium; facta autem in ſtatu deliro exceptionem ad- mittit.
3. Stillicidium vrinæ, a paralytica ſphincteris veſicæ deſerti- one, ſiue ſpontanea, ſiue violenta, dependens, quo diu- tius durauit, eo inſanabilius iudicatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Miſtio *inuoluntaria nocturna* iuniorum optime tractatur.
 - 1) Minis & virgis, ad negligentiam coërcendam. Vbi autem vitium veſicæ ſuſpectum merito eſt, hiſ reme- diis nihil efficitur.
 - 2) Prouida diætã, denegando eis poſt meridiem potum copioſum, iniungendo verſus ingreſſum lecti vrinæ miſſionem, & detinendo illos a diureticis.
 - 3) Vbi autem *atonia* tandem in culpa eſſe deprehenditur, roborantia & ſpecifica, inferius denominata, adhi- beantur.
2. Stillicidium vrinæ, a paralytica ſphincteris veſicæ deſerti- one dependens, expoſcit.
 - 1) *Roborantia neruina*.
 - 2) *Interna*, qualia ſunt ſic dicta antepileptica, cinnaba- rina, coralliata, gemmata, item gummi iuniperi ma- ſtich. ſuccin. eſſent. cortic. aurant. nucis moſchar

b) Ex

b) *Externa*, e.g. herb. serpill. rorismarin. salu. puleg. maioran. betonic. organ. item castor. lumbric. ter- restr. in sacculo cum vino cocta & calide adplicata. *Balsam.* ex oleo nucis moschat. express. cum oleis destillatis serpilli & succini mixt. & perinao adplicat. item *therma*, *fomenta* e succino, thure, mastiche, accensis.

2) *Specifica* prædicantur:

a) Guttur galli, caponis, tostum & in vino rubro propinatum: tunicæ interiores ventriculi gallinarum combustæ.

b) Testiculi leporis combusti.

c) Cinis murium.

d) Vesica apri cum lotio combusta: vulua suis quocumque modo vsurpata.

e) Piscis a lucio pisce deglutitus.

f) Erinæci vsti drach. ij. in 4. part. de quibus versus somnum vna dosis sumitur.

g) Hæc omnia, vel per se, vel cum nuce moschata remixta exhibeantur.

3. Quando malum ab *apostemate* vel vlcere colli vesicæ dependet, balsamica locum habent, e.g. mastix, terebinth. coct. gummi iuniperi.

4. Vbi vero incontinentia vrinæ oborta est a violenta partium continentium *læsione*, ruptura, dissectione, &c. ibi congrua chirurgorum instrumenta plus valent, quam pharmaceutica curatio; commendatur tamen amuleti- ce *buso* exsiccat, sub axillis gestatus, *conf. Henrici ab Heer obseruat. medicas.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Adstringentia* vbique cautissime in vsum vocari debent, præcipue in senibus calculosis & puerperis, quibus lo- chiorum fluxus facile inde supprimitur.


2. *Diuretica* pharmaceutica & diætetica prudentem subordinacionem postulant.

3. *Laxantia* maiorem vsum præstant.

4. In puerperio, si vterus prolabatur, relaxato simul sphinctere

tere vesicæ globulus cereus, croco martis vel terra vi-
tricoli dulci leuiter conspersus, immittatur.

5. Ad prophylaxin puerpera a præmaturo parturienti la-
bore, item rudi partus per obstetricem promotione, &
refrigeratione muniatur, calor autem, ligatura abdo-
minis, & neruina externe imposita, adhibeantur.
6. Infantibus calculosis & stillicidio vrinæ laborantibus, ab-
sorbentia, lapis percarum, & externe cataplasmata so-
latium præbent.



TABVLA C.

DE

D I A B E T E.

I. DEFINITIO.

Diabetes est copiosa, cruda, & velox vrinæ excretio, potulen-
torum adsumptorum proportionem longe superans.
Deriuatur a *διαβαίω*, peruado.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt *gradu*: in aliis enim per annum fere hæc copiosa
excretio contingit, & tamen notabilis hectica accedere
non obseruatur: in aliis autem cum intensa siti, febre
hectica & corporis extenuatione manifesta est.
2. Non confundendus est hic morbus cum larga illa excreti-
one vrinæ, quæ in morbis quibusdam cum leuamine cri-
tice quasi contingit.

III. SIGNA.

1. Vrina tenuis & cruda, nullo sedimento, sed subdulci sapo-
re prædita.
2. Quantitate extraordinaria proueniens.
3. Hanc si retinere velint ægri, lumbi intumescunt, & hypo-
chondria intus grauantur.
4. Ægri de siti immodica, & interno calore æstuante, con-
queruntur; febris autem acuta typica non concurrat.

K k k. k k

IV. SVB.

IV. *SVBIECTA.*

1. Diabetes est rarissimus morbus, quem bis tantum se vidisse *Galenus* scriptis suis testatur.
2. Reperitur autem præcipue in eius modi subiectis, quibus reliqua viscera colatoria læsione aliqua occupata sunt.
3. Hinc speciatim talibus evenit hominibus, qui in morbis, præsertim acutis, præpostere tractati sunt, & sic plerumque symptomaticus est adfectus.

V. *CAVSSÆ.*

1. Causæ *antecedentes* ex modo dictis dilucescunt.
2. Causa *proxima* est ingens excretorii motus urinae perturbatio, quæ non solum serum, verum etiam lympham, ex colliquata pinguedine reductam, ad vias urinarias cum impetu protrudit.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Diabetes viscerum læsionibus sæpissime innititur, & sic eiusdem cum illis est prognoseos.
2. Quo magis inualuit, eo minor spes est restitutionis.
3. Ægroti tamen per aliquod tempus hoc morbo subsistere possunt.
4. Tandem tabe moriuntur.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. Ad *infarctus viscerum* expediendos propinentur aperientia, non adeo diuretica, e.g.
 - 1) *Radic.* cichorii, tarax. polypod. caryophyllat. rub. tinctorum, liquirit.
 - 2) *Herbae* capillares, epithym. &c.
 - 3) *Pilulae*, e gummatibus resolventibus & extractis amaris paratae, e. g. *Beckeri*.
 - 4) *Salia* digestiua media, tartar. vitriolat. arcan. duplicat.
2. Ad *ardores* temperandos hisce iungantur ex acidis vegetabilibus: acetosa, plantag. portulac. it. tinctur. rosar. tinct. flor. bellid. pulvis antispasmodicus, cum præcipitante quodam terreo mixtus, utriusque scopo inferuit; ubi specialius commendari solent cancri fluuiatiles, in clibano exsiccati, tosti, pulverisati & ad drach. I. pro dosi exhibiti.
 3. Ad

3. Ad impetum diureticum quodam modo reuellendum laxantia subinde interponantur; quo nomine sennata, rhabarbarina, cum passulis minoribus laudantur. Fortiora fugiantur.
4. Denique si malum quodam modo remitteret, ad viscerum roborationem tonica subiungi possent, e.g. tinct. vitrioli martis *Ludowici*, cum essent. adianth. alb. item herbæ hepaticæ & spleneticæ subadstringentes, v.g. hepatica nobilis, agrimon. scolopend.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Adstringentia*, si in diabete ad fluxum cohibendum adhibentur, viscera vehementius constringunt, tumores lumborum, immo ascitem & mortem accelerant.
2. *Opiatorum* abusus eadem damna certissime iniungit.
3. Diabetici a calida diætâ, motu corporis vehemente & animi pathematibus sibi temperent; diætâ autem gelatinosa, emulsiva consumptionem corporis, & virium defectum, paullulum resarciant.

TABVLA CL

DE

ADPETITVS EXCESSV.

I. DIFFERENTIA.

Intemperantia in cibis adsumendis differt secundum species.

1. *Addephagia* dicitur, quando cibi
 - 1) vel nimia quantitate & mensura,
 - 2) vel nimis præcipiti ingluvie ingeruntur, quo etiam pertinet
 - 3) *Orexis canina*, der heiß oder Hundß-Hunger, vbi anxie cibos adpetunt ægri, his autem non statim præsentibus, lipothymicis pathematibus corripuntur; quibus superatis de adpetitu tali nihil magis perferunt.

2. *Pica* seu *citta* vocatur, quando absurda peculiari desiderio adpetunt, e.g. cretam, calcem, carbones &c.
3. *Malacia* adpellatur, vbi peculiaria, sed gratiora, esculenta singulariter desiderant.

II. SIGNA.

Immoderatam ingluuiem cibi ordinarie comitantur :

1. Angustia cardialgica & anxietates.
2. Nausea, ructus, & non raro vomitus, vel diarrhoea.
3. I emulenta & vertiginosa capitis afflictio, immo nonnumquam dolores satis vehementes.
4. Grauitas artuum, & languor corporis vniuersi.
5. In abdomine tormina, borborygmi, pressiones oriuntur, vt ægri conquerantur, es liege ihnen toie ein Stein im Magen.
6. Interdum accedunt febres, interdum suffocationes, interdum plane conuulsiones.

III. SVBIECTA.

1. Addephagia præ aliis indulgent pusiones, saporem iam distinguere compotes.
2. Feminæ ad *sensum* quidem satis acutæ, ad *iudicandum* vero hebetiores.
3. Sanguinei & sanguineo-phlegmatici *quantitate* edendi præ aliis peccant; cholericæ autem in *modo* cibi adsumendi sibi nocent, nimio & præcipiti impetu ingurgitando; melancholici præ aliis mediocritatem seruant, nisi inuidia festinationem persuadeat, vel dapes *aliorum* sumtibus offerantur.
4. Qui ab inedia ad plenam & lautam diætam transferuntur.
5. Qui a vermibus, hypochondriacis adfectibus, febribus quartanis, immo ipsa epilepsia, diu obsidentur.
6. *Malacia* euenit grauidis.
7. *Pica* autem non solum grauidas, verum etiam virgines, inordinato fluxu mensium laborantes, vel epilepsia aut vermibus obnoxias occupat; item febre quartana decumbentes.

IV. CAUSSAE.

1. Primaria causa inordinati adpetitus & edacitatis dependet

det a male fundata aſtimatione & opinione ſaporis grati ac deinde a conſuetudinis incitamento.

2. Hinc ens rationis, perperam ratiocinantis, iuſtius accuſatur, quam figura particularum, aut partium textura: quidquid de brutis, ad ſubruendam hanc ſententiam, obiiciatur: hæc enim in tali caſu melius ſæpe vtuntur ratione, quam hominum plerique.
3. Et ſicut nuda mentis fictio legitimum adpetitum ſubuertere, & nauſeam inducere poteſt, ita etiam vorandi cupiditas a nulla alia cauſa dependet, quam a voluntate, non ſufficienter penſitata, ſed primos ſenſuum motus ſequente.
4. In infantibus, quibus cibi ab aliis obtruduntur, ſubest cauſa magis paſſiua; quæ tamen ſucceſſu temporis fit actiua.
5. Cauſæ illius addephagiæ, quæ in modo edendi excedit, ſunt magis occaſionales, nempe fames diu tolerata, feſtinaſtio, ſaporis delectamentum &c.

V. PROGNOſIS.

1. *Addephagia* toti generi humano ineffabile damnum adfert, & ſi in defectu ciborum adſumendorum ſemel, in exceſſu ſane decem millies, peccatur.
2. Iuſtiſſimo itaque titulo potitur *abſtinentia*, quando multorum & magnorum morborum remedium a D. D. *Stahlio* diſſertatione quadam peculiari prædicatur.
3. Quando poſt graviores morbos protinus & immodice cibus capitur, periculum nuper ſuperatum, de nouo, & quidem grauius ægri incurrunt.
4. In iſtis fonticis morbis qualiſcumque intemperantia in peſſimum ſtatum deuoluit ægrotos.
5. Hiſtoriæ abunde confirmant, quod, qui poſt diuturnam famem ad ſatietatem cibum ſuſceperint, repentina morte frequenter fuerint ſublati.
6. E pluribus incommodis, quæ addephagia de reliquo ſanis hominibus adferre ſolet, aliqua, *ſub ſignis* memorata, videantur. Tandem obſtructiones viſcerum, cachexia & atrophia, in infantibus præcipue, inducuntur.

7. De *pica* *Hildanus* bene obseruauit, quod quidam a febre quartana prius restituti non fuerint, quam post peruersi illius appetitus expletionem.
8. Quæ puellæ ante pubertatem *pica* laborant, illæ succedente mensium fluxu sæpius ab illa liberantur; quæ uero menses iam expertæ sunt, vel cum inordinato fluxu talem adfectum incurrunt, in iis difficulter superatur.
9. Idem sentiendum est, si hoc malum hæreditate transmissum sit.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Post cibum auide & intemperanter ingestum mox sufficiens & tenuis potus ad nauſeam vsque exhibeatur, ut vomitus suscitetur.
2. Vomitus autem si sponte succedere recuset, & tamen noxa magnopere vrgeat, per conuenientia emetica prouocetur, e.g.

Recip. tartar. emetic. gr. II-III.


arcan. duplicat. gr. X. M. pro dosi.

3. Aluus quando clausa est, lenissime soluatur, nulla autem ratione stimuletur, ne dolores colico-spastici inducantur.
4. Ad præcautionem temperantia in cibis, & placidus corporis motus plus possunt, quam omnia stomachica & digestiua.
5. *Pica* interdum superatur, quando locus ille, ubi calcem, cretam &c. abradunt, rebus amaris & aduersis illinitur.
6. Quicumque sani in certum aliquem cibum impetuoso appetitu rapiuntur, uti in *orexi canina* seu *bulimo*, *Dhsetts Hunger*, contingit, illis nauſea, & quasi vomituritio excitetur; cui scopo inferuit extractum tabaci, cibo tali parcius remixtum, & saccharo edulcoratum.

VII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Cum grano salis accipiendum est pro uerbum illud: *Spey-Rinder*, *gedenß Rinder*: licet enim infantes largiter edentes, & interdum per vomitum cruditates ventriculi reiicientes, augmentum corporis sumere obseruentur, certis-

- tiffimum tamen est, quod talis vomitus, nisi nimio ciborum infarctu onerarentur, minime ita successurus esset.
2. Hinc nullo modo imitandum est stolidum illud consilium, quod infantes ad nauseam & vomitum cibo subinde explere commendat; tanto minus, quia vomitus ille, antequam prouenit, multas angustias, cardialgias, clamores & languores excitat.
 3. Principium vitale quando, prægressa voracitate, vel per vomitum vel per diarrhœam ab onere suo liberare sese intendit, quam maxime cauendum est, ne excretiones tales, quantumcumque notabiles, inepta arte supprimantur.



TABVLA CII.

DE

ADPETITVS DEFECTV,

SEV

ANOREXIA ET NAVSEA.

I. DEFINITIO.

1. *Anorexia* est nimia a cibis abstinētia, modo a ventriculi deprauatione, modo ab aītoribus caussis orta. Derivatur ab α priuat. & $\delta\epsilon\tau\epsilon\gamma\omega$, cupio.
2. *Nausea* est plenaria a cibis abstinētia, anorexiam gradu quidem superans, eiusdem autem cum hac originis.

II. DIFFERENTIA.

Anorexia & nausea contingunt:

1. vel *idiopathice*, ubi ipse ventriculus est deprauatus;
2. vel *symptomatice*, quo casu vel *diuturniores* sunt hī adfectus, & morbos chronicos, e.g. tabem, hecticam, ascitem, pectoris vel hypochondriorum constantia pathemata, pro fundamento habent; vel *transitorii* magis sunt,

sunt, e.g. in febris, præcipue acutis, quibus feliciter superatis, mox adpetitus redit.

3. De nausea *gravidarum* suo loco dicitur.

III. SIGNA.

Signa horum malorum per se satis quidem clara sunt, notari tamen meretur, quod in *anorexia* sæpe adhuc aliquid, sed sine adpetitu, ægri edant, & mox ab ingestis gravitatem in ventriculo experiantur, in *nausea* vero conatus vomendi facilius accedere soleat.

IV. SVBIECTA.

1. Adpetitus defectum *idiopathicum* incurrunt homines minus temperantes, & insuper otiosi.

2. *Symptomaticam* autem adpetitus deiectionem omnes illi experiuntur, qui morbis, superius nominatis, succumbunt.

V. CAVSSAE.

1. Anorexiæ & nausæ *idiopathica*.

1) Cruditates ventriculi mucidæ, acidæ, nidorosæ.

2) Regurgitatio bilis versus ventriculum post animi excandescentiam tacitam, pastu præcipue mox superveniente.

2. Anorexiæ & nausæ *symptomatica*.

Huius causa est occupatio principii vitalis circa laborem quemdam extraordinarium, ad hunc vel illum morbum profligandum: vnde laborem ordinarium concoctionis, & chyli distributionis, ad tempus prætermittere cogitur.

VI. PROGNOSIS.

1. Defectio adpetitus *idiopathica*, conveniente methodo tractata, tanto facilius superatur, quanto propius ad locum adfectum medicamenti hic concessus est aditus.

2. *Symptomatica* autem adpetitus deiectio prius non tollitur, quam si morbus primarius fuerit sublatus: hinc quo magis ille pertinax, eo pertinacius etiam est vitium adpetitus.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Idiopathica* adpetitus deiectionis

- 1) In caussa cruditarum mucosarum primo loco exhibeantur digestiua salina, e.g. tartarus vitriolatus, nitrum antimoniac. nitrum vitriolicum *Ludouici*, &c.
 - 2) Deinde, si nihil contra indicet, vomitorium præscribatur, præsertim in subiecto euemero, & huic excretioni adueto; coniuncto laxandi stimulo, vt sursum & deorsum reiiciantur cruditates; vbi autem vomitus locum non habet, per purgantia negotium expediendum est.
 - 3) Post digestiua, & si e re fuerit, euacuationem emeticocatharticam, in vsum veniant tonica, amarulenta, stomachica. Hic præ aliis laudantur:
 - a) *Radices* ari, gentian. rubr. pimpinell. alb. helen. imperator. caryophyll.
 - b) *Herba* centaur. min. card. benedict. absinth.
 - c) *Ex aromaticis* zedoar. galang. piper.
 - d) *E martialibus* tinct. vitrioli martis *Ludouici*, crocus martis antimoniatus *Stablij*.
 - 4) In caussa biliosa ad materiæ præparationem exhibeantur nitrosa & præcipitantia, quibus, in casu adhuc recente, emeticum aliquod subiungere conuenit.
 - 5) Quoad diætam in suspecta tenaci mucida cruditate prudens vsus piperis pro condiendis cibis non leuem locum occupat, in subiectis autem serosis vsus sinap. & zingib. magis conducit.
2. *Symptomática* adpetitus amissionis.
- 1) Seorsim huic adfectui subuenire velle frustraneum est: hinc primarius potius morbus respiciatur, quo sublato, sponte plurimum redit adpetitus.
 - 2) Quod si tamen, superato licet morbo, adpetitus langueret, optimo cum successu tinctura vitrioli martis *Ludouici* versus pastum exhibetur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Dolenda sunt ventriculi fata in *symptomático* appetitus defectu: in hoc enim casu non solum ab imperitis plebeis cibi contra intentionem principii vitalis agro ob-

- truduntur, sed etiam a vulgo Medicorum varia peruersa, & primario morbo repugnantia calida medicamina, ad appetitum concitandum, exhibentur.
2. *Centaureum minus* in *idiopathica* adpetitus deiectione præ aliis, ad tonum restituendum, laudatur, e.g. essentia illius versus partem exhibenda. Extractum parua etiam dosi laxat: hinc si grana illius 4-8. cum granis 8-12. extracti panchymagog. *Croll.* remisceantur, pro constitutione languentis satis bene purgant.
 3. Essentia illa *centaurii minoris*, facta per spiritum vitrioli, vel sulphuris per campanam, acidula, commode quoque per vnam vel alteram hebdomadam adhibetur, si adpetitus per febres intermittentes, immo etiam acutas, langueat.
 4. *Bagliuini* in omnibus ventriculi malis *hieram picram* ad modum commendat.
 5. Inter gratiora primarium locum habet *vinum* generosum, & remedia ex eo parata, e.g. infusum cum herbis amaris, non quibusuis, sed superius commendatis: non omnia enim amara adpetitum prouocant.
 6. *Sanguineis* puris acida magis conueniunt, e.g. mala citri, acetosella, fructus berberum: sanguineo-phlegmaticis seu melancholicis conducit elixir proprietatis, circa tempus prandii exhibitum; phlegmaticis martialia, sed moderatis dosibus, prosunt.
 7. Puluis stomachicus *Birckmanni* seu *Quercetani*, & alia vsitata nullo modo contemnenda sunt, caueatur modo, ne adfectus symptomaticus cum idiopathico confundatur.
 8. De remediis *externis*, ventriculo adplicandis, paucis dicere restat, quod raro necessaria sunt; vbi tamen omnino desiderantur, emplastrum de crusta panis, de tacamahaca cum oleo mastichis emollitum, locum habent. Conf. quæ *tabula de vomitu*, item de *cardialgia adlegata sunt.*

TABVLA CIII.
DE
FOETORE ORIS.

I. CAUSSÆ.

Fœtor oris a diuersis exoritur caussis, quarum præcipuæ sunt :

1. Scorburus, in specie stomachace.
2. Lues venerea.
3. Vlcus, siue simplex, siue fistulosum, in pulmonibus; quod in phthisi contingit.
4. Item vlcus oris interni.
5. Caries dentium, vel quæcumque illorum impuritas.
6. Cruditates ventriculi nidorosa, a vitio concoctionis dependentes.
7. In specie *atonia* circa orificium ventriculi sinistrum, vnde vapores eius modi fœtidi libere emergere possunt.

II. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Pro diuersitate caussarum, medicatio quoque diuerso modo instituenda est: hinc

1. In scorbuto respiciatur *primarius* adfectus, quo superato symptoma fœtoris ex ore euanescit.
2. Sic etiam res se habet cum fœtore a lue venerea dependente: singula suo loco quærantur.
3. In causa vlceris pulmonum, fœtor oris eandem cum phthisi & methodum & prognosin designat.
4. Vlceroso-fistulosus in ore status exposcit:
 - 1) *Interne* antiueneræ & balsamica temperatiora.
 - 2) *Externe* subsidia chirurgica. *Conf. tabul. chirurgic.*
5. Dentis, carie infecti, exposcunt euulsionem; conspurcati per puluerem dentifricium & alia subsidia sunt repurgandi, e. g.

Rec. Myrrh. elect.

ciner. rorismar. ana vnc. semis.

pulu. rad. irid. Florent. drachm. III.

LII II 2

alum.

alum. vft.

nuc. moschat. ana drach. vnam & semis.

ol. lign. rhod. gutt. X. M. F. puluis.

6. Quando *ventriculus* deprauatus foetorem oris exspirat, eadem methodus locum habet, quæ tabula de adpeticus defectu commendata est.
7. Vbi in specie sub finem medicationis tonica tanto magis adhibenda sunt, quo magis atonia orificii sinistri suspecta est: laudantur in hunc finem grana mastichis, 4-6. subinde deglutienda.

III. OBSERVATIO PRACTICA.

Interdum foetor e naribus provenit, quo casu ozæna seu vlcus narium subest, quod eandem cum vlcere oris exposcit medicationem. *Conf. tabul. chirurg. de ozæna.*



TABVLA CIV.

DE

S O D A.

I. DEFINITIO.

Soda est ardor ventriculi molestus, circa œsophagum præcipue sensibilis: modo a causis internis, modo ab externis inductus.

II. DIFFERENTIA.

1. Soda, vti hodie accipitur, distinguenda venit a soda antiquorum, qui per hanc vocem specialem dolentem ardorem capitis denotare solent.
2. Soda differt secundum causas, quæ differentia in praxi confert utilitatem.

III. SIGNA.

1. Conqueruntur ægri de molesto sensu in ventriculo, præcipue circa œsophagum.
2. Quem sensum, num verius per ardoris, an vero per frigo-

ris denominationem exprimere debeant, nesciunt; alii enim dicunt: *es brenne*, alii: *es fâlte*; sed nota est antiqua loquendi ratio, *quod frigus adurat*, & re vera frigus ardorem quemdam inducit.

3. Cum hoc sensu concurrat dolor quidam ventriculi molestus, pressorius, tensius.
4. Vti & levis constrictio per œsophagum vsque ad fauces ascendens.
5. Cum intercurrente momentanea nausea, salivæ in os effusione, & tensamine vomibundo.

IV. SVBIECTA.

1. Evenit hic morbus sanguineis, sanguineo-melancholicis, sanguineo-cholericis.
2. Quæ causis occasionalibus, inferius nominatis, exponuntur.
3. Quæ commotionibus sanguinis sæpius exposita sunt.

V. CAUSSÆ.

Producitur hoc malum a causis:

1. Modo *internis*; quales sunt
 - 1) congestiones sanguinis versus ventriculum & intestina.
 - 2) Biliofa saburra in primis viis.
 - 3) Motus fibrillarum subtilissime tremulus, qui multum etiam ad sensum talem contribuit.
2. Modo *externis*; hæ sunt:
 1. Pinguia adsumta, præcipue si potus frigidus mox ingeratur.
 - 2) Calida aromata, quæ sanguinem exagitant, irritationis sensum inducunt, & cum sæculentis nimiam fermentationem subeunt; quæ fermentatio tanto acrior emergit, quo magis biliofa saburra conspirat.
 - 3) Refrigeratio ventriculi.
 - 4) Elixiria calida, sub prætextu stomachi debilitati propinata.
 - 5) Potus sæculenti, acida edulia.
3. *Recentiores* ab acrimonia acida volatili hunc morbum deducunt.

VL PROGNOSIS.

1. Magnæ quidem considerationis non est hic morbus, in consuetudinem tamen abiens, multas molestias parit.
2. Quando autem incongruentibus remediis tractatur, peiora incommoda succedunt. *Conf. cautela.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Si aliquid exhibendum esse videatur, in vsum veniant


1. *Alcalica fixa*, cum sale quodam volatili, e.g. mixtura tonico-neruina *Stahl*i et unctura antimonii vel tartari & spiritu volatili C. C. ana remixta, quæ tinctura ardorem ventriculi egregie corrigit.
2. Vel alcalica fixa sola, e.g. oleum tartari per deliquium, ad guttas X-XV-XX, item tincturæ modo dictæ alcalicæ, de quibus, quo minus vel magis causticæ sunt, eo plures vel pauciores guttæ propinentur.
3. Qui malum hoc acceptum ferunt sanguinis commotioni, iis lenia acida & nitrosa conueniunt, immo etiam spiritus vitrioli, salis &c.
4. *Biliosa saburra* potissimum peccante nitrosa cum absorbentibus marinis locum habent.
5. Omnibus egregie conducit porus calidus, e.g. thée, coffeee.
6. Qui pertinaciter & frequenter hoc incommodo laborant, & manifesto sunt plethorici, his venæ sectiones & vomitoria, verno & autumnali tempore dextre exhibenda, proderunt.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Recentiores, quoniam in sola acrimonia acida causam huius mali collocant, ad absorbentia terrea vnice confugiunt.
2. Præcipue autem *creta* in scenam vocatur, quæ, quando cum acido fermentescente in ventriculo remiscetur, insigniter adstringit, & comprimit crassiores ventriculi fibrillas: vnde ægri cardialgias grauiiores, obstipationes viscerum, anorexiam, & feminæ vitium mensium incurrunt.
3. Sunt, qui loco cretæ *farinam laterum* vsurpant, quæ tamen, quia

quia per se iam adstringens est, multo magis hac efficacia prædita erit, si cum acido concurrat.

4. Idem detrimentum adferunt alia *adstringentia*, e.g. folia quercus, pulvis gallarum &c.
5. Qui neglecta debita diæta, solis medicamentis hunc morbum adgrediuntur, nihil obtinent, sed potius ex abusu medicamentorum hypochondriaco - spleneticos spasmos incurrunt.
6. Sunt quibus prodest haustus spiritus vini, nempe iis, qui a pinguibus adsumtis hoc malum inuicantur.
7. Amygdalas excortic. num. 6-8. contusas & comestas præsentaneum sæpius attulisse solamen, certum est.



TABVLA CV.

DE

CARDIALGIA.

I. DEFINITIO.

Cardialgia est dolor ventriculi spasmodicus, circa superius eiusdem orificium præcipue sensibilis: qua constrictione principium agens mucida in illo contenta eliminare, flatulenta dissipare, vel sanguinem circa eundem congestum discutere aut exprimere intendit. Deriuatur a *καρδία*, cor, & *αλγία*, doleo, quia circa scrobiculum cordis dolor in primis sentitur.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt cardialgia ab *anorexia* seu *inadpetentia*, quæ magis chronicum malum, quod sensu dolorifico non ita manifestum est.
2. Cardialgia est vel
 - 1) *Idiopathica*, quæ etiam *nauseosa* dicitur, & a primarum viarum cruditatibus, ad quas etiam vermes referendi sunt, dependet; vel

2) *Sym-*

- 2) *Symptomatica*, quæ a translatione sanguinis menstrui vel hæmorrhoidalis originem ducit.
3. Cardialgia differt etiam *gradu*, quo symptomatica idiopathica facile superat, in illa enim viscera cum vena portæ adnexa simul adficiuntur: summus gradus est cardialgia *synoptica*, quæ a totius mesenterii spasmodica contractione dependet.
4. Hæc distinguenda venit a *suffocatione* illa, in cardialgia *idiopathica* magis obueniens, da die Patienten ohne respiration hinliegen: hæc enim a consensuali diaphragmatis & pericardii adfectione producitur.

III. SIGNA.

1. Pressiones & tensiones circa scrobiculum cordis.
2. Angustiæ, immo anxietates præcordiorum.
3. Plurimum accedit nausea, & non raro vomitus.
4. Quo magis status verminosus concurrit, eo copiosius saliu in os effunditur, in profundis faucibus mucus ita sentitur, ac si frustum aliquod frigidum ibi hæreat.
5. *Calor & frigus* sæpius alternant, cum sudoribus anxii, frigidis.
6. *Ieiuno* ventriculo hæc pathemata augentur, post pastum autem notabiliter mitescunt.
7. *Ructus*, quando erumpunt, leuamen ægro adferre observantur.
8. Commotiones sanguinis circa venam portæ, vbi in causis sunt, ibi febricula aliqua accedere solet.

IV. SVBIECTA.

1. Cardialgia occurrit in valetudinariis subiectis, quæ saburra primarum viarum laborant.
2. Specialiter in *hypochondriacis*, qui plerumque sunt flatulenti.
3. Maxime omnium in *feminis hystericis*, vicio mensium obnoxiiis.
4. Infantes etiam, præsentibus vermibus, ab hoc malo instantur.

V. CAUSSÆ.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* cardialgiæ *idiopathica* est:
 - 1) Vel flatulentia, hypochondriacis & hysteris præ aliis familiaris.
 - 2) Vel viscosus mucus aut alia saburra in primis viis, quo etiam vermes referendi sunt.
2. Causa *materialis* cardialgiæ *symptomática* est motus sanguinis, siue menstrui siue hæmorrhoidalis retenti, cuius causa *antecedens* nonnumquam est neglectio euacuationum sanguinis artificialium aduetarum.
3. Causa *formalis* est reciproca laxatio & strictura toni in ventriculo, intestinis, & reliquis partibus, quæ in consensum trahuntur: tonus enim quando relaxatur, flatus expanduntur, & sic partes relaxatæ ab iis distenduntur; strictura autem toni, si deinde his partibus distensis inducatur, tam sensibilem, ob consensum præcipue systematis nervorum, excitat dolorem, ut ægroti sæpe suffocatiuis vel syncopiticis adfectibus corripiantur, es drehet sich alles bey ihnen um, wird grün und schwarz vor ihren Augen, bis sie gar dahin sinken.
4. Causæ *procatarctica* & *occasionales* sunt:
 - 1) Obstructiones alui, & flatuum retentiones.
 - 2) Ventriculi refrigerationes, præcipue in sensibilibus subiectis.
 - 3) Cibi crassi, dyspepti, non bene commansi, vel nimia quantitate adsumti, aut mutatio in molliorem, delicatam diætam.
 - 4) Animi tacita excaudescencia inter pastum.

VI. PROGNOISIS.

1. Cardialgia in principio non adeo fonticus est morbus, successu autem temporis lipothymiam, præcipue in feminis, solet adferre, vnde meruendum, ne congestio sanguinis, ibi facta, in stasin inflammatoriam transeat.
2. Cardialgia *symptomática*, seu a motibus sanguinis excitata, difficilioris est restitutionis, quam idiopathica: facile enim in habitum degenerat; vel adfectus plane conuulsivos

suos inducit, præsertim quando calida remedia, sub prætextu ventriculi roborandi, offeruntur.

3. Immo prostant exempla, quod vomitoria, hypochondriacis cardialgicis propinata, deliria & maniam illico produxerint.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Cardialgiæ *idiopathicæ*:

- 1) Ad materiam *corrigendam* & præparandam exhibeantur digestiua, resoluentia, abstergentia & incidentia, e. g.
 - a) *Salina*: tartarus tartarifatus, vitriolatus, arcanum duplicatum &c. versus partem præcipue exhibenda.
 - b) *Aromatica* acriuscula, inter quæ primas tenet piper, vtpote cruditates viscosas egregie resoluens.
 - c) *Radices* acriusculæ: ari, pimpinellæ albæ, &c.
 - d) *Vinum* calefactum aromatizatum, quod & roborat ventriculum & flatus discutit, & promptam fermentationem creat.
 - e) *Sinapi*, commendante *Paracelso*, fermentationem cito promouet, & omne viscidum in ventriculo resoluit.
 - f) Ad præparantia interdum etiam pertinent *absorbentia*, vt materiam nimis tenacem reddant pulposam & volubilem.
- 2) His præmissis, si æger melius non habet, & nihil contra indicet, ad materiæ præparatæ euacuationem *tartarus emeticus* ad grana II. III. cum tartaro tartarifato exhibeatur.
- 3) Vbi autem *vermes* in caussis sunt, ibi, præmissis digestiuis amaris, vermes enecantibus, mercurius dulcis cum stimulo colocynthiaco ad euacuationem propinetur.
- 4) Post vomitorium subiungatur lene quoddam *anodynum*, quod viscus adfectum quietum iterum reddat; pro quo scopus *Sydenham* aliquid theriacæ versus notem propinare commendat.
- 5) Denique ad *tonum* ventriculi roborandum subsequen-
tibus diebus exhibeantur *martialia*, e. g. crocus mar-

cis aperitiuus sub initium gran. II, deinde gran. III, item tinct. martis aperitiua *Ludouici*, quæ meliorem adhuc habet effectum, & ob gratum saporem præ aliis laudari meretur.

6) His martialibus interponantur, aut coniungantur, *stomachica* amara, e.g. essent. absinth. centaur. min. gentianæ rubræ, quæ ad tonum restituendum efficacissima, item essent. pimpinell. alb. helen. zedoar. galang. cass. caryophyll. conseruando vbique alui legitimum successum.

2. *Cardialgiæ symptomatica, & syncopica.*

1) In hac, loco calidorum, exhibeantur temperantiâ *nitrosa*, cinnabarina, cum sale quodam digestiuo & guttula olei cinnamomi vel caryophyllorum: tales enim pulueres in angustiis præcordiorum vtrique sexui efficacissime subueniunt.

2) His subinde interponantur lenia laxantiâ, e.g. pilulæ *Stahlina*, flatus egregie discutientes & effectum simul roborantem exerentes, item *Becheriana*, *Sylviana*, tartareæ *Quercetani*, infusa e resoluentibus, abstergentibus & laxantibus parata.

3) Ad tonum roborandum propinentur vel superius laudata, vel mixtura tonico-neruina e tinctura alcalica & spiritu quodam volatili parata, specificè essentia millesfolii cum essent. alexipharm. remixta.

4) Ad præcautionem venæ sectiones æquinoctiales commendentur, & euacuationes sanguinis naturales respiciantur.

VIII. *CAVELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. *Digestiua salina* pure magis succurrunt *materia*, in ventriculo hærenti, minus autem ipsi ventriculo.

2. *Aromatica* vero non solum materiam reddunt fluidiorem, sed & tonum ventriculi roborant: hinc absente æstu febrili optime conueniunt; quando autem in commotionibus febrilibus offeruntur, quæ in *cardialgia* symptomatica non raro accedunt, malum exasperant.

3. Vulgare illud remedium, dextre adhibitum, in *cardialgia*

idiopathica non reiciendum est, quando nempe plebeii grana 15-20. piperis, vel sola, vel cum spiritu vini, deglutiunt & quietam continentiam seruant: ventriculus enim per illud simplex non solum corrigitur, sed & leuis sudor excitatur.

4. *Essentia* aromatum longe vtiliores hic sunt, quam *olea* illorum: hæc enim ventriculum saltem stimulant, fermentationem autem minime promouent.
5. *Sal vitrioli* illud habet incommodum, vt diu in ventriculo hæreat, & hinc omnis spasmus ex aliis partibus eo conuocetur; in hoc autem malo talia emetica eligere præstat, quæ satis cito vomitum excitant, qualia sunt septica, ventriculum corrodentia, quæ substantia latius in sale vitrioli extensa est, & hinc non statim effectum exserit.
6. E vegetabilibus *asarum*, vel illius extractum, adhiberi potest. Conf. *Coberus*, qui in obseruationibus suis, lectu dignis, illud commendat.
7. Ad *vomitoria* minime festinandum est, conuenit potius, salia digestiua versus partem exhibere, & expectare, an illa sola non sufficiant ad totum negotium expediendum, & vomitum spontaneum excitandum.
8. Maxime omnium euitandus est error ille grauissimus, vbi in cardialgia symptomatice, nempe passionibus hypochondriacis & hysterice vomitoria præscribuntur: hæc enim ratione delirium, inmo maniam induci obseruatum est.
9. Sic etiam *carminatiua*, olea destillata & alia calida stomachica in sanguinis hisce commotionibus euitanda sunt.
10. Caueant sibi ægroti cardialgici in posterum a causis occasionalibus, superius descriptis.



TABVLA CVI.

DE

FLATVLENTIA.

I. DEFINITIO.

Flatu-

Flatulentia est prompta, insolentior & copiosa generatio flatuum, tamquam substantiæ halituoso-elasticae, ad aëream indolem accedentis, e resolutis humoribus in abdomine originem ducentis, & variis diris symptomatibus stipatæ.

II. DIFFERENTIA.

1. Non agimus hic de flatibus *vesicæ & uteri*, qui, licet rarius, vere tamen interdum contingunt, sed de iis, qui in intestinis generantur.
2. Neque de illis flatibus, qui ex hisce, in rarioribus exemplis, ipsam *abdominis cavitatem occupant*, & in ingentem molem illud distendunt, dicemus, nam de illa *flatuaria* flatulentia *tabula de hydropo* actum est, sed de simplice illa flatulentia, quæ, uti in intestinis gignitur, ita & in illis retinetur.
3. Hæc flatulentia est:
 - 1) vel *torpida & stupida*, quæ exiguum, immo subinde plane nullum sensum molestum infert, & phlegmaticis est familiaris.
 - 2) Vel *impetiosa*, quæ, ob leues etiam occasiones, vehementes contentiones, & sensibiles dolores excitat; cui sanguinei, de cholérico vel melancholico temperamento participant, obnoxii sunt.
4. Porro flatulentia differt ratione *causarum*:
 - 1) Alia enim dependet a simplice intestinorum *atonia*, seu languido torpore, ubi flatu, citra insignem torminosum sensum, progrediuntur, siue *sursum*, & tum *rustus* vocantur, siue *deorsum*, quo casu *flatuum* nomen retinent.
 - 2) Alia originem ducit a *lentore tenaci*, motus peristaltici finem frustrante: hic modo spasticæ stricture, modo reciprocæ flaccidæ toni remissiones occurrunt.
 - 3) Alia a turbulenta *sanguinis* circa venam portæ *commotione* oritur, ob connexionem, quam huius venæ rami cum intestinis habent.

III. *SIGNA.*

1. Strepitus vultatorii & borborygmi per intestina sentiuntur.
2. Interdum autem, loco huius vultationis, pertinaces quasi stases adfligunt.
3. Vtrimque tensiones & contentiones sese manifestant.
4. Ex harum contumacia oriuntur dolores, modo vultatorii & tortiles, modo tensui ac rupturam veluti minantes.
5. Quo manifestius commotiones sanguinis conspirant, eo magis de pressione in sinistro latere, ventriculo, & præcipue cardialgia, immo vniuersis mali hypochondriaci symptomatibus conqueruntur.
6. Obstructio alui vbique hoc malum sæpius comitatur & fouet.
7. Angustia circa pectus & anxietates concurrunt.
8. Quo magis cruditates primarum viarum ad flatum occasionem dederunt, eo magis vertiginosa & stupido-grauativa capitis pathemata sentiuntur; in causa vero commotionis sanguinis circa venam portæ dolores veri & acuti obseruantur.
9. Tandem expansi illi vapores vel iterum subsident, & condensantur, seu in corpus arctius, fluidum tamen, coalescunt; quod in malo mitiore, in primis a refrigeratione exorto, item vbi flatum in superioribus intestinis adhuc oberrant, crebrius contingit: vel, potissimum in grauiore malo, sursum aut deorsum erumpunt.

IV. *SVBIECTA.*

1. Flatulentia non omnes promiscue homines ita obnoxii sunt, vt auxilium medicum requiratur, sed potissimum *phlegmatici*, quorum corporis habitus mollior ad toni relaxationem maxime dispositus est; qui vero crassioris & robustæ sunt texturæ, ab incommodo flatulentia, licet non ab omnibus flatibus, satis sunt liberi.
2. Phlegmaticos sequuntur *sanguinei*.
3. Cholericus quidem & melancholicus coniici etiam possunt

in flatulentiam, sed non directe, verum per accidentales causas, e.g. quando a morbo quodam debilitati sunt.

4. Qui ad mutationem frigoris & caloris ad modum sensibiles sunt.
5. Hinc feminæ præ viris huic malo subiacent, non promiscue tamen, sed præcipue quæ mensium vel lochiorum ataxias experiuntur, item viduæ, minus castæ, & puerperæ, male tractatæ.
6. In virili sexu eminent *hypochondriaci*: omnes enim tales sunt flatulenti: deinde sequentibus annis hæmorrhoidarii, nephritici, ischiadici, podagrici, herniosi.

V. CAUSSAE.

1. *Primaria* causa generationis flatuum est *relaxatio* motus peristaltici, non tam per vniuersum intestinorum tractum, quam passim, modo in hac, modo in alia regione.
2. Hæc relaxata, flaccida intestini portio spatium concedit substantiæ halituosæ, vt pro indole sua elastica sese expandere & flaccidam illam portionem distendere queat; quod sine tali relaxatione fieri non posset.
3. Has flatulentas distensiones, a relaxatione dependentes, natura *actiue* iterum propulsare adgreditur, quod facit tum expulsione, tum contentione tonico-spasticis.
4. Et sic in vna parte *relaxatio* ceu defectus motus tonici, & distensionis auctor, occurrit; ab hac autem distensione maiore in altera parte intensio tonico-spastica, tamquam motus peristaltici antipraxis aduersus defectum excitatur, ad partem distentam in ordinem naturalem reducendam.
5. In commotione sanguinis circa venam portæ eadem remissio & constrictio contingit.
6. Pro *materiali* causa flatulentæ accusantur:
 - 1) Res, quæ mucida & tenaci textura, intestinis adhærescendo, molestiam faciunt, e.g.
 - a) Oleracea succi crassioris.
 - b) Leguminosa: pisa, fabæ.
 - c) Pisces marini siccari.

d) Pin-

- d) Pinguia, præcipue caro ouilla, item pultacea, æcedente utrimque mox frigido potu.
- 2) Materiæ ad fermentationem promptæ, quæ ipso fermentationis actu elasticos tales vapores efformant. Tales sunt:
- a) Potus sæculentus, e.g. cereuisia siue nimis recens, siue dolio fere euacuato hauriatur.
- b) Farinacea triticea, his sæcibus fermentata, in sensibilibus præcipue subiectis.
- c) Dulcia e fructibus succulentis & ipso in primis melle; quæ quidem non immediate flatus generant, sed fermentatione sua prius producunt acrimoniam, intestina stimulantem, a quo stimulo vno loco constrictio excitatur, altero autem flaccida toni remissio inducitur.
- 3) Ad hunc causæ *materialis* censum etiam referuntur corporis refrigerationes, alui siccitas, cui nilus tonicus accedit.
- 4) Conferantur etiam, quæ de *caussis* sub differentia dicta sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Flatulentia fonticum sane est malum, & in otiosis, præcipue feminis, bonam partem vitæ facit molestam.
2. Quo magis in habitum deducta est flatulentia, eo certius accedunt dolores colici, cardialgici, anxietates, suffocationes.
3. Et hoc malum *consuetudinale*, quia nullum, neque materiæ, neque effectus, neque causarum, habet proportionem, sed a solis erroneis motibus fouetur, per nudam directam medicationem spem sui tollendi non admittit.
4. Flatuum *voluntaria cohibitio* maiora adhuc mala, præcipue in sanguineis, iisque plethoricis, inducit, nempe tormina non solum spastica, sed etiam syncopes vel vibrationes conuulsiuas; & hoc in non rarioribus exemplis contingit: quæ phænomena sæpe deludent causarum speculatores, qui ab acutissimis salibus scorbuticis, & inflig-

ni sanguinis dyscrasia originem eorum deducere conantur.

5. Libera autem flatuum emissio consuetudinem, facile insolescentem, inducit.
6. *Ructus* seu *anotrici flatus*, quando supprimuntur, non solum cardialgias, verum etiam incommoda vertiginosa, apoplexiæ metum incutientia, producunt.
7. Tandem *suppressio* flatuum habitualium tumores, indurationes abdominis, tympanitem, hecticam inducit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Ante omnia consideretur, num flatulentia simpliciter & magis directe in ipsis intestinis sedem suam habeat, an vero consensualiter saltem oboriatur; uti hoc in motibus hypochondriacis, hysterics, hæmorrhoidalibus, nephriticis, item in reliquis abortuum & puerperiorum vitis, sæpe contingit.
2. Posterioribus casibus primarii morbi respiciantur, & secundum methodum, suo loco commendatam, tractentur.
3. *Directa* autem & magis simplex flatulentia sequente methodo tractetur:
 - 1) Alui legitimus successus ubique conseruetur, hac enim clausa, flatulentia facile inualefcit. Ad hunc finem obtinendum commendantur
 - a) *Clysteres* lenitivi, tonici, stimulantés, subinde repetendi; quibus, præter sal commune, etiam centauremin. pro stimulo addi potest.
 - b) *Laxantia* leniora, non tam laxandi, quam primario tonum ventriculi roborandi scopo exhibenda: quo nomine pilulæ *Stahlî* egregie se gerunt, virtute enim balsamica ventriculum roborant, & tam ad vniuersum flatulentia negotium, quam ad exacerbationes, optimo effectu adhibentur.
 - 2) His interponantur & subiungantur salia digestiua media cum nitro & pauca cinnabari; qui pulueres ad cruditates mucidas & ipsius ventriculi incommodas sensationes plus sane præstant, quam ingens farrago calidorum carminatiuorum & neruinarum.

- 3) Tandem *tonica* exhibeantur, e.g.
- a) Essent. gentianæ rubræ & pimpinellæ albæ, vel illius extractum.
 - b) Composita ex aromatibus, e.g. essent. carminatiua *Wedelii*.
 - c) Essent. corticum aurantium, millefolii, absinthii composita.
 - d) Spiritus nitri dulcis, item spiritus salis tartari, & salia volatilia vrinosa aromatizata.
 - e) *Externe* emplastra stomachica circa scrobiculum cordis, e.g. emplastr. matricale ceratum, item balsama stomachica ex oleis nucis moschatæ, anethi, carui, fœniculi, chamomillæ, *destillatis*, cum oleis *expressis* lauri irini, nam sola destillata nimis volatilia sunt, & acredine sua cutim facile lædunt.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Carminatiua*, in hoc malo satis decantata, prudentissime adhibenda sunt: quando enim commotiones sanguinis circa venam portæ flatulentiam fouent, calida illa insigne damnum adferunt.
2. Ante omnia fugiatur infaustum illud conamen, in hypochondriaco-hysterico-cardialgicis flatulentis pathematibus *vomitorium* propinare: anoterica enim flatulentia inde prouocatur, quæ tormina exquisita, tensiones colicoiliacas, respirationis angustiam, vertiginem ad scotomiam vsque, tinnitum & susurrum aurium, inseparabiles habet comites, donec tandem ructuum nomine erumpentes leuamen aliquod adferant.
3. Ad flatuum *anotericorum* felicem extirpationem non sufficit prouocatio & deriuatio ad inferiora, sed necesse est, vt tonus intestinorum restituatur.
4. Hinc *laxantia*, quatenus tonum magis relaxant, plus ad flatus fouendos, quam illos tollendos conferunt, quidquid etiam de rhabarbari efficacia aduersus flatulentiam dicatur.
5. Aliiter se res habet cum pilulis balsamicis *Stahlis*, quæ intes-

stina

stina magis roborant, quam relaxant, & hinc in flatulencia optime conueniunt.

6. De *aloe* notandum est, quod illius grana 2-3. speciali prompto & facili successu alui excretionem prouocent: hinc ii extractum imperator. vel helen. vel, ubi præsto est, pimpinell. alb. cum paucioribus illis granis iungatur, flatulentia plurimum succurrunt. In phlegmaticis pilulae tales vna vel altera gutta olei carui, aut quibus non est nausea, anisi imbui possunt.
7. Præter ea etiam hoc habet *aloe*, vt circa inferiora magis exferat laxationem stimulatoriam: vnde hæmorrhoides diuturno illius vsu sæpius prouocantur.
8. In qualibet ventriculi & intestinorum flatulencia vsus *corticum aurantium* bene se commendat, e.g. essentia ex illis parata, quæ blandam tonicam efficaciam præstat, & amaritie sua ventriculi cruditatibus, tamquam laudabile digestiuum & carminatiuum, succurrit, & præter ea in doloribus post partum, *Nachwehen*, cum syrupo cort. aurant. & de citro mixta, & cum aqua carminatiua melissæ exhibita, momentaneum auxilium adfert.
9. Flatulencia sursum & deorsum simul non facile datur, ad minimum non ita continua: motus enim peristalticus inuersus eodem tempore non potest esse naturalis & ordinatus.
10. Tandem in *contumace* flatulencia motus corporis sufficiens omnia carminatiua & tonica longo interuallo post se relinquit.

TABVLA CVII.

DE

C O L I C A.

1. **D**EFINITIO.

Colica est dolor acutus exquisitissimus in abdomine, a spasmo-

modica intestinorum laxatorum, præcipue intestini coli, contractione existens.

II. DIFFERENTIA.

1. Colica differt secundum species:

- 1) *Flatulenta* seu *pituitosa* dignoscitur e maiori distensione & inflatione abdominis, ructibus, flatulentia, borborrygmis, caussis antecedentibus.
- 2) *Biliofa* ex torsione acri sæuissima & scindente quasi fit manifesta, concurrente, post iracundiam, capitis dolore, & non raro diarrhœa.
- 3) *Hæmorrhoidalis*, & *nephritica*, diiudicatur ex spastica contentione & compressione abdominis, aluo sæpius adstricta, ad minimum in principio, cephalalgia, lassitudine, intercurrentibus horrore, æstu &c. *Conf. tabula de malo hypochondriaco-hysterico & tab. de ileo hæmatite.*
- 4) *Hysterica* dicitur, vbi dolores tensiui, alius pertinaciter stricta, retractio umbilici, volutationes in abdomine &c. occurrunt, & circa intestina magis tenuiora ac ventriculum sentiuntur, sicut ordinaria colica intestina crassa potissimum infestat.
- 5) *Convulsiva* nihil aliud est, quam insignis gradus hystericae passionis, vbi pathemata, a torsione intestini coli excitata, vsque ad scrobiculum cordis extenduntur. Quando in infantibus occurris, vocatur die innerliche Noth oder Jammer.
- 6) De colica *iliaca* sequente tabula agemus.

2. Non omnia tamen tormina pro colica, strictiore sensu sumpta, haberi debent; quamuis illa quoque interdum satis ægros affligant: sunt enim aliqui ita sensibiles, vt etiam e leuibus diætæ vitiis sensibilia tormina incurrant, e.g. ex ingestione flatulentorum, cereuisia nondum bene defæcata, insueta, ex vsu carnis pinguioris, si mox frigidum haustum sumant.

III. SIGNA.

1. Tormina satis vehementia & durabilia: non raro enim vltra vnum diem persistunt & paroxyzant.

2. Oc-

2. Occupant locum circa & supra umbilicum.
3. Sensum referunt modo torsionis, modo grauissimæ tensionis, rupturam veluti inlantis, modo fremitus cuiusdam & tremoris.
4. Accedunt symptomata maximæ anxietatis, angustia internæ, borborygiorum.
5. Intercurrit exterioris corporis vaga refrigeratio cum sudoribus frigescentibus, interdum simul conatibus vomendi.
6. Coniuncta est plerumque flatulentia & obstructio alui, rarissime diarrhœa, nisi in colica biliosa & hæmorrhoidali cum fœcibus in hac sanguinolentis & tenesmo.
7. Specialia signa sub *differentia* iam indicata sunt.

IV. *SVBIECTA.*

1. Colica utriusque quidem sexui, feminino tamen & frequentius & vehementius, euenire solet: in feminis enim longo successu durat, sub initium quidem ostendit leuiorem indolem, deinde vero ad conuulsivas plane succussiones excedit, in viris autem sæpius intra spasticos tenesmos motus subsistere obseruatur.
2. *Feminae*, quæ hac passione corripiuntur, sunt vel phlegmaticæ, vel sanguineæ, aut sanguineo-cholericæ, impedito mensium successu laborantes. Item puerperæ, quibus abdomen post partum non decenter ligatur; hæ non solum in puerperio, sed etiam futuro tempore colica cum magna flatulentia adficiuntur.
3. In sexu virili ætas consistentior potissimum a colica infestatur, præcipue talia subiecta, quæ moribus hæmorrhoidalibus & nephritide infestata sunt; sæpius etiam illa, quæ adueras sanguinis euacuationes artificiales subito intermiserunt.
4. Colica *biliosa* facile corripiuntur personæ cholericæ temperamenti, quando post animi excandescentiam mox cibum adsumunt, vel bibunt.

V. *CAVSSÆ.*

1. *Causa materialis* in colica est
 - 1) vel induratio & impactio scybalorum.

- 2) Vel biliosa *faburra*, aut alia acrimonia in primis viis hærens.
- 3) Vel sanguis menstruus aut hæmorrhoidalis retentus.
2. Causa *formalis* est spasmodica contractio intestinorum relaxatorum & a flatibus expansorum, quibus motibus spasticis principium vitale tamquam *caussa efficiens* horum spasmodorum materiam, circa illa loca molestam exprimere & dissipare intendit; de qua retestantur borborygmi, qui nihil aliud sunt quam flatuum ex vno claustro in aliud spatium propulsio.
3. *Erroneus* autem motus est: nam neque ad flatuum dissipationem, neque ad materiae acris biliosæ eliminationem tantus impetus requiritur. Multo magis in colica hæmorrhoidali motus talis erroneus censendus est, dum summa illa constrictio in intestinis inferioribus incipit, & sanguinem versus superiora potius *restringit*, quam quod hac ratione eum exprimere valeat.
4. Causæ *occasionales* & *procatartica*, præter illas, quas in *subiectis* iam denominauimus, sunt:
- 1) Sensibilitas subiectorum, quæ colicam facile *habitualement* introducere solet.
 - 2) Obstructiones alui.
 - 3) Refrigerationes abdominis vel pedum immodestæ.
 - 4) Cibi lenti, viscosi, crassiores, e.g. cucumeres, melones, cucurbitæ, vel pingues, potu frigido mox superueniente.

VI. PROGNOISIS.

1. Quo *sæpius* colica recurrit, eo citius a leui causa reuocatur, & in habitum transmigrat.
2. Quæ colica cum *horrore* inuadit, illa non solum grauius adfligit, verum etiam inflammationem vel iam præsentem indicat, vel successuram minatur.
3. Sic etiam vehementior est colica, quæ alui obstructione stipata est, quam vbi aliqua huius solutio obseruatur.
4. Conatus *vomendi* in colica semper suspecti, & *iliaca* passionis metum incutiunt, nisi a cibus, paullo ante largiter inge-

ingestis, vel potu largiore frigido, ceu colicæ auctori-
bus, simul oriantur.

5. Præcipue autem in sexu feminino fortes eius modi con-
tritus, vndecumque suborti, vomitus eruenti metum ad-
ferunt.
6. Quo exquisitius colici dolores adfligunt, eo facilius con-
vulsivos motus inuitant.
7. Quo diuturnius sanguis menstruus, ad exitum non recte
promotus, circa viscera stagnat, eo certius febris quar-
tana, cachexia, hydrops &c. inducuntur.
8. Colica *hamorrhoidalis*, podagræ vel mali ischiadici repul-
sione vel nephritidis præpostera sopitione inducta, præ-
sentiora est periculi.
9. Soluitur autem
 - 1) vel salutariter, superueniente in paroxysmo fluxu hæ-
morrhoidem sincero, aut saltem mucoso.
 - 2) vel infausta reurgitatione ad viscera, præcipue ad he-
par, cum insequentibus obstructionibus, cachexia, a-
scite, hectica, quartana, tympanite.
 - 3) vel macularum scorbuticarum prouentu, qui in subie-
ctis humidis, non secus ac in malo hypochondriaco,
subinde contingit, & a corruptione sanguinis, sub di-
uturna illius spastica detentione, dependet.
10. Colica *biliosa*, nisi materia tempestiue obtundatur & eua-
cuetur, febres biliosas, inflammatorias, præcipue cau-
sum producere potest: bilis enim acrimoniam ex fer-
mentescens adsumtis auctam, pro causa habet, ad
quam materiam acrem, sed paucam, propellendam, in-
solentior motus intestinorum accedit. Soluitur inte-
rim spontanea subinde alui fluxione, nisi peculiarem
plane intestinorum adrosionem perpetraverit, quæ ta-
men vix alibi, quam in prægressa mala medicatione,
contingit.
11. Quando autem *impedita* bilis excretio colicæ ansam dedit,
icterus inducitur.
12. *Singultus*, ubi colicæ præter consuetudinem superuenit, di-
ri ominus censendus est.

13. Colica, *anodynis opiatis* incongruenter tractata, paralyfi
sapius excipitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis*, in omni colica locum habens.

1. Spasmus intestinorum dolorificus demulcendus, & si qua
in illis materia peccans reperiatur educenda est. Præ-
stant hoc
 - 1) Commodissime *clysteres*, pro causa diuersa diuersis in-
gredientibus parandi.
 - 2) Laxantia ex mercurio dulci, senna, rhabar. sale mi-
rabili.
2. *Materialis* causa est discutienda.
 - 1) *Interne*,
 - a) vel per carminatiua & temperata salia digestiua,
 - b) vel per temperantia nitrosa,
 - 2) *Externe*, ubi conducunt
 - a) *Sacculi carminatiui* ex speciebus odoratis, e.g. rad. i-
rid. Florentin. cyper. angelic. herb. menth. puleg.
flor. chamomill. fer. anisi, anethi, petroselin.
 - b) *Linimenta ex oleis colicis*, e.g. irino, castorin. chamom-
mill. laurin. *destillatis*, v.g. foenicul. menth. caru. a-
neth. absinth. chamomill.
 - c) *Balsama ex his oleis & oleo nucis moschatae* parata.
 - d) *Emplastra stomachalia*.
 - e) *Calor & fons* abdominis, e.g. lapides calefacti & vesti-
ca, aqua calida semi-repleta.
3. *Tonus* partium labefactatus est restaurandus; in quem fi-
nem conducunt.
 - 1) *Interne*
 - a) *Salia volatilia* cum tinct. alcal. mixta, e.g. mixtura
tonico-neruina *Stahl*.
 - b) *Martialia*: essent. vitrioli martis *Ludonici*.
 - c) *Carminatiua & aromatica*: essent. cort. aurant. citri,
gentianae rubrae, spiritus salis ammoniaci, cum spe-
ciebus carminatiuis abstractus.
 - 2) *Externe* neruina & roborantia, priore membro me-
morata, conueniunt.

B. *Methodus specialis.*1. *Colicæ flatulentæ & mucosæ.*

- 1) Præmittantur *clysteres carminatiui & emollientes* e flor. chamomill. tanacet. matricar. eupator. rosar. stœchad. Arab. herb. maluæ, althææ, veronicæ, parati; quibus, præter sal commune, pro stimulo centaur. minus addatur, quod sensum morficantem in intestino recto exferit, & hac ratione flatus e superioribus intestinis deriuat. Stimuli loco inseruit etiam elixir proprietatis, quod mucum resoluit & simul euacuat.
- 2) Subiungantur pro diuersitate temperamentorum carminatiua, interpositis subinde laxantibus fennatis, e.g.
 - a) *Radices* imperator. angelic. pimpinell. alb. zedoar. gentian. rubr.
 - b) *cortex* Winteranus.
 - c) *Semina* anisi, fœniculi, carui, petroselini, &, ad digestionem promouendam, specialissime sem. sinapios, eruca.
 - d) *Aromata*: pip. cardamom. galang. caryophyll. quæ omnia in ructibus pariter summi vsus sunt.
 - e) *Salia digestina*: tartar. vitriolat. arcan. duplicat. cum nitro & cinnabari.
 - f) *Composita*: spiritus tartari, nitri dulcis, mixtura simplex, essent. alexipharm. *Stahlî*, cort. aurant. gentian. rubr. centaur. min. &c.

2. *Colicæ biliosæ seu cholericæ.*

- 1) Hic in vsum veniant temperantia, absorbentia, e.g. nitrum, crystallus montana, mater perlar. corall. &c. item oleum amygdalar. dulcium recens, iuscula puluorum cum semine nigell. manna.
- 2) Quod si vero hæc reuomantur, clyster domesticus applicetur cum calore & fotu abdominis.

3. *Colicæ hæmorrhoidalis & nephriticæ.*

- 1) Præmittantur & repetantur clysteres paregorici ex oleo lini, oliuarum, verbasci, & nitro parati.

2) De-

- 2) Deinde porrigantur pulueres nitroso - temperantes cum cinnabari, e.g. puluis antispasmodicus, item iuscula calida cum oleo amygdalarum dulcium.
- 3) His præmissis in vehementiore impetu versus noctem exhibeatur theriaca, vel pulueribus dictis M. P. de cynoglossi. a gr. 1-2. addatur.
- 4) *Remittente* paroxysmo alexipharmaca & temperantia continentur, ac insuper mixtura tonico - neruina *Stablii*, cum essent. millefolii fociata, propinetur.
- 5) *Externe* in usum vocentur
 - a) *Fotus* intestini recti.
 - b) *cataplasma* e meliloto & verbasco, cui infideant patientes.
 - c) *Calor* abdomini conciliandus:
 - α) Per aquam, vel lac, si vesicæ immittantur & calide adplicentur.
 - β) Per lateres calefactos.
 - d) *Sacculi* neruini, ex illis speciebus, quarum sub methodo generali mentio facta est, parati.
 - e) *Linimenta* ex oleis ante dictis, speciatim laurino & nucis moschatae.
 - f) Spiritus vini *camphoratus*, regioni dolenti adplicandus.
 - g) Regimen quietum & leniter diaphoreticum.
4. Colicæ *hysterica*.
 - 1) Præmittantur & repetantur clysteres carminatiui, ad quos specificè commendatur herba veronica, cum iusculo carnis cocta, addito oleo anethi & sale communi.
 - 2) Vbi ægrotæ clysteres auerfantur, vel malum non adeo vrget, substituantur pediluua, vel infusio, & laxans e fenna, semine foeniculi, item essent. ialappæ cum vitello oui & aquis vterinis.
 - 3) Deinde subiungantur
 - a) *Interne*.
 - α) Essent. alexipharm. vel tragea e rad. pimpinell. alb. carlin. cum semine anisi, foeniculi.
 - β) Tem-

- β) Temperantia nitrosa, & in effero motu anodyna correcta.
- γ) Tandem tonica, e.g. mixtura tonico-neruina *Stahlii*, essent. millefol. castor.
- b) *Externe.*
- α) *Regimen leniter diapnoicum.*
- β) *Spiritus neruinus* ex essent. castorei, spiritu serpilli, camphora & essent. anodyna.
- γ) *Linimentum* e pinguedine cati siluestris cum oleis carminatiuis.
5. Ad prophylaxin in colica hæmorrhoidali & hysterica commendantur :
- 1) Venæ sectio æquinoctialis in pede.
 - 2) Euacuationum sanguinis deuitarum promotio, e.g. mensium per infusa laxantia aperitiua, item, si ex viuisit, hæmorrhoidum per hirudines.
 - 3) Caussarum procatarticarum euitatio.
 - 4) Speciatim alui legitimus vbique successus.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Colica *humorosa* a reliqua pure spasmodica omni circumspeditione in cura distinguenda est: causæ enim vti prorsus diuersæ sunt, ita horum malorum confusio maiora damna importat; vbi autem complicantur, & vnum malum alterum generat, e.g. quando a colica spasmodica inducitur biliosa, ibi methodus lenissima quam maxime commendata esse debet.
2. *Carminatiua* numquam concedantur ante, quam viæ per clysteres vel laxantia sint reserata. Tunc autem locum habent in colica *flatulenta*, minime vero in *spasmodica*, vbi orgasmum & dolores eo notabilius augent, quo magis calida existunt.
3. Si vmquam alibi, certe in colica *clysteres* maximum vsum habent, hisce enim solis vniuersum sæpe malum soluitur: hinc non leue subest incommodum, si ægri eosdem admittere recusent; quo rædioso casu tanto frequentius temperantia nitrosa cum ciñabarinis exhibenda sunt.

4. Quoniam colica, etiam *hemorrhoidalis*, in intestinis inferioribus, *colo* nempe & *recto*, potissimum residet, medicamenta, per os exhibita, effectum suum ad modum tarde exserunt, inter ea vires prosteruntur; *clysteres* autem ad locum adfectum proxime accedunt, intestina emolliunt, lentos humores fluxiles reddunt, & acrimoniam illorum abstergunt.
5. *Clysteres* autem aliquoties repetendi, & tres vel quatuor intra 4-6-8. horas iniiciendi sunt, si nempe colica continet, & præcipue, si prioribus faeces saltem crassiores eductæ fuerint.
6. *Priores* magis sint adsterui, acriusculi, salini, *posteriores* vero magis emollientes.
7. *Vitellionorum* commode clysteribus adduntur, habent enim indolem saponariam resoluendo & abstergendo pinguis, submucida.
8. De *femine* autem *lini* exigua saltem portio addatur, nam valde mucidam reddit consistentiam humorum.
9. Si *clyster* substiterit, simplex aqua calida, cum manipulo salis iniecta, priorem educit.
10. In colica pure hæmorrhoidali *aluus* ita subinde adstricta est, • vt intestinum instrumento clysterico tenaciter resistat.
11. Ex aduerso testantur historix, quod iniecti clysteres, ob motum peristalticum inuersum, sæpe per os egressi sint, aut intolerabilibus cardialgiis ac molestis ructibus ægrum exerceant; quo casu simplex aquosus clyster cum multo sale, vti iam superius dictum, vsum præstat.
12. *Aluo* per clysteres soluta, viribus constantibus, & præsentate in primis viis saburra, ex habitu corporis vel prægressa mala diæta iudicanda, *purgans* aliquod mediocre bono cum successu potest propinari.
13. In colica *hemorrhoidali*, irritis omnibus, auxilio tandem fuit *venæsectio* in pede, vel si & hæc spem frustrata sit, *hirudinum* applicatio ad loca hæmorrhoidalia in paroxysmo operæ pretium fecit; quæ tamen alias meliori effectu ad prophylaxin vsurpantur.
14. Immo vti feminis torminosi tales morbi vehementiores & fre-

& frequentiores, quam viris, contingunt, ob manifestum excretionis menstruæ cum motu hæmorrhoidum consensum, ita & in illis *venæ sectiones*, in pedibus instituta, maximum profecto & præsentissimum, immo mirificum habent usum, quæ proinde magnopere commendantur, tanto magis si insignis plethora, ructus, vel metus vomitus cruenti adsint: coniunctis nitrosis & specificis e millefolio &c.

15. Ad ipsarum autem hæmorrhoidum prouocationem in colica tali hæmorrhoidali nullus adeo in præsens habetur respectus, motus enim sunt erronei, ad finem non pertinentes; in futurum autem, ne colica illa recrudescat, illis consulatur. Conferantur quæ *num. 13. de hirudinum adplicatione* diximus.
16. *Pulveres nitrosi*, si vomitus superuenerint, efficaciam exerunt præsentissimam; succurrit etiam *nitrum* alui expeditioni, si ad drachmas totas detur, per se tamen non producit diarrhœas, sed tum demum, si natura onerata sit, & talia profluvia vtiliter intendat: hinc diarrhœæ tales, si materia molesta excreta fuerit, per se desinunt, licet nitri doses repetantur,
17. Hodierni in colica vulgo festinant ad *opiata*, sed re vera intuta sunt: si enim, aluo nondum liberata, neque causa continente educta, adhibeantur, vires magis debilitantur, materia spissior redditur, dolores, quos breuissime suspendunt, maiore atrocità recurunt, colica in primis spasmodica in habitum transmigrat, vel *paresis* aut spasmus fixus, immo præceps mors succedit. Paresis talis tractatur ad methodum malorum paralyticorum, & spasmus fixus, vti arthritici morbi.
18. Vix etiam *opiatorum* vsus, dextre adhibitus, est necessarius, aluo enim soluta & causa continente educta, dolores plurimum sponte cessant. Si vero, euacuatione, ante omnia bilis, prius instituta, vsus illorum e re videatur, doses parcissimæ exhibeantur.
19. Præcipue autem ab *opiis* abstinendum, si vestigia febrilia

præsto sint cum doloribus, & ita impendentis staseos inflammatoriarum iusta suspicio fovenda videatur, alias partes narcosi tali stupefactæ ad motus naturæ vtilis ineptæ redduntur.

20. *Castoreum* vsu interno angustias præcordiorum & nauseam producit, externe autem pro odore vtilius adhibetur, uti & *assa fetida*, item *corium incersum*, quibus feminæ excitantur, si suffocationes hystericae superueniant.
21. *Regimen* diaphoreticum sine alui solutione, & materiarum crassarum subductione in colica spasmodica inducit paresin, in biliosa bilem in artus diffundit, in ceteris speciebus auget anxietates; lenis autem diaphoresis vsuum suum præstat.
22. *Specificæ* multa quidem laudantur, sed optandum, ut effectum præstent tutum & salutarem.
23. In feminis operæ pretium subinde fecit euporiston illud, nempe *folia berula* quatuor vel quinque puluerisata, & cum calido vehiculo propinata: subadstringente & simul nonnihil aromatica, & tonum roborandi efficacia profunt.
24. *Chamomilla*, specificè laudata, non quidem reiicienda, pro absoluto tamen specifico non extollenda est. *Vid. Simon Pauli.*
25. Tamquam *specificæ* porro laudantur:
 - 1) Cortices aurantiorum in substantia, vel melius in essentia.
 - 2) *Mentha*.
 - 3) *Tanacetum*, cuius odor solus nonnullos restituit.
 - 4) *Caro lupi* in colica hysterica.
 - 5) *Millefolium certissimum* motuum hypochondriacorum sedatiuum.
 - 6) *Tubuli tabacophilorum*, oleo tincti, quid valeant, experiendum.
 - 7) *Radix cynoglossæ* intra horam vndecimam & duodecimam meridianam effossa, & in substantia per spiritum ardentem exhibita, specificè virtute etiam pallore dicitur.

26. Radix *gentiana vera* hic non contemnenda est, diarrhœas etiam contumaces, in primis insignibus torminibus non adeo stipatas, efficaciter tollit.
- 27) Dolores feminarum torminosi, ex inordinato adsumtorum vsu interdum satis acriter excitati, per aliquot cochlearia vini Hispanici seu Canariensis generosi egregie tolluntur.
28. Potus, quantum tolerari potest, *calidus* insignis subinde in paroxysmo est efficacis; *frigidus* autem malum exasperat, & facile spasmos versus superiora inuitare solet, cum vehemente vomitus conatu.
29. Colica *nephritica*, vti ad hæmorrhoidalem etiam referri debet, ita easdem cum hac exposcit cautelas & obseruationes.
30. Ad spasticam *stricturam* in intestinis relaxandam, *pedilunia* & *manulunia* efficaciter inseruiunt.

*****o*****

TABVLA CVIII.

DE
PASSIONE ILIACA,
SEV
MISERERE MEI.

I. DEFINITIO.

Passio iliaca est acutissima species colicæ, variis diris symptomatibus stipata. Deriuatur ab intestino *ileo*, quia hoc potissimum occupat.

II. DIFFERENTIA.

1. In hoc malo tres obseruantur species, secundum causas differentes.
 - 1) Passio iliaca *conuolutionis*, in qua situs intestini intra se ipsum mutatus est, cum duplicatura sui, quam *Sylvius* & *Peyrus*, tractatu de glandulis intestinalibus, descri-

scribunt. Hæc species dicitur *volvulus*, conuolulus, die Verschlenkung der Gedärme.

2) Passio iliaca *herniosa*, in qua intestina, fæcibus vel flatulentia repleta, ita detinentur, vt ægre in naturalem sui ordinem reponi possint.

3) Passio iliaca *obstructionis*, vbi saltem pertinax alui restrictio hoc malum fouet. De singulis sub causis plura.

2. Passio iliaca differt a *colica*

1) vt species a genere.

2) *Gradu* dolorum, quo colicam longe superat.

3) *Loco* adfecto: hic enim intestinum *ileon*, sed non solum, verum etiam reliqua tenuia, in colica autem intestina *crassa* potissimum infestantur.

4) *Prognosi*: longe enim periculosius est hoc malum, quam simplex colica.

III. SIGNA.

1. Dolores atrocissimi, lancinantes, & per transuersum vmbilici scindentes.

2. Insignes anxietates & cardialgiæ cum ructuum frequente emissione.

3. Internæ phlogoses & febriles anxietatis commotiones.

4. Occlusio alui diurna, nec clysteribus facile referanda.

5. Quo magis hoc malum præualefcit, eo magis conatus vomendi, immo ipse vomitus accedit, per quem postea ipsæ fæces aluinæ proiiciuntur, cum variis motibus anxietatis, lipothymicis, conuulsivis.

6. Tandem nisi ocyus auxilium concurrat, inflammationem intestini ilei excipit *sphacelus*, qui quidem dolores repente soluit, sudores autem frigidos & mortem præsentem adfert.

IV. SVBIECTA.

Passio iliaca est rarus ad modum morbus, & sine discrimine sexus atque ætatis in illa subiecta cadit, quæ causis subsequentibus obnoxia euadunt.

V. CAVSSAE.

1. Causa passionis iliacæ *interna* est

1) vel

- 1) vel intestinorum conuolutio, cum succedente stasi inflammatoria
 - 2) Vel hernia incarcerata, vbi intestinum, fæcibus vel flatibus refertum, lapsum, nec facile reponi potest, ob tumorem, qui accedere solet, inflammatorium: vnde contumax alui obstructio exoritur.
 3. Vel pertinacissima alui constrictio, ex abusu præcipue adstringentium inducta.
2. Causæ *externæ & occasionales* obseruantur:
- 1) Vehementes corporis concussiones, currendo, saltando, equitando, rursiendo, sternutando.
 - 2) Gestationes onerum grauiorum cum renisu fortiore.
 - 3) Cibi crudi, fumo indurati, flatulenti, & potus fermentescentes.
 - 4) *Vermes*, præcipue necati & non statim expulsi.

VI. PROGNOSIS.

1. Passio iliaca est malum ad modum periculosum & calamitosum, quod vel per ipsius denominationem, *miserere mei*, auctores exprimere voluerunt.
2. In casu, vbi ex intestinorum conuolutione & distorsione malum exortum est, minima spes vitæ adfulget.
3. Sic etiam passio iliaca ex hernia incarcerata sæpe fit lethalis, præcipue si qualiscumque plethora concurrat.
4. *Melioris* spei illa est passio, quæ ab induratis scybalis & pertinaci alui obstructione fouetur; modo tempestiue artis auxilium accedat.

VII METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

- 1: In *conuolutione & distorsione* indicantur:
 - 1) *Explicatio intestinorum* & reductio in situm suum naturalem; quod autem negotium facilius mente concipitur, quam actu obtinetur. Commendantur in hunc finem varia artificia, e.g.
 - a) Deglutitio *globulorum* aliquot plumbeorum, antimoniatorum, &c. vt pondere penetrent, intestina explicent, & aluum ita aperiant.
 - b) Haustus *mercurii viui* ad integram libram, præmissis

- aliquot vncijs olei amygdalarum dulcium, & subiuncta celeriore corporis motu, siue cursitando, siue equitando, siue curru vehementius vehendo.
- c) Adplicatio *foliis* ad orificium ani; sed quia intestinum rectum ita constrictum obseruatur, vt fistulam clysteris ægre admittat, multo difficilius crassius hoc instrumentum poterit adplicari.
- d) Nouum illud inuentum, nempe clyisma e fumo tabaci, quid hic præstet, experientiæ relinquitur.
- 2) *Discussio inflammationis*: in hunc finem commendantur
- a) *Interne* nitrosa, cinnabarina.
 - b) *Externe*.
 - α) Spiritus vini camphoratus, crocatus, linteis duplicatis abdomini adplicandus.
 - β) Sacculi e discutientibus & carminatiuis cum camphora parati.
 - γ) Venæ sectio, si insignis plethora adsit, tempestiua.
2. In *hernia incarcerata* indicantur:
- 1) *Repositio intestini* prolapsi: in quem finem laudantur:
 - a) Supinus corporis situs.
 - b) Focis e carminatiuis & emollientibus, e.g. herbis maluæ, violar. althææ, summitat. origani, serpilli, floribus chamomillæ, sambuci, seminibus anisi, fœniculi, fœnugræci, psyllii, cum lacte coquendis.
 - c) Absente tumore inflammatorio decocta talia in forma cataplasmatidis adplicari, vel per spongiam, decocto calido imbutam, hernia foueri potest.
 - 2) *Præclusio inflammationis*: qui scopus per nitrosa, item potiones temperantes & diapnoicas obtinetur.
 - 3) *Alui solutio*, quæ, facta intestini repositione, per clysteres emollientes tentanda est.
3. In *scybalarum induratione* indicantur:
- 1) *Interne*: nitrosa, cinnabarina, potiones temperantes & diapnoicæ, ad inflammationem præcauendam, vel iam præsentem discutiendam.
 - 2) *Ex-*

- 2) *Externe* ad eundem finem & præcipue alium expediendam commendantur:
- a) *Clysteres* lubricantes cum nitro, & gr. II-III. camphoræ. Species emollientes superius iam descriptimus; conf. etiam tabula *præcedens de colica*, ubi plura de clysteribus legenda sunt. His pro stimulo denique addatur sapo Venetus, ubique sufficiens oleum, & præsentè inflammatione, album græcum.
 - b) *Suppositoria* acria.
 - c) Spiritus vini camphoratus vel emplastrum saponatum *Barbette*, abdomini applicanda.
 - d) *Illinitio* abdominis cum pinguedine anserina, aut omenti animalis castrati, sed absente inflammatione.
 - e) *Sacculi* calidi e carminatiuis & discutientibus cum camphora.
 - f) *Venasectio* in statu plethorico.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Clysteres* veramque hic faciunt paginam, prostant enim exempla, in quibus nuda aqua calida, cum drachmis VI-VIII. salis iniecta, motum peristalticum deorsum reuocauit.
2. Cauendum autem, ne mel ipsis adiciatur; præsentè enim inflammatione promouet suppurationem.
3. Præter ea faciunt clysteres in hoc pertinacissimo, quod possunt, rarius autem, quod desideratur.
4. In casu *hernia* incarceratæ caueatur ab audace illo conamine chirurgorum imperitorum, qui, præsentè licet tumore inflammatorio, ad operationem incisoriã audacter festinant.
5. Caueant sibi eiusmodi ægri in posterum a causis occasionalibus, superius memoratis, potus semper sit sufficiens, motus corporis placidus.
6. Ad præcauendam talem pertinacem obstructionem sequens pilularum formula, ad grana 3-5. subinde sumenda, a D. D. *Stablio* commendatur;


Recip. aloës rosat. part. II.

extract. panchymagog. *Crollii* part. I.

limatur. martis præparat. part. semis M. f. M. P.

7. *Sydenhami* methodus, quid in illo malo quod ab obstructi-
one alui post abusum præcipue adstringentium in febril-
ibus &c. fouetur, valeat, experiendum est. Trademus
illam sequentibus:

- 1) Præscribebat mane & vesperi scrupulum I. salis absinthii.
- 2) Per diem autem singulis horis, immo sæpius, aliquot cochlearia de aqua menthæ crispæ exhibebat.
- 3) Externe canem iuniorem abdomini imponebat.
- 4) Sedatis doloribus & motibus vomendi, pilul. Coch. cum vehiculo dictæ aquæ propinabat.
- 5) Sub ipso pilularum purgante effectu, immo per plures adhuc dies, eandem aquam vsurpandam commendabat.
- 6) Tenuem admodum, durante morbo, dietam, vix iusculum ad satietatem patienti concedens, vbique calorem, applicato panno duplicato conseruandum, iniungebat.



TABVLA CIX.

DE

V E R M I B V S

I. DEFINITIO.

Vermes sunt animalcula in corpore humano producta, & in primis viis maxime reperiunda.

II. DIFFERENTIA.

1. Vermes differunt secundum species, quarum auctores alii quinque, alii quatuor, alii plures, alii pauciores recensent; satis commode tamen in tres classes diuiduntur:

1) Sunt

- 1) Sunt alii *teretes longi*, qui ob similitudinem, quam cum lumbricis terrestribus habent, *lumbrici* vocantur.
- 2) Alii sunt *lati*, & vel solitarii sese volutant, ad quorum classẽ *cucurbitini*, semini cucurbitæ similes, referuntur, vel catenatim subinde cohærent, & e latitudine sua in longitudinem decem, immo plurium, vlnarum diducuntur.
- 3) Alii sunt *teretes breues*, qui *ascarides* vocantur, & vermiculis casei similes sunt, qui saltum facere solent, sed talis motus in hisce ascaridibus non ita deprehenditur, licet denominationem inde, nempe ab *ἀσκήω* moveo, accepisse videantur. Hi in intestino recto plurimum stabulantur, vbi sensibilem molestiam, titillationem, pruritus & tenesinum inferunt.
2. Occurrunt interdum vermes insolitæ, aculeatæ, immo plane monstrosæ figuræ, præcipue in infantibus, qui ab illis plane consumuntur. Hic incantatio sæpe accusatur, germ. das Kind ist beruffen: vnde etiam similia fascinatoria medicamenta accersere solent. Sed & hic, vt in aliis incantationis suspicionibus, sæpius errare contingit.

III. SIGNA.

1. Frequens *sputatio*, vel ad minimum saliuæ in os effusio, & nauseabunda adfectio, tempore præsertim matutino.
2. Narium pruritus, frictio, immo scalptio.
3. Livescens color albuminis, & concauitas vniuersi, oculorum.
4. Abdominis inflatio & induratio cum doloribus torminosis.
5. Aluus modo obstructa, modo laxans est.
6. Adpetitus vagus, modo nimius, modo imminutus.
7. Sitis, præcipue ieiuna, immo subinde nocturna.
8. Capitis remulenta adfectio.
9. Genæ modo rubent, modo pallent.
10. Alii pauores sub somno cum dentium stridore incurrunt.
11. Alii delirius euigilant.

12. Alii convulsionibus epilepticis, vel plane singularibus symptomatibus corripiuntur, vt pro incantatis ab imprecatis habeantur.

IV. SVBIECTA.

1. Infantes & pueri ob addephagiam vermibus potissimum sunt obnoxii, adeo, vt in illis nonnumquam globi conglomerationi, tunica inclusi, excernantur, germ. Wurm, Stöcke.
2. Adultiores temperamenti corporis cachectici, mucosi, flatulenti, item feminae mensium obstructione laborantes.

V. CAVSSAE.

1. De causis vermium inter auctores nondum conuenit, probabilissimum tamen est, quod a putredine quadam, in corpore humano, praecipue primis viis, contingente, originem ducant; experientia enim docet, animalcula talia e rebus putrefactis provenire, e.g. caseo, carne &c.
2. Huic sententiae lucem adfundit vitium digestionis, quod in subiectis, vermibus obsessis, ordinarie obseruatur: vnde cibi, non legitime cocti, in putredinem abeunt, & natiuitati vermium ansam praebent.
3. Causae externae sunt:
 - 1) Cibi crudi, mucidi, dyspepti, quantitate deglutiti: hinc in pueris edacibus vermes adeo familiares sunt.
 - 2) Dulcia saccharata, nimium vsurpata.
4. Recentiorum opinionem, quasi e seminio insectorum in corpore vermes producantur, multae premunt difficultates; praecipue vero quod vermes figura sua prorsus non conueniant cum insectis illis, quorum seminio productio illorum adscribitur.
5. Vermium in infantibus prouentum ab ipso lactis vitio aliqui arcessunt, vero autem magis simile videtur, semina ex vno corpore in alterum transmitti, e.g. quando nutrices vel vetulae, dentium impuritate vel alia oris labe adfectae, cibos infantum praemandunt, aut per anhelitum foedum turpia semina illis ingerunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Non leue malum est verminosa colluies, & graua sæpius symptomata, tam in iunioribus quam adultis, inducit.
2. Et licet vermes per se alia damna inferre nequeant, quam hirudinum more, intestina sugendo lædere, & in globum complicati, ipsa sui mole obstructiones intestinorum efficere, ad ingentes tamen motuum spasticorum, immo conuulsiuorum exacerbationes naturam stimulant.
3. Extra complicationem cum aliis morbis introducunt vitia adperitus, concoctionis, diarrhœas, vomitus, cardialgias, dolores colicos: non parum etiam ad flatum & mensum obstructionem contribuunt.
4. Cum *chronicis* morbis coniuncti, e.g. malo hypochondriaco-hysterico, motibus hæmorrhoidalibus &c. his non leue pondus addunt, & motus pertinacissimos ad exprimendum & excutiendum concitant.
5. *Acutis* morbis vermes sociati maximorum damnorum auctores sunt, e.g. si in acutis anorexia occurrat, & vermes, nutrimento destituti, moriantur, atque in intestinis putrescant, lethales sæpe motus & irritationes succedunt, nempe conuulsiui adfectus, deliriz, diarrhœas, quæ omnia in acutis periculum augent.
6. Idem damnum inducitur, si vermes per remedia amara, e.g. myrrham, enecat in intestinis putrescant: febres sæpius malignæ inde producuntur.
7. In acutis pro malo omine & signo malignitatis habetur, si in statu, vel etiam incremento morbi vermes excernantur; quo casu antiqui putabant, tantam adfuisse putredinem, vt etiam statim vermes ex illa producti sint.
8. Vermes *rubri*, sanguine per suctionem repleti, febres facile acutas inducunt.
9. *Ascarides*, præter pruritus in intestino recto & tenesim, nullas quidem adeo molestias inferunt, multo difficilius tamen lumbricis expelluntur.
10. Sic etiam *lati* illi cucurbitini, quia vniuersum intestino-

rum systema sæpe occupant, expulsiōni pertinacissime resistunt.

11. *Lumbrici* quando in ventriculum transferuntur, plus negotii faciunt, quam si in intestinis hæreant: pessimorum enim tunc symptomatum auctores obseruantur.


VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Ad vermes *enecandos* exhibeantur specifica amara, interpositis salibus abstergentibus & digestiuis: in hunc finem laudantur:
 - 1) *Radices* graminis, zedoariæ, gentianæ vtriusque & aristolochiæ rotundæ, quæ amaritie nullis facile simplicibus cedit.
 - 2) *Herba* absinth. centaur. min. card. bened. hyperici, tanaceti. abrotan. marrub. alb. succus scordii, millefolii.
 - 3) *Flores* persicorum.
 - 4) *Semen* santonici, & quæ illius species est, tanaceti, e.g. decoctum seminis santonici cum lacte paratum.
 - 5) Myrrha, corallina, elixir proprietatis, vitriolum martis, amygdalæ amaræ, tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum.
2. His per aliquot dies exhibitis, vermes enecati, aut ad minimum commoti & proturbati, e corpore mature *excrnantur*. Præstat hoc, præter reliqua purgantia aloëtica, colocynthiaca, speciatim mercurius dulcis, qui etiam vermes, adhuc viuos, enecat; de quo legatur exiguus tractatus Boyle de specificis.
3. *Externe* abdomini adplicare solent amara, aut bilem tauri umbilico illinunt, item vnguent. de arthanita seu cyclamine, quod externa vnctione non tantum pueros, sed etiam adultiores laxat.
4. Ad dolores colicos mitigandos clysteres dulces conducunt, qui parantur ex lacte, oleo quodam, melle vel saccharo.
5. In cibis fugiantur lactinia, dulcia saccharata, & dyspepta.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quæ insolita plane symptomata a vermibus inducantur, in *Moronii directorio medico* sub titulo vermium & febrium euolui possunt,
2. *Erasmus* epistol. in laud. medicinæ exemplum refert cuiusdam pueri, qui in delirio a vermibus lingua germanica, ab illo numquam intellecta, locutus fuerit.
3. Et sane non solum in infantum, sed etiam adultiorum chronicis morbis præcipue abdominis pathematibus, vermes semper suspecti esse debent, e.g. in adpetitu vago, nausea, cardialgia, saliuâ, ieiuno ventriculo, in os effluente, tenesmo, conuulsionibus.
4. Notatu digna est obseruatio D. D. *Stahl*i dissertatione de adfectibus oculorum pag. 20. quod in *canibus*, præ aliis animalibus, sæpius in ipso fundo ventriculi, vnus aut alter nodus, (addo: siue introrsum siue extrorsum in tunica exporrectus) fabæ quantitatem circiter referens, reperiatur, cum foramine in cavitatem ventriculi exeunte, & capace intus cavitatem, quam interdum vnus maior, sæpius vero numero plures mediocres lumbrici inhabitent.
5. Quæ cardialgiæ & conatus vomendi perennes inde manare debeant, & quam difficillimum sit lumbricos, tali domicilio peculiari circumuallatos, expugnare, ipsa sana ratio dicitur; & licet in corpore humano hæc vermium munimenta nondum adeo detecta sint, plures tamen circumstantiæ eadem reddunt suspecta.
6. In exercitationibus *Francisci Rubei* de febre tertiana continua memoratur, quod quidam diu & grauiter illa afflictus fuerit, & multa remedia frustra sint adhibita, donec vermes quosdam maiores per vices excerneret.
7. Non quæuis amara vermes enecare, nec alimentum eorum amaritiei inficere, ex bile satis manifestum est: hæc enim amarore non caret, & tamen vermibus aduersari non obseruatur: hic specifica amara ad id negotium requiruntur.
8. *Myrrharubra* efficacia in vermibus enecandis satis quidem

- probata, in eo tamen ridicula est, quod vermes, in toto corpore luxuriantes, interimere fingatur.
9. *Species diaturbith* cum rhabbaro vermes quidem expellunt, sed ad modum vehementer & incommode, vomitum enim plerumque cient.
 10. *Amygdala amara* non reiiciendæ sunt: de illis enim notum est, quod animalia quadrupedia (nonnulli addunt: quæ cæca nascuntur) interficiant, & volatilia conuulsionibus inde moriantur: hinc probabile, illas etiam vermibus esse aduersas.
 11. Sic etiam *nuxvomica* pari effectû, animalia necandi, nota est, licet hoc remedium infantibus minus, bene vero adultis, experientia teste, conueniat.
 12. *Cornu cerui* vltum a multis laudatur, id quod experientiæ relinquendum est: de spiritu autem illius notum est, quod, nisi notabilibus dosibus a scrup. I. ad drach. semis exhibeatur, nihil magnopere præster.
 13. De *musco corallino* vna vel altera obseruatio apud *Schenckium* legi meretur.
 14. Herba *saluia* specialiter a quibusdam laudatur: quid efficiat, experiendum est.
 15. Sic etiam laudatur *salsugo* illa, in qua haleces conferuantur, dos. 1-2. cochlearia.



TABVLA CX.

DE

OBSTRUCTIONE ALVI.

I. DEFINITIO.

Obstructio alui est fæcum aluinarum vltra tempus consuetum retentio, a causa modo actiua, modo passiuâ originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. Obstructio alui est

1) vel

- 1) vel *idiopathica*, ubi nulli alii morbi concurrunt;
 - 2) vel *symptomata*, quando alui obstructio aliis morbis accedit, e.g. febribus, congestionibus.
2. Obstructio alui, quæ a causa *activa* dependet, bene distinguenda venit ab illa, quæ magis *passive* contingit; illa enim adstrictio potius, quam obstructio dicenda est. *Vid. causæ.*

III. SIGNA.

1. Retentio fecum aluinarum ultra 24. horas.
2. Temulenta & vertiginosa capitis afflictio.
3. Congestiones circa caput dolentes.
4. Flatuum incommoda.
5. Pressiones circa ventriculum.
6. Angustia & anxietates circa præcordia.

IV. SVBIECTA.

Ad obstructionem alui præ aliis proclives sunt homines

1. Otiosi, sedentarii, speculabundi.
2. Qui ebullitionibus sanguinis obnoxii sunt.
3. Sicciores, temperamenti cholericæ & melancholici.
4. Specialiter hypochondriaci, nephritici, podagræ, & alii arthritici.
5. Plurimi eorum, qui febribus acutis corripiuntur.
6. Κακόςμαχοι.

V. CAUSSÆ.

1. Causa obstructionis alui generatim duplex est, nempe vel *activa* vel *passiva*.
2. *Activam* causam vocamus stricturam illam, quæ in quam plurimis morbis intestino recto a natura inducitur, e.g. in malo hypochondriaco, nephritide, calculo, & in omnibus fere congestionibus sanguinis versus partes corporis superiores.
3. *Passivam* autem causam dicimus, quando obstructio alui a segnitie quadam naturæ, & defectu motus peristaltici dependet: vnde scybala facile indurantur.
4. Causæ *occasionales*, quæ ad hanc scybalorum indurationem contribuunt, sunt sequentes:

Qq q q q 2

1) Ne-

- 1) Neglectus illius temporis & leuioris stimuli, quo natura aluum deponere consuevit.
- 2) Exæstuatio corporis & largi sudores.
- 3) Potus nimium parcus, fæculentus & vita otiosa.
- 4) Cibi crudi, dyspepti, siccores.

VI PROGNOSIS.

1. Obstructio alui multa parit incommoda, immo subinde pericula: præter enim symptomata, quæ sub *signis* adlegata sunt, sequentia adhuc pathemata conspiciunt.
2. In cholericis, biliosis, obbiliosæ saburræ retentionem facile accedunt colica, ardores, phlogoses.
3. Scybala indurata, quando venulas intestinorum comprimunt, & hac ratione liberum sanguinis in illis profusum sufflamant, inflammationem circa hæc loca excitant periculosam.
4. Obstructio alui cum aliis morbis complicata, hos vix non omnes exacerbat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. In obstructione alui *idiopathica*.
 - 1) Hæc, præcipue in habitum deducta, quam difficulter in ordinem naturalem redigi solet, certissime tamen *motu & potu* superatur;
 - 2) *Motu* quidem non violento, qui potius obstructionem auget, sed placido & continuo: hoc enim remedio tonus intestinorum naturalis restituitur.
 - 3) *Potu* autem sufficiente, diluto, bene defæcato; qua ratione scybalorum induratio impeditur.
 - 4) Non exiguum etiam ad aluum expediendam confert momentum, certo & determinato quotidie tempore huic excretioni indulgere & paullulum ei insistere: hoc enim incommodo per aliquot hebdomadas superato, natura obsequentior fiet & temporis iactura largiter resarciatur, testantibus pluribus exemplis, quorum habitualis obstructio hoc modo feliciter sublata est.
 - 5) Sic etiam vsus aliquem præstat, panem exiguum, butyro

tyro *largiter* illitum, prandio & coenæ paullulum præmittere.

- 6) Tempore vernali & autumnali in vsum veniant congruæ purgationes.
- 7) *Vrgente* autem *adfectu* clysteres magis conducunt, quam interna laxantia, nisi sint benignissima & tamen satis efficacia; ad quorum censum pertinent pilulæ *Stahlianæ*, *Beccherianæ*, item martiales, e.g.

Recip. aloës rosat. drachm. II.

extract. panchymagog. *Crollii* drachm. I.

linatur. martis drachm. semis M.f.l.a. pilul.

dof. gr. 4 - 6.

2. In adstrictione alui *symptomata*.

- 1) In hac primarius quidem morbus respiciendus est, quoniam tamen aluus adstricta illum sæpe exacerbatur, expedita autem eundem notabiliter consolatur, excretio illa dextre promouenda est.
- 2) Hinc in morbis *chronicis*, e.g. malo hypochondriaco, congestionibus circa caput &c. eadem valeant consilia, quæ ad idiopathicam obstructionem dedimus, habito tamen vbique respectu ad primarium malum.
- 3) In *acutis* autem sufficiens saltem potus, clysteres, & sine hæsitatione, pilulæ *Stahlianæ* locum habeant. *Vid. cautela.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Segnities alui *habitualis* quando occurrit, semper inquirendum est, num incommoda, sub *signis* & *prognosi* descripta, sint constipata: his enim absentibus, non opus est medicatione.
2. Occurrunt enim eius modi exempla, licet satis rara, ubi aluus per 3 - 6. dies ordinarie clausa est, nec tamen incommoda inde sentiunt: immo notum est, quod indiuidua quædam, licet ordinarium & sufficientem cibum adsumerint, aluum tamen intra duas, tres vel quatuor hebdomadas semel tantum habuerint apertam, bona de reliquo sanitate gaudentia.

3. Duo illa remedia, nempe *motus* & *potus*, non debent separari; solus enim *potus* peristalticum motum in primis viis adhuc magis relaxat, & sic in causa saltem actiua, nec in hac vbiq;e, sufficit; solus autem *motus* humidum in intestinis magis dissipat, vnde scybala indurantur.
4. A *motu* nemo deterreatur, qui, minus illi adfuetus, sub initium maiorem potius adstrictionem, quam alui solutionem ab illo experitur: placida enim illius continuatio meliora ostendet.
5. *Aqua calida*, siue coffée, siue thée, siue alio conueniente herba aut radícula imbuta, eximium hic habet vsum; cauendo solum, ne nimis sit saturata, alias coffée, præsertim deficiente motu, tremorem artuum inducit, thée autem nimis adstringente efficacia operatur.
6. Siccitatem alui, præcipue vero veram illius adstrictionem acrioribus *purgantibus* oppugnare, plurima mala producit.
7. Immo *laxantia* leniora improbantur; & hæc enim & acriora purgantia maiorem sæpe adstrictionem inducunt; ad minimum, dum causa per illa non tollitur, malum inde non mitescit.
8. Tanto magis autem laxantia, *nimis frequenter* exhibita, damnum inferunt: succedit enim tanta naturæ segnities, vt sua sponte tandem aluum plane non soluat, vnde adfectus facile colici, immo iliaci, vel, quo magis aloëtica adhibita sunt, splenetico-hypochondriaci, melancholici, arthritico-spastici inducuntur.
9. In *symptomatica* obstipatione sollicitè inquirendum est, num morbus primarius alui solutionem artificialem toleret: sunt enim febres quædam acutæ, in quibus huius excretionis promotio non sine vitæ periculo suscipitur, e. g. variolæ, morbilli, purpura, rubra & alba.

TABVLA CXI.
DE
TENESMO
ET
PROCIDENTIA ANI.

I. DEFINITIO.

Tenesmus est continuus, plurimum vacuus, desidendi conatus, interdum cum aliquo interdum cum insigni tumore ani coniunctus. Deriuatur a *τείνω* tendo, hinc *τενεσμός* nisus.

II. DIFFERENTIA.

Tenesmus est adfectus mere *symptomaticus*, & non aliter differt, quam secundum diuersas causas & morbos primarios, cum quibus complicatus est.

III. SIGNA.

1. Titillatio, pruritus molestus, serpiginosus, in orificio ani.
2. Vrens sensatio ad comprimendum & exprimendum.
3. Continuus ad desidendum quidem conatus, nulla autem, nisi pulposo-mucosa, pauca excretio.
4. Intestini recti saepe procidentia, cui suspectus nonnumquam tumor accedit.

IV. SVBIECTA.

Tenesmus familiaris est

1. *Hæmorrhoidariis*, quando scilicet hæmorrhoides non legitime succedunt, motus tamen adsunt ad easdem promouendas.
2. Qui materiam valde acrem, biliosam, per aluum diu reiciunt.
3. Non raro calculo vesicæ laborantibus.
4. Feminis grauidis, quando vterus intestino recto fortiter incumbit, vnde irritatio ad desidendum, & compressio venarum hæmorrhoidalium, in hoc intestino currentium, cum tumore exoritur.

Procidencia autem ani euenit

1. Omnibus modo dictis subiectis.
2. Infantibus ob acres diarrhœas & inconditos clamores.
3. Illis personis, quæ magna difficultate fœces aluinas siccas deponunt; vel diurnas diarrhœas & dysenterias perpellæ sunt.
4. Quæ paralyfi spincteris ani laborant, etiam hanc molestiam, licet non statim, sed successu temporis incurrunt.

V. CAUSSAE.

1. *Tenesmi.*

1) *Causæ interna.*

- a) Fluxus alui biliosus vel alius acris materiæ.
- b) Negotium hæmorrhoidale, non legitime succedens.
- c) Ascariides, intestinum rectum obidentes, & itumulantes.
- d) Calculus vesicæ non raro tenesimum ciet: vnde partium connexio adparet.
- e) Pondus vteri in grauidis, intestinum rectum comprimens.

2. *Causæ externa.*

- a) Resinæ purgantium adsumptorum, præcipue pars resinosa aloës & hellebori nigri.
- b) Equitatio diuturna.
- c) Charta ad absterfionem ani vsurpata, cui piper, zingiber, vel alia acria caustica, e.g. alumen, vitriolum, interfuerunt.

2. *Procidencia ani.*

- 1) Hæc dependet ab iisdem generatim causis, quæ tenesimum inducunt.
- 2) Speciatim vero a relaxatione tunicæ nerueæ & glandulosæ intestini recti, per crebriores alui fluxiones &c. producta: nam tota tunica fibrosa externa non prolabitur, vtpote tenacibus plane ligamentis spinæ dorsif vndique firmissime adnexa, sed tantum interna neruea & glandulosa.
- 3) Cui rei specialissime adnumeranda est *paralytica sphincteris*

Eteris ani relaxatio, quamquam paralyfin huius musculi non statim, sed successu demum temporis procidentia ani sequatur.

VI. PROGNOSIS.

1. *Singultus*, tenesmo superueniens, periculosus est.
2. *Hippocrates* aphorism. 27. sect. VII. dicit: mulieri in vtero gerenti tenesinus superueniens, abortire facit.
3. Procidentia ani est adfectus re vera molestissimus, in primis si diutius continuet, quod per totos interdum dies contingit.
4. Immo si intestinum inflatur, & refrigescat, metus est inflammationis, gangrænæ, sphaceli, mortis.
5. Si vero recte tractetur, & non nimis crebro iam facta sit, procidentia talis facile adhuc restituitur.
6. Concurrente causa paralytica sphincteris vesicæ, plus difficultatis subest.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Tenesmi.*

- 1) Quoniam *tenesmus* pure symptomaticus est adfectus, ante omnia morbus primarius respiciatur.
- 2) Hinc in causa *ascaridum* anthelmintica & externe clysteres, ex herba tanacetii, radice graminis, summit. absinthii, myrrha, parati, exhibeantur: his enim enecatis & expulsis, symptoma sponte cessat. *Conf. tab. de vermibus.*
- 3) Præsentem *calculum vesicæ* hic tractetur secundum methodum, tabula de calculo commendatur.
- 4) In fluxu bilioso, acri, dysenterico, motibus hæmorrhoidalibus & statu grauiditatis, sequente modo medicatio instituat, nempe ad materiam acrem obtundendam & euacuandam, atque motus spasticos demulcendos exhibeantur:
 - a) *Interne* nitrosa, aborbentia, cinnabarina; item emulsiones, gelatinæ, cremor hordei excorticati, gummi arabic. tragacanth.
 - b) *Externe.*

Rrr rr

a) Cly-

- α) *Clysteres* e lacte pingui, herbis emollientibus, feminibus carminatiuis, oleo quodam, e.g. amygdal. dulc. lilior. alb. papau. flor. verbasci, cum vitello oui subacto, pauco saccharo, parati.
- β) *Vapor* terebinthinæ, feminum carminatiuorum, e.g. anethi, parti adfectæ admissus.
- γ) *Fotus* calidi e floribus & herbis carminatiuis, flor. chamomillæ, verbasci, immo e folius auenæ excorticatæ decocto, cataplasmatibus instar adplicato; cui exterius instilletur oleum chamomillæ, lini, lilior. alborum.
- δ) Ante omnia *externus calor*, tanto magis si cum torminibus & deiectione acri coniunctus sit tenuissimus, commendetur.
- ε) Quo etiam casu non leue præstat leuamen, vas aqua calida repletum supponere.
- ζ) Unguentum e mucilagine cydoniorum, oleo verbasci & vitello ouorum paratum.
2. *Procidentiæ ani.*
- 1) Repositio intestini recti quantocyus promoueat per
- a) situm, vt æger antrorsum pronus ponatur.
 - b) Modestam repressiorem digitis, oleo prius inunctis, e.g. ol. verbasci.
 - c) Spongiam seu linteum oleis decoctis adstringent. & carminatiuo - neruinis imbutum, & ægro iacenti suppositum.
 - d) Adspersionem pollinis mastichis & momenti aluminis.
 - e) Sacculum, v.g. ex auena excorticata in aqua foliorum quercus ad molliculam consistentiam cocta, cui parum aluminis inspergitur, vt tali sacco calido infideat ægrotus.
 - f) Aquam tenellorum foliorum quercus calefactam, & aqua rosarum remixtam.
- 2) Quam diu intestinum prolapsum adhuc hæret, blando calore diligentissime foueatur, ne cum frigore periculum accedat.


- 3) *Inflammatio* si concurrere videatur, huius legitima discussio prius tentetur, e.g. per epithema ex herbis scordii, saluiæ, flor. chamomill. rosar. sambuci, vino coctis, & deinde procidentia cura subiungatur.
- 4) Quando *sphincter* paralyti eneruatus est, post repositionem morbus ad methodum *tabula de paralyti* commendatam tractetur, & intestini detentio per subligacula promoueatur. Est autem fere semper infanabilis.
- 5) Alui successus placidus, si necessarium fit, promouetur per lenientia, nitrosa, relaxantia, vel per clysteres.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. In tenesimo *hamorrhoidali* & bilioso caueant sibi ægri ab *aloëticis*, e.g. pilulis *Francofurtensibus*, elixire proprietatis.
2. Tenesimum grauidarum nil nisi partus exclusio tollit, mitigatur tamen per medicationem sub methodo commendatam.
3. *Lac* ad clysteres fit recens, non acescens,
4. Absterasio ani per folia *verbasci* bonam potius opinionem fouet, quam aliquem effectum producit.
5. Si *colica*, non tamen biliosa, cum tenesimo concurrat, clysteri aliquid salis, ad mucum abstergendum, adiiciatur.
6. In actis N. C. dec. II. ann. I. mentio fit exempli, quod intestinum rectum ad integræ vlnæ longitudinem prolapsum fuerit; sed hoc fidem fere superat; tota enim huius intestini longitudo vix ad dimidiam vlnam accedit.
7. Pulueres leniter *adstringentes*, quando ad promouendam intestini repositionem adhibentur, debent esse tenerissimi, ne tunicis adhærendo tenesimum magis augeant; aut de nouo inuitent, e.g. puluis gallar. tormentill. bistortæ.
8. Sic etiam cauendum, ne *adstringentes* pulueres, e.g. aluminis, nimis constringant, & hac ratione ad excretionem magis stimulent.
9. *Flores verbasci*, si æstui solis in vitro exponantur, aut massæ panariæ illud vitrum inuolutum in clibanum reponatur, fatiscunt in fuscum liquamen, quod, leuissime eua-

porando, in consistentiam vnguenti redactum, egregium est neruinum traumaticum, balsamicum, consolidatiuum & hinc in caussa huius mali paralytica egregie conducit.

10. *Hartmannus* puluerem de *scarabais equinis* ad procidentiam intestini recti mirum in modum extollit. De *ligaculis* vid. *Sculteri* armamentarium, & *Paraus* in scriptis medicis.



TABVLA CXII.

DE

V O M I T V.

I. DEFINITIO.

Vomitus est inuersus motus peristalticus ventriculi & intestinorum, per quem natura noxiam aliquam materiam, siue vere existentem, siue imaginariam, proxima hacce via eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

Differt vomitus secundum varias suas species, quarum sequentes adnotamus:

1. Vomitus *simplex* cruditarum primarum viarum, siue mucosarum, siue biliosarum. Huc etiam spectat vomitus in febre tertiana sub paroxysmo frigoris contingens.
2. Vomitus *periodicus*, qui certo anni tempore, mane vel circa prandium, quibusdam sanis familiaris est.
3. Vomitus *nephriticorum* & *calculosorum*, ante noui paroxysmi recursum eueniens.
4. Vomitus *hypochondriacorum* & *hystericarum* sub commotione sanguinis in vena portæ contingens.
5. Vomitus *vermium*, non tantum in infancili, sed etiam adultiore ætate reperiendus.
6. Vomitus *vulneratorum* profundius in cerebrum, ob consensum paris octaui neruorum.

7. Vomitus *granidarum*, satis frequens.
8. Vomitus vel *criticus* in acutis, vel *symptomaticus* in iisdem a rebus externis, e.g. potu frigidulo, excitatus.
9. Vomitus *niger*, instar roob sambuci, in chronicis & acutis.
10. Vomitus *iliacus*, vbi excrementa, immo clysteres *à vo* excerni solent.
11. Vomitus *imaginarius*, quando sensibilia subiecta ob visum tantum vel auditum rerum nauseosarum seu aduersarum vomitu corripuntur; quo etiam spectat, quod quidam homines sine vomitu non possint audire cantilenas de morte agentes, item nec naui nec curru vehi, præcipue retrorsum sedendo. Huc referendus est vomitus nauigantium die See-Krankheit.
12. Vomitus *cruentus* ad hæmorrhagias spectat.

III. SIGNA.

Signa, quæ vomitum partim præcedunt, partim eundem commitantur, sunt sequentia :

1. Nauseabunda ad vomitum conamina.
2. Cardialgia, & angustia præcordiorum.
3. Crebræ horripilationes.
4. Saliuæ in os effusio.
5. Adfectio capitis vertiginosa & temulenta.
6. Lassitudo per corpus vniuersum.
7. Hæc signa omnibus vomitibus sunt communia, peculiaris autem & certis speciebus, e.g. iliaco vomitui, propria, per se satis sunt manifesta.

IV. SVBIECTA.

1. Vomitus *mucosus* temperamento sanguineo-phlegmatico est familiaris.
2. Vomitus *biliosus* cholericis præ aliis proprius est.
3. Vomitus *granidarum* ordinarie in eius modi sanguineis obseruatur, quæ reliquo tempore cupedias solent amare.
4. Reliquarum specierum subiecta sub *differentia* iam denominata sunt.

V. CAUSSAE.

1. Causſæ vomitus *mucofi* ſunt:
 - 1) Cibi dyſpepti & ab his relictæ in primis viis ſordes mucoſæ tenaces.
 - 2) Cibi cum nauſea adſumti.
 - 3) Vermes.
 - 4) Refrigerationes ventriculi.
 - 5) Mutatio diætæ & vitæ reliqui generis.
2. Causſæ vomitus *biliofi* ſunt:
 - 1) Iracundia, maxime tacita & ſuppreſſa.
 - 2) Senſibilitas ſubiecti.
3. Cauſſa vomitus *nephriticorum*, calculoſorum, item hypochondriacorum & hystericarum eſt ſaburra in primis viis, quam natura, ceu rudiora impedimenta, ante novum paroxyſmum remouere intendit.
4. Cauſſa vomitus *vulneratorum* in caput eſt conſenſus paris octaui neruorum cum ventriculo.
5. Cauſſa vomitus *iliaci* videatur tabula de *paſſione iliaca*.

VI. PROGNOſIS.

1. Vomitus *ſimplex*, in primis *periodicus*, & qui in febribus intermittentibus ſub frigore, & in acutis critice contingit, ſalutaris eſt, licet oprandum ſit, vt violentus & inuertius talis motus periltalticus iuſto ordine adminiſtretur, & ita materia peccans per inferiora educatur.
2. Vomitus *hypochondriacorum* & hystericarum metum incutit vomitus cruenti ſucceſſuri; tanto magis, ſi a ſuppreſſis hæmorrhagiis foueatur.
3. Vomitus *gravidarum* nimis violentus & perennans, abortum minatur.
4. Vomitus *niger* in acutis ſignum eſt lethale, in chronicis vero poſt quartanas, aut paſſiones hypochondriacas, diutius toleratas; melioris eſt euentus. *Conf. tabula de febre quartana intermittente.*

VII. METHÔDVſ MEDENDI ET REMEDIA.

1. Materia ad euacuationem *præparanda*, &, ſi opus ſit, eliminanda eſt.

1) Ma-

- 1) Materiam *mucosam*, viscidam & tenacem incidunt & abstergunt
- a) *Salia* digestiua: tartarus vitriolatus, tartarus tartarifatus, arcanum duplicatum, nitrum antimoniatum, cremor tartari, sal tartari, liquor terræ foliatæ tartari, item *salia* fixa: ablinthii, card. benedict. centaur. min. sal digestiuum *Sylui*, sal ammoniacum depuratum.
 - b) *Radices*: ari, gentian. rubr. helenii, pimpinel. alb. & c.
 - c) *Gummi-resina*: ammoniac. galban. sagapen.
- 2) Materiam nimis *tenacem* & *viscidam* reddunt pulposam & volubilem omnia præcipitantia: conch. præparat. oculi cancri, mater perlarum, crystallus montana.
- 3) Materiam *biliosam*, *acidam* & *nidosam* obtundunt & incraffant modo dicta præcipitantia, item limatura martis, gummi arab. tragacanth.
2. Materia subacta & eliminata *motus*, si sponte non cesser, sopiendus est.
- 1) *Interne* conducunt anodyna correcta, gemmata, cinnabarina, e.g.
 Recip. spec. de hyacinth.
 conch. præparat. ana gr. VI.
 coralliorum gr. IV.
 cinnabar. antimon.
 M. P. de cynoglossa ana gr. II. M. pro dosi.
 Conducunt etiam in hunc finem: theriaca scrup. I. ad drach. I. in vino calido exhibita, item theriaca cælestis, tinct. anodyna *Langelotti* ex opio, cum succo cydoniorum fermentato.
 - a) *Externæ* locum habent.
 - a) *Emplastra*, e.g. recip. emplastr. de crusta panis & tamaricæ ana vnc. semis, camphoræ gran. V. olei cuiusdam carminatiui, anethi, cumini, q. s. ad malaxationem.
 - b) *Epithemata* e caryophyllis, mastiche, ligno aloës & herbis aromaticis.

c) *Bal-*

- c) *Balsama stomachica* scrobiculo cordis calide illinenda.
- d) Immersio manuum in aquam calidam reuulsorio scopo laudatur.
3. *Tonus* denique ventriculi roborandus est. Huc pertinent
- 1) *Interne* neruina, tonica, martialia teneriora, & stomachica, e.g. mixtura tonico-neruina *Stablii*, essent. absinth. compos. citri, aurant. gentian. rubr. centaur. min. galang. zedoar. tinct. martis aperitiua *Ludouici*, &c.
 - 2) *Externe* locum habent stomachica emplastr. balsama & epithemata, superius iam indicata; quo nomine vulgare illud remedium sane non contemnendum est, quando crusta panis tosta, aromatibus & vino generoso imbuta, calide applicatur.
4. Vomitus *gravidarum* sequente methodo tractetur :
- 1) Aromatica carminatiua aliquoties per diem exhibeantur, e.g. essent. galang. zedoar. citri, aurant. Egrege etiam conducunt rad. cyperi, irid. Florentin. helen. rosmarinum, ladanum vino immissa, & versus prandium accœnam adhibita. Confert etiam hic & alibi essent. millefol. & tinct. coralliorum.
 - 2) Nonnumquam lene aliquod laxans interponatur, e.g. pilul. *Stablii*, *Becheri*, vel clysteres.
 - 3) Ad prophylaxin ante conceptionem venæ sectio instituat, quæ vomitus gravidarum impedit *Conf. tabula de adfectibus gravidarum.*
5. Vomitus *nephriticorum* exposcit :
- 1) alui solutionem per clysteres temperantes & acrimoniam infringentes.
 - 2) Nitrosa cum sale quodam digestiuo, pauca portione cinnabaris, &, in primis, si etiam circa umbilicum incommoda sentiantur, gutta I. olei vel cinnamomi, vel cardamomi, vel caryophyllorum.
 - 3) His præmissis essentia millefolii in usum veniat.
 - 4) Ardor febrilis si non adest, salia volatilia vrinosa, cum tinctura alcalina remixta, in temperamento præcipue


pue phlegmatico, locum habent. Confer. tabula de *nephritide*.

6. Vomitus *hypochondriacorum* & *hystericarum* eadem metho- do ac *nephriticorum*, in primis autem per nitrosa & es- sentiam millefolii, tractatur.
7. Vomitus *cholericus*, seu cholera simplex, tractatur absor- bentibus nitrosis &c. *Conf. tabula de febris biliosis.*
8. Vomitus *propter vermes*, his extirpatis, cessat. *Vid. tab. de vermibus.*

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Cum grano salis accipiendum est axioma illud: *vomitus per vomitum curatur*, error enim grauissimus committi potest in subiectis, quæ ad vomitum cruentum vel hæ- moptysin procliuia sunt.
2. Non minore periculo *hypochondriacis* & *hystericis* nauseo- sis, vomituribundis, & de ventriculi debilitate conque- rentibus, vomitus prouocatur: prostant enim exempla quam plurima, quæ inter vomendum vel sanguinem re- icerunt, vel delira, immo maniaca facta sunt. Vbi ver- mes suspecti sunt, vomitus etiam vitandus est.
3. Quando autem vomitus a cibis apeptis, pinguibus, ira vel nausea adiuntis, exortus est, tum emeticum aliquod, e. g. tartarus emeticus, præmisso, si opus sit, digestiuo, lo- cum habet.
4. Radix *ipecaacanhæ* præ ceteris emeticis hoc præcipuum ha- bet, quod, præter virtutem emeticam, ventriculum et- iam roborat: vnde in hoc casu tanto magis commenda- tur, e.g. recip. rad. ipecaeoan. gr. XV. salis absinthii gr. V. misce pro dosi.
5. Vomitus quando in *febris* contingit, bene obseruandum est, num verus ille sit, an vero laboriosum tantum vo- mendi conamen, ein blosses Würgen: hoc enim frustra- neum, ac proinde vel sedandum vel promouendum est; illud obtinetur per remedia sub *methodo* commendata, hoc autem per materiæ præparationem ope pulueris di- gestiuo, singulis horis ad scrup. I. propinandi.

6. Vomitus in *acutis* symptomaticus, quia sæpius a cibo vel potu frigido dependet, præcauetur, si sub initium parum, sæpe, & calide bibatur, & deficiente adpetitu, nihil cibi adsumatur. Præter ea tali vomitui & simul causæ generali optime per pulveres bezoardicos occurritur.
7. *Mentha* in vomitu simplice specificum pro feminis habetur.
8. Ad *analepsin* externe commendatur acetum rutaceum, rosatum, flor. calendulæ, pro feminis autem acetum castoreo simul imbutum.
9. Pro *diata* nihil melius conducit, quam quies & calor.
10. *Filum*, quod farcimini fumato adligatum fuit, verula quædam collo ægri circumdare, & hac ratione vomitum sedare solet. Sed talia artificia credulitati hominum potissimum superstructa sunt.
11. *Flores calcatrippæ* a recentioribus quibusdam laudantur in vomitu, præcipue infantum, sistendo, & quidem in forma decocti cereuisiarii, vinosi, aquosi vel lactis: efficaces fuisse hos flores, ubi alia remedia interne & externe frustra adhibita fuerint, testantur.



TABVLA CXIII.

DE

DIARRHOEA.

I. DEFINITIO.

Diarrhœa est intensior motus peristalticus intestinorum, per quem principium vitale materiam aliquam siue mucosam, siue biliosam e primis viis eliminare intendit. Deriuatur a *διὰ*, per, & *ῥέω*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

Diarrhœæ differunt secundum *species*.

1. Diarrhœa *simplex* dicitur, quando materia seroso-mucosa deiicitur.
2. Diarrhœa *cholericæ*, in qua biliosa saburra eliminatur.
3. Diarrhœa *lientericæ*, vbi cibi ita crudi excernuntur, vt ne exiguum quidem coctionis signum adpareat.
4. Diarrhœa *cæliacæ*, in qua excrementa per coctionem paululum in chymum mutata reiciuntur.
5. Diarrhœæ *dysentericæ & hepaticæ* peculiaribus tabulis exhibitæ sunt.
6. Diarrhœæ *criticæ* sunt, quæ die critico, e.g. in febribus quotidianis continuis, item, quod paullulo rarius evenit, in tertianis sub paroxysmo, proueniunt.
7. *Semi critica* sunt, quæ in febribus catarrhalibus, petechizantibus, contingunt.
8. *Symptomaticæ* sunt, quæ e.g. in variolis, morbillis, purpura accedunt.
9. *Ictericæ* sunt, quando alba excrementa deiiciuntur.
10. *Periodicæ* sunt, quæ certis anni temporibus, & præcipue circa æquinoctia, obseruantur.
11. *Colliquatiuæ* dicuntur, quæ in hæctica consummata, sub excretionem materiæ seroso-lymphalis, eueniunt; de quibus autem, tamquam *passiuis* magis fluxionibus, non prorsus valet definitio.

III. SIGNA.

Diarrhœarum signa satis quidem sunt manifesta, symptomatica autem, quæ easdem plerumque vel præcedunt vel comitantur, sunt sequentia:

1. Præcedunt *motus tensiui* & borborygmi in abdomine, cum *doloribus* lancinantibus & pungentibus, præcipue in regione umbilici.
2. *Appetitus* plurimum statim sub initium est deiectus.
3. *Vires* autem tum demum valde minuuntur, quando excretio illa per aliquot dies largiter procedit.
4. Quo diutius continuat, eo facilius *tenesmus* accedit, *caput* debilitatur, & *calor* internus, maiora incommoda minitans, augetur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Diarrhœis *simplicibus*, mucofo-ferofis, temperamentum maxime phlegmaticum fubiacer: in talibus enim fubiectis excrementa femper fere funt tenuia.
2. Quo magis autem fimplices hæ diarrhœæ certam *perio-*
dum obferuant, eo magis temperamento fanguineo funt propriæ.
3. Diarrhœis *biliofis* cholericis potiffimum expoſiti funt.
4. Diarrhœæ *criticæ*, quæ in febribus aliquando proueniunt. in fanguineis fæpius obferuantur.
5. Homines fenſibiles & delicatuli, fi, corpore calente, nudis pedibus incedant, facile diarrhœas fimplices incurrunr.

V. *CAVSSÆ.*

1. Cauſſa *materialis* in diarrhœis fimplicibus eſt ordinarie materia lenta, tenax, viſcida, in primis viis.
2. Aliquando præſto eſt materia ſemi-corruprta, cum vermibus, non ſolum in ætate infantili & puerili, ſed etiam annoſiore: proſtant enim exempla, in quibus aſcarides ſingulis menſibus per diarrhœam excernuntur, concurrente in inreſtino recto pruritu, valde moleſto.
3. Cauſſa *efficiens* eſt principium vitale, quod motum periftalticum intendit, & ſimul copioſos humores e maſſa fanguinea adpellit, ad materiam talem reſoluendam & abſtergendam.
4. Cauſſæ *externæ & occaſionales* funt:
 - 1) Sudores, in primis matutini, cohibiti.
 - 2) Cibi crudi & dyſpepti, immo etiam pingues, ſi ſubiecta ſenſibilia ſtatim bibant; præcipue autem intemperans fructuum fermentefcentium ingeſtio, maxime ſi mox etiam potus accedat.
 - 3) *Refrigeratio* abdominis poſt prægreſſam feri colliquationem per corporis exagitationem. Vnde natura cogitur ſerum illud acre orgaſticum repulſum per aliam viam expellere.
 - 4) Potus ſæculentus, & vere fermentefcens, e.g. muſtum, frigidus etiam potus, vel ipſum refrigerium; quo ve-

ro casu sensibilitas subiecti magis, quam materia, peccat.

5. Causa diarrhoeæ *lienterica* est frequenter cicatrificatio intestinorum, antea eroforum, e prægressa dysenteria, qua orificia vasorum lacteorum simul læsa sunt. Interdum autem vel ventriculi imbecillitas, vel motus peristaltici exacerbatio peccat.
6. pro causa diarrhoeæ *cæliaca* non tam imbecillitas ventriculi, quam vasorum lacteorum obstructio accusanda est.
7. Diarrhoeæ *cholericæ* causam esse effusionem bilis in intestinum rectum, sub animi excandescencia contingentem, per vulgus constat. *Conf. tabul. de febribus biliosis.*
8. Causæ reliquarum specierum suo loco adlegatæ sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Omnes diarrhoeæ, maximæ etiam malignitatis, si per *adstringentia* vel *opiata* cito sistantur, grauiora damna inducunt, quam si sui iuris maneant: tota enim familia simplicium diarrhoearum nihil periculosi minatur.
2. Hinc *simplex* tantum diarrhoea, imprudente tali ratione tractata, successores habet dolores colicos acutissimos, translationes materiæ, præcipue in senioribus, ad caput vel pectus: vnde adfectus vertiginosi, catarrhales, catarrhi suffocatiui &c. oriuntur.
3. Maiora autem & præsentiora damna succedunt, si diarrhoeæ *biliosæ* supprimantur: facile enim febris causodea inde oritur.
4. Omnium maxima pericula inducuntur per diarrhoearum *criticarum* suppressionem.
5. Diarrhoeæ *semi-critica* ita salutariter quidem non procedunt, nullum tamen conspicuum detrimentum morbo adferre obseruantur.
6. Diarrhoeæ *symptomática* in variolis, morbillis, purpura, &c. infeliciter quidem sæpius exeunt, negandum autem non est, quod interdum nihil periculi adferant.
7. *Periodica*, nisi turbentur, sunt salutares.
8. Simples *lienterica* & *cæliaca* diarrhoeæ etiam satis sunt benignæ, & medicamentis facile cedunt.

9. *Cholerica*, nisi febris accedat, mediocriter se habent.
 10. Denique quæuis diarrhœa, copiose & diu procedens, vires exhaurit, & ægrum denique in febrem lentam aut atrophiam coniiicere obseruatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. In diarrhœa *simplice*, ad materiam mucosam & tenacem incidendam & abstergendam exhibeantur remedia digestiua, resoluentia, colliquantia, e.g.
- 1) *Vegetabilia* amara, resoluentia, acriuscula, aromatica. rad. gent. rubr. ari, helen. zedoar. herb. absinth. centaur. min. herbæ capillares, piper, zingiber, galang. acor. & costus verus. Item semina aromatica: anisi, fœniculi, cumini, dauci, ammeos, amomi, quæ singula & composita saburram illam tenaciorem resoluere, abstergere & fluxilem reddere possunt.
 - 2) *Salia media*: arcan. duplicat. nitrum antimoniac. tartarus vitriolat. it. sal tartari, cremor tartari, liquor terræ foliat. tartari, sal digestiuum *Syluii*, sal ammoniac. depurat.
 - 3) *Salia fixa*: absinth. centaur. min. card. benedict. &c.
 - 4) *Gummi-resina*: ammoniac. galban. sagapen.
 - 5) Conuenit etiam aliquando materiam nimis tenacem & viscidam in pulposam & volubilem consistentiam redigere per præcipitantia, e.g. matr. perlar. conch. præparat. ocul. cancr. crystall. montan.
 - 6) Quo magis autem *biliosa* subest materia, eo magis nitrosa cum dictis præcipitantibus necessaria. Huc pertinet methodus tabula de febribus biliosis commendata.
2. Præparata materia per lenia laxantia *euacuetur*, & sic labori naturæ succurratur: id quod commodissime peragitur pilulis *Becherianis* veris, vel *Stahlianis*, quarum aliquot doses, etiam sine præmissis præparantibus, solæ sæpius sufficiunt, ad diarrhœam simplicem feliciter tollendam. Conducit etiam rhabarb. item vsus habent clysteres carminatiui, abstergentes.

3. Deinde motus pertinax, si, eliminata materia, sponte non cesset, sopiatur per
 - 1) Tonica subadstringentia: pira exsiccata, cydonia, & ex illis parata, nempe diacydonium tabulatum cum & sine aromatibus.
 - 2) Gemmata, lapides quinque pretiosos, spec. de hyacinth. coralliata.
 - 3) Lenia anodyna, M.P. de cynoglossa, theriac. essent. opii *Langelotti*, item nucem moschatam, quæ simplex magis sopiens est, quam adstringens.
 - 4) Sequentia composita: syrupum de agresta, trageam granorum actes, myrtillos exsiccatos, electuar. diaphaniconis, spec. dia-mosch. in senibus electuar. discord. *Fracastorii*.
 - 5) *Externa* etiam non profus reiicienda sunt, sed vix, nisi in pertinaci diarrhœa, locum habent, e.g. inunctiones umbilici & scrobiculi cordis, speciatim per oleum carvi: effectum etiam aliquem præstant lapides serpentine, calide impositi. emplastr. de crusta panis vel stomachale *Cratonis*, cum emplastro de tacamahac. remixtum, additis oleis destillat. neruinis.
4. Denique ad *tonum* intestinorum in naturalem ordinem restituendum respiciatur. Præstant hoc:
 - 1) plurima eorum, quæ ad motum sopiendum iam modo commendata sunt.
 - 2) Martialia: v.g. tinct. mart. aperit. *Ludovici*, cum essent. lign. aloës, vel spiritu salis dulci, remixta, tinct. tonico-neruina *Stablii*, conferv. visceralis & elixir viscerale *Bæcleri*, tinctur. aurant. essent. cinnamom.
5. Diarrhœæ *lienterica* & *cæliaca* eamdem exposcunt methodum, nisi quod in *lienteria*, si nihil contraindicet, vomitorium propinari possit; *cæliaca* autem passio, quia obstructione vasorum lacteorum fouetur, a vomitu nullum usum habet, sed resoluentia, aperientia & laxantia, superius nominata, postulat.
6. Sic etiam diarrhœæ *periodica*, vti simplices, tractantur, & quando emanent, potius promouendæ, quam alienis


cohibendæ sunt, e. g. f. l. a. vinum medicatum e rad. he-
len. gentian. rubr. ari, zedoar. galang. gramin. herb.
centaur. min. absinth. rorismarin. tanacet. rhabârb.
fibr. hellebor. nigr. fol. sennæ.

7. Quando *vermes* in suspicionem veniunt, anthelmintica
superius commendatis iungantur.
8. Diarrhœæ *critica*, *semicritica* & *symptomatica* in febribus
quo modo tractandæ sint, videatur tabulis de febre ca-
tarrhali benigna, maligna, variolis, intermittente ter-
tiana.
9. *Ictericæ* tractantur secundum methodum, tabula de ictero
commendatam.
10. Diarrhœæ *hepatica* & *dysenterica* medicationes quarantur
tab. de fluxu hepatico & dysenteria.
11. Diarrhœæ *colligativa* heclicorum quo modo tractandæ
sint, tabulæ de phthisi & febre heclica docent.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Vti in genere cauendum est, ne diarrhœæ qualescumque
simpliciter cohibeantur, ita minime omnium conueni-
nit, illas diarrhœas suppressere, quæ iam aduetsactæ
sunt, per vices recurrunt, & cum euphoria ægri decur-
rere obseruantur: materia enim hac ratione suppressa
viscerum obstructions, hydropem, vel ad minimum
adfectus flatulentos & colicos inducit.
2. Ad præoccupandum autem hoc euacuationis genus, vel
potius tanto commodius expediendum, lenes *laxationes*
vere & autumno eximium vsum præstant.
3. *Digestiua*, præparantia, melius & conuenientius laxanti-
bus præmittuntur, quam iisdem coniunguntur.
4. Diarrhœa si, præmissis resoluentibus, abstergentibus & la-
xantibus, nihilo minus contumax esse adpareat, tum *nux*
moschata egregie se gerit: excretiones enim tales non so-
lum temperat, immo auctiore dosi sistit, sed etiam to-
num intestinorum restaurat.
5. Sic etiam *gentiana rubra*, moderate adhibita, diarrhœas
sensim iterum in ordinem redigit, & tonum egregie
roborat.

6. Ad tonum naturalem in hoc genere in ordinem reuocandum, in diuturnis etiam diarrhœis non contemnendæ efficaciam sunt esculenta quædam placida, & leni adstringendi virtute prædita.
7. Inter hæc primo loco numerari potest fructus *forbi piriformis*, germ. Spör. *Aepffel*: tam peculiarem enim in alio nimis laxa hæc pirula habent efficaciam, vt plura eorum sine alui subsequente obstipatione edere liceat, in ipsis vero diarrhœis & dysenteria, facta iam sufficiente & diuturna exoneratione, 2-3. notabiliter sistant. De *forbis exsiccatis* & *mespilis exsiccatis* per vulgus notum est, quod in talibus circumstantiis egregie se gerant; modo præmittenda præmittantur.
8. *Boyle* vbique fere in diarrhœis commendat *gummi arabicum* & *tragacantham*; *Helmontius* autem *vitellum oui*, ad duritiem coctum, &, si opus sit, repetendum.
9. Licet quilibet *potus* copiosus diarrhœas magis foueat, *calidus* tamen magis prodest, quam nocet, & hinc audacter porrigendus. Conducit panis bis coctus, vino rubro immerfus, aux moschata in cibus, iuscula, quies corporis & animi, calor moderatus.



TABVLA CXIV.

DE

MOTVVM VITALIVM DEFECTV
GENERATIM.

I. DEFINITIO.

Defectus motuum vitalium est motus tonici & progressiui siue totalis siue partialis neglectio, quæ vel a causis moralibus vel a physicis originem ducit, & œconomiam animali grauissima pericula minatur.

T t t t

II. DIF.

II. DIFFERENTIA.

1. Motuum vitalium defectus obseruantur
 - 1) modo, & primario quidem, in *tono*: vnde morbi apoplectici, hemiplectici, paralytici, palpitatorii &c. oriuntur.
 - 2) Modo in *pulsu*: vnde mala lipothymica introducuntur.
2. Ita autem coniuncti sunt hi motuum defectus, vt alter alteri qualecumque impedimentum & damnum adferat. Sic v.g. defectus motus tonici languorem inducit motui sanguinis progressiuo.
3. Motuum deficientium species sunt:
 - 1) Debilitas seu verus virium defectus.
 - 2) Tremula partium impotentia.
 - 3) Paralysis & hemiplexia.
 - 4) Apoplexia.
 - 5) Catarrhus suffocatiuus.
 - 6) Adfectus soporosi & obliuiosi.
 - 7) Adfectus lipothymici.
 - 8) Marasmus senilis.
4. Omnes hi defectus respectu *partium adfectarum* suos habent gradus:
 - 1) *Tonus* enim modo per vniuersum corpus, modo in dimidia illius parte, modo in particulari quodam membro, vel prorsus omittitur, vel notabilissime immiuitur, de qua re tabulis sequentibus speciatim dicemus.
 - 2) Sic & *pulsus cordis* neglectio gradu differt; id quod in lipothymia & syncope obseruamus.
5. Hæc autem graduum differentia respectu *specierum*, & *succedendi* illarum habilitatis non æque locum habet; e.g. virium deiectio in malignis, licet summa sit, transit tamen potius in conuulsiones quam in paralyfin. Sic & paralysis longe frequentius succedit conuulsionibus, quam vlli *leuiori* gradui defectus motuum.
6. Et licet tremores paralytodei in veram aliquando paralyfin, & paralysis in apoplexiam non numquam desinat, hoc

hoc tamen non solum raro contingit, sed & in plerisque exemplis post multos demum annos & amplas ætatum periodos fieri solet. Vnde mutuus talis successus a specie inferiore ad superiorem a generica magis occasione, quam a specifica paritate & confinitate dependet.

7. Dignissima est distinctio inter vires consumptas, exhaustas, *amissas* a posteriori, & inter vires *omissas* a priori.
8. Sic & a vero virium defectu discerni debet rigida partium contentio, & oppressio grauatua, tensua, plethorica.

III. SIGNA.

1. Defectus *tonicos* designant
 - 1) Relaxatio & mollities partium solidarum.
 - 2) Impotentia illarum ad motum, cum virium insigni languore.
2. Defectus *pulsorios* certissime cognoscimus, quando pulsus vel paruus & debilis est, vel tactu deprehendi non potest.
3. Vtrisque conspirant:
 - 1) Reliquarum actionum tam vitalium quam animalium & naturalium vel imminutiones vel cessationes.
 - 2) Partium externarum refrigerationes cum pallido colore.

IV. SVBIECTA.

1. Veri motuum defectus præ omnibus aliis malis rarissime eueniunt.
2. Occupant autem ætatem præcipue senilem, in qua anima a vigore actionum suarum in & per corpus remittere vel abstrahi obseruatur.
3. Temperamentum *phlegmaticum* videtur quidem præ aliis motuum tonicorum omissionibus fauere, quando autem causas occasionales, inferius indicatas, ex æquo consideramus, accusatio huius temperamenti multum mitigatur.
4. Et quando sexus *femininus* ad hos defectus subeundos habilior dicitur, id a sensibilitate potius & meticoloso animo quam a phlegmatico illarum temperamento derivandum esse censemus.
5. Reliqua tabulis specialibus reseruamus.

V. CAUSSAE.

1. Pro caussa propiore defectus motuum vitalium accusant quidem vulgo obstructionem neruorum & interceptum fluxum spirituum, quoniam autem hi adfectus raro obtingunt, adfertum illud vel hoc solo phænomeno ad modum implicatum redditur. Præter ea satis notum est, quid trepida, immo falsa æstimatio naturæ valeat, e. g. hæmiophobi, quando de venæ sectione instituenda commemorant, in lipothymiam incidunt.
2. Hinc dicimus, quod *periculosa* in corpore coorta *constitutio*, siue vere siue falso iudicata, naturam ita turbet & trepidam reddat, vt inops consilii & auxilii actiones suas desperabunda tergiuersatione omittat.
3. Causse *antecedentes & occasionales*, quæ hanc virium deiectionem inducere possunt, sunt præcipue sequentes.
 - 1) *Oppressio plethorica*, variis & diuturnis spasticis afflictionibus complicata. Quando enim natura sub hisce incommodis motibus vires suas frustra adplicauit, tandem pertæsa desistit.
 - 2) Morbi *chronici*, qui debitam corpori nutritionem pervertunt, vel diuturnis doloribus, vigiliis, inedia, vires exhauriunt.
 - 3) Morbi *acuti*, infeliciter succedentes.
 - 4) Grauis *lasio* corporis.
 - 5) Iracundia tacita & suppressa.
 - 6) Terror repectinus.
 - 7) Ebriosa intemperantia & abusus veneris.
 - 8) Prægressæ enervationes animi per multas speculationes sub vita otiosa.

VI. PROGNOSIS.

1. *Defectus* motuum vitalium maiora semper pericula inuoluit, quam illorum *excessus*. Euentus enim motuum talium deficientium est, vt atoniam flaccidam pressis vestigiis sequatur imminutio motus progressiui. Vnde restagnatio sanguinis in partibus, infarctus, stases, veræ obstructiones & tandem corruptiones eueniunt. Et sic defe-

defectus motuum vitalium est proxima via ad interitum.

2. Vires *amissa* per labores, dolores, agrypniam, euacuationes prodigas &c. minoris sunt periculi & facillioris restitutionis, quam illæ, quæ citra causas manifestas *omittuntur*.
3. Impedit virium defectus *secretiones & excretiones*, atque ob moralem illam peruersam, immo desperabundam, trepidationem natura motus vitales decenter non adgreditur & profequitur.
4. *Vniuersalis* motuum defectus periculosior est *particulari*.
5. Defectus *pulsus* facilius restituitur, quam *toni*.
6. Pulsus & toni defectus in *malignis* quo modo considerandi sint, tabula de febribus malignis indicauimus.
7. Deficiente tono deficit sensus.
8. Sensuum internorum imminutio & vniuersalis corporis lassitudo quando senes repente corripit, apoplexia metuenda est.
9. Sensibiles facilius restituntur a motuum defectibus, quam minus tales.
10. Animi pathemata vti motibus deficientibus occasionem dare possunt, ita & eorundem restaurationi non nunquam ansam præbent; de qua re duo exempla notatu dignissima in *theoria Stahlî* pag. 9. 13. ex *Valleriola* & *Act. Natur. curios.* referuntur.
11. Motus autem deficientes illi, qui ab animi turbis oriuntur, semper sunt contumaciores, quam qui causis materialibus innituntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. De *methodo*, qua motus deficientes tractandi sunt, hic non dicemus; quem ad modum enim pauciores sunt horum adfectuum species, ita in tabulis specialibus, quæ sequuntur, facili negotio omnia sunt perspicienda.
2. Sic & *cautela* atque *obseruationes* practicæ in iisdem continentur.
3. De *marasmo senili* hic speciatim tantum notamus, quod ratione tractationis cum malis atrophicis & hecticis

prorsus conueniat. Licet enim virium abiectio, quæ in hoc senum morbo obseruatur, solis caussis materialibus & læsionibus internis non semper innitatur, sed naturæ tædium, quo post varia exercitia & incommoda, tam moralia quam vitalia, vitam suam, quouis respectu iam ærumnosam, prosequitur, multum sane hic valeat: hæc tamen consideratio plus habet vtilitatis ad prognosin therapix difficilioris formandam, quam ad principii vitalis tædium auferendum. Notum enim est, quam parum remedia valeant ad errores naturæ corrigendos.



TABVLA CXV.

DE

TREMORE ARTVVM.

I. DEFINITIO.

Tremor artuum est membrorum perpetua vicissitudine in contrarium agitatio, a deficiente tono & nisu partium originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. Tremor artuum contingit :

- 1) Vel *actiue*, e.g. in terrore, ira, gaudio, febribus intermittentibus &c. quales artuum tremores ad motus semi-conuulsiuos referendi sunt.
- 2) Vel *passiue*, qui tremores a causa priuatiua dependent, & ad adfectus semi-paralyticos pertinent; de quibus hic agimus, quique *tremores paralytodei* vocantur.

2. Hi *passiui* tremores distinguendi etiam veniunt a motibus illistremulis, qui a caussis mere externis oriuntur, e.g. humida partium exteriorum refrigeratione, copioso potu calido, thée, coffee, in conclaibus frigidis ad sudorem vsque adsumto.

III. SIGNA.

Hæc per se satis sunt manifesta.

IV. SVB-

IV. *SVBIECTA.*

Tremor artuum, a *priuatiua* caussa dependens, euenit anno-
ribus, in quibus principium vitale a vigore suo nota-
biliter remittit.

V. *CAVSSAE.*

1. Caussa *interna* est neruorum flaccida debilitas & toni re-
missio.
2. Caussæ *externæ* sunt:
 - 1) Euacuationum artificialium, tam sanguinis quam reli-
quorum humorum, neglectio.
 - 2) Regimina acrius diaphoretica.
 - 3) Abusus spirituosorum.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Tremor artuum in senibus est morbus valde pertinax.
2. Quo magis in habitum deductus est, eo difficilius curatur.
3. In recentiore tamen casu spes est restitutionis.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. *Prima via* ante omnia expurgentur per rhabarbarina &
helleborata, e.g. essentiam hellebori nigri, methodo
Stahliana paratam.
2. Adsuetae *vena sectiones* & scarificationes repetantur.
3. Tonus partium restituitur:
 - 1) *Interne* per
 - a) Mixturem tonico-neruinam *Stahlis*.
 - b) Vinum medicatum e neruinis paratum, e.g. herb.
serpill. chamæpit. rorismarin. flor. lauendul. spi-
cæ, lign. iuniper. fantal. citr. fassafr. guaiac. aloës
bacc. lauri, iuniperi.
 - 2) *Externe* per
 - a) Spiritum abstractitium serpilli &c.
 - b) Castorina.
 - c) Fodus ex herb. matricar. tanacet. sabin. aliisque co-
ronariis paratos.

VIII. *CAVTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. Quæ cautelæ tabula de *paralysi* traditæ sunt, illæ etiam hoc
loco obseruentur.

2. Præ-

2. Præcipue a *nimis calidis* abstinendum est, alias atrophia facile inducitur.



TABVLA CXVI.

DE

PARALYSI ET HEMIPLEXIA.

I. DEFINITIO.

1. *Paralysis* est repentina motus tonici vitalis in certa aliqua parte remissio, sensum & motum siue in totum. siue plurimum tantum, in illa auferens. Deriuatur a *παράλυω*, dissoluo.
2. *Hemiplexia* est abolitio sensus atque motus in toto corporis latere. Deriuatur ab *ἡμί*, semis, & *πλήσσω*, percutio.

II. DIFFERENTIA.

1. Differentiam *paralyseos* & *hemiplexia* monstrant definitiones, nempe *paralysis* est adfectus magis partialis, *hemiplexia* autem dimidium latus occupat.
2. *Paralysis* differt gradu:
 - 1) *Leuior* *paralysis* est, quæ lenta inuasionem contingit. Hic obscurus adhuc sensus superest, & pars sensum inflatur.
 - 2) *Absoluta* & *plenaria* *paralysis* omnem motum & sensum in parte adfecta vno impetu tollit: vnde ingens statim illius inflatio, ob sanguinis irruptionem, sequitur; qui supremus gradus *paraplexia*, vel *apoplexia* partialis, a nonnullis vocatur. Hanc constitutionem sæpe excipit *sphacelus*, vti leuiorem gradum aridura.
3. *Paralysis vera* discernenda est a *spuria* illa *scorbutica*, vbi adfectum membrum potentia quidem mouendi destitutum est, restat tamen sensus exquisitus: adsunt videlicet dolores tensorii, tractorii, grauissimi. Nostro tempore possemus addere *paralytiin spuriam purpuream*. Non raro

raro enim eius modi adfectus paralytodei & hemiple-
ctodei iis obueniunt, qui purpura laborant.

4. Sic etiam distinguenda venit ab illa specie, vbi membrum quidem mouere possunt debiles, sed nullus sensus ad-
est, corpor potius & stupor: das Glied ist eingeschlaffen.
5. Alia adhuc datur species paralyseos, quæ colicæ accedere
obseruatur, & ad differentiam *paresis ex colica* dicitur.
• In hac, post grauem afflictionem colicam, repentina to-
ni remissio in exterioribus artubus occurrit; præcipue
quando colica narcoticis, vel regimine sudorifero coa-
cto, tractata fuit.
6. *Hemiplexia* suos etiam habet gradus, vti sub signis dicitur.

III. SIGNA.

1. *Paralyseos*,

1. Abolitio sensus & motus in parte quadam.

a) Siue in *exigua*, e.g.

α) Sphinctere ani: vnde excrementa aluina satis re-
tineri non possunt.

β) Sphinctere vesicæ: quo casu stillicidium vrinæ est
continuum.

γ) Musculo linguæ: hinc balbuties, impotentia lo-
quendi.

δ) Musculo laryngis: vnde impotentia deglutiendi,
modo solida, modo ipsa adeo liquida.

b) Siue in *diffusa* parte, e.g. pede, brachio &c.

- 2) *Plenaria* paralytis, seu *paraplexia*, omnem sensum & mo-
tum aufert, vti sub *differentia* iam dictum, adeoque
partem insigniter flaccidam & turgidam reddit, *lenior*
vero paralytis nonnulla motus indicia relinquit.

2. *Hemiplexia*.

- 1) Hic alterum totum latus, nempe brachium, crus, pes,
immo viscera circa illud latus interna, motus & sen-
sus defectu occupantur.
- 2) Loquela vel tota, vel saltem distincta, euanescit.
- 3) In latere *sano* sæpius accedunt motus conuulsui, spa-
simus cynicus, tortura faciei.

- 4) Totum latus *adfectum* colore liuido occupatum est, & ante, quam plane emoriantur, sphacelus interdum accelerat.

IV. SVBIECTA.

1. Paralyfis obtingit:

- 1) Vel ipsi aliquando *infantili* ætati, sed non nisi debilitatæ, idque ab exanthematum, scabiei aut variolarum malo successu & reliquis, maxime omnium a contusionibus ac distorsionibus, per incuriam & silentium famularum: rarius, ab epilepticis exagitationibus.
 - 2) Mediæ ætati obtingit maxime a spasticis dolorificis exagitationibus, quando membrum illud ab iisdem diu vexatum fuit; item post vehementes conuulsiones epilepticas. Hæc species sæpe coniuncta est cum *aridura* partis, seu *atrophia*, aliæ autem species, senioribus euenientes, turgescenciam magis & ruborem exhibent.
 - 3) Senescenti ætati obtingit magis tacite & idiopathice, e causis corporeis prægressis, e.g. neglectu euacuationum sanguinis, concurrentibus animi perturbationibus.
2. De reliquo paralyfis occupat homines debiles, otiosos, somnolentos, vinosos, iracundos.
3. Hinc præcipue corripit sanguineos & sanguineo-phlegmaticos.
4. *Hemiplexiam* incurrunt vel apoplectici, vel cum spastico-arthriticis motibus & doloribus diu colluctati.

V. CAUSSAE.

1. Hæ multum conueniunt cum causis apoplexiæ. Causa enim *formalis* hic itidem destitutionem energiæ motoræ inuoluit. Est tamen hic motuum defectus tantum particularis.
2. Quid vero causæ hanc motus tonici desertionem efficiat, id multum multos fatigat. Quando enim res *materialis*, quarum ingentem numerum adferunt, passim acculant, pertinent tamen illæ omnes ad causas tantum *ocasionales* & *procatarcticas*.

3. Ita-

3. Itaque pro *caussa efficiente* merito accusamus *tædium & fastidiosam auersionem* ipsius naturæ in hac vel illa corporis parte motus vitales exerendi.
4. Hoc naturæ tædium innititur quidem causis plerumque *materialibus*, e. g. plethoræ, euacuationum sanguinis consuetarum omissioni, incongruis medicationibus, præcipue per anodyna mercurialia & adstringentia, sudoris per refrigerationem oppressioni, diætæ vinosæ ad frequentem vsque ebrietatem & denique externis violentiis: pollunt tamen & solent hi morbi non raro sine materialibus hisce causis per sola *animi pathemata* introduci.

VI. PROGNOSIS.

1. Cura difficilis est, quia non tam cum materia, quam agente interno militandum est; quæ difficultas in omnibus talibus morbis, quibus principium vitale concurrere & motus perficere recusat, obseruatur.
2. Hinc veræ paralyfes, quam infrequentes sunt, tam contumaciter artis auxilium adspernantur.
3. Sponte etiam sua numquam soluuntur, nisi animi commotiones & acres intentiones, intercedant, e. g. incendium, inuasio bellica. Sic vir quidam illustris, scala decidens, a paralyfi, secunda vice iam repullulante, liberabatur.
4. Quantumcumque etiam paralyfis curetur, certius tamen recidua, eaque grauior, expectanda est, ita vt raro tertius recursus obseruandus sit.
5. Grauior recursus, qui in iunioribus præcipue contingit, vel in hemiplexiam, vel apoplexiam lethalem terminatur.
6. *Leuior* paralyfis vt lentam partis ariduram inducit, sic *vehementiorem & plenariam*, tumida & flaccescente parte conspicuam, sphacelus intra 3-4 dies facile excipit.
7. *Ebriosis*, quando in paralyfin prolabantur, omnem simul memoriam & ingenium perdere obseruantur.
8. Præcipue etiam *linguæ* paralyfin talem memoriæ labem & puerilem quasi insipientiam inducit; in quo statu, quan-

do iuvenes sunt, diu superstites manere, seniores autem, recurrente nouo insultu, paraplexia seu plenaria & perfecta paralyfi citius exspirare obseruantur.

9. *Paresis* e colica longe quidem rarior est, quam alia paralyfis, eandem tamen difficultatem therapiaë, præcipue in annosis, inuoluit.
10. *Hemiplexia* vitæ quidem periculum in vnum vel alterum diem, immo aliquot subinde menses, differt, frequentius tamen, si totum latus, & ita capitatis etiam medietatem occupauerit, in plenariam apoplexiam, quam in nudam paralyfin, transmigrat.
11. Hæc, quo magis exquisite omnem motum sustulit, eo breuiore tempore est lethalis, in primis ob respirationis grauissimam læsionem, ab immobilitate thoracis in adhiesto latere dependentem.
12. Verbo: paralytici & hemiplectici morbi in iunioribus raro in senioribus rarissime tolluntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Curatoria.

1. *Generalis paralyseos & hemiplexia.*

- 1) Præsente plethora, aut consuetudine euacuationum sanguinis, larga statim *vena sectio* locum habet *Conf. cautela.*
- 2) Præmittatur clyster neruino carminatiuus, cum electuar. diacolocynth, vnc. semis, & sal. gemmæ drach. II. acuat.
- 3) Subiungatur purgans aliquod ex essentia hellebori nigri, methodo *Stahliana* parata, vel si nihil contra indicet, vomitorium e tartaro emetico præscribatur.
- 4) In progressu medicationis lenia *laxantia* helleborina subinde interponantur.
- 5) Ad partem paralyticam *roborandam* exhibeantur
 - a) *Interne:*
 - α) *Generalius* alexipharmaca, coniuncto moderato regimine, e.g. essent. alexipharm. *Stahlis*, immo ipsa theriaca.

β) Sa

- β) Salia volatilia cum tincturis alcalinis remixta, v.g. tinctur. tonico-neruina *Stahlii*.
- γ) Succinata, e.g. essent. succin. liquor. C.C. succinatus, interpositis vbique antispasmodicis, cinnabarinis.
- δ) Infusa e neruinis, e.g. herb. meliss. betonic. chamæp. chamædr. rorismarin. flor. lauendul. spic. nard. salu. puleg. lilior. conuall. stœchad. Arab. calendul. cort. aurantior. Winteran. cinnamon.
- ε) *Speciatim* puluis *lumbricorum terrestrium* & oleum cinnamomi laudari solent.
- ζ) Specificam efficaciam habere dicuntur pilulæ *Wildegansii* genuinæ.
- b) *Externe.*
- α) *Radices*: angelic. imperator. pimpinell. alb. valerian. leuistic. mei. irid. Florentin. fraxinell. cyper.
- β) *Herba*: thym. maioran. mar. ver. puleg. betonic. serpill. basilicon. organ. meliss. &c.
- γ) *Flores*: lilior. conuall. chamomill. calend. melilot. matricar. tanacet.
- δ) *Ligna*: sassafr. santal. aloës; quæ omnia in forma balneorum, infusuum, fotuum, facculorum, adhiberi possunt.
- ε) *Gummata* odorata: ladan. bdell. styrac. calamit. præcipue galban.
- ζ) *Spiritus* aromatizati neruini, aquæ spirituosæ, salia volatilia oleosa, præ omnibus autem spiritus acidus formicarum & lumbricor. terrestr.
- η) *Olea*: laurin. vulpin. petræ, limacum, vermium maialium.
- 6) Ad *sensationem* reuocandam laudantur:
- a) Frictio partis adfectæ modesta cum linteis calidis, siue siccis siue spiritu serpilli aut formicarum humectatis.
- b) Agitatio membri moderata.
- c) Embrocationes.
- d) Vrticationes.

- e) Sinapismi e semin. sinap. eruc. rad. pyrethr cum acet. destillat. parat.
- f) Cæsio cum virgis; cauendo tamen, ne in calidis subiectis, per vltima tria remedia inflammatio excite-
tur.
- 7) Ad *ariduram*, per paralyfin inductam, conueniunt pin-
guedines animalium, e.g. canis rubri, vulpis, taxi,
vrſi, ardeæ &c.

2. *Specialis.*1) Paralyſeos *linguae*.a) Ad adfluxum *auocandum* in vſum veniant:

α) Clyſteres ſtimulantes, ſupra deſcripti.

β) Venæ ſectio larga in pede, ſi plethora adſit.

γ) Purgantia.

b) Ad *discutiendum* præſcribantur neruina, ſuperius
commemorata, e.g.

α) Recip. rad. cyper. vnc. I.

irid. Florent. vnc. ſemis.

herb. maioran.

ſaluia.

ſerpilliana man. II.

ſlor. lauendul.

ſpic. ana man. I.

M. infund. cum vino, coq. add.

ſpiritus formicar. vnc. I.

ſal. volat. oleof. vnc. ſemis.

Cum hoc decocto os ſapius calide eluatur.

β) Item conducunt linimenta e ſpiritu formicar. ſer-
pilli, oleis neruinis, pingued. caſtor. emplaſtr.
de galban. caranna. v.g.

Recip. ſpirit. formicar.

ſerpill. ana drach. II.

eſſent. caſtor.

ambræ ana drach. I.

ol. lauendul.

maioran. ana ſcrup. ſemis M.

γ) *Interne*, ad *discutiendum*, ſimul adhibeantur, quæ
ſub

sub methodo generali dicta sunt, vbi sigillatim in aponia, a crapula exorta, tinct. ancimon. tar. rarifat. laudatur.

2) Paralyseos *sphincteris ani & vesicae.*

Hic externe adplicetur castoreum cum herbis aromaticis, in primis serpill.

3) *Hemiplexia.*

Valet hic medicatio apoplexiæ, specialiter etiam sectio raninarum, & in latere opposito irritantia varia & excitantia.

B) *Præseruatoria.*

1. Tempestiuæ *vena sectiones*, præcipue in adfuetis, plus præstabunt, quam reliqua fere in vniuersum.
2. Sic etiam præcipue *renouationes* fluxuum naturalium efficaces deprehenduntur, siue sanguineorum, e.g. mensium, hæmorrhoidum, siue serosorum, v.g. fonticulorum.

VIII. *CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. *Vena sectio* non ita raro nullum vsum, immo sinistrum effectum, exhibet: hinc bene considerandum est, an vel ætas, vel habitus corporis plethorici, vel suppressæ hæmorrhagiæ &c. eandem exposcant: quo casu tanta quantitate, quanta fere tolerari potest, instituat, & quidem in parte magis adfecta, vel ad minimum directe circa partem in illo, quam opposito latere. Ad præcautionem autem administrata, quouis modo commendari meretur.
2. Cauetur, ne pars adfecta nimio calore foueatur, facile enim intumescit, vt, cum ita motus tonicus desit, spæculus inducatur.
3. *Neruina*, vt optime in hoc malo conueniunt, ita tamen a nimis acribus, calido - humidis cauendum est: acria enim resinosa, sulphurea, exæstuatione nimia poros obstruunt & malum exasperant, præcipue quando sanguis nondum ventilatus & temperatus est.
4. Obstruunt etiam poros *unguinosâ*, nempe pingued. animal.

- mal. e.g. castor. canis, vulpis, vnguent. de cane rubro: quæ, sub forti frictione applicata, in rigore & aridura, ab externa vi obortis, magis conueniunt, quam in vera paralyfi, tacite & repente inducta. *Vid. dissertat. de motus voluntarii vsu medico.*
5. Maxima cautione opus est, ne inflammatio in parte adfecta exoriat, sphaelus enim metuendus venit: vnde *olea destillata calida*, immediate & nude adhiberi, dissuadentur; *temperata vero*, e.g. ol. terebinth. cum spirituosis dilutum, facilius tolerantur: hisce autem externis oppido parum obtinetur.
 6. *Salia volatilia*, seorsim exhibita, fidem non merentur: vti enim in rheumaticis & podagricis stuporem molestum inferunt, ita stupentibus iam membris maiorem stuporem inducere obseruantur. Si vero vsus illorum placeat, cum duplo, immo triplo tincturæ alcalinæ remiscantur, & aluo bene respondente, ac corpore perspirabili, mixtura talis, non tamen largiter nec diu, propinetur.
 7. Sic etiam experientia confirmat, quod vsus *lumbricorum terrestrium* crudorum, oleorum, pinguedinum, medullarum e ciconiis, vulpibus &c. vanis speculationibus superstructus sit.
 8. Liguamen, pinguedo, vel oleum e vermibus nigris marialibus, *scarabeis*, quid efficiat, vltiori experientiæ relinquatur.
 9. Sic etiam *limacum* pinguedo seu oleum non quidem contemnitur, præstat autem, quod potest, raro, quod desideratur.
 10. Veteres specificè laudant *confectionem anacardinam*, & sane optandum, vt experientiæ fatis faceret.
 11. *Raaiæ*, herba & flores *arnica* in causa grumosi sanguinis ex lapsu a *Borello* maxime commendantur. Et sane a paucis abhinc annis hæc planta mirificas virtutes exseruit, tam in lapsu ex alto, quam in paralyticis & pluribus aliis soniticis adfectibus. *Legatur dissertatio inauguralis D. de la Marche de arnica veræ vsu.* Interponere solemus pilulas

- las balsámicas, ita quidem, vt per tres dies iam pilulas iam decoctum arnicæ adhibeamus, atque hoc ordine diu continuemus.
12. Omnes fere scriptores laudant *castoreum*; quod de *externo* illius vsu quadantenus valeat; *interne* autem exhibitum varia potius incommoda parit.
 13. Herba *sideritis*, *tetrahit*, seu *indaica* a *Borello* obseruat 99. cent. 4. in paralyfi æque ac pleuritide laudatur, dicente: balneo adhibita, medetur paralyfi, fotu vero pleuritidi; nec negandum, quod ab eius vsu insperata pleuritidis resolutio, & in paralyfi aliqua, licet exigua, efficacia obseruata sit, modus autem adhibendi non placet, sed loco balnei, tonum adhuc magis relaxantis, in paralyfi forma sacculi siue cataplasmatibus commendatur.
 14. Maiorem efficaciam, frequente vsu firmatam, adscribimus præcellenti antiparalytico *spiritui acido formicarum*, bene saturato & per spiritum vini rectificatiss. præparato, quo sacculi & epithemata imbuantur.
 15. Neque *neruina* odorem gratum spirantia, & hinc principio vitali accepta, laude sua priuanda sunt. *Conf. num. 3.* item *fotus* cum speciebus aromaticis in vino decoctis, *sacculi* e neruinis cum vino & pauca camphora, *spiritus* neruini, aromatizati, præcipue spiritus *serpilli*, citrini odoris, non hirsuti, male olentis, aliquoties abstractus, & cum tantillo camphoræ exaltatus. Fotus autem vaporosi humidi non adeo commode adplicari possunt.
 16. Paralytici ab aliis sibi artus moueri patiantur, ne sanguis temere otiosus hæreat: *frictiones* etiam non sunt contemnendæ.
 17. *Antiscorbutica*, in primis calidiora, in vera paralyfi cautissime exhibeantur.
 18. Paralytici sæpe etiam fiunt *hectici*: vnde tanto magis ab acrioribus & calidis abstinendum est, ne ianua heclicæ aperiat. *Conf. num. 3, 5, 6.*
 19. Refrigerantia & humectantia maxime nocent: *mitiorem* enim in *plenariam* paralyfin & sphacelum deuoluunt.
 20. *Paresis* e colica tractatur

- 1) *Interne*: lenibus abstergentibus, carminatiuis, laxantibus, clysmaticis.
- 2) *Externe*: aperta aluo, fomentationibus, balneis vaporosis neruinis, & denique, non ab initio, humidis infessibus neruinis penetrantioribus.
21. *Opiata* vti arthriticos motus facile in paralyticam contracturam præcipitant, ita *alexipharmaca* sine regimine iterato data, huic inducto malo succurrunt, ad tollendum autem illud non sufficiunt: vehementes *sudationes* nocent.
22. *Emplastica* non sint nimis mucosa, nec resinosa calida, sed odore leni penetrantia; inter quæ eminent ceratum de galbano camphoratum, seu, vt vulgo dicitur, matricale.
23. *Alui* legitimus successus vti semper respiciendus est, ita interpositis spatiis aliquando laxatio conducit; cauendo tamen a stimulantibus, ne ani paralysis inducatur.
24. *Nitri* vsus, præcipue sub initium adfectuum paralyticorum calidorum, mitigationem adfert.
25. Laudatur etiam *cinnabaris* ad gran. II. adicienda.
26. Coagulationi sanguinis, a casu violento subuenitur per aperitiuo-diuretica; vbi *radix rubia tinctorum* non contemnenda est: habent etiam vsum diuretico colliquatium absorbentia marina, acido soluta, & ad drachmam semis exhibita, adiecto sale digestiuo & nitro; externe *camphora*.
27. Exhibent vulgo *sanguinem hirci* vel *corallia*, acido soluta, ad scrup. II. alii spiritum *fuliginis*, de quo notandum, quod in rebus angustiis temere non sit exhibendus. Conf. num. 11.
28. Tandem adhuc notandum est, quod duo motuum extrema, nempe paralytici & conuulsui adfectus, in vno indiuiduo coniuncta, non raro occurrant, & quando vnum membrum paralyti adfectum alterum oppositum conuulsionibus exerceatur; sed vti ad *excessus* motuum specifica remedia detecta sunt, ita ad *defectus* talia adhuc desiderantur, quod, ad inutiles speculationes euitandas, probe obseruandum.

TABVLA CXVII.

DE

A P O P L E X I A.

I. DEFINITIO.

Apoplexia est præceps & repentina sensus ac motus per vniuersum corpus talis abolitio, vt ægri vel subito & vno quasi ictu omnem harum rerum vsu amittant, vel, si auditus & visus adhuc aliqua signa adsint, motuum tamen voluntariorum plena impotentia laborent; quæ motuum plenaria remissio a tædio principii vitalis a motibus, antea frustra institutis, originem ducit. Deriuatur ab ἀποπλήττω, percutio.

II. DIFFERENTIA.

1. Apoplexia diuiditur in *sanguineam* & *serosam*; quam differentiam temperamentum, diætæ & reliqua antecedentia, facile docent.
2. Apoplexia differt *gradu*:
 - 1) Alia enim *lenior* est, quæ de pulsu cordis & arteriarum paullulum adhuc relinquit, sub qua constitutione rubor aliquis genarum conspicuus manet: interdum etiam aliqua mouendi facultas relicta est, quæ tamen mature evanescit.
 - 2) Alia *vehementior*, in quo supremo gradu omnis motus vitalis & sensus plane sublatus est: vnde repentina mors inducitur.
3. Apoplexia a *syncope* quo modo dignoscenda sit, sequentia docent:
 - 1) Syncope iuniori & seniori ætati promiscue conuenit, apoplexia autem non æque, sed saltem seniori.
 - 2) In *apoplexia* oculi sunt aperti & rigidi, in *syncope* autem clausi vel saltem torpidi.
 - 3) In *syncope* pulsus quidem satis debilis est, plane tamen non cessat, vti in *apoplexia* vehementiore; immo licet

cer in *leniore* apoplexia pulsus paullulum adhuc sentitur, ita tamen non deprehenditur, sicut in syncope.

- 4) In syncope pallor faciei morti similis, in apoplexia autem, præcipue sanguinea, rubor genarum conspicuus est.
- 5) In syncope stertor e pectore seu sibilus non obseruatur, vti in apoplexia.
4. Apoplexia a *catarrho suffocatio* & *asthmate conuulsio* distinguitur per signa horum adfectuum, inter se collata.
Vid. differentiam & signa tabul. de catarrho suffocatio & tabul. de asthmate conuulsio.

III. SIGNA.

1. *Imminentis.*

- 1) Torpor & lassitudo, cum tremore artuum.
- 2) Adfectio capitis vertiginosa, stupido grauatiua, soporosa.
- 3) Immo dolores profundiores, prementes, perennantes, in occipite.
- 4) Tinnitus aurium & susurri repentini.
- 5) Splendores oculorum transitorii, & subitæ visus obfuscationes.
- 6) Mentis obnubilationes.

2. *Presentis.*

- 1) Post vertiginem in momento in terram coniciuntur, & sine motu iacent.
- 2) Stertor seu sibilus e pectore occurrit, tamquam infarctus, liberæ respirationi obfistens.
- 3) Oculi semi-aperti, & vitrei cernuntur, cum pupilla dilatata.
- 4) In *sanguineis* vasa circa tempora inflantur, & rubor quidam genarum adparet; in *phlegmaticis* autem adpectus magis est pallidus, & torum corpus tepet.
- 5) In malo *leniore* aliquis adhuc pulsus obseruatur; in adfectu autem *vehementiore* omnis sensus & motus interne ac externe cessat.

- 6) Post mortem, cranio aperto, in valvulis cerebri sanguineorum aliquot cochlearia extrauasati sanguinis reperi-

periuntur; qui sanguis alias, omiſſa ſeſtione, per nares & os excernitur.

- 7) In *phlegmaticis* autem, loco ſanguinis, totidem ſeri mucoſi inuenitur, quod, ſibi relictum, per fauces & os erumpere obſeruat.

IV. SVBIECTA.

Apoplexia plerumque corripuntur homines

1. Aetatis virilis, & potiſſimum ſenilis.
2. Dantur tamen iuuenes apoplectici, plethorici, ſanguinei, poſt vini abuſum, vel immodicam animi indignationem.
3. Sanguinei circa annum 45. ad 50. &c. Phlegmatici autem, lautæ diætæ, annis prouectioribus.
4. Qui euacuationes ſanguinis naturales, e.g. hæmorrhoides, inconditis artificiis ſuppreſſerunt. vel artificiales adſuetas neglexerunt.
5. Quibus excretiones ſeroſæ vel cohibitæ ſunt, vel ſponte ceſſarunt, e.g. fonticuli, vlcera manantia, coryza, tuſſis humida, pedum ſudores.
6. Sub his omnibus anni *climacterici* in conſiderationem veniunt, quibus natura nouas plerumque reuolutiones ſuſcipit. Ceterum apoplexia, licet rarus ſit morbus, frequentior tamen eſt paralyſi.

V. CAUSSAE.

1. Cauſſam apoplexiæ ſeroſæ & etiam ſanguineæ in materia mucoſa quærere, irritum eſt; tot enim millia hominum muco abundant, & grauedine, coryza, tuſſi, ſæpius vexantur, quibus tamen apoplexia non euenit, & ſic motuum vitia a communibus talibus cauſſis deducere non poſſumus.
2. Facilius autem agnoſci poteſt plenaria deſtitutio ipſius energix motorix, quam durabilis & contumax auerſio mouendi, ac ſaſtidiola tergiuerſatio, qualis in paralyſi reperitur.
3. Cauſſa *antecedens remota* eſt neglectus euacuationum conſuetæ.

suctarum, & hinc inducta plethora, concurrente, in statu pituitoso, spissitudine lymphæ.

4. *Causa antecedens propinquior* est repentina congestio sanguinis abundantis, & laxis expansi ad cerebrum & tenerima vasa plexus choroidei, immediate neruorum medullæ incumbentis.
5. *Causa proxima & continens* est sanguinis, vel tantum feri, circa plexum choroideum extrauasio per *arterias* carotidum: fieri etiam potest, vt *venarum* infarctus & obstructio ibi in causa sit.
6. *Causæ occasionales & procatartica* sunt:
 - 1) Ventriculi mala dispositio, quæ multum ad vertiginem & demum apoplexiam inducendam valet.
 - 2) Ætas ad senectutem vergens.
 - 3) Dispositio hæreditaria.
 - 4) Vitæ genus perpetuis crapulis deditum.
 - 5) Violenta capitis læsio per contusionem, luxationem &c.

VI. PROGNOISIS.

1. Apoplexia *vehementior* sæpissime est lethalis, & quidem intra paucas plerumque horas.
2. Moriuntur sæpe apoplectici conuulsionibus, sed vix alibi, quam circa caput.
3. In apoplectis *sanguineis*, vti sub *signis* iam dictum, sanguis per nares vel infundibulum post mortem erumpit, sub manifesta oculorum protuberantia, faciei, & maxime vasorum iugularium, inflatione.
4. In *serosis* autem subiectis spuma mucosa per os excernitur.
5. *Lenior* autem apoplexia vel in paralyfin certi alicuius membri transmutatur, vel si, accedente in primis febre, solui videatur, serius ocyus maiore energia recurrere solet.
6. Sæpius etiam leuior apoplexia sensuum internorum debilitatem, & artuum tremorem, immo interdum spasmus oris *cynicum* relinquit.
7. **Qui** apoplexia semel tacti sunt, rarissime alio morbo, quam hoc, vehementius recurrente, moriuntur.

8. Oculi

8. Oculi, nebula infecti, pesimum & lethale signum exhibent.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Curativa.*

- 1) Congestio sanguinis incompleta versus caput est *derivanda*: Laudantur in hunc finem
 - a) Venæ sectio largior ad uncias VIII - X. in brachio instituenda; cui vniversali venæ sectioni, si operæ pretium & spes adsit, sectio raninarum, aut in fronte, subiungenda, vel incisio narium per scalpellum scarificatorium, more Ægyptiorum, & hæc omnia in sanguinea præcipue apoplexia.
 - b) In apoplexia magis *phlegmatica* clysteres acres stimulantés e fol. sennæ, colocynth. electuar. hier. picr. salibus, sapone; qui clysteres, etiam in statu sanguineo, subiungi possunt, ad sanguinis extravasati in vasa resorptionem promouendam.
 - c) In casu phlegmatico, minus autem sanguineo, vomitorium locum habet, e.g. salis vltrioli drach. semis cum vehiculo largiore.
- 2) *Natura* quasi aufugiens & abhorrens est *inuitanda*; quod faciunt & simul congestionem diuertunt:
 - a) Spiritus neruini, e.g. serpilli, item spiritus vini camphorat. temporibus, vertici & fronti, adplicandi.
 - b) Spiritus oleosi, in primis succinati, ori etiam guttatim instillandi.
 - c) Salia volatilia vrinosa, naribus admouenda.
 - d) Friktiones partium inferiorum.
 - e) Complanatio capitis, abrasio capillis admoto instrumento illo lotricum calefacto, mit einem warmen Bügel-Eisen.
 - f) Cataplasmata rubefaciëntia e radic. pyrethri, raphan. nigr. it. sinapi, pipere indico & murario, plantis pedum adplicata.
 - g) Vesicatoria.
 - h) Ligaturæ partium oppositarum.

i) Er-

- i) Errhina fortiora cum euphorbio, in apoplexia serosa.
- 3) His coniungantur remedia, quæ congestionem *repellere* dicuntur, e.g. bufo exsiccat, vertici impositus, fabina, oleum vulpium, castorinum.
- 4) Præfente sanguinis orgasmo temperantia, nitrosa, cinabarina, numquam omittantur.
2. *Præservatoria.*
- 1) *Venæ sectiones* in pede largiores circa æquinoctia instituantur: & in plethoricis ad annum 60 - 70. & ultra continentur, spernendo anilem metum, ratione thesauri vitalis conseruandi.
- 2) *Hirudines* tam circa aures, quam intestinum rectum, adplicentur.
- 3) Singulis circiter mensibus congrua laxantia exhibeantur, e.g. in cholericis & sanguineis fennata, rhabarbarina, in mucosis & magis frigidis jalappina, helleborata, aloëtica: omnibus prodest extract. panchymag. *Crollii.*
- 4) Ad *caput* roborandum propinentur tonica, e.g. mixtura tonico-neruina *Stahlii*, volatile oleosum *Syluii*, liquor C. C. succinatus: interspiciuntur temperantibus & antispasmodicis.
- 5) *Dieta* sit parca & exquisita, vitando ebrietatem, præcipue spiritum vini, insignes refrigerationes, carbonum foetorem & præ omnibus, animi commotiones iracundas, ac profundas speculationes.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quam necessaria est *venæ sectio* in sanguinea apoplexia, tam noxia illa euadit, si nimis parce instituat: hac enim ratione motus sanguinis magis inuitatur.
2. *Vomitorium*, vti in apoplexia sanguinea locum non habet, ita etiam in phlegmatica illud vix consultum est, si degluendi facultas iam penitus sublata sit: facile enim acris illa *fluida* materia (in forma *ficca* plane adhiberi non potest) in asperam arteriam & pulmones defluere atque damnum inferre potest.

3. *Salvitrioli*, quod a *Langio* tantopere laudatur, vbi opem tulit, magis cardialgico-suffocatiuum, quam simpliciter apoplecticum fuisse adfectum, existimandum est.
4. *Balsamorum apoplecticorum* sterilissimus hic est vsus.
5. Paulo magis conueniunt *Spiritus oleosi*, in primis succinati, si, quod methodus docet, non solum externe adhibeantur, sed etiam ori guttatim immittantur.
6. Temperantia cum antispasmodicis plurimis profuerunt, maxime in nimio sanguinis orgasmo & climate calidiorē; qui etiam pulueres cum præcipuum locum habent, si apoplexia in paralytin terminetur, coniunctis moderatis alexipharmacis & regimine modesto.
7. *Externa* illa sub *methodo* quidem commemorata sunt, ordinarie tamen sine effectu adhibentur, ita vt *vesicatoria* ne vesiculam quidem excitent.
8. Caueant sibi seniores plethorici, mobilem vitam in otiosam & lautam insuper diætam, commutare.
9. In *Finlandia* apoplexia omnis ætatis homines promiscue infestare dicitur, & hoc quidem potissimum ex subitanea frigoris cum calore permutatione, quando, post capitis in templo refrigerationem, calida hypocausta ingrediuntur.
10. E quibus caussis iunioribus nascitur epilepsia, ex iisdem senescentibus prouenit apoplexia.
11. Licet in quibusdam apoplecticis *polypus* in vasis cordis sit inuentus, vero tamen magis simile est, polypum talem iam diu ante huius adfectus inuasionem adfuisse: nam & in illis, qui palpitationibus cordis & anxietatibus laborarunt, post mortem polypi sunt deprehensi. Nequaquam etiam polypus totam cavitatem arteriæ explere potest, & sic frustraneæ de illo sunt speculationes.
12. *Specificæ* in pertinaci hoc malo magis optanda, quam expectanda sunt: hinc primarius labor eo tendat, vt congestio humorum versus caput præoccupetur & deriuetur; siue sint sanguinei, siue serosi.
13. Ceterum notatu dignissimum est, quod, licet apoplexiæ

valde raro occurrat, & leuissima exitus lethalis via sit, plerique tamen mortalium hunc morbum mirifice timeant, & multis potius ac diuturnis cruciatibus e vita migrare exoptent.



TABVLA CXVIII.

DE

CATARRHO SVFFOCATIVO.

I. DEFINITIO.

Catarrhus suffocatiuus est copiosa materia seroso-mucosa intra vesiculas pulmonales irruptio, a repentina congestione humorum versus pectus & paralytode pulmonum ac thoracis debilitatione existens.

II. DIFFERENTIA.

1. Catarrhus suffocatiuus non confundendus est cum
 - 1) tussi humida, medicamentis alibi expectorantibus, alibi narcoticis in anomalias coniecta.
 - 2) praecipiti illa pectoris oppressione, quae a retropulsione malorum rheumaticorum, exanthematicorum, tumorum statarum, fluxuum ulcerosorum diuturnorum; quae omnia a catarrho suffocatiuo longe distant.
 - 3) Sic etiam differt ab illis anxietatibus asthmaticis, quae per paroxysmos eueniunt subiectis, scirrhopulmonum vel occulta vomica laborantibus, iisque fere iunioribus sanguineis.
2. Bene etiam distinguendus est catarrhus suffocatiuus ab *asthmate conuulsiuo*:
 - 1) E diuersitate subiectorum: sinceriorum enim sanguineum raro huic catarrho obnoxii sunt, bene vero asthmati conuulsiuo. *Conf. subiecta.*
 - 2) Ex adfluxu materiae perpetuo in catarrho suffocatiuo praesente, asthmate autem conuulsiuo absente.

3) In

- 3) In catarrho suffocatiuo est remissio toni circa pectus, in asthma autem conuulsio occurrit motus tonici exacerbatio.
 - 4) Hinc actiua & fortis cohibitio compressoria magis, quam sola impotentia ad respirandum præsto est.
 - 5) Nec etiam tanta virium iactura, sed potius maior anxietas & cordis palpitatio in asthma conuulsio observanda occurrit.
3. Differentiam catarrhi suffocatiui ab *apoplexia serosa* anxie quærere, frustraneum, nec vilius vñsest: læpe enim concurrunt; hanc autem sinceram arguunt prægressa solum capitis mala, rubor & lippitudo oculorum, cephalæ obtusa, spumescencia ex ore.

III. SIGNA.

1. Occupat hic catarrhus ægrum repentino insultu.
2. Respiratio euadit valde difficilis.
3. Plenitudo pectoris spumido quasi sono inter respirandum colligenda.
4. Præsto est præsentissima virium remissio & debilitas, seu defatigatio, & hæc quidem secundum sensum & denominationem ægri, re ipsa autem adest spasmodica tensio seu renisus, vbi sub illa subtili tractione partium & rigore lassitudo talis interna & sensus tensionis grauatius exoritur.
5. Exserit sese notabilis *inquietudo*, ita vt membra in vno eodemque situ diu seruari nequeant.
6. Concurrat ipsius animi desponsio obliuiosa, de vita diffidens.
7. *Tussis* ordinarie nulla vel tamen non ad proportionem adest, sed sub coctione pectoris conspicua impotentia, & verus virium defectus ad tussim, & excretionem per eandem sese manifestant.
8. Urget potissimum hic morbus in pectore, non solum inferiore, pulmonibus, sed etiam exteriori, motu scilicet ipsarum costarum.
9. Facies est turgida & oculi fulgent.

IV. *SVBIECTA.*

1. Vix unquam alii homines catarrho suffocatio corripuntur, quam qui, vulgari loquendi sensu, *catarrhosi*, vel, ut dicunt, delapsi catarrhorum a capite ad fauces & pectus per longum tempus obnoxii fuerunt.
2. Præ aliis *senioribus* phlegmatici, vel phlegmatico-sanguinei, succulenti.
3. Immo uniuersa illa corporis constitutio, quæ alibi paralyti, alibi apoplexiæ obnoxia est.
4. *Graciliores* rarissime hic morbus occupat, nisi tussi diuturniore vexati sint, aut plane phthisica ulceratione iam laborent.
5. *Iuniores* non facile ab hoc morbo infestantur, exceptis ad modum phlegmaticis & corpulentis, iisque catarrhalibus congestionibus & excretionibus debilitatis.
6. *Infantes* quidem obesi, ab achoribus retropulsis, & diaphoresi repente suppressa, suffocationis periculum quoque incurrunt, sed non adeo præcipiti & lubitaneo effectû.

V. *CAVSSAE.*

1. Ex iis, quæ in descriptione *subiectorum* dicta sunt, verior causarum sedes magis in *capite*, quam pectore, quærenda videtur.
2. Origo repentinæ huius & copiosæ congestionis & irruptionis inuoluit quidem materiam ad talem decubitus formandum aptam, quæ in habitu corporis phlegmatico manifesta est, & in ætatis senilis minore energia excutiendi, immo temperamento etiam animi sustentatur; manet tamen ubique quasi, quo modo præcise hoc die & hac hora flaccescantia & marcor pulmonum, tamquam causa *proxima* huius irruptionis & adfluxus seroso-mucosæ materiæ, eueniat.
3. Causæ *remotæ* & *occasionales* obseruantur:
 - 1) In infantibus crustæ lacteæ vel sudoris repulsio.
 - 2) In annosioribus euacuationum sanguinis adfuetarum neglectio.
 - 3) Refrigerationes, & ær frigido-humidus.

4) Ad-

- 4) Adfectuum cutaneorum & rheumaticorum peruersa tractatio, speciatim lippitudinis oculorum retro-pulsio.
- 5) Ebriosa lauta diæta.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Catarrhus suffocatiuus est breuioris euentus: nisi enim repentino & decente auxilio succurratur, ægri intra 24. horas syncoptici plurimum moriuntur.
2. Nonnumquam in *febriculam* resoluitur, quo intuitu præsentaneum quidem mortis periculum aufertur, febris tamen mali & vagabundi moris, plerumque hecticodes, ac, durante anxia respiratione, non minus lethalis obseruatur.
3. Vel laxitas pectoris asthmatica, tussiculosa, diuturna succedit cum multa mucosæ materiæ eruptione, intercurrentibus etiam quasi paroxysmis asthmaticis, spasticis, maxime si externæ causæ accedant.
4. Vel etiam *cachectica* corporis flaccida debilitas insequitur.
5. Certe, nisi debitis analepticis, tonicis, abstergentibus mature succurratur, vel dicta iam pericula, vel tantam debilitatem post se relinquit, vt ægrotus abhinc, velut alius factus, vacillantem ad modum valetudinem experiatur.
6. Annosiores citius ab hoc morbo iugulantur, quam infantes, in quibus per 8-14. dies mors sæpe differtur.
7. Præcipue annosiores, fortiore huius mali insultu correpti, tam repente solent exspirare, vt, apoplexia an catarrho interierint, merito dubitetur. Multos interim pro apoplecticis efferri certum est, quos suffocatio potius eius modi catarrhalis spastica, vel sincera paralytica constarum motus abolitio extinxit.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *In paroxysmo.*

1. Ad infarctum oppletiuum in pectore *deriuandum*, & adfluxum intercipiendum adplicetur clyster stimulanse centaure. min. maioran. colocynth. addito in nonnullis euphorbio ad gr. II.

2. Vbi qualiscumque *plethora* adparet, subiungatur (immo urgente necessitate præmittatur) clysteri venæ sectio in brachio ad VI-VIII. vncias. *Conf. cautela.*
 3. Peracta, aut, si non necessaria fuerit, prætermittitur venæ sectione, ventriculi constitutio respiciatur, & si vomitus indicetur, in vsum veniat sal vitrioli ad drach. I. cum largo vehiculo, cui in phlegmaticis laxans, e.g. gummi guttæ, addi potest; vel exhibeatur decoctum rad. asari, immo, festinante casu, tabaci, cuius anxios effectus vinum aromatizatum tollit. *Conf. cautela*, vbi in specie de *sulphure antimonii aurato* tenerrimo dicitur.
 4. Sub his omnibus frictions, ligaturæ & sinapismi in partibus remotis non negligantur.
 5. Denique ad *stasin* mucosam *discutiendam* & resoluendam exhibeantur alexipharmaca & succinata, e.g. essent. alexipharm. *Stahlii*, speciatim essentia pimpinell. albæ, porro essentia succini, tinct. salis tartari, tinct. antimon. tartarizata, cum spiritu salis armoniaci anisato, & regimine sudorifero iuncto. Conueniunt etiam nitrosa, quæ irritationes & illarum causas partim mitigant, partim ad euacuationem præparant. Tandem lenit, sedat, simulque discutit cort. cascarillæ.
- B. *Extra paroxysmum.*
1. Quam primum adfectus remittit, propinentur *tonica*, e.g. mixtura tonico-neruina *Stahlii*, tinct. vitrioli martis *Lououici*.
 2. Ad *vires* reficiendas interponantur analeptica ex emulsionibus cum aquis diapnoicis, item aq. cinnamom. namph. lilior. conuall. flor. tiliæ, cerafor. nigror. &c. Conducit etiam vinum generosum peregrinum, maxime in adfuetis & diæta aromatica.
 3. *Febris* si succedere videatur, diæta alexipharmaca locum habent, cum pulueribus antifebrilibus nitroso-temperantibus.
 4. *Chronicam* autem indolem quando morbus inducit, laudata discutientia & resoluentia cum gummi-resinis & regimine calido continentur.

5. Ad *novum* insultum præoccupandum venæ sectio æquinoctialis in pede instituat, subiunctis interdum purgantibus phlegmagogis.
6. *Somnus* diurnus, aër humido frigidus, & commotiones animi fugiantur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Licet ægri de virium defectu conquerantur, *vena sectio* tamen non reformidanda est, si rubicundum in facie colorem exhibeant : hic enim periculum suffocationis, vti cito fit, ita etiam cito sæpe tollitur, vt in futurum vires non adeo requirat. Idem de vomitorio valet iudicium : si modo præsens & præceps periculum sublatum sit, tum vires facile refarciuntur.
2. In pure *phlegmaticis* autem venæ sectio minus convenit, bene vero *vomitus*, si inordinata diæta præcesserit, per sal vitrioli, quod non solum vomitum, verum etiam adfluxus ad alias partes dispulsionem promouet.
3. *Christianus Langius* in miscellan. hoc vomitorium adeo extollit, vt etiam apoplecticos per illud restitutos esse adseueret.
4. *Radix asari* non modo effectu vomitorio, sed etiam discussorio prodest.
5. In casu *necessitatis* locum habet herba *tabaci* in cereuisia vel aqua leuiter cocta, quæ non modo vomitorium, sed & fere resoluentem effectum habet ; anxietates autem, quas circa pectus mouet, aromatica, carminatiua, haustus vini calidi tollere possunt.
6. Quando autem infarctus non adeo enormis est, ita vt liberum aërem æger haurire queat, fortis commotio in senibus debilibus non admittatur, sed potius resoluentia cum tinctura tonica paruis & repetitis dosibus exhibeantur.
7. Cautissime distinguatur catarrhus suffocatiuus ab *asthmate conuulsiuo*, in quo malo salia volatilia in habitu corporis *ευσάρκω* minime omnium conducunt.
8. *Febris* succedens, vti raro salutis spem ostendit ; quando
nem-

- nempe virium defectus, inquietudo, torpor, magna pectoris angustia, & respirandi difficultas perseverant; ita eo cautius tractanda est solis alexipharmacis diaphoretico-diureticis, & pulueribus, ex antimonio diaphoretico, nitro & absorbente quodam paratis: abstinendo a catarrhalibus calidis & salibus volatilibus.
9. Nocet *alut* obstipatio, licet directa, forsi, & profusa exoneratione non referenda fit.
 10. In consistente & senescente ætate omnes tum ordinariæ excretiones, e.g. fluxus mensium, hæmorrhoidum, venæ sectiones, scarificationes, tonticuli, &c. sollicitè conseruandæ sunt, ne illarum neglectiones huic malo anam præbeant.
 11. In primis *catarrhosi* tales circa æquinoctia moderate se gerant, tempestates frigido humidas euitent, & maxime nimio somno se opponant.
 12. In senibus phlegmatico sanguineis, tussi humida & coryza sæpe laborantibus, totius temperamenti correctio intendatur per motum corporis laboriosum, diætam moderate aromaticam, purgantia phlegmagoga, balsamico-amara, gummi-resinosa, muciditatem sanguinis corrigentia: alias catarrhus suffocatiuus, apoplexia, lethargus &c. metuenda sunt.
 13. Præter ea omnia, quæ in apoplexia, illa etiam hic observanda veniunt, maxime temperamentorum diuersitas sub medicatione: vbique notando, quod tempestiuæ *euacuationes* omnes humorum correctiones longissime superent.
 14. Non opus est, multum inquirere, num lassitudo illa & defatigatio, de qua ægri conqueruntur, dependeat a relaxatione toni vniuersali, (cuius tamen contrarium multa circumstantiæ docent) an vero a spasmodica tensione: tempus enim hic non vacat, tonum roborare, vel spasmos demulcere, sed præstat, expedire angustiam respirationis, & viam liberiores reddere.
 15. Adfectus paralytodes, & partium fibrosarum resolutiui, licet

- licet alias facile recrudescant, e.g. apoplexia, paralyfis non ita promte tamen catarrhus suffocatiuus recurrit.
16. *Cadauera secta* docuerunt, quod vesiculæ pulmonales materia mucida repletæ fuerint.
 17. *Vesicatoria*, capiti vel nuca: adplicata, præsentaneum subinde effectum exhibuerunt.
 18. Sic etiam *epithemata* e fermento panario, succino præparato & aceto squillitico, capiti imposita.
 19. *Sulphur antimonii auratum* vltimæ præcipitationis mirifice & puncto fere temporis catarrhum suspendere, obseruare licuit, & quidem non in vno, sed plurimis eius modi languidis, in quibus pro diuersarum circumstantiarum ratione (post catarrhi suspensionem) modo lenem vomitum, modo sudorem, modo nullam conspicuam excretionem produxit. Dosis gran. VI. cum sale quodam digestiuo miscenda. *Conf. D. Ræmpleri dissert. inauguralis de catarrho suffocatiuo.*



TABVLA CXIX.

DE

ADFFECTIBVS SOPOROSIS.

I. DEFINITIO.

1. *Lethargus* est morbus soporosus, idiopathicus, a congestione sanguinis versus caput, & subsecuta inde stasi originem ducens, ac omnium rerum obliuionem inuoluens. Deriuatur a λήθη, obliuio.
2. *Coma* est adfectus soporosus symptomaticus, a restrictione humorum versus caput in febris acutis, minus recte succedentibus, ortus, cum deliriis plurimum complicatus. Deriuatur ab inusitato κῶ, cubo.

II. DIFFERENTIA.

1. Adpellationes horum malorum a nonnullis inuertuntur,

Zzz zz

qui

qui *lethargum* pro symptomate febrili, *coma* autem, in primis *somnolentum*, pro idiopathico morbo habent.

2. Sic etiam alii *carum* his addunt, & lethargo leuiorem pronunciant, quem contra alii grauiorem esse lethargo, & medium inter hunc & *apoplexiam*, sine sensibilitate & spe excitationis, credunt.

III. SIGNA.

1. Lethargi.

1) *Imminentis.*

- a) In dispositis pigritia & lassitudo.
- b) Vertigo, tremor capitis vel dolor in posteriore eius parte grauius, profundus.
- c) Perpetua ad somnum inclinatio, somnus profundior, susurrus aurium, & sensuum heberudo. *Vid. Foresti observationes.*

2) *Præsentis.*

- a) Præceps lapsus in altissimum somnum vel soporem, ut non solum ægrius excitari possit æger, sed & licet excitetur, sui & quarumcumque rerum immemor sit, ac magis magisque in somnum relabatur.
- b) Pulsus, respiratio, color & calor a statu naturali non multum recedunt.
- c) Et licet motus febrilis concurrat, est tamen ille sapius ad modum lenis, minime autem exquisitæ & acutæ periodi.

2. Comatis.

1) *Somnolenti.*

- a) Sopor diuturnus & ita profundus, ut immobiles iaceant ægri, more lethargicorum.
- b) Suscitantur tamen facilius, neque adeo sensibilibiter aut præfracte delirant, nec plane immemores sunt.

2) *Vigilis, seu insomnis.*

- a) Maxime quidem in somnum propendent, hunc tamen non adsequuntur.
- b) Delirant plerumque.
- c) In audiendo, si adlocutus fueris, promptissimi.
- d) Si terigeris illos, mox oculos eleuant.

e) In:

- e) Interdum malum inferre tentant, lecto repente exsili-
lentes.

IV. *SUBIECTA.*1. *Lethargi.*

- 1) Personæ phlegmatico-sanguineæ, crassæ & obesæ.
- 2) Seniores otiosi, lautæ & humidæ diætæ addicti, ac meridiari soliti.
- 3) Catarrhis capitis & pectoris vexati.
- 4) Qui vsum fonticulorum, vel scarificationes aduetas, ob ætatem prouectiorem, imprudenter negligunt.
- 5) Qui vsum tabaci, vel fumi forma haustum, vel pulueris facie naribus inspiratum, subito omittunt, non raro in sopores incidunt lethargicos, vel in apoplexiam serosam.
- 6) Idem periculum imminet, senibus maxime, post diurnas vigilias, curas & ægritudines animi, narcoticorum vsum, ebrietatem, graues capitis contusiones, largiorem moram sub radiis lunæ.
- 7) Infantes obesi ab achoribus retropulsis lethargici quasi euadunt.

2. *Comatis.*

Comata accedunt subiectis, febribus acutis, malignis, decumbentibus, prægressis insignibus capitis doloribus, deliriis, vsu opiatorum, stupefacientium.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis remota* omnium horum malorum est plethora.
2. Causa *materialis proxima* est stasis sanguinis, a congestione versus caput exorta.
3. Causa *efficiens* est tedium principii vitalis ad motus illos eluctatorios, euacuationem sanguinis per nares respicientes.
4. Et sic lethargus ratione caussarum magnam conuenientiam habet cum apoplexia.
5. Causas *occasionales & procatarticas* in descriptione *subiectorum* iam indicauimus.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Seniores somnolenti, nisi diæta lauta & vitæ genus otiosum mature mutetur, in somnum denique profundissimum & lethalem delabuntur.
2. In plenario *lethargo*, ubi prorsus excitari non possunt ægri, intra quartum & septimum diem sæpe moriuntur; nisi ætas vegetior, aut insperata eruptio purulenta ex infundibulo, naribus, vel auribus contingat, quod post vulnera capitis, aut acutos eiusdem adfectus, interdum obseruare licet.
3. *Coma* vix non eiusdem discriminis est, cuius lethalitatem sudor frigidus denunciat.
4. Satius est, *lethargo* superuenire phrenitidem quam phrenitidi *lethargum*.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *Curatoria.*1. *In lethargo.*

- 1) Ad sensus *exsuscitandos*, & decubitus humorum a capite partim reuellendum, conducunt:
 - a) Clysteres stimulantés, vel suppositoria acria e colocynt spec. hieræ, diagrid. agaric. sal. gemmæ, oleo irino.
 - b) Ligaturæ partium oppositarum.
 - c) Frictiones.
 - d) Vesicatoria.
 - e) Cataplasmata rubefacientia, plantis pedum & volis manuum adplicata.
 - f) Salia volatilia, naribus admota.
 - g) Pilorum euulsio.
 - h) Clamores & acu puncturæ.
- 2) In *plethoricis*, post adplicationem clysteris, statim venæ sectio instituat, & deinde, si necessarium videatur, hirudines adplicentur.
- 3) Ad motum sanguinis translatorium & orgasticum componendum coniungantur.
 - a) *Interne*, pulueres antispasmodici nitroso-cinnabari- ni cum lenibus alexipharmacis.

b) *Ex-*

- b) *Externe*, camphorata, bufo exsiccat, peſtinatio vel ſcalptio.
- 4) Et quoniam in nonnullis ſubiectis *primarum viarum* cruditates præſto ſunt, vbi caput per conſenſum adfici- tur, adhibeantur in his præparantia & euacuantia, nempe vel vomitoria, vel purgantia ialappina, helle- borata.
- 5) Subiunctis iis, quæ materiam mucoſam diſcutiunt, & caput roborant, e.g. radicibus catarrhalibus, eſſent. ſuccini, tinctur. antimon. cum ſpiritu C. C. rectifi- cato.
2. *In comate.*
- 1) In vtroque comate *febris* decurſus reſpiciatur :
- a) *Interne* per antifebrilia, diapnoica, coniunctis cinna- barinis & diſcutientibus.
- b) *Externe* per camphorata, buſonem exſiccatum.
- 2) Adhibitis ſimul excitantibus, e.g. veſicatoriis, odore ſalium volatiliũ &c.
- B. *Prophylactica.*
1. Cauſſarum antecedentium occupatio & ſublatio vbique reſpiciatur.
2. In ſenibus mucoſis temperamentum corrigatur, & humo- res a capite reuellantur.
3. Præſcribantur in hunc finem phlegmagoga ex agarico, ialappa, colocynthide, vel in ſanguineis, helleboro nigro; quæ ſingulis anni quadrantibus reperantur.
4. Subiungantur amara ſulphurea, e.g. radices & herbæ ca- tarrahales, item gummi-reſinæ; vel pilularum vel infuſi forma, circa æquinoctia uſurpanda.
5. *Dieta* conueniens vbique iniungatur, nempe cibus par- cior, aromatizatus, ſiccior, aſſatus, potus aliquando vi- noſus, vinum amarum medicatum, motus corporis conſumtorius, excitantia per ſal quoddam volatile.

VIII. *CAVELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. *Vena ſectio* ante inſtituenda eſt, quam ſanguinis ſtaſis in ſuppurationem perueniat, alias plus nocet, quam prod- eſt.

2. A *sternuatoriorum* vñ plane abstinendum quod adfluxum ad caput magis prouocant: quando autem iusta suspicio adest, stalin in suppurationem & maturitatem iam tranfuisse, cum possunt adhiberi, sub spe, an forte per illas vias pus eliciatur.
3. *Fonticuli* senioribus mucum serosum a cerebro reuellunt, & sic stases soporosas occupant.
4. *Cucupha* & similia topica neruina muniunt capitis partes ab infarctu seroso, & ita in phlegmaticis locum habent, modo camphora condiantur; in sanguineis autem congestionem accelerant, & obfirmant.
5. *Comati* vti directe nihil adhiberi potest, ita, obseruandum, quod, si versus dies criticos æger obdormiscat, & libere transpirare videatur, exiguus, immo plane nullus metus interueniat.
6. Hinc non turbandi sunt tales ægroti qui a die quarto ad septimum somnolentia tali corripuntur, &, vigiles facti, alacriter sese habent, ac vel vrinam vel aluum excernunt, vel potum desiderant & iterum obdormiscunt; medicamenta saltem ipsis euigilantibus propinentur.
7. In *comate camphorata*, vertici & temporibus largiter adplicata, vsum præstant; quo etiam pertinet emulsio ex aceto, nucleis persicorum cum camphora.
8. Sic etiam *unguentum alabastrinum* facit, quod potest.
9. *Castoreum* suo loco relinquendum est, solet enim, externe etiam exhibitum, narcoticum præstare effectum.
10. *Coma*, ab *opio* inductum, per odorem aceti nihil auxilii expectat, & quando negotium eo processit, vt perpetua in somnum propensio iam adpareat, res fere conclamata est; nisi forte salia volatilia, repetitis vicibus naribus adhibita, aliquid conferant.
11. *Lethargus*, vti in iunioribus & alacrioribus subiectis raro euenit; ita somnolentia illa, ab externa violenta cerebri concussionem inducta, vix lethargicæ indolis reputanda est: sæpius enim euigilant, non ita obliuiosi sunt, & spes vitæ adfulget, præcipue quia *pus* per aures & nares

res sponte erumpere in illis obseruatur, & sic sine Medici concursu, cuius manus in talibus casibus perbreues sunt, restituitur.

12. *Salia volatilia oleosa* commouent quidem, sed non corrigunt, hinc nullo modo adhibeantur.

TABVLA CXX.

DE

LIPOTHYMIA ET SYNCOPE.

I. DEFINITIO.

1. *Lipothymia* est notabilis vitalium & animalium actionum, ad minimum quoad sensum, abolitio, a defectu motus vitalis pulsorii originem ducens. Deriuatur a *λείπω*, deficio, & *θυμός*, animus.
2. *Syncope* est plenaria vitalium & animalium actionum, ad minimum quoad sensum, abolitio, a defectu motus pulsorii dependens. Deriuatur a *συγκίπτω*, concido.

II. DIFFERENTIA.

1. *Lipothymia* & *syncope* diuersa quidem sunt nomina, vnus autem idemque est morbus, & non nisi *gradu* differens, vti e signis patebit.
2. Hic adfectus est vel *idiopathicus*, vel *symptomaticus*: ille sine aliis vrgentibus morbis obuenerit, hic autem accidit vel chronicis, vel acutis, e.g. scorbuto, febribus malignis.
3. Differentiam *lipothymia* & *syncope* ab *apoplexia* docent signa vtrorumque adfectuum, inter se collata. Vide *tabulam de apoplexia* & quidem *different. num. 2.*
4. Differentia *lipothymia* a conuulsivis malis innotescit ex flaccido corpore in *lipothymicis* praesente.
5. Quoniam *mors* ipsa non nisi gradu a *syncope* differt, in dubio statu sciendum est, quod, quamdiu *syncope* adsit, flaccescant artus, morte autem subsecuta, corpus rigidum

gidum reddatur , præcipue sub vltimo conuulsionis molimine.

III. SIGNA.

1. Præcedit notabilis circa cor anxietas.
2. Succedit repentina virium & actionum veluti extinctio, non solum animalium, sed & ipsarum vitalium ;
3. Ita vt sensus, motus & pulsus officia sua amisisse adpareant.
4. In *lipothymia* quidem debilissima adhuc pulsatio, vel potius tremor solum cordis cum respiratione, vix tamen sentienda, obseruatur.
5. In *syncope* autem plenaria ἀσφυξία, seu pulsus & respirationis omissio adparet, ita vt sine vlllo vitæ indicio ægri conspiciantur.
6. Pallor faciei morti similis est.
7. Nullus in corpore vigor, sed torpor flaccidus sese manifestant.
8. Frigus ad minimum in extremitatibus, sentitur.
9. Oculi sunt clausi, aut saltem turbidi.
10. Os etiam clausum est, sed non constrictum, aliquando autem indecore hians.
11. Quamprimum ad sese iterum redeunt, profunda suspiria & respiratio in iis obseruantur.

IV. SVBIECTA.

1. *Lipothymia idiopathica* rarior est quam symptomatica, & euenit generatim
 - 1) Admodum teneris, sensibilibus, animi commotionibus, præcipue terrori, obnoxiiis: temperamento melancholico vel phlegmatico melancholico præditis; vel denique e quacumque antea causa lipothymiaæ adsuefactis.
 - 2) Speciatim autem iis, qui indefesso studio, post dictas occasiones, speculantur.
 - 3) Item grauidis, quæ pectus & abdomen nimium constringunt.
 - 4) Sic etiam *virgines* aliquando inter partum *syncope* corripuntur.

ripiuntur, unde suspicionem, eamque non semper iniuste, incurrunt, quod animi sint incasti.

- 5) Euenit etiam aliis, qui animi pathemata inter cibum admittunt, eaque suppressere coguntur.
2. Lipothymia *symptomata* euenit familiarissime
- 1) *Fœminis*, spisso & mucido sanguine præditis, ob fluxum mensium impeditiorem: vbi satis frequenter hysteriarum exempla occurrunt, quæ per plures dies syncoptico tali malo corripiuntur.
 - 2) Qui hyperemesi anxia defatigati sunt.
 - 3) Profusionibus sanguinis, sudoris, diarrhœæ, lactis, magnis doloribus, insolitis laboribus exhausti cum inedia.
 - 4) Voracibus, qui ventriculum insolita quantitate & peruersa qualitate ciborum onerarunt.
 - 5) Puerperis post partum laboriosum, refrigerium, lochia nimia.
 - 6) Qui aduentitia extraordinaria passi sunt, e.g. venena, lapsum in ventriculum, refrigeria &c.
 - 7) Qui febribus *acutis* vel intermittentibus correpti, corpus calidum, vel leni diapnoë tepescens, repente refrigerant, vel post easdem febres præmature crudis vel nimis cibis ventriculum replent.
 - 8) Speciatiim vbi febres *epidemicæ* malignæ imminet.
 - 9) Denique qui excretiones debitas, e.g. solutionem alui, non experiuntur.

V. CAUSSAE.

1. Nexus *causalis* in hisce morbis, præcipue *idiopathicis*, eamdem, quam in apoplexia & paralyfi, inuoluit difficultatem: nulla enim plane connexio & proportio harum mentis fictionum cum crasi & motu sanguinis adparet.
2. *Materiales* sane causæ hic non sufficiunt, ad tantam desperationem naturæ; quod vel exinde elucescit, quia lipothymia & syncopa sine conspicua materia occurrunt.
3. Hoc autem certum est, quod animus meticulosus & diffi-

dens, cum statu plethorico coniunctus, hisce motuum defectibus fundamentum generatim subministret.

4. Causas *procatarcticas* & *occasionales* in descriptione *subiectorum* iam indicauimus. Hisce accedunt: fama mortis personæ alicuius dilectæ, periculum vitæ ex improviso cooriens, incendium vel quæcumque alia naturæ aduersa.

VI. PROGNOISIS.

1. Lipothymia *idiopathica*, quæ in sensibilibus, sanis, melancholicis, euenit, & aliquid pathetici, e.g. terroris, timoris, anxietatis coniunctum, seu proxime prægressum, pro fundamento habet, magnam raro considerationem, ad minimum in præsens, meretur.
2. In futurum autem *peioris* semper ominis est: tum ad morbos vniuerse, si hi aliquando ingruant: tum speciatim, quod tanto facilius in tali constitutione expectandi sint.
3. Lipothymia autem *symptomata* maioris est momenti: adfuefacta quidem, & quæ morbis chronicis coniungitur lipothymia, minoris est periculi, quam quæ acutis & malignis accedit.
4. Morbus *acutus*, qui a lipothymia initium capit, non est boni augurii.
5. Quæ lipothymia incremento morbi, vel status initio superuenit, paullo minus periculosa est, quum ibi omnia sint laboriosa.
6. Quæ autem morbi statui, ad crisin vel debitas declinationes spectanti, accedit, longe peioris est præfagii: quamvis & hic adfuefactio periculum minuere possit.
7. Quæ suppressioni debitarum, in certis morbis, excretionum superuenit, tantæ non est considerationis, quam quæ sine euidente aliqua causa morbis accedere solet.
8. Quæcumque lipothymia aliis morbis accedunt, per se commode non tractantur: quando enim ipse morbus per legitimas secretiones & excretiones feliciter decurrit, & symptomata vrgentia congruo modo mitigantur, tum sponte sibi restituitur natura.

9. *Syncope* diuturna sæpe febres post se relinquit.
10. *Syncope* ab *hæmorrhagiis* nimis periculosa est, maxime in subiectis trepidis, & minus aduetis: vnde puerperæ lipothymicæ, quod a *syncope* ad mortem sæpius transeant, sollicitè obseruari, & a somno quavis ratione distineri debent.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis*, lipothymiam magis *idiopathicam* respiciens.

1. Principium agens ad motus *excuscitetur*. Faciunt hoc
 - 1) Clysters stimulantés.
 - 2) Adpersio aquæ frigidæ.
 - 3) Odorifera penetrantiora, e.g. salia volatilia, nempe spiritus C.C. salis armoniaci, item spiritus cinnamomi, liliorum conuallium, aqua Hungarica.
 - 4) Relaxatio vestium.
 - 5) Decubitus horizontalis in lecto calido.
 - 6) Frictiones.
 - 7) Sternutatoria.
 - 8) Piper vel sal volatile, linguæ imponenda.
2. Facta excitatione natura trepidans *refocilletur*, & discussio sanguinis intendatur; quod obtinetur
 - 1) Per analeptica, e.g. fiat potio aromatisata ex aqua ceraforum nigrorum, borraginis, flor. tiliæ, acaciæ, lil. conuall. namph. lauend. cinnamom.
 - 2) Per essentiam alexipharmacam *Stablii*.
 - 3) Per syrupum acidi citri, rosarum, de canell.
 - 4) Per haustum vini generosi, vel essentia croci imbuti.
3. *Febris* præcaueatur. In hunc finem conducunt:
 - 1) Continuatus modicus vsus dictæ essentia alexipharmacæ.
 - 2) Præcipue pulueres nitroso absorbentes, cum sale quodam digestiuo, antimonio diaphoretico & momento cinnabaris sociati; vbi versus somnum lene anodynum, e.g. theriaca, exigua dosi addi potest.

B. *Methodus specialis*, pro diuersis causis lipothymicæ *symptomata* varians.

1. Vbi lipothymia a prægrauatione ventriculi post pastum, vel etiam a debilitate primarum viarum, sine occasione, cum imminuto adpetitu & ructibus nauseosis obtingit, digestiua, laxantia, &, si nihil contraindicet, matura emetica, conueniunt.
2. In turbato *uteri* statu, & sanguinis menstrui impedito successu, pilulæ *Becheri* omnibus aliis palmam præripiunt, si sufficiens humectatio & corporis motus ipsis coniungantur.
3. In causis hypochondriaco - hysterici mali tractandus est morbus, vti tabula de malo hypochondriaco - hysterico indicatum est; præcipue autem in tali statu locum habet elixir antihypochondriacum, e mixtura simplice & extracto panchymagogo *Crollii* paratum.
4. In febribus *intermittentibus* quando lipothymia occurrunt, cruditates per digestiua & lenia laxantia eliminantur, subiunctis, vt moris est, alexipharmacis temperatis. *Conferantur tabula de febribus intermittentibus.*
5. In febribus *acutis* si lipothymia obueniant, nitrosa, digestiua, & absorbentia in principio, alexipharmaca in statu, continentia tranquilla cum regimine, diapnoica in declinatione, adhibenda sunt: coniunctis vbique analepticis ex aquis fragrantioribus temperatis, syrupo acetositatis citri, manibus Christi perlatis, confect. de hyacinth. alkermes, &c.
6. In causa *hyperemeseos* præscribatur vinum aromatizatum calidum, & versus noctem theriaca.
7. Quando *terror* lipothymiam induxit, tum profunt gemmata, specificè hyacinthus præparata, adiecto gran. I. M. P. de cynoglossa. Vulgus exhibet specificum cephalicum, puluerem Marchionis.
8. Vbi ab *ira* excitatur lipothymia, quo casu sæpe prodromus est febrium cholericarum, emesis satis matura, vel nitroso - absorbentia, profunt.
9. In lipothymia post nimias *hamorrhagias*, sudores, diarrhœas, immodicos labores, cum inedia coniunctos, analepsis

e bonis alimentis requiritur, e. g. gelatinosa, restaurantia, cum tonicis coralliatis, gemmatis.

10. Homines de reliquo sani, quando sub venæ sectione lipothymia corripiuntur, medicatione non indigent, facies modo aqua frigida adspargatur, vel acetum destillatum aut sal quoddam volatile naribus admoueat.
11. In lipothymia cum *apoplexia* coniuncta, vel in statu dubio, suspectis etiam causis antecedentibus, venæ sectio in senioribus, ad hunc morbum alias minus proclivibus, commendatur.

C. *Methodus præservatoria.*

1. Causæ *antecedentes*, quantum fieri potest, remoueantur.
2. Cruditates primarum viarum, vt fomes *ασφύξιας*, tollantur per digestiua & congrua laxantia.
3. Animus a passionibus & speculationibus liberior conferuetur.
4. Excretiones debitæ promoueantur.
5. Excitantia remedia in subiectis, ad lipothymiam inclinantibus, semper præsto sint, vt malum statim præoccupari possit.
6. *Motus* corporis moderatus numquam negligatur.

VIII. *CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. *Clysteres* ad naturam excitandam prius adhiberi non debent, quam si lipothymia ad quadrantem horæ duraverit.
2. Vbi vero aliqua vitæ signa adhuc præsto sunt, illorum vsus plane potest prætermitti.
3. Durante lipothymia medicamenta *interna* tuto propinari non possunt, quia facile arteriam asperam ingrediuntur.
4. Methodus vulgaris commendat *spirituosa* fortiora, interne propinanda, ad spiritus, vt dicitur, excitandos, sed sanguinem fortius exagitant, ac morbo sæpè incrementum adferunt. Et licet ad sensus reuocandos aliquid præstent, plus tamen vellicationes, frictiones & punctiones in partibus sensibilibus ad hunc scopum contribuunt.
5. Sic etiam post excitationem vitrum generosi vini plus

- analepticæ virtutis præbet, quam omnia balsàmica acriora, nisi forte speciali odoris suauitate aliquid præstent.
6. Non vana est vulgaris illa commendatio, quod lipothymicis post paroxysmum propinari debeant medicamenta, sanguinem coagulatum *resoluentia*: in tali enim ad interiora congestione non tantum spissitudo sanguinis inducitur, sed facile etiam stases circa viscera, & febres inflammatoriæ exoriuntur.
 7. Natura ipsa hanc indicationem subministrat: nam profunda illa suspiria post excitationem nihil aliud intendunt, quam sanguinis, præcipue circa pulmones & hypochondria hærentis, discussionem.
 8. *Somnus* post paroxysmum non statim concedatur.
 9. Hilaris animus ad vires recuperandas, & anomalias motuum sanguinis præueniendas, magis hic valet, quam vlla medicamenta.
 10. *Febris* si statim post lipothymiam percipiatur, analeptica illa spirituosa, immo ipse haustus vini prætermittantur, & mox antifebrilia in vsum vocentur.
 11. *Vomitorium* commode propinatur in lipothymia, a terrore vel iracundia tacita post pastum exorta: melius enim est, cibum reiici quam male digeri; modo vires respondeant, & subiectum sit euemetum.
 12. Calore tolerabili foueantur ægroti.
 13. Quæ subiecta sub venæ sectione ad lipothymiam inclinant, illis vena non nimium est liganda; caueant etiam sibi, ne pleno ventriculo sanguinis-ventilatio instituat, neque statim post eandem adsurgant.
 14. Deinde consideratu dignissimæ sunt duæ sequentes observationes:
 - 1) In *lipothymia*, quæ a rebus *presentibus* excitatur, corpus ægrotorum vehementissime constringitur, vasa fortiter detumescunt, patientes non prorsus in terram procidunt, sed aliquem adhuc impetum resistendi ac sese saluandi ostendunt, e.g. sunt lipothymici, qui sub venæ sectione omni vi chirurgi manus, vulnusculum ligant-

ligantes, detrudere conantur; de qua actione, finito paroxysmo, vix possunt persuaderi.

- 2) Quando autem lipothymia ob res adhuc *futuras* exoritur, ægri facile in terram procidunt, & ab omnibus animalibus & vitalibus actionibus desistunt.



TABVLA CXXI.

DE

MEMORIAE DEBILITATE.

I. DEFINITIO.

Debilis memoriae est species sensuum internorum læsionis, varia phantasiae & iudicii vitia sensim inducens.

II. DIFFERENTIA.

Debilis memoriae, quæ per eiusdem abusum & fatigationem inducitur, differt a reliqua obliuivisa aut *simplice debilitate*, quæ non tam nudum defectum, quam confusionem memoriae inuoluit.

III. CAUSSÆ.

Memoriae debilitatem inducunt:

1. Frequens illius vsus seu potius abusus in ediscendis vocabulis variarum præcipue linguarum.
2. Paralytica capitis, præsertim linguæ, afflictio.
3. Violentæ capitis læsiones.
4. Tolerati grauissimi capitis dolores in malis phreniticis &c.
5. Ebriosum vitæ genus.
6. Veneris abusus.

IV. PROGNOISIS.

1. Omnes memoriae læsiones, si medicamenta spectemus, curatu sunt difficillimæ, nec, nisi vitæ genere mutato, & omnibus animi pathematibus ad tranquillitatem gratam ac lætabundam reductis, vix vlllo modo subleuandæ.
2. Ante omnia summe difficilis successus est illa memoriae læsio,

læſio, quæ cum *paralytica debilitatione* quarumcumque circa caput partium, præcipue linguæ, connexa, & ſimul leuiter delira exiſtit.

3. Inclinant vel ad ſomnum profundum, eumque ſatis tranquillum, qui, tantum abeſt vt ſtupiditatem illam imminuat, vt notabiliter potius eandem augere obſeruetur;
4. Vel vigiliis excedunt, & hac ratione deliria inuitant.
5. Ex his duobus incommodis per mediam ſemitam emergere, difficillimum eſt, niſi ipſa natura, ſub iucunda præcipue totius vitæ mutatione, ad ſeſe redeat.

V. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

Ad hæc *motuum & ſenſuum vitia*, ſeu vt loquuntur, ſpirituum defectus, ſequentia remedia vulgo commendantur :

1. Odore & ſapore grato prædita, e.g. eſſent. ligni aloës, ambræ.
2. Volatilem & ſpirituoſam indolem exhibentia, v.g. aqua magnanimitatis, aromatica ſpirituoſa.
3. Alia ſic dicta neruino analeptica, in primis vbi notabilis virium defectus occurrit: ſunt enim non pauci, qui ſub obliuiſo ſtupore maxime robuſti ſunt, copioſe edunt, optime nutriuntur, ac proinde analepticis talibus non indigent.


VI. *CAVELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. Vti *ſpeciales* medicationes hic non ſatis faciunt, ita generales ventilationes debitarum excretionum, in primis, vbi locum habere videtur, ſanguinis, partim ſubleuant, naturam, partim officii ſui debiti illam admonent.
2. Non expedit, obliuiſis talibus aliquid aduerſi & ingrati iniungere: his enim occaſionibus ad promtius ſuccedentia deliria tranſeunt.
3. In quibus *vena ſectio* locum habet, in illis prius non inſtituatur, quam primæ viæ mediocriter euacuata ſint.
4. Externe laudantur *cucupha* e neruinis & aromaticis parata, nempe herb. maioran. hyſſop. flor. ſpic lauendul. cinnamom. cardamom. cubeb. caryophyll. lign. aloës

&c.

&c. item commendantur spirituoſa, oleoſa, ballàmica; ſed optandum, vt euentus exſpectationi reſponderet.

5. *Pulvis abbatis Tritheimii* a Io. Wolffio tanta in hoc malo laude extollitur, vt hinc *memorabilibus* ſuis eundem inferendum duxerit; ſed ſpecificam aliquam ab illo efficaciam exſpectare, fruſtraneum eſt, licet omnia fere, quæ proſtant, aromata, & vulgo credita meliora analeptica margaritas, corallia, contineat.



TABVLA CXXII.

DE

MELANCHOLIA.

I. DEFINITIO.

Melancholia eſt læſio & perturbatio phantaſiæ, quæ rectam eius & ordinatam agendi ideam interrumpit, vcaliena inde idea quaſi inſeratur, & ſecundum hanc actiones perperam exercentur. Deriuatur a μέλαινα, nigra & χολη, bilis; ſecundum hypotheſin antiquorum.

II. DIFFERENTIA.

1. Melancholia eſt vel *triftis*, vel *incunda*, vel *mixta*; quæ differentia temperamentorum diuerſitate potiffimum innititur.
2. Differt melancholia ratione *cauſarum*:
 - 1) In aliis enim a ſola mentis falſa *prafiguratiōe* & æſtimatione dependet, & hos perpetuo fere adfligit:
 - 2) In aliis a corporeis *læſionibus* excitatur, & in his per occaſiones ad proportionem mali corporei euenit; quo nomine melancholia præcipue *hypochondriaca* fatiſ nota eſt.
 - 3) In aliis *mixtus* occurrit morbus, e.g. quando melancholia a corporalibus cauſiſ prima rudimenta accepit, per accedentes autem morales cauſiſ talia augmenta

Bbb bbb

nanci-

nanciscitur, vt, sublatis licet corporeis caussis, perpetua tamen anxietate & inquietudine detineantur.

III. SIGNA.

1. Animi anxietas sine omni rationali caussa, vnde conqueruntur: das Herz sey ihnen so schwer, die Welt zu enge, es wäre als ob sie einen Mord begangen, oder als wenn Himmel und Erde auf ihnen lägen.
2. Fastidium omnium rerum, antea etiam acceptarum, ipsius adeo vitæ.
3. Lacrimarum frequens effusio.
4. Alii amplius spatium desiderant, fenestras aperiunt, & effugere conantur; nam carcere inclusi sibi videntur.
5. Alii habitacula clausa desiderant, & ob metum capturæ, supplicii capitalis, &c. sese abscondunt.
6. His animi angustiis iunguntur vitia motuum in corpore, nempe
7. Palpitatio cordis.
8. Respiratio profunda, laboriosa.
9. Morus tonici modo stricturæ: vnde horror, pallor, & aspectus extenuatus.
10. Modo illius remissiones: vnde repentinus rubor, volaticus æstus, lassitudo & virium defectus. Non raro etiam febris quasi acuta sub initium accedit. Conf. caut. 9.
11. Alius plurimum pertinaciter adstricta est.
12. Animi anxietatibus etiam adnumeranda veniunt grauia *insomnia*, talibus subiectis familiaria, quando scilicet melancholico - sanguineis de repentinis incendiis, sanguinis in proprio corpore per alios effusionibus; serosis autem magis de profundis aquarum gurgitibus, transitu per illos cum periculo submersionis, *insomnia* obtinent.
13. His accedunt *pauores* sub somno, a quibus sæpius excitantur cum summa animi consternatione & anhelitu laborioso.
14. In melancholia *incunda* circa res ludicras, obscænas, occupati

cupati sunt ægri. Huc spectant leuia illa chronica deliria, vbi reges vel principes se esse existimant.

IV. SVBIECTA.

1. Melancholiæ subiecta vel solius mali denominatione innotescunt, sunt nempe personæ
2. Temperamenti præcipue melancholici, vel sanguineo-melancholici, vbi & animi & corporis constitutio, ad hunc morbum fouendum, optime quadrat.
3. Specialiter huic subiacent litterati, hypochondriaci, splenetici dicti, & feminæ hysterica.

V. CAUSSAE.

1. Sub *differentia* iam dictum est, quod melancholia modo a solis animi præfigurationibus, modo a corporis læsionibus originem ducat.
2. Licet enim anima, secundum substantiam sui, ἀπρόθετα sit, intimam tamen ac realem συμπρόθεταν subit, quatenus cum corporis necessitatibus conspirat.
3. Vnde læsiones in corpore siue præsentés, siue saltém imminentes, in animam redundant, & anima, immoderatis æstimationibus turbata, anxias tales ideas in corporis directiones conuertit, & sic reciproco damno corporis perturbationes menti, & mentis iterum corpori laborem faciunt.
4. Causæ itaque sunt:
 - 1) Vel *materiales*, e. g.
 - a) Sanguinis spissitudo, detentio, & quasi inclusio circa venam portæ.
 - b) Mala dispositio partium nobilium internarum, e. g. constitutio scirrhusa, vlcerosa immo actu vlcerata; quales ægri non solum ad mœrorem, pauorem, fastidia, omnis spei abiectiōnem, verum etiā ad iracundiam inclinant.
 - c) Fluxus hæmorrhoidalis suppressus in viris, & mensium perturbationes in feminis, ad causas antecedentes pertinent.
 - 2) Vel *imateriales*, v. g.

- a) Abusus speculationum & profundarum impressionum.
 - b) Conscientiæ labes, contemptus, illusiones.
 - c) Frustratio spei diurnæ.
 - d) Terrores, timores, ab infantia iam inducti.
5. Deducuntur vulgo hæ & aliæ mentis læsiones a mala spirituum crasi, vnde tumultu quodam agant, turbulentas ideas forment, easque animæ obiciant; quæ peruersum inde conceptum *patiatur* potius, quam *agat*: sed actiones non sunt tumultuaria, verum fictioni mentis exacte respondent.
6. Sic etiam idea mentis periculosa corporis constitutioni admodum analogæ est, e. g. incarcerato sanguine, de carcere & captura loquuntur; cui rei accedunt subsidia illa spontanea, quæ rationi omnino conformia sunt, nempe profunda & anhelosa suspiria, quibus sanguinis circa venam portæ stagnationes insigniter expediunt; item conamina ad sui liberationem, desideria in amplum campum &c.

VI. PROGNOISIS.

1. Melancholia a causis *immaterialibus*, nudis animi imaginationibus, profundis speculationibus &c. dependens, longe obstinatiores est, quam quæ causam materialem pro obiecto habet.
2. Hinc melancholia *hypochondriaca* præ aliis meliorem adhuc spem facit restitutionis, præcipue si hæmorrhoides superueniant.
3. Quando autem speculationes tales in habitum deducuntur, difficillimæ sunt tractationis.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quæ melancholia ab *immaterialibus* causis ortum duxit, indiget medicina mentali potius, quam corporali, nempe
 - 1) Patientissima, placida & amica, conuersatione.
 - 2) Abstinencia a stolidè dictorum & factorum taxationibus, præcipue importunis, multo magis autem a verberationibus.


beribus & vinculis, extra tempus insuperabilis necessitatis.

- 3) Oblatione remediorum idoneorum, quibus timores anxietates talium ægrorum funditus auferri queant, e.g. auxiliorum victus & amictus, solationum diuinorum &c.
2. Hæc methodus locum etiam habet, quando melancholia prima sui *rudimenta* a materialibus causis, *augmenta* autem a moralibus sollicitudinibus, accepit.
3. Quando autem melancholia a *materialibus* causis originem duxit, hæc legitima ratione remouendæ sunt.
4. Hinc, in melancholia *hypochondriaca* sequente methodo incedatur:
 - 1) Primæ viæ per laxantia melanagoga expurgentur.
 - 2) Venæ sectio in pede ad vnc. IV-VI. instituat.
 - 3) Deinde ad orgasmum sanguinis componendum, temperantia nitrosa exhibeantur.
 - 4) Denique, ad tonum partibus restituendum, martialia selecta propinentur.
 - 5) Præter ea in viris negotium hæmorrhoidum, in feminis autem mensium fluxus, respiciatur, & vbique sufficiens motus ac potus commendetur. *Conf. tabula de malo hypochondriaco-hysterico.*

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Ingens discrimen est inter turbas motuum, quæ ab ipso animo per morales causas inducuntur, & contra illas, quæ a veris corporeis impedimentis & periculis animo offeruntur; quæ proinde circumstantiæ solertissime discernendæ sunt, ne medendi tentamen præpostere instituat.
2. In melancholia, a speculationibus simpliciter inducta, dolendum est, quod mortales in verorum remediorum adplicatione tam grauissime hallucinentur, & stultius sæpe se gerant, quam ipsi insanientes: sane enim *verbera* & *vincula* stultitiam bono fide non superant, sed solam forte malitiam coniunctam.

3. Melancholia *hypochondriaca*, *grauior* etiam, a *venæ sectione* plus solatii, quam vllis aliis remediis, accipit; immo, quod bene notandum, si talis ventilatio non præmissa fuerit, reliqua medicatio irrita & vana deprehendetur.
4. In feminis vsum aliquando habet *tinctura alcalina acris*, e. g. antimonii, tartari; modo nitrosa præmittantur.
5. *Nitrum*, in potu etiam exhibitum, sensibilem hic efficaciam præstat.
6. Post venæ sectionem & spasticæ stricturæ per nitrosa & cinnabarina mitigationem, locum habent sanguinem crassum resoluentia & motum eius distributorium adiuuantia. Laudatur in viris mixtura simplex, leniter camphorata.
7. *Specificæ* passim celebrantur, *anagallis* punicea, vnde germanice *Gecken-Henl* dicitur, *adianth. album*, vitriolum lunæ, puluis *Iulii Palmarii*, & alia, de quibus plura sequente tabula dicemus.
8. *Vomitória* melancholicos in maniam frequenter coniciunt. *Conf. tab. de malo hypochondriaco-hysterico.*
9. Quo maior est spissitudo sanguinis in hypochondriaca melancholia, eo facilius commotiones febriles resolutoriæ accedunt; quo quidem casu probe notandum est, quod primis hebdomadibus *schema quasi acutum phreniticum* exhibeatur, circa tertium autem septenarium talis morbus valde remittat, donec tandem prorsus superetur. Hanc obseruationem tanto magis commendandam iudico, quia deliria illa, quæ sub initium satis acuta adparent, non raro Medicis imponunt, vt statim potius in meningibus quam in vena portæ quærant, atque varia peruersa remedia adhibeant.



TABVLA CXXIII.

DE

M A N I A.

I. DEFINITIO.

Mania est acutissima species deliriorum, a perturbatione phantasiæ & iudicii originem ducens. Deriuatur a *μαίνωμαι*, insanio.

II. DIFFERENTIA.

1) Deliria sunt

- 1) Vel manifestius *symptomata*, quæ evidentem alium corporis adfectum sequuntur.
- 2) Vel *idiopathica*, quæ nullum corporis evidentem morbum comitantur.

2. Porro deliria sunt

- 1) Vel *acuta*, & brevioris periodi, quæ in morbis acutis, e. g. phrenitide &c. obueniunt, & indefinita habent obiecta, v. g. mortem præsciunt, in lecto peregrino se iacere, domi suæ se non esse, conqueruntur, & ad sua, tamquam meliora, proficisci velle contendunt. De his tractandis sub febribus fusius diximus.
- 2) Vel *chronica* seu *diuturna*, cuius indolis sunt
 - a) *Melancholia*, de qua præcedente tabula actum est.
 - b) *Mania*, quam hæc tabula exhibet.
 - c) Deliria *lunatica*, *canicularia*, & *noctambulatio*, quæ lunæ phasibus exacerbari sentitur.
 - d) *Erotomania* personalis.
 - e) *Furor uterinus*.
 - f) *Tarantismus*.
 - g) *Chorea sancti Viti*.
 - h) *Hydrophobia* inueterata; quorum omnium sequentibus duabus tabulis mentio fiet.

III. SIGNA.

Mania.

1. Adspectus audax cum facie pallida & oculis sanguine suffusis: qui autem a spectrorum phantasmatis maniam incurrunt, illi medio adspectu inter timorem & audacem resistendi conatum se habent.
2. Aliis hominibus actu nocendi inuigilant tales insani, & infidiosa sæpius simulatione opportunitates quærunt.

3. Im-

3. Immo aliquando alios iugulant; ad quod perpetrandum stupendo robore præditi sunt.
4. Et licet, in *grauiore* etiam malo, febris nulla adsit, tanto tamen maniaci calore pollent, vt frigus enorme non sentiant, nec vllum inde damnum, e.g. perniones, sphacellum;
5. A sensu enim abstracti sunt ad res speculatiuas, vnde etiam verbera & vulnera vix sentiunt, & ob audaces actus depulsorios partium calorem semper conferuant.
6. Præsentibus rebus speculationibus suis ita implicantur, vt futurarum vel extranearum nullam curam habeant, immo aliquando aliorum quascumque adlocutiones non audiant.
7. Hilares plurimum & curis vacui obseruantur: cantionibus & musica instrumentali oblectantur: reges & principes se esse existimant.
8. Leuissimis tamen occasionibus, nedum increpationibus, irascuntur & ad resistendum excitantur.
9. Variis sub somno visionibus perturbantur.
10. Venerem immoderate & proterue concupiscunt.
11. Aluum in conspectu omnium exonerare, illos non pudet.
12. Alii in deserta loca discedunt, vel tamen colloquia cum hominibus fugiunt.
13. Alii longius iter decurrunt, & reuersi ac de scopo huius itineris quæsiti, nihil respondent.
14. Alii latrocinium aut vim illatam conqueruntur.
15. In declinatione morbi alii sunt stupidi, quieti & tristes, & propriam ægritudinem agnoscunt.
16. Alii ex religione & infano errore membra sua dilacerant, de reliquo tamen erga alios modeste se gerunt.

IV. SVBIECTA.

1. Euenit mania sæpius cholericomelancholicis, iracundis hominibus.
2. Qui multiplici altercatione & contradictione domesticorum fortius exacerbantur.
3. Præcipue vero feminae, post longam mensium perturbationem

tionem, & varia animi pathemata, præsertim lasciuus speculationes, hoc malum incurrunt.

V. CAUSSAE.

1. *Imateriales.*

- 1) Mania frequentius a malis animi moribus introduci-
tur, vel etiam fouetur, quam a corporeis proportio-
natis causis.
- 2) Præcipuum autem sibi locum vendicant iracundia, &
profundæ, immodestæ, speculationes.
- 3) Ad causas etiam *imateriales* pertinent *incantationes*,
item spectrorum visiones.

2. *Materiales.*

- 1) Suppressio vel mensium vel hæmorrhoidum, vel sper-
matis.
- 2) Vermes malæ indolis, & munimentis fere insuperabi-
libus absconditi. *Conf. cautel. tab. de vermibus.*
- 3) Ebriosum vitæ genus.
- 3) Philtra, & veneficia.

VI. PROGNOSIS.

1. Mania a causis *imaterialibus* dependens, longe obstinati-
oris indolis est, quam quæ causâ materiali fundatur:
hinc in casu incantationis, vel grauiorum animi per-
turbationum, & præcipue speculationum, res fere con-
clamata est.
2. Ex causis *maturalibus* plurimam restitutionis spem facit
suppressio mensium, hæmorrhoidum, & seminis, vnde
iam *Hippocrates* sect. VI. aphor. 21. dicit: infanientibus,
si *varices* aut *hamorrhoides* superuenerint, infaniæ fit so-
lutio.
3. A *philtris* autem exorta mania, præ aliis a causâ materiali
inductis, pertinaciter se gerit.
4. *Maniaci*, quando post profundum & diuturnum somnum
iugiter delirant, difficulter restituntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Aluus* purgante aliquo *aperiatur*.

Ccc ccc

2. De-

2. Deinde, ad plethoram imminuendam, *vena sectio* largior ad X, immo plures uncias instituat.
3. Ad *sensum* excitandum vomitoria, eaque fortiora, subinde exhibeantur: quo nomine helleborus *albus* ab antiquis iam temporibus famosus est. *Vide cautelas.*
4. Ad *orgasum* sanguinis, in mania iam peccantem, & per vomitoria augmentum accipientem, propinentur nitrosa & præcipitantia.
5. Denique *specificæ* in subsidium trahantur; quo nomine clarent:
 - 1) *Anagallis* punicea, cuius solius decocto plures maniacos restitutos esse, fidem facit *Quercetanus*.
 - 2) Inter sic dicta splenetica aliquid tribuendum est herbis capillaribus, præcipue adiantho *albo*, & aliquantum *aureo*.
 - 3) Præparata ex *argento*, e.g. vitriolum lunæ, tinctura lunæ cœrulea, calx lunæ cum regulo antimonii, leni candefactione & mutua quasi fixatione præparata; ubi effectus argento magis, quam cupro, in illo contento, tribuendus videtur.
 - 4) Baccæ herbæ paridis.
 - 5) Sanguis asini, retro aures, mense martio, uti quidam volunt, emissus & exsiccatus.
6. Præter ea in feminis negotium mensium, & in viris hæmorrhoides respiciantur.
7. In causâ recenti seminis, ad veneris incitamenta temperanda, plurimum valet vsus nitri copiosus, immo prodigus: quo casu simul externe circa testiculos, in forma epithematis, cum aceto applicari potest.
8. In mania ex philtris, præparata e *nuce vomica*, e.g. electuarium de ovo, specificè commendantur.
9. *Erotomania personalis* & *furor uterinus* eandem exposcunt medicationem.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Plethora, quia in omnibus maniacis peccat, omnibus etiam *vena sectio* est necessaria: emissio autem sanguinis

- e vena frontis, quam vulgus die Nase-Über adpellat, si omnino effectum aliquem edidisse videatur, rebus *con-tingentibus* id adnumerandum est.
2. Sic etiam sentiendum de remediis *attractivis* ad plantas pedum, & *repellentibus* ad verticem.
 3. *Camphorata* a recentioribus, præcipue *Ettmüllero*, in deliriis multum commendantur; quod de vsu illius externo, minime autem interno, locum habeat.
 4. Laudant præcipue illius vsum ad veneris incitamenta, si hoc in morbo peccent, temperanda; quam sententiam suam superstruere videntur traditioni illi, in *Schola Sallermitana* reperiundæ: *Camphora per nares castrat odore mares*; quod de extinctione ebullitionis spermaticæ interpretantur, cum tamen poëta per phrasin, *odore castrare*, haud dubie intelligat, olfactus energiæ labefactionem: certe enim neque in sanis, neque in ægrotis *camphora per odorem castrat*.
 5. Ceterum de hoc negotio notabilis est locus apud *Nicolaum Blegny* in *Zodiaco Gallico* de virgine cœnobio inclusa e furore vterino tandem maniaca, mortua, quod scrutiny anatomico vnicum testiculum exhibuerit, pugni magnitudinem referentem & numerosis vesiculis, racemi vuarum instar, tumentem.
 6. *Opiatorum* vsus, vti in omnibus deliriis non solum suspectus est, sed etiam frequenter irritus & malum exasperans deprehenditur, ita præcipue in mania talem effectum præstat, vt vehementius inde & non aliter insaniant, quam si inebriamine exagitati sint; soporiferum autem correctum, quod non stupefaciendo, sed re vera placando agat, magis locum habere possit.
 7. Fatigationes virium per impetuosas *vomitiones* & *purgationes* multis antiquis & recentioribus placent, sed hæc *generalia* tentamina tam incerti sunt euentus, vt tam facile, vbi *promiscue* exhibentur, in deterius, quam melius deducant furiosos.
 8. *Quid de helleboro albo* in deliriis antiqui sibi promiserint,

prouerbiū : *helleboro* indiget, satis illustrat; sed cum ille maximam partem fortibus euacuationibus effectum suum edat, magna circumspectione adhibendus est: in deliriis sane hypochondriacis fortiores tales commouones certissime nocent.

9. *D.D. Stahl.* de empirico quodam refert, quod per herbas aliquot cephalico-nervinas & carminatiuas, v.g. verbenam, saluiam, betonicam, plantaginem, cum adiantho albo, in variis mente captis operæ pretium fecerit. Sunt hæ herbæ e censu illarum, quæ famosum illum puluerem *Iulii Palmarii* contra morsum canis rabidi ingrediuntur.
10. Denique quod de *vinculis, verberibus, & aliis*, magis quam stultis, stultorum remediis diximus, sano sensu in ipsa mania potest adplicari: leuiter enim delirantes celeriter maniam grauiorem incurrunt, quando ante tempus insuperabilis necessitatis vinculis ligantur: sensibilis enim talium subiectorum animus, si parum ad sese redeat, memor eorum, quæ peracta sunt, perpetua inquietudine detinetur.
11. *Sanguis asini*, linteis imbibitus, exsiccatus & frustulum eius potui iniectum, a multis ad maniam sedandam commendatur: fides sit penes experientiam, quam etiam frustraneam fuisse certum est.



TABVLA CXXIV.

DE

HYDROPHOBIA.

I. DEFINITIO.

Hydrophobia est species deliriorum liquidorum & splendidorum auersionem, sub febre sæpe acutissima, inferens: a morsu canis rabidi, vel alio eidem analogo contagio inducta. Deriuatur ab ὑδωρ, aqua & φοβέω, timeo.

II. DIF-

II. DIFFERENTIA.

1. Hydrophobia, quando a cane rabido inducitur, *rabies canina* vocatur.
2. Quando autem a lupi rabidi morfu prouenit, *lycanthropia* dicitur.
3. Hinc *rabies canina*, *lycanthropia*, &, quæ vtrorumque horum malorum *comes* est, exquisita *hydrophobia* proprie non differunt, sed vnius morbi schema exhibent, excepto, quod hydrophobia non statim sub initium, sed post nonum ordinarie diem, superueniat.
4. His adfectibus analogæ quodam modo sunt *tarantismus*, quem *tarantula* ictus infert, & *chorea sancti Viti*.
5. Lycanthropia diuiditur alias in *physicam* & *theologicam*, vbi lupus a diabolo obsessus dicitur.

III. SIGNA.

1. Post morsum a cane, vel lupo, æger timidi & abiecti animi deprehenditur.
2. Febris accedit acutissima, quæ summa anxietate, profundis suspiriis, & exquisitissimis doloribus coniuncta est.
3. Nono demum die rabies impetum exhibet.
4. Hæc quando præualuit, respuit miser, & mordendo auerit, omnia liquida: vnde sub febre acuta ineffabili siti affligitur.
5. Facillime accedunt conuulsiones.
6. Post mortem scrutinio anatomico inflammationes viscerum, præcipue pulmonum, detectæ sunt.

IV. SVBIECTA.

1. Rarissimus hic morbus occupat vix non omnes, qui a tali rabido animali morfi sunt.
2. Et quoniam morbus *contagiosus* est, per morsum ab homine rabido etiam cum aliis hominibus communicatur.

V. CAUSSÆ.

1. Vti theoria physica, & multo magis medica, de venenis fatis intricata est, ita etiam de venenis animalium nulla suppetit ratio, cur ita cito, intime, & citra proportionatam violentiam, œconomiam vitalem destruant.

2. Hinc, quoniam neque natura, neque ars *methodice*, consulere valet, sed vnice artis *empirica*, venena theoriæ medicæ non sunt obiectum.
3. Sufficit itaque de his & aliis venenis scire, quod præsentissimam & penetrantissimam, summe noxiam, efficaciam possideant, &, nisi festinatum feratur auxilium, mortem successu plurimum satis veloci inferant.
4. Ad hanc energiam fermentalem morsuum venenatorum concurrat anxia & lipothymica naturæ trepidatio, vnde actus vitales obnubilantur, omittuntur, vt Iphacelus superueniat. Quæ causa *moralis* non infimum obtinet locum, immo materialem efficaciam superat.

VI. PROGNOISIS.

1. Hic atrox morbus, vbi ad exquisitam rabiem præualuit, vix vllam spem euadendi relinquit.
2. Præcipue quando hydrophobia, omnem medicamento- rum ingestionem respuens iam successit. *Conf. D. D. Stahl's theoria medica pag. 1285. seq.*

VII. REMEDIA.

1. Nulla hic suppetit methodus, sed, quæ Dei clementia est, remedia specifica.
2. Abstrusum sane & admiratione dignum, quod omnium præsentissimum & velut infallibile remedium sit, *hepar, cor, vel cerebrum*, non solum de illo ipso animali, quod momordit, sed etiam de aliquo eiusdem speciei, immo lupi, canibus anxie exagitati, & tandem trucidati; cuius hepar ad morsum canis rabidi, præsentem iam delirio, efficaciter obseruatum est.
3. Externe *pila* illius animalis, quod momordit, vulnere illigata, efficacia sunt; modo tempestiue adhibeantur.
4. Sic etiam repentina & diuturna membri vulnerati in aquam demersio effectum præstat; vbi alii, non sine ratione, aquam *marinam* laudant, cui non vbique præsentem *salsa* substituenda, est.
5. *Limatura orichalci* tenuis, ad drachm. I. exhibita, pluribus vicibus salutarem efficaciam præstitit.

6. *Weick-*

6. *Weickhardus* in thesauro suo pharmaceutico maximopere commendat *scarabæos* illos maiales, in melle suffocatos, & horum circiter tres tempore necessitatis confusos; exhibendo quidquid inde succulenti exprimi potest: adseuerat quod hoc experimentum numquam fefellerit.
7. Si commodiora ad manus non sint, *electuarium* de ouo cum *nuce vomica* exhibeatur.
8. Vel *amygdala amara*, quæ, quoniam animalia talia alias enecant, impressam ab illis ideam venenatam etiam extinguere creduntur.
9. *Cancris combusti*, & vulnere inspersi, a *Galeno* iam pro morsu canis rabidi laudantur, & hodierni practici, speciatim *Michælis ad Ioustonum*, adserunt, quod *nostrates* æque ac *marini* efficaces sint, spiritum etiam ex illis destillatum extollunt.
10. *Iulius Palmarius* libro de morbo contagioso pro certissimo ad hunc adfectum experimento sequentem puluerem commendat:
- Recip. rutæ,
 saluiæ,
 verbenæ,
 betonicæ,
 melissæ,
 plantaginis acut.
 hyperici,
 centaur. min.
 absinth.
 artemis.
 polypod. ana. Dosis drachm. I. singulis diebus
 semel aut bis sumenda, & decocto illius
 vulnus simul eluendum.
11. Radicem *gentiana vera* seu *rubra* pari vsu & dosi commendat, uti & radicem *pimpinella alba*.
12. Itali ad pleraque venena radicem *valeriana* laudant.
13. *Chirurgica* præsidia sunt:

- 1) Scarificatio profunda.
 - 2) Exsuctio per cucurbitulam.
 - 3) Efficacior est vstio per ferrum candefactum, lata & tolerabiliter profunda.
 - 4) Præter ea sola vulneris extersio sufficit, neque consolidatio prius, quam vulnere funditus repurgato, locum habet.
14. Specialissimæ observationis est *Simonis Pauli de baculo corni arboris* adfertio, quod scilicet, in manibus ad incalescentiam detentus, rabiem post multos annos in illis resuscitet, qui antea eodem morbo curati fuerint. *Conf. ipse Auctor & D. D. Stahlii dissertatio de metatchematisms morborump. 42.*



TABVLA CXXV.

DE

TARANTISMO.

I. DEFINITIO.

Tarantismus est morbus maxime fonticus, ab ictu *tarantulae* venenoso inductus, & cum grauibus symptomatibus, maxime autem cum insigni phantasiæ depravatione coniunctus.

II. DIFFERENTIA.

1. Quem ad modum diuersæ species vulgo numerantur tarantularum, quarum altera alteram gradu virulentia superat, ita & morbus, ab ictu horum animalculorum inflictus, modo mitior, modo sæuior deprehenditur.
2. Præ aliis autem, teste *Bagliuio*, illæ tarantulae maxime nociuæ sunt, quæ in regione *Apuliae* apud *Tarentum*, a qua ciuitate nomen habent, reperiuntur. Ex contrario *Kempferus in observationibus suis exoticis* refert, *Persia* tarantulas aliasque talem tragœdiam ictu suo non excitare.

III. SIGNA.

1. Mox post tarantulæ ictum, qui cum punctura apium ratione sensus primum conuenire dicitur, obseruant in vulnerato periculosas corporis & animi perturbationes.
1. In corpore obseruatur insignis virium iactura, dolor in parte adfecta, cum circulo modo flauo modo nigricante. Succedit intumescencia, stupor & sensus in illa parte abolitio.
3. Animus est anxius, suspiciosus, tristis, homines fugiens & solitaria loca quærens, in nonnullis desperabundus.
4. Præcipue delira mentis perturbatio accedit, ita vt alii quidem vlulent, vestimenta dilacerent, in cœno se voluent, vel quæcumque indecora suscipiant; alii autem mortuorum instar immobiles iaceant.
5. Alii his, alii aliis coloribus delectantur, nigrum autem colorem altis suspiriis omnes abhorrent.
6. Instrumentis musicis modo his modo aliis mirum in modum adficiuntur, atque ad saltationes tam strenue excitantur, vt largum sudorem experiantur.
7. Sonis autem *dissonantibus*, ex vitio musicorum intercurrentibus, summis anxietatibus cardialgicis tam diu respondent, donec *consoni* sonitus iterum audiantur.
8. Non quibusuis autem anni temporibus harum tarantularum ictus adeo noxius esse solet, sed diebus tantum æstiuis, canicularibus; quo quidem tempore messoribus & viatoribus ita est infensus, vt pedes suos ocreis muni-recogantur.

IV. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est subtile & potens venenum, quod per ictum tarantularum cum corpore communicatur.
2. Causa *efficiens* est perterrita natura, quæ inops consilii in talem angorem coniicitur & ita confunditur, vt & morales & vitales actiones confuse instituat. *Conf. tab. de febribus malignis in genere.*
3. Ceterum admirandum magis est, quam explicandam, quod eius modi ægri vehementer saltent ad illum tonum, qui tarantulæ gratus esse dicitur.

Ddd ddd

V. PRO-

V. *PROGNOSIS.*


1. Quo venenosior est tarantula, quæ ictum inflixit, eo periculosior est adfectus.
2. Venenum quando cum humoribus iam est communicatum, nihil iuuant neque antidota neque musica, sed paucis plerumque diebus ægri moriuntur. *Conf. Baglinus.*
3. Immo licet periculum superatum sit, subtile tamen seminium in massa sanguinea sæpius remanet, quod singulis annis, præcipue circa annum a tempore ictus recursum recidiuam & perniciem minatur.
4. Præ aliis autem subiecta plethorica in grauius periculum coniiciuntur, ob febres acutas & motus spastico conuulsuos.

VI. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. In tempore venire, & ante quidem, quam virus cum massa humorum communicatur, primum felicitis medellæ est momentum.
2. Hinc locus adfectus, quando abstersus est, mox scarificetur & cucurbitula imponatur, vel vstio profunda instituitur, & theriacalia adplicentur.
3. Alexipharmaca cum analepticis temperatis interne propinentur.
4. Præcipue autem talis musicæ sonus instruat, quo tarantulam delectari obseruatum est. Non quibusuis enim instrumentis & concentibus tarantatos adfici, notissimum est. Vnde tam diu musica varianda est, donec ad choreas excitentur. Conferatur *Valentini museum*, in quo eius modi concentus exhibetur, qui præ aliis tarantulis gratus obseruatur.
5. Quando ægroti post vehementes saltationes largum sudorem experiuntur, & fatigati paullulum requiescunt, sudor abstergendus & potus largior atque tenuis porrigendus est, donec saltationes sponte sua repetant.
6. Hoc saltationis exercitium, interposita requie, ad quatuor vel plures dies tarantati sæpe continuant, & tum a periculo solent liberari.

7. *Quantum*

7. Quando hic morbus post annum interuallum vel quocumque alio tempore recurrere videtur, eandem musicam commendant.
8. In plethoricis venæ sectio, mox post ictum instituenda, non improbat.



TABVLA CXXVI.

DE

NOCTAMBVLATIONE.

I. DEFINITIO.

Noctambulatio est species læsionis phantasiæ, nocturno tempore sese manifestans, & insolitas plane circumstantias inuoluens.

II. DIFFERENTIA.

Noctambulatio differt *gradu*:

1. Qui *leuiter* tantum illa adficiuntur, loca periculosa nocturno tempore non adeunt, sed repetunt quasi actiones suas, quas ratione officii sui per diem perpetrant, e. g. discipuli de lecto nudi surgunt, & exercitia elaborant: ancillæ domum scopis purgant &c.
2. Qui vero *maiore* gradu hoc morbo corripiuntur, per loca quæuis alta, etiam periculosissima, obambulant. Dicuntur etiam *lunatici*, quia proxysmi illorum secundum phases lunæ recurrunt.

III. CAUSSAE.

1. Pro causa *materiali* plethora præcipue accusanda venit.
2. *Immaterialis* causa est phantasia, in quibusdam subiectis insigniter actiuosa.


IV. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Præmittatur primarum viarum blanda expurgatio.
2. Deinde venæ sectio in pede instituat, & pro re nata, scarificationes in vsum veniant.

Ddd ddd 2

3. Sub-

3. Subiungantur nitrofa & cinnabarina.
4. Lunæ phafes & æquinoctia vbique refpiciantur.
5. *Externa* fimul in fubfidium trahantur nempe
 - 1) Caftigationes cum virgis, tali nempe tempore, quo obambulans, inftituendæ.
 - 2) Adpofitio vafis alicuius, aqua repleti, iuxta lectum ægri, vt furgens in illud delabatur, & ita euigilet.



TABVLA CXXVII.

DE

N O S T A L G I A .

I. DEFINITIO.

Nostalgia est immoderatum & anxium defiderium in patriam redeundi, a vitio imaginationis exortum, & cum variis symptomatibus complicatum. Deriuatur a *νόσος*, reditus & *άλγος*, mœror, german. das Heimern, Heimweh.

II. DIFFERENTIA.

Nostalgia est

1. Vel *idiopathica*, quæ in solius animi vitio imaginario refidet.
2. Vel *symptomatica*, quæ cum corporeis morbis complicata est.

III. SIGNA.

1. Adest triftitia inquieta & tædium præfentis vitæ conditionis.
2. De patriæ moribus & viuendi ratione multum fpeculantur, atque illius prærogatiuam quauis occasione extollunt.
3. Quo minor fpes est, fore, vt eius modi ægri vota fua attingere poffint, eo certius animi mœrores in vera deliria transmigrant.

4. Mo-

4. Motus vitales sunt turbati, adest defectus appetitus, vitium digestionis, agrypnia, pulsus inordinatus, excretiones naturales supprimuntur, & motus febriles facile accedunt.

IV. SVBIECTA.

1. Hic morbus, cuius recentiora tantum secula mentionem faciunt, certis populis præ aliis familiaris obseruatur, e.g. Helueticis, Germanis.
2. Præcipue illis, qui temperamenti sunt sensibilis, molliter domi edueati, & prima vice in exterarum regiones iter fecerunt.
3. Maxime omnium euenit, quando eius modi delicatuli & sensibiles mox post exitum e patria varias calamitates & aduersas vitæ conditiones perferre coguntur, inter quas principem fere locum sibi vendicant morbosæ corporis afflictiones.

V. CAUSSÆ

1. Primaria huius morbi causa in ipso animo quærenda est, nempe in vitio imaginationis; id quod euentus sæpius confirmat. Multi enim conualescunt simul atque itineris in patriam instituendi vel solum apparatus vident, licet pharmaceutica remedia non adhibita sint.
2. Negandum autem non est, quod in quibusdam subiectis materiales morbida causa conspirent, e.g. plethora, vitium primarum regionum, febres.


VI PROGNOSIS.

1. Nostalgia *idiopathica* minoris periculi censetur, quam *symptomatica*.
2. Quando autem nulla spes adfulget fore, vt desiderio satis possit fieri non raro lethalem fieri, adfectum, experientia docet. Testatus est chiliarcha quidam Illustrissimus, se nostalgiam militum suorum Germanorum in obsidione Negroponti multo periculosiorem, quam ipsas febres Hungaricas, obseruasse.
3. *Symptomatica* quæ febre quadam acuta maligna complicata est, omnium periculosissima obseruatur. Animi

enim trepidatio & fluctuatio uti potior causa est infelicis febrium malignarum euentus, ita per anxios moerores, in nostalgia praesentes, multum illa augetur.

VII METHODVS MEDENDI CVM CAVELIS.

1. Nostalgia *idiopathica* reditu in patriam certissime quidem curatur, quando autem hic non habet locum, *animi* cura habenda est.
2. In hunc finem vulgo quidem commendant iucundas cum aliis conuersationes, aëris mutationes, vini generosi, animum refocillantis, vsum, & quaecumque alia; hæc autem animi cura neque sufficiens neque conueniens est.
3. Plus valet, si eius modi ægris *fides Abrahami* inculcetur, ut discant, ipsam patriam esse locum peregrinum, nos advenas in terra, aliamque quærendam ciuitatem. Hac enim contemplatione facilius mouemur, ut & patriæ & populi & cognationis nostræ sponte obliuiscamur.
4. In nostalgia *symptomata*, præter hanc animi curam, plethora & spissitudo sanguinis sunt respicienda.
5. Si febrilis vel alius morbus coniunctus est, ille conueniente ratione debet tractari.
6. Euitanda sunt violenta euacuantia, volatilia & quæ alia calida spiritibus excitandis vulgo destinantur.



TABVLA CXXVIII.

DE

PHILT R I S.

I. DEFINITIO.

Philtre sunt remedia specialissimæ efficaciam, quibuscum nefarii homines alterius amorem in quemcumque alium excitare intendunt, eoque ipso calamitosa symptomata in corpore & animo introducunt. Deriuatur a *Φιλέω*, amo,

amo, german. ein Liebes-Trantf, olim enim in forma potus grati nefanda hæc remedia offerebantur, hodie autem talia augmenta hæc cepit malitia, vt in variis formulis philtra possint exhiberi.

II. DIFFERENTIA.

1. Hic amor coactus obseruatur
 - 1) modo inter hominem & hominem.
 - 2) modo inter hominem & brutum.
 - 3) modo inter amicos, modo inimicos.
 - 4) modo inter sexum æqualem, modo inæqualem.
2. Remedia, quæ perniciosum hunc effectum exerunt, sunt
 - 1) vel *naturalia*, ad quæ & *magnetica* referuntur, videlicet quando diuersa semina sanguine, sudore, &c. imbuta, terræ mandantur atque herbæ, quæ ex illis procreant, in talem vsûm adhibentur.
 - 2) *Superstitiosa & magica*, e. g. per verba, characteres, imprecationes, item per amuleta, clauos, acus, annulos, &c.
 - 3) Non est autem animus noster pessima hæc remedia ex aliis auctoribus huc transcribere (optandum enim esset, vt nullo loco legerentur) sed propositum nobis est, remedia calamitosæ philtris *opponenda* commendare.

III. SIGNA.

1. Conuersatio prægressa cum subiecto quodam suspecto.
2. Insequens rapidus & anxius amor cum mentis perturbatione.
3. Inquietudo, somni defectus, impudicæ actiones.
4. Grauisimæ cardialgiæ & conatus vomendi mox post philtrum oblatum, immo vomitus atroces.
5. Asthmata suffocatiua, vertigines, tremores, lipothymia, paralyfes.
6. Vel ex contrario motus spastico-conuulsui & veræ conuulsiones.
7. Interdum ataxiæ febriles vel hæmorrhagiæ conspirant.
8. Denique mentis confusions pro subiectorum & philtro-
rum

rum diuerſitate confirmantur vel in maniam, vel melancholiam, vel erotomaniam vel moroſin, ſeu ſtupidam & obliuiſam fatuitatem.

9. Donec tandem tabida conſectaria hanc ſcenam claudant.

IV. CAVSSAE.

1. *Materialis* philtorum indoles a priori ſatis intricata eſt, & ad qualitates vere occultas referri meretur, a poſteriori autem ſeu ab effectu concludimus, quod illa remedia ſenſui vitali interno quam maxime ſint aduerſa, dum vel orgaſticas ſeu inteſtinas humorum commotiones vel inignes illorum ſpiſſitudines inferunt.
2. Vnde natura, tamquam cauſa *efficiens* in anxiam confuſionem coniiicitur, atque ad varias anomalias in actionibus tam moralibus quam vitalibus excitatur.
3. Pro diuerſa autem philtorum conditione, humores vel grauiter commouentur, atque hoc reſpectu maniaci adfectus producuntur, vel minimum inſpiſſantur, & ſic melancholica pathemata atque totius temperamenti inuerſio ſequuntur.

V. PROGNOSIS.

1. Philtra moderatum amorem, licet hic intendatur, raro attingunt, ſed & animum & corpus miſere turbant.
2. Deliria ſi vel furibunda vel ſtupida ægrum iam occuparunt, vix locus eſt medicationi.
3. Immo licet philtra tempeſtiue excutiantur, languores tamen & animi & corporis facile relinquuntur.
4. Deliria, quæ iam ceſſant & per interualla redeunt, optimæ non ſunt prognœſeos.
5. Quo citius philtorum oblationem hec̄ticus ſtatus ſuccedit, eo periculoſius eſt malum.
6. Conuulſiones, ex hoc malo pullulantes, difficillime eradicantur.
7. Hæmorrhagiæ immodicæ, licet bona intentione a natura ſuſcipiantur, æque tamen ac in febribus malignis ſunt ſuſpectæ, atque hinc prudente ratione compenſendæ.
8. Matrimonium quando cum illa perſona, in quam animus
anxie

anxie fertur, contrahitur, confusiones quidem mentis quodam modo corrigi solent, est autem lusus quouis in-
tuitu valde anceps.

VI METHODVS ET REMEDIA CVM CAVELIS.

A. *Philtorum naturalium.*

1. Primis diebus, quibus cardialgiæ & vomendi conamina adhuc sentiuntur, mox emeticum, vel ex sale vitrioli ad scrup. i. vel rad. asari, vel tartaro emetico exhibeatur.
2. Deinde stomachica propinentur e. g. essent. gent. rubr. cort. aurant. cinnamom. meliss. cascarill.
3. Post duodecim horas subiungatur catharticum ex rad. ialappæ, ellebori nigri & colocynthide.
4. Hoc peracto nitrosa & absorbentia propinentur, vt motus spasticus diaphragmatis & abdominis temperetur.
5. Sordes biliosæ, quæ inter ea confluerunt, per rhabarbarum abstergantur.
6. Post euacuantium vsum reliquus torminosus motus mitigetur, atque in hunc finem essentia quædam carminativa, v. g. ex helenio, caryophyll. pimp. alb. cort. aurant. cent. minor. galanga ter per diem porrigatur.
7. In subiectis plethoricis, præcipue adsuetis, larga venæ sectio in brachio instituat, tanto magis, quando vasa capillaria turgent, & animus iam est turbatus.
8. Ad reuellendas a capite congestiones pediluua, frictions & rubefacientia ex fimo columbino, radice pyrethri, cepis, sem. sinap. aceto &c. plantis pedum adplicentur, & catharsis subinde repetatur.
9. Natura trepidans reficiatur per alexipharmaca & diuretica temperata, quæ simul materiam orgasticam fermentescentem ex philtro forte relictam, per diapnoën & diuresin eliminant; coniunctis analepticis ex cinnam. aquis fragrantibus & ipso vino generoso modice sumto. Theriacalia autem & alia calida excludantur.
10. Specifica dubiæ sunt efficaciam. A multis celebratur puluis vel spiritus secundinarum, & tum quidem, si philtum in sanguine menstruo consistat.
11. Ceterum medicina mentis quouis modo respiciatur per


preces & colloquia seria; turpia autem obiecta & profani sermones euitentur.

12. Strenui labores vel itinera longa imponantur.

B. *Philtorum magicorum.*

1. Hic efficacissima sunt præsidia spiritualia, non ex magia, sed ex armamentario fidei christianæ petenda.
2. Quid valeant remedia illa naturalia, quæ *antimagica* vulgo audiunt, experientiæ relinquitur. Periti viri laudant herb. hyperic. artemis. puleg. antirrhin. adianth. aur. anagallid. purpur. cichor. flor. alb. quæ omnia in substantia interne sumenda & externe in forma suffitus adhibenda sunt. *Confer. Mercklini sylloge casuum, incantationi* adscribi solitorum.
3. Speciatim suadent, vt cum frustulo vestis illius hominis, ex quo fascinatio præsumitur, prunis iniecto æger perfumeretur.
4. *Oleum ex arillis sambuci* virtutem specificè emeticam hic habere dicunt. Sed vt hoc adseruum experientia nondum confirmatum, ita specifica emesis hoc loco non necessaria est.
5. *Fhiltra magica* nos eo perducunt, vt *morborum*, per *fascinum* seu *incantationem* inductorum, mentionem hic loci faciamus. Non est autem animus, hanc rem intricatam, & multis tam credulitatibus quam erroribus inuolutam, peruestigare, quoniam ad scopum nostrum medicum nihil utilitatis adferunt.
6. Hinc paucis dicimus, quod in praxi medica frequentissime quidem fascinum soleat accusari, præcipue in infantibus, quando dicunt: das Kind ist betuffen, über eine böse Stelle gebracht &c. rarissime autem veritati id respondeat.
7. Eo ipso autem, dum vulgatæ huic accusationi aures patulas non præbemus, cauendum est, ne ex vno in alterum extremum rapiamur. Quid quid enim hodie contra existentiam horum morborum dicatur, res ipsa tamen nonnumquam loquitur, *quod dentur morbi ex incantatione.*

8. Habemus sane huius adfertī ralia specimina, quæ non, nisi omnia nos fallant, fallere possunt.
9. Quod autem ad signa illa attinet diagnostica, quibus incantationem vulgo confirmare audent, videlicet insolitas illas res, quæ per vomitum, aluum, vrinam, abscessus &c. non numquam excernuntur, vti sunt animalcula miræ figuræ, acus, plumæ, clavi, globuli, dentes & plura alia, necesse est, vt. neque hæc sine circumspēcto examine credantur.
10. Quam parum autem valeat artis medicæ præsidium in morbis per fascino inductis, & ratio a priori facile prædicat, & experientia virorum fide dignorum a posteriori confirmat.
11. Commendant in casibus vere suspectis illa remedia, quæ philtris magicis superius opposuimus.



TABVLA CXXIX.

DE

EBRIETATE.

I. DIFFERENTIA.

1. Dolendum quidem est, quod, dum inter christianos vivimus, de ebrietate sermo faciendus sit, quoniam autem hoc flagitium toto die committitur, atque tristitia sanitatis detrimenta hinc emergunt, Medicorum officium est, vt his noxis pro viribus occurrere discant.
2. Tanto minus autem hoc artis auxilium denegandum est iis, qui non ex abusu spirituosorum, cerevisiæ & vini, sed a vaporibus fermentescentibus in cellis vinariis, cerevisiariis &c. ebrietatem incurrunt.

II. SIGNA.

1. Occurrit respiratio celerior, vox semirauca, balbuties linguæ, titubatio membrorum, in primis pedum, stupor

Eee eee 2

& ob-

& obscuritas oculorum, motus vertiginosi, rubor faciei, præcipue in sanguineis, in non nullis autem, qui ad vomitum inclinant, pallor obseruatur.

2. Qui a copiosa spiritus vini ingurgitatione ebrii redduntur, illi maiora symptomata plerumque incurrunt:

- 1) Alii enim repente corruunt, viribus ocysus priuantur, deficient animo, incidunt in syncopen, pulsus est ad modum debilis & irregularis, cor palpitac, membra tremunt.
- 2) Alii vertigine caduca, alii apoplexia, alii conuulsiõibus corripuntur.
- 3) Alii soporosis adfectibus, alii vehementibus vomitibus & diarrhoeis, alii inflammatione ventriculi erysipelacea, alii febre acuta & grauib deliriis infestantur.
- 4) Quam diu mentis adhuc compotes sunt, summus ardor ventriculi persentiscitur; in non nullis flammula cœrulea ex faucibus cum periculo suffocationis erumpit, & loquela, immo mens ipsa, intercipitur.
- 5) Adest respiratio anxia & anhelosa, metus suffocationis & status quasi agonizans.

III. CAUSSÆ.

1. Causse materiales sunt particule sulphuree & pingues, quæ orgasmum sanguinis excitant, organa nimis opplent & distendunt.
2. Vnde ipsa anima confunditur, ac actiones tam vitales quam morales sinistre & puerse instituat.
3. Et sic sensuum & spirituum obnubilaciones, quas vulgo accusant, prætermittimus.

IV. PROGNOSIS.

1. Quæ damna & pericula ebrietatem presso pede sequantur, sub signis indicauimus. Quæ vero lentis successibus inuitantur, non minimæ sunt considerationis.
2. Variæ enim læsiones in actionibus animalibus, vitalibus & naturalibus inducuntur, e.g.
 - 1) Stupor, iudicii & ingenii tarditas, obliuio, torpor & auersio rerum seriarum.

2) Ad-

- 2) Adpētītus prostratio, nausēa, abstīnētia a cibis solidis, somnolētia, languor viriūm, inertia sensuum extēriorum, caligo oculorum, vertigo, pigritia.
- 3) Cachēxia, œdemata, hydrops, icterus, quartana, scabies, gutta rosacea, tussis vel pectoralis vel præcipue hypochondriaca, viscerum indurationes, scirrhi, hēctica, spāsmi, vitia vrinæ, alui, vertigo, cordis palpitatione, temperamenti mutatio.

V. METHODOVS ET REMEDIA.

1. Ebrius mox in lectum reponatur, vt sulphuræ & agiles partes moderata transpiratione exhalent; frigus autem quouis modo arceatur, quia per hoc ebrietas augetur. In alterutrum autem latus ponendus est ebrius, ne pondus primarum viarum repletarum nobilebus vasis sanguineis incumbat.
2. Vomitus cieatur, non ipsis quidem emeticis, sed vel digito, vel pluma oleo illita & faucibus immissa, vel cereuisia tepida cum butyro remixta, coniunctis aluum externe mouentibus, e.g. clysteribus, suppositoriis.
3. Regimen diaphoreticum placide promoueatur per decocta calida, coffeæ, thée &c. cauendo a calidis diaphoreticis.
4. Vomitus subiungantur pulueres nitrosi & absorbentes, ad commotiones sanguinis moderandas & particulas agiles obtundendas.
5. *Flammula* quando post copiosam spiritus vini ingurgitationem ex faucibus erumpit, sequente methodo vti consultum est:
 - 1) Situs corporis sit supinus.
 - 2) Ad flammulam extinguendam porrigitur decocta mucilaginosâ tepida ex cremore hordei, auenæ, decoctum C.C. citratum, passulatum, item lac pingue.
 - 3) Deinde ardor *internus* leniatur absorbentibus cum lacte mixtis, nitro cum coralliis, emulsionibus ex amygdal. dulcibus; *externe* autem combustio leniatur & sanetur oleo lil. alb. amygdal. dulc. ouorum, raparum.

6. Ad reliquias crapulæ tollendas suadent

- 1) Altero mane iusculum vinosum leuiter aromatifatam, cum amaris roborantibus, e.g. vino absinthiaco. Conueniunt etiam oua sorbilia cum nuce moschata & cinnamomo. Hac ratione tonus ventriculi debilitatus restituitur.
- 2) Ad dolores capitis sedandos conducunt interne nitrosa cum absorbentibus citratis & pauca cinnabaris portione; externe autem camphorata laudantur, item epithemata ex nucl. persic. aq. verben. flor. til. samb. nymph. plantag. adspers. spirit. vin. camph. leniter crocato. Antiqui sale pedes fricabant, vnde *sale perunctus* vocabatur, qui crapulam edormiuerat.

VI. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Laudanda quidem, sed non semper efficacia sunt conamina illa, quibus horrorem a nimio potu potatoribus conciliare intendunt. Commendantur passim in hunc finem rana viridis, anguilla vino suffocata, lacerta, oua noctuæ & plura alia.
2. Suadent etiam, vt potator in dies consuetæ mensuræ non nihil detrahat, & purgationes frequentes ex phlegmagogis & cholagogis coniungat.
3. Præter ea ad ebrietatem cauendam varia diuretica laudant, præcipue nitrosa & salia volatilia vrinosa.
4. Sed vti hæc omnia fontem mali non attingunt, ita turpe est christianis, manca talia remedia genuinis & sobriis substituere.
5. *Spiritus vini* ventriculum roborare falso dicitur, inimicus potius est partibus neruosis. Iuuat autem fermentatiuam resolutionem (e.g. cochlear spiritus vini quando in massam panariam funditur, hanc eximie fermentescentem & fluidam reddit) & hac ratione dyspeptorum adsumtorum concoctionem promouet.

TABVLA CXXX.
DE
V E N E N I S.

I. DEFINITIO.

Venenum, medico sensu sumtum, est materiatum summe noxium & penetrantissimum, quod œconomiam vitalem, citra proportionatam violentiam in sensu incurrentem, cito, grauiter & intime peruertit, ac nisi maturum auxilium adferatur, successu præcipiti mortem introducit.

II. DIFFERENTIA.

1. Venena sunt

- 1) vel *vegetabilia*. e.g. aconitum, cicuta, napellus, &c.
- 2) vel *mineralia*. e.g. arsenicum, mercurius sublimatus, cobaltum, aqua fortis &c. Huc pertinent vapores minerales venenosi.
- 3) vel *animalia*, e.g. scorpium, vipera, bufo, aranea, cantharides &c.

2. Venena differunt *gradu* vehementiæ, quo respectu

- 1) Alia *summe* sunt agilia, quæ exiguo temporis spatio occidunt.
- 2) Alia *lenta & temporaria*, quorum specimen exhibet famosus ille puluis, qui in Gallia tot cædes occultas hactenus patrauit, & *poudre de succession* adpellatur. De Indis etiam & Turcis refertur, quod eius modi lenta venena, quæ post longum demum tempus occidunt, præparare possint. A quo tempore autem tale languidum venenum adsumtum est, mox languere incipiunt ægri, & sub schemate morbosò chronico tandem extinguuntur.

3. Porro venena alia sunt *hominum*, alia *brutorum*, e.g. ciconiæ vescuntur serpentibus & bufonibus, sues hyosciamo; ex contrario aloë & amygdalæ amaræ lupis, canibus & vulpibus sunt venena.

4. Duplici autem ratione venena perniciosum suum edunt effectum, videlicet
- 1) Vel ore adsumta.
 - 2) Vel externo tantum contactu. Huc pertinent præcipue morsus & ictus animalium venenosorum.

III. SIGNA.

1. Venenum ore adsumtum mox excipiunt anxii conatus vomendi, qui in enormes vomitus sæpe transeunt.
2. Conspirant angustia suffocativa cum angore animi.
3. Toriones ventriculi & intestinorum spastica cum ingentibus doloribus & cruciatibus.
4. Adest ardor internus cum sudore frigido & extrema inquietudine.
5. Motus autem hi spastici transeunt modo in veras convulsiones, & in singultum, modo in lipothymicas motuum abiectioes.
6. Crebro etiam intercurrunt anomali febriles motus, cum pulsu inordinato & palpitatione cordis.
7. Abdomen ordinarie intumescit, & tum extremitates sunt frigida & membra tremore adficiuntur.
8. Vrina vel est suppressa, vel cum ardoribus emittitur.
9. Adspectus faciei est toruus, oculi inflati, venæ tumida.
10. Sensuum externorum concurrat hebetudo cum vertiginosa afflictione.
11. Fauces sunt inflammata, adrosæ.
12. Cadauera secta ordinarie monstrant erosiones, gangrænam & sphacelum in œsophago, ventriculo & intestinis, sanguinem in vasis coagulatum, viscera nigra. Præter ea foetidum spargunt odorem, varium exhibent colorem, vngues nigri obseruantur, spuma ante os adparet, capilli copiose decidunt, & cor ordinarie valde flaccidum est. Veterum autem traditio, quod non possit comburi, falsa deprehenditur.
13. Non nulla venena, quæ ad modum sunt subtilia, vestigium erosionis in primis viis non relinquunt.
14. Vapores *arsenicales* inferunt lipothymias, cardialgiam syncopiti-

copticam, torsiones ventriculi, vomitus maxime acerbos, inflationem abdominis cum torminibus intestinorum, deiectiones aluinas crudeles, & tandem conuulsiones.

15. Vapores *mercuriales* adfectus asthmaticos, catarrhales, suffocatiuos inducunt: lædunt enim & relaxant neruum pectoralem, vti auctores passim obseruant.
16. Vapores *lithargyrii* excitant adfectus vomibundos, cardiacos, tenesmum, diarrhœas, tormina colica; vnde practicus innotuit *colica saturnina*.
17. Vapores *sulphurei minerales*, die milde Schwaden, giftige Berg-Gestöber, adferunt metum suffocationis, asthmata spastica sicca & denique ipsam phthisin.
18. Vapores ex *carbonibus*, præcipue *lithanthracibus* in loco occluso accensis, arcessunt dolores capitis, temulentiam vertiginosam & repentinam sæpe mortem.
19. Vapores *fermentescetes ex musto, cereuisia, melle*, peccus maxime offendunt, & malorum, modo dictorum, feraces obseruantur.
20. Ceterum hæctica, contractura, aridura sequuntur præcedentes adfectus, nisi congrua medicatione illis occurratur.

IV. CAUSSÆ.

1. Venena alia *corrodendo*, alia celerem *putrefactionem humoribus inferendo*, noxium suum effectum edunt.
2. Aduersus extremum & repentinum hoc periculum natura adflicta extremos etiam veloces & festinantes motus, modo spasticos, modo conuulsuos, modo emeticos, modo catharticos, modo febriles & inflammatorios, modo palpatorios cordis, excitant.
3. Quando autem per laboriosissimos hosce conatus periculum non potest superari, cum post varia animi deliquia motus suos eluctatorios penitus omittit, & corpus suum non quidem strictum & rigidum, vti ordinarie solet, sed *laxum* relinquit: vnde putredo tanto citius accedere solet.

V. PROGNOSIS.

1. Per vulgus constat, quod venena, nisi maturum auxilium adferatur, lethalem ordinarie exitum sortiantur.
2. Atque hoc non tantum valet de illis venenorum speciebus, quæ summè agilia sunt, & *celerem* mortem interunt sed & de iis, quæ languide perniciem suam exserunt.
3. Hæc enim, vti sine animaduersione & sensibilitate cum corpore communicantur, humoribus intime sese insinuant, & primis hebdomadibus leuissimas tantum ægritudines & infirmitates pariunt; ita contra hostem hunc inopinatum, occultum & insidiosum arma tempestiue dirigi non possunt.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quando venenum adhuc in primis viis latet, conducunt pingua oleosa, tepide adsumenda, e.g. lac pingue, cerevisia cum butyro mixta, decocta mucilaginosâ, hordei, auenæ, C.C. oleum oliuarum, amygdalarum, &c.
2. Venenum quando hac ratione temperatum est, tum, vt euomatur, externæ irritationes per digitum vel plumam adhibeantur, & ipsa emetica excludantur.
3. Veneno autem cum humoribus iam communicato, abstergantur primæ viæ per decocta lenientia & gelatinosa, coniunctis clysteribus, theriaca remixtis. Hac ratione absterisio primarum viarum *αίω* & *κίτω* obtinetur.
4. Deinde humoribus veneno infectis destinentur decocta alexipharmaca, e.g. ex rad. vincetoxici, scorzoner. herba scordii. Essentiæ autem & aceta bezoard. excludantur. Conducunt etiam potiones ex aquis diaphoreticis & absorbentibus citratis, item iulapia ex decocto C.C. citrato, aquis diapnoicis & sirupis analepticis, coniuncto vbique regimine leniter diaphoretico.
5. *Faucium ardores & erosiones* demulcentur per decocta modo dicta, cum melle rosato remixta; item per elæosacchara, gargarisinata lenientia & discutientia, ab acridine libera.
6. *Tormina intestinorum* solantur linimenta stomachica camphora-

phorata. Reliquorum symptomatum tractatio videatur inferius.

7. *Ictus & morsus animalium venenosorum, e.g. scorpionum, viperarum, araneorum, vesparum, quo modo tractari debent, videatur tabula chirurgica de vulncribus venenatis.*
8. *Cantharides* adsumuntur tractantur vti venenum haustum, & *ardores urine*, quos inferunt, iniectionibus emollientibus oleosis demulcentur; interne hunc ardorem mitigant iac, nitrosa, absorbentia, discutientia & roborantia ex rad. helen. vincetox. caryophyll. pimp. alb. gent. rubr. cort. aurant.
9. *Aqua fortis & vegetabilia venenosa* eandem exposcunt medicationem.
10. *Vapores metallici corrosivi* sequente ratione oppugnantur:
 - 1) Vomitus mitior mature excitatur per aliquot grana tartari emetici, cum absorbente & carminatio quodam mixti.
 - 2) Deinde ad inuoluendas moleculas noxias propinantur absorbentia, lenientia, mucilaginoso ex spermate ceti, oleo oliuarum, decocto ex rad. ar. bardanæ, liquirit. herb. malu. flor. chamomil. prunis, passulis, addito tantillo mellis.
 - 3) Quo magis suffocationis metus imminet, eo citius aer liberior, & quidem frigidior, eligendus est. Huc pertinet adpersio faciei aqua frigida.
 - 4) Venæ sectio in plethoricis, & huic adfuetis locum habet.
 - 5) Post hæc diaphoretica fixa & essentia alexipharmaca temperata conducunt. Primis etiam diebus aliquot drachmæ saponis Hispanici, cum lacte & melle rosaceo mixti, semel de die possunt propinari.
 - 6) Hæc medela etiam locum habet in aliis vaporibus putridis & fermentescentibus.
 - 7) *Colici dolores* sedantur clysteribus mucilaginosi, carminatiuis, cum tantillo theriacæ mixtis, & mature inficiendis; item linimentis lenientibus & roborantibus ex ol. lilior. alb. chamomill. aneth. fœnic. caru.

- nuc. mosch. caryophyll. & momento theriacæ. *Interne* essentia alexipharmaca, carminatiua & cascarillæ conducunt.
- 8) *Diarrhæa immodica* sedantur absorbentibus, mucilaginosi, cortice cascarillæ, roborantibus modo dictis; cauendo a narcoticis & adstringentibus.
 - 9) *Alui autem adstrictio* expolcit clysteres emollientes: iuncta leni laxatione.
 - 10) *Vrinæ suppressiones & ardores* quo modo tractari debeant, superius iam diximus.
 - 11) *Anxietas precordiorum* mitigatur essentia alexipharmaca, subiunctis analepticis temperatis, item puluere nitroso, coralliato & cinnabarino.
 - 12) Superato periculo diaphoresis placida continuetur, stomachica adhibeantur & aluus aperta seruetur.



TABVLA CXXXI.

DE

FVLGINE TACTIS.

I. SIGNA.

1. Hi plurimum *succumbunt*, & vel *repentinamorte* exstinguuntur, vel post aliquam moram vitæ indicia offerunt.
2. *Terror*, qui animo hominis, tonitru percussi, adhuc infidet, non solum mentem confusam relinquit, sed etiam totam œconomiam vitalem perturbat, immo mortem paullo post subsequenter maturat.
3. *Interceptio respirationis* & suffocationis periculum, quod prouenit ex fulminis halitu subtili sulphureo, actum respirationis sufflaminante. Inde peremptorum cadauera sulphureum foetorem spargunt, nec ab aibus aut canibus adrodidicuntur.
4. *Lasio corporis*, in primis combustio ad modum sensibilis, cuius prerogatiua præ aliis combustionibus eminet ex repen-

repentino insultu & halitu sulphureo accenso. Vnde in teneris & plethoricis talem ambustionem gangræna, immo sphacelus facile excipit.

5. *Syncope* & extrema animi abiectio, sub qua plurimi exanimantur, pauci difficillime reuocantur.

II. PROGNOSIS.

1. Iam antea sub *signis* indicatum est, rarius eius modi subiecta ad se redire, sed sæpe exstingui.
2. Restituta autem subiecta vel ad aliquod tempus, vel per totam vitam insaniunt, ad minimum operationum animæ debilitatio, v.g. memoriæ læsio, remanet.
3. Quandoque vitia corporis, paralysis lateris vel membri, aut tremores, aut anniuersarii dolores.
4. Aliquando in sensibus externis vitia relicta adparent, v.g. surditas, balbuties, priuatio odoris, cæcitas.

III. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Actiuitatem animæ, aufugientis quasi post tantum ex fulmine terrorem, reuocant spirituosa analeptica.
 - 1) Offerendus itaque est naribus spiritus salis ammoniaci, cum oleo destillat. roris mar. serpill. lauendul. cinnamom. mixtus.
 - 2) Naribus immittenda sternutatoria mitiora, ex puluere & aqua odorifera, lil. conuall. serpill. Hungaric. betonic. spirituosa.
 - 3) Ori immittendæ sunt aquæ simul analepticæ, aqua Hungaric. ad gutt. XXX - XL. aqua cinnamom. cerafor. nigr. lilior. conuall. flor. namph. meliss. rosar. it. confect. alkermes cum cinnamomo vnc. semis, cum aqua soluta & ori indita.
2. *Vestes sulphurei odoris*, languentem animam subtiliter afficientis, protinus exuantur, & corpus aqua vel lacte calidis abluatur, addita frictione cum linteis calidis.
3. *Suffimigia suaueolentia* adhibeantur, e.g. rosmarin. serpill. mar. ver. bacc. laur. iuniper. lign. rhod. aloës, saffastr. gumm. mastich. benzoës, succin. storax calamic. abstinendo a castoreo & foetidis.

4. In plethoricis mox sub initium venæ sectio suadet, subiuñcta frictione & analepticis.
5. *Combustioni* ipsi sequentia opponuntur :
 - 1) Ad obtundendum subtile *empyreuma* superficiale, ardoremque demulcendum, cremor lactis, cepæ assatæ, nitrum solutum, cerulla alba, linimenta ex oleo lilior. alb. mucilage seminis psyll. albo ouorum, aqua rosarum, cerulla, camphora, mature vsurpanda.
 - 2) *Vesicæ* ex combustione ortæ aperiantur & rescindantur, tum prædicta adplicentur, quibus addi possunt mastix, pauxill. myrrh. & tantillum olei spermatis ranarum.
 - 3) In ambitu defensiva emplastica vel melioris vsus camphorata.
 - 4) In molestis excoriationibus, si quæ adsint, præstat præmissis resoluentibus internis & externis adhibere escharotica, vt emplastr. saturninum, de minio Norimb. cauendo ne diutius talia inhareant.
6. *Symptomata* principaliora :
 - 1) *Surditas* residua tractatur linimento intra aurem adplicando (parca tamen quantitate) ex oleo destillato chamomill. camphora & tantillo vel salis volatil. vel olei succini.
 - 2) *Cacitas* postulat aquas ophthalmicas ex euphras. foenicul. ros. hyssop. quæ cum amygdal. dulc. in emulsionem conuertri, & cum tantillo camphoræ, croci orient. & rut. præparat. remisceri & intra oculum adplicari possunt; item externa neruina.
 - 3) In *obmutescencia* conueniunt :
 - a) *Tempestiua* venæ sectio, eique subordinata purgatio & rubefacientium vsus ad plantas pedum.
 - b) Quandoque aqua spirituosa, cum paucis oleo cinnamom. mixta, sub lingua excipienda.
 - c) Si *paralytici* quid subsit, neruina & roborantia, motus corporis & lateris adfecti qualiscumque agitatio conducunt.

TABVLA CXXXII.

DE

STRANGVLATIS.

I. DIFFERENTIA.

1. Non loquimur hic de iis strangulatis, qui vere iam expirarunt: in his enim neque consilia, neque auxilia medica locum habent.
2. Sed de illis agimus, in quibus aliqua vitalitas vel superest, vel superesse creditur.

II. SIGNA.

1. Varia quidem ab auctoribus signa traduntur, ex quibus vel perfectam suffocationem atque mortem agnoscere, vel ex contrario aliquam vitæ spem concipere possumus.
2. Quoniam autem in eius modi casibus ancipitibus semper consultius est, aliquid quam nihil ad vitam resuscitandam tentare, signa illa exigua adferunt vtilitatem, atque hinc consulto illa prætermittimus.

III. SVBIECTA.

1. Homines melancholici, anxii, desperabundi, amentes & mentemoti solamen per *ἀνοχηρίαν* quærentes.
2. Qui variis contra creatorem suum peccatis conscientiæ labem sibi contraxerunt.
3. Quibus guttur a latronibus laqueo fuit præclusum.

IV. CAVSÆ.

1. Intereptio motus progressiui sanguinis per pulmones, a qua circuli sanguinis vniuersalis dependet subflaminatio.
2. Occlusio respirationis, indeque proueniens stagnatio sanguinis, quæ primum in partes nobiliores internas & deinde in reliquum corpus se extendit.

V. PROGNOISIS.

1. Anceps & dubia spes est in strangulatis iis, qui plethoram, melancholiam & graues morbos antea sunt experti,

nem,

item, qui valde rigent & frigent, oculos habent contortos & penitus fractos ac prouectioris iam sunt ætatis.

2. Strangulati, qui in vitam reuocantur, ad pristinum sanitatis vigorem raro perueniunt, sed variis malis, præcipue autem afflictionibus pectoris plerumque sunt obnoxii.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Mature a laqueo liberentur, subiuncto ad dolorem leniendum & collum, quod rigide constrictum est, emolliendum, vsu ol. lenientium ex ol. amygd. dulc. lil. alb. chamomill. cum pauco ol. lign. rhod. vel salisfr. vel serpill. & tantillo camph. si vero læsio & excoriatio quædam adsit, linimento ex ol. lil. alb. chamom. hyperici, de spermate ranarum, mastichino cum pauxillo liquor. myrrh. ceruss. & camphor. non neglectis fomentationibus & frictionibus cum linteis calidis.
2. His subiungenda est venæ sectio, quæ largius promouenda per frictionem eiusdem brachii, cum clyster stimulan- & sternutatorium, vti & more veterum irritatio faucium cum pluma, oleo imbuta, denique iterata V. S. venarum raninarum aut iugularium, ad partes superiores ab oppletione sanguinis liberandas.
3. Nec tum spernenda sunt alia stimulantia, v.g. rubefaciens aut vesicatorium in pectore, extreme autem acria, caustica vti & suffimigia fugiantur. Conducit etiam dimissio olei lenientis intra fauces, quo vel hæ emolliantur, vel moderata emesis prouocetur. Inflatio faucium cum instrumento fistuloso hic dubia est.
4. Vbi ad se redire comparent, roborantia vinosa, ex croco & cinnamomo, nec non parum balsami liquidi cum aqua spirituosa, vino aut confect. alkerm. complet. cum cinnam. & tantillo boni vini adsumenda. Pro odoratu conducunt vel suaueolentia, vel modestus salis ammoniaci vsus.
5. Interponantur alexipharm. vinum bezoard. aut ess. angel. scord. imper. caryoph. cinnamom. aut spir. C. C. gutt. XV. emuls. cum aquis. diapnoic. cum frictionibus repetendis & denique balnea vinosa neruina.

TABVLA CXXXIII.
DE
AQVA SVBMERSIS.

I. **S**IGNA.

1. Qui aqua sunt submerfi oculis vel oclusis, vel semiclausis & quantisper dehifcentibus, vel pallidis & plane confracctis, concauis aut pene distortis decumbunt.
2. In superficie corporis adest pallor frigidus, rigor, in abdomine vero, non numquam simul in pectore tepor.
3. Ungues liuefcunt, nares sunt acuminatæ, labia pallida, livida, aliquando etiam in thorace liuor, quod indicium est ad modum suspectum.
4. In hoc statu habentur pro mortuis, in primis si etiam pulsus profus deficit, & respiratio (quam vulgus pluma naribus admota explorat) deest.
5. Quam primum vero ad se redeunt, hæc omnia leni gradu sensim reuertuntur in statum pristinum.

II. **P**ROGNOSIS.

1. Quando sanguis ex submersorum naribus & faucibus pro-
manat, veram tum indicat suffocationem, omne artis
auxilium eludentem. Item
2. Ore hiantes vt moribundi iacentes, & quorum lingua liuet
& inter dentes emicat, vix reuocari poterunt.
3. Quibus non nulli, Hippocratis effatu, adnumerant, quan-
do spuma ante os reperitur, quod tamen alii experientia
teste in dubium vocant.
4. *Consectaria* hanc submersionem morti proximam, licet
non lethalem, insequentia, sunt :
 - 1) In præsens exiguæ respirationis, pulsus, teporis externi
indicium, post ea aliquot elapsis horis ipsa mens re-
dit, licet plerumque obliuiofa.
 - 2) Hoc tempore grauissimum virium defectum, alii rigo-
rem febrilem, vertiginem aut motus conuulsiuos, alii

Ggg ggg

vomi-

vomitum spontaneum aut diarrhœam aquosam aut mictionem largam experiuntur.

- 3) Deinde post aliquod tempus vegetiores facti, semper vitium, vel in animo vel corpore, ex hoc casu residuum ostendunt. Nempe
 - a) *Animi* hilaritas, firmitas, tractabilitas in timidum, mœstum, morosum, hebetem & inertiozem statum degenerat.
 - b) *Ad corpus* quod attinet: *infantes* disponuntur ad motus conuulsiuos contumaciores, *adulti* ad varias alias œconomix anomalias.

III METHODVS MEDENDI CVM CAVELIS.

Quando in submersis de non penitus subsecuta morte Medicus suspicatur, ante omnia intendat:

1. *Reuocationem*; id quod sequenti modo peragendum:
 - 1) *Pulmonibus* ab extra, quantum fieri potest, primo inflatis, submersus capite paullo declinatus ponatur, collocato sub ventriculi regione puluinari aut alio quodam corpore solidiore.
 - 2) *Ad aquam* euacuandam *vomitum* prouocetur vel per plumam, penicillum, digitum, vel per blandum aliquod emeticum e.g. oxysacchar. emetic. tart. emet. sal. vitrioli. Et licet ventriculus in non nullis aquam non contineat, vomitus tamen ad *motum* inducendum conducere potest.
 - 3) Quando paullulum ad sese redeunt, clysteres & suppositoria stimulantia, neruina; tum frictiones cum lintheis calidis & suffimigia suauiora it. sal. armoniac. odor adhibeantur.
 - 4) *Purgantia* frustra sunt, nisi iam clariora vitæ indicia adsint. Prodest tum M. P. de succino *Craton.* ad XII-XV. grana, in plethoricis sub frictione venæ sectio.
 - 5) Alii ad reuocationem *concussionem* corporis & *compressionem* ventris ad superiora adhibent, nec sine effectu, & *Borellus* tales, pro mortuis habitos, sæpius resuscitavit per panis allati micas, aqua vitæ imbutas & cordi im-

impositas. Simul autem in lecto calido reliquas partes frictionibus rubefecit.

2. Post signa *redeuntis vita* interponenda & subiungenda sunt:

1) *Analeptica* ex spirituosis: aqua rosar. flor. namph. til. lil. conuall. ceras. nigr. betonic. serpill, cinnam. apoplecticis antepileptic. *Langii*, sirup. de beton. de citro, de canela, addendo paullulum spirit. C.C.

2) *Ad equalem sanguinis motum*, per peripheriam obtinendum, regimen diapnoicum & continuatio ante dictorum adhibeatur. *Forestus* laudat decoct. flor. chamomill. quod tamen non nisi delapsis in aquam marinam aptum videtur, quibus & alia lenientia oleosa mucilaginoso profunt.

3) Quando *vires* aliquo modo accreuerunt, balneum temperatum neruinum, sed non nimis calidum, nec diutius iusto vsurpandum, conducit.

3. *Symptomata*, si quæ remaneant, sequente modo tractentur:

1) Ante omnia *mentis* rationem habere conuenit, quæ per moralia *sensim* corrigenda est.

2) *Ad corpus* quod attinet, motus & euacuationes in posterum iniungantur, aliquando etiam moderate excitantia conducunt.

3) In *tussi* adhuc residua pulmones per expectorantia & discutientia ab impuritatibus purgandi sunt.

4) *Diala* in futurum sic tenuis, euchyla, & plethorici venæ sectionem non negligant.

5) Animi pathemata, in primis *terror*, omni studio euentur.

TABVLA CXXXIV.

DE

ADFFECTIBVS GRAVIDARVM.

I. SIGNA GRAVIDITATIS.

Hæc in simplici grauiditate satis plana sunt: quando autem alia incommoda conspirant, vel mulier malitiose dissimulat, tum nuda saltem probabilitas locum habet.

1. *Emanatio mensium* in recte sanis & robustis, sine manifesta alia causa, primum signum est, sed non absolutum; aliquando enim *morbide* menses emanant, citra præsentem dysphoriam.
2. Insignis *nausea a carnibus*, ipso etiam illarum odore, præcipue si alios cibos bene toleret femina, & de reliquo tolerabiliter se habeat.
3. *Ventris intumescencia*, non complanata nec inæqualis, sed globosa, & præcipue circa umbilici regionem summum hæmisphærii efformans.
4. Placidum huius intumescentiæ augmentum, pedibus a tumore liberis: rarissime enim *morbidus* tumor in abdomine directe incipit.
5. *Motus fœtus*, circa vicesimam circiter hebdomadam contingens, luculentissimum est signum, modo a borborygmis & aliis flatulentis volutationibus perite distinguitur, sensu scilicet sub hypogastrio altiore.
6. Dissimulante autem matre, manus *aliena*, bene calida, tepido ventri, vel frigida calenti, imposita motum quidem fœtus aliquando percipere, rem tamen certius definire non potest.
7. Sic etiam in tali casu femina quædam perita oculari ventris inspectione, maiorem vel minorem probabilitatem detegere valet.
8. *Vrina inspectio*, secundum traditiones præcipue instituta, licet fallacissima sit, verum tamen est, quod imprægnatæ *sana* sanam etiam quoad colorem & claritatem urinam exhi-

exhibeant: hæc si claro loco versus subobscurum alium, aut angulum, spectetur, subtilibus atomis internatantibus, Sonnen-Stäubchen, conspicua est; qui quidem atomi in *morbida* mensium obstructione aliquando etiam occurrunt, sed, accuratâ inspectione, multo crassiores; quamquam negari nequeat, quod teneriores feminæ, quibus menses morbosos ob causas suppressi sunt, teneriores habeant atomos, quam robustiores grauidæ.

9. *Suffimigia* gummatum, vtero adplicata, ad gustum peruenientia, & aliæ antiquarum traditionum probationes, vel mere fabulosæ, vel, ob subiectorum diuersam sensibilitatem, satis incertæ sunt.

II. DIFFERENTIA.

1. *Legitimus* foetus a falso, motus solo sensu, discernendus est: obscuræ enim foetus perceptiones, ad debitum vsque tempus manentes, molæ præsentiam reddunt suspectam; quam confirmant fluxus vterini irregulares, inflatio cito augescens, cum variis spasticis flatulentis motibus, aliæ insolitæ ex vtero emanationes, taciturna feminæ anxietas, partus ultra debitum tempus emanatio.
2. Intumescencia ventris grauidarum a cachectico - ascitico tumore discernitur præcipue
 - 1) Statu vitali prægresso corrupto, cachectico.
 - 2) Speciatim tumoribus pedum prægressis & occurrentibus.
 - 3) Quando autem docente experientia, grauiditas & tumores abdominis non morboosi complicantur, hæc diagnostica signa locum non obtinent.
3. Ipsi autem morbi differunt secundum causas, alii enim a plethora, alii ab animi pathematibus, alii a vitiis diætæ, alii a violentis causis externis, alii a mole & pondere vteri distensi, proueniunt.

III. SVBIECTA.

1. Non omnes promiscue grauidæ malis subsequenter obnoxia sunt: longe enim maximus numerus rusticarum, laboribus addictarum, ab illis immunes viuunt, & ita vi-

vidis exemplis docent, ficta & adfectata multarum pathemata non tam ad grauiditatis, quam vitæ generis circumstantias pertinere.

2. Sunt autem morbis his sæpius obnoxia:
 - 1) Teneriores & delicatula, quæ & corpore & animo sensibiles sunt.
 - 2) Præcipue plethorica, desides intemperantes.
 - 3) Multis animi pathematibus exagitata, sollicita, meticulosa, tristes, iracunda.

IV. AFFECTVS ET METHODVS MEDENDI.

A. Affectus a plethora dependentes.

1. *Hæmorrhagia narium* enormis: hæc tractatur secundum methodum, quæ tabula de hæmorrhagia narium commendata est. Sic etiam *hæmoptysis* & *vomitus* cruentus eandem exposcunt medicationem, quam suo loco commendauimus.
2. *Hæmorrhoides* nimia minuuntur temperantibus nitrosis, cinnabarinis.
3. *Hæmorrhagia uteri*: hæc duplici modo, licet rarius, contingit.
 - 1) Vel enim sanguis prioribus mensibus, menstrui fluxus instar, erumpit, & ita calculum notabiliter turbat;
 - 2) Vel, rarioribus adhuc casibus, a medio gestationis tempore, aut serius, sanguis prorumpere incipit, & ad partum vsque continuat; quæ duæ species periculo abortus propiores sunt. Tractantur
 - a) Nitrosis, cinnabarinis.
 - b) Roborantibus gemmatis.
 - c) *Pilulis Stahlianis*.
 - d) Congrua venæ sectio in brachio, ad maiorem profusionem, abortus prodromum, præoccupandam.
Conf. tabul. XVI, vbi de *fluxu abortiuo* plura dicuntur.

4. *Cephalalgia*.

Hæc potissimum excitatur causis *occasionalibus* sequentibus:

- 1) Immodesto corporis aut animi motu.

2) Par-

- 2) Partium inferiorum refrigeratione.
 - 3) Potu spirituofo. *Exposcit*
 - a) *Interne*: temperantia nitrofa & leniffima laxantia.
 - b) *Externe*: spiritum vini camphoratum, fi odorem possint perferre.
5. *Grauitas & lassitudo artuum, præcipue pedum.*
 Hæc tollitur
- 1) Congrua & tempestiua venæ sectione.
 - 2) Placido corporis motu.
 - 3) Pulueribus antorgasticis.
6. *Tussis sicca, & anhelitus difficultas.*
 Hæc eadem remedia exposcunt: quando autem difficilis respiratio post cibum largiorem euenit, vel vltimis mensibus ab ipsius vteri sarcina introducitur, priore causa salina digestiua, posteriore vero patientia ad partus vsque exclusionem, requiruntur.
7. *Abortus.*
 Hic quidem *plethoram* pro causa generali agnoscit, & primis præcipue mensibus, maxime primiparis, plethoricis præ aliis euenire solet, causæ tamen sequentes occasionem ad eundem sæpius suppeditant:
- 1) Vehementes animi perturbationes, e.g. iracundia, terror repentinus.
 - 2) Largior mensium fluxus, extra conceptionem familiaris.
 - 3) Diæta vinosaf, aromatica.
 - 4) Vomitiones vehementes, & purgantia fortiora.*
 - 5) Fluxus aluini, diuturni, lienteriodes, foetui nutrimentum subducentes.
 - 6) Vel conatus saltem deiiciendi, torminosi, spastici, tenesmodes.
 - 7) Vnde etiam clysteres stimulantef aliquando damnum hoc inferunt.
 - 8) Vehementes corporis commotiones, e.g. saltationes, vecturæ, violentæ concussiones abdominis, lapsus.
 - 9) Veheris incontinentia.

- 10) Largior venæ sectio in pede; quamquam hæc caussa rarior & cum grano salis accipienda est. *Conf. dissertatio Hoielsini de venæ sectione gravidarum in pede.*
- 11) Emmenagoga fortiora.
- 12) Nidores fœdi, in primis pinguium accensorum, e. g. sebaceorum ellychniorum.
- 13) Nephritici dolores.
- 14) Cachexia.
- 15) Fluor albus, vel alia vteri vitia.
- 16) Opiata, vid. *Etmüll. coll. præct.*
- 17) Fascinationes.
- 18) Fœtus debilis vel plane mortuus.
- 19) Febres acutæ, nonnumquam etiam intermittentes. Notum enim est, quod grauida, febre tertiana correpta, die vacuo partum septimestrem vitium excluderet.
- Hic fonticus adfectus præ aliis prudentem exposcit medicationem.

a) Ad præcauendum commendantur:

- α) Venæ sectio iterata in brachio, nempe sub initium & medium gestationis. Sic olim credebant, hodie autem *frequentius* siue in brachio siue in pede venam secamus, & si necesse videretur, singulis mensibus eandem repetimus. *Conf. dissertatio Fabricii de venæ sectione ab abortu præseruante.*
- β) Temperantia, præcipue nitrosa, sub qualicumque sanguinis commotione propinanda.
- γ) Roborantia, quo scopo pilulæ *Stah!ianæ*, subinde exhibitæ, aliis præferuntur: laudantur etiam carminatiua, e. g. essent. cort. aurant. item tragæa & rad. carlin. cum sem. fœnicul. & nuc. moschat.
- δ) Diætâ temperata, lubrica, cum placido corporis motu & mentis tranquillitate. Nonnulli loco corporis motus commendant *decubitus* in lecto & quidem per totum gestationis tempus continuandum; neque semper sine effectu. Nota enim est persona, quæ post octo abortus hac ratione fœtum maturum feliciter tandem exclusit.

ε) Spe-

- a) Specificè laudantur *testa onorum* exclusorum, præcipue gallinarum & perdicum. Item *acini pas-sularum* maiorum, qui tamen euidenter adstringunt.
- b) In *hæmorrhagiâ* vero *uteri* emicante & doloribus dorsi lancinantibus, abortus periculum minitantibus, tentari quidem potest embryonis conseruatio per temperantia nitrosa, tonica gemmata cum leni anodyno, versus somnum exhibenda;
- c) Quoniam autem, præsentè iam *uteri hæmorrhagiâ*, omne auxilium sæpe irritum obseruatur, euentus harum rerum, sub vsu analepticorum & carminatiuorum temperatorum, expectandus est.
- d) Vbi autem grauior hæmorrhagiâ *uteri* vires grauidæ exhaurire videtur, otiosum spectatorem agere non conuenit, sed ipsam potius excussionem per remedia promouere decet; quo casu optime sane se commendant pilulæ *Stahlia*næ, vel *Becherianæ* genuinæ.
- e) Post *abortus elisionem* tanto minus opus est adstringentibus: nam hæmorrhagiæ tales sponte mitescunt, vel tamen mitissimis analepticis & tonicis auscultant.
- f) Ad *fungosa* autem *uteri concrementa* præoccupanda, & felicem in posterum fœcunditatem obtinendam, pilulæ *Stahlia*næ, per nouem priores dies vsurpandæ, commendantur.
- B. *Affectus a diætâ vitiis dependentes.*

1. *Vomitus.*

- 1) Licet frequens hoc malum a congestione sanguinis versus ventriculum sapius oriatur, ad diætæ tamen vitia eundem referendum putauimus, quia ventriculi vitium, intemperantia & voracitas plurimum concurrunt.
- 2) Conspirant reliqua adpetitus vitia, nempe *fastidium*, immo insignis *nausea* a carnibus.

H h h h h h

3) Aliis

- 3) Aliis adpetitus eximie augetur.
- 4) Aliæ *malacia* & fastidioso ciborum selectu laborant.
- 5) Aliæ plane *pica* seu ingente desiderio rerum vel toto genere alienarum, vel pro tempore non impetrandarum corripuntur.
- 6) Aliæ molestam oppletionem a cibis experiuntur, quæ post vnam vel alteram horam iterum euanescit, & quia vltimis maxime mensibus obseruatur, sarcinæ potius vteri, quam vitio diætæ attribuenda videtur.
- 7) *Vomitus* autem ipse & nausea primis quatuor aut sex hebdomadis frequentius occurrunt, raro diutius, rarissime per totam gestationis periodum durant.
- 8) Rariora sunt exempla, quibus hæc incommoda post aliquot demum menses, vel plane circa finem gestationis eueniunt.
- 9) Exferit autem sese vomitus tempore sæpius matutino, cui tolerabiliter peracto euphoria per diem succedit.
- 10) Quando autem adpetitui nimium indulgent, vomitus facile excedit, diutius continuat, & grauiora incommoda parturit.

Hic *excedens vomitus* sequente modo tractetur:

- a) Venæ sectio in brachio instituat, huic enim magis, quam medicamentis, vomitus auscultat.
- b) *Interne* propinentur incidentia, digestiua, stomachica e radic. ari, helen. galang. zedoar. zingib. cubeb. cort. aurant. conditis, malis cydoniorum, cinnamomo, nuce moschata rore marino, cum vino infusus; item e salibus tartarus vitriolat. arcan. duplicat. nitr. porro: gemmata, pilul. *Stahliana*, *Becheriana*, millefol.
- c) *Externe* imponantur ventriculo roborantia, balsama stomachica ex oleis nuc. moschat. meliss. absinth. &c. vel emplastrum de tacamahaca cum oleo anethi, vel sacculi carminatiui.

d) *Ma.*

d) *Malacia & pica* tractationem vide tab. de vitiis adpeticus.

2. *Alui adstrictio vel obstructio.*

Hæc sæpe ob potum parcum & desidiam grauidis euenit, rarius directa grauiditatis culpa, nempe sarcina vteri, in intestinum rectum incumbente; quo posteriore casu tenesimum comitem habet. Succurritur

- 1) Per dietam emollientem, præcipue potum sufficientem, & placidum corporis motum.
- 2) Per vsum pilularum *Stahlii, Becheri*, vel e gummi-resinis, e.g. ammoniaco, paratarum, item pot. fennat.
- 3) *Externe* per *suppositoria* e globulis moschatis, vel clysteres e decocto auenaceo.

3. *Tormina alui & flatulentia.*

Hæc tolluntur carminatiuis e cort. aurant. pimpinell. alb. aromat. nostratibus, nempe sem. anisi, fœniculi, cumini.

4. *Diarrhœa.*

Huius causæ licet a diarrhœæ alius causis multum non recedant, maiorem tamen considerationem in *gravidis* diarrhœa meretur: diu enim continuans, & spastico-tenesimodeis molestiis stipata, abortum minatur. Hinc placide sistenda est.

- 1) *Interne* conducunt roborantia, stomachica, carminatiua, e.g. condit. cort. aurant. calami aromatici, galang. zedoar. zingib. miua cydon. &c.
- 2) *Externe* vsum habent balsama & emplastra stomachica.

5. *Fluor albus.*

Hic vti rarissime grauidis euenit, præcipue quando mariti fideles sunt, ita indolem exhibet pertinacissimam: ob imprægnationem enim laxantia, per multos dies necessaria, non possunt adhiberi. Secure tractatur:

- 1) Corrigentibus & repurgantibus carminatiuis, e.g.
 - a) Essent. e rad. ari, pimpinell. alb. herbis amaris.
 - b) Iusuf. e meliss. galeops. flor. alb. & præcipue abrotano.

2) Singulis hebdomadis semel vel bis interponantur pilulæ *Stahlia*næ vel *Becheriana*næ genuinæ.

C. *Adfectus a mole & pondere vteri dependentes.*

1. *Dolor coxarum & lumborum.*

- 1) Exserit sese hic dolor postremo maxime tempore, ob ventrem, acrius antrorsum ac deorsum pendentem.
- 2) Aliis dolet ipse venter exterior, cum nitida & striis transuersis distincta rubedine, non aliter ac si abdomen fissuras agere minaretur. Non indiget medicatione, post partum enim sponte euanescit.

2. *Inflationes crurum varicose.*

- 1) Hæ inflationes in phlegmaticis tumoribus œdematosis stipatæ sunt.
- 2) In aliis temperamentis ecchymomata, sugillationum instar, eueniunt, blaue und braune Flecken um solch Geäder herum.
- 3) Vulgus crura ita adfecta vocat *Rindes-Beine*.
- 4) A medio gestationis tempore ad partum vsque occurrunt, ob vteri molem, vas iliacum seu crurale prementem.
- 5) Post partum quidem euanescent, sed in quibusdam subinde recurrunt, certissime futura noua grauiditate.
- 6) Indigent medicatione sequente:

a) *Curatiue:*

- α) *Interne* ad dolores temperandos pulu. antispasmod.
- β) *Externe* frict. cum excutia, camphorat. & in puerperio ligatura.

b) *Praeseruatue* exposcit venæ sectionem medio gestationis tempore, alui successum, sessionem altiorem, motum corporis lenem, & a partu, vteri repurgationem.

3. *Vrina frequens stimulus.*

- 1) Hic vltimis maxime hebdomadis occurrit, aliquando etiam circa medium gestationis tempus, nempe quando

do vterus, ob ligamentorum laxitatem, magis deorsum incumbit.

2) Edito partu tollitur & hoc symptoma.

4. *Stranguria, & suppressio urinae temporaria.*

His succurritur

1) *Interne* temperantibus nitrosis, cinnabarinis.

2) *Externe* cataplasmatibus.

5. *Haemorrhoidum inflatiores vesiculares.*

1) Hæ dolore ardente, immo interdum vlcerosâ erosione, molestissimæ sunt, præcipue plethoricis. Germanis dicuntur *Mass-Rötter, Sacken, Belgis Sacken.*

2) Experunt;

a) *Interne* temperantia nitrosa & vsus millefolii.

b) *Externe* unguentum de linaria.

6. *Tumores pedum.*

1) Hi, quando ultra genua non extensi sunt, nullius periculi obseruantur.

2) Vbi autem ipsum etiam abdomen inuadunt, ibi asciticam indolem exhibent.

3) Sed præstat grauiditatis tempore hydropicos tales tumores tolerare, & symptomatum saltem mitigationi insistere, quam directe ipsum morbum adgredi.

4) Conuenit inter ea ambulare potius, quam plurimum stare, aut, in humilibus præcipue scabellis, diutius sedere.

D. *Affectus a causis singularioribus dependentes.*

1. *Nimia corporis extenuatio.*

1) Hoc casu infantes bene habiles & auctiores obseruantur.

2) Expocit macilentus talis habitus diætã gelatinosã, amygdalatã, temperantem, & corporis quietem.

2. *Nimia pinguedo.*

1) Abundantior hæc matris nutritio minorem plerumque & gracilem infantem edere obseruatur.

2) Requirit venæ sectionem, diætã moderatã, vitam mobilem, & laxantia subinde leniora.

3. *Debilitas synoptica.*
 - 1) Hæc differt a lassitudine plethorica.
 - 2) Exposcit alui legitimum succellum, & stomachica carminatiua.
4. *Prematura aquarum euacuatio.*
 - 1) Hæc abortum & partum præmaturum minatur.
 - 2) Requirit roborantia interna & externa.
5. *Lichenes.*
 - 1) Hæc exanthemata in facie & collo, præcipue biliosorum, exoriuntur, & vulgo Leber-Flecke vocantur.
 - 2) In aliis pallores, in aliis vero rubores volaticos inducunt.
 - 3) Non indigent medicatione, quia post partum euanescent.
6. *Incommoda præter consuetudinem.*
 - 1) Sunt, quæ aliquot *eiusdem* sexus proles gestarunt, si deinde *diuersi* sexus prolem concipiant, multis modis incommodius habere obseruantur.
 - 2) Hæc tamen incommoda pro indubio signo, alterius sexus concepti, non habenda sunt.
 - 3) Multo magis reliqua signa, quæ ad sexum dignoscendum vulgari traditione recepta sunt, fallere obseruantur, e. g. quod color grauidæ floridus, & animus alacrior, masculi; pallidus autem adspectus, & mentis torpor, femellæ gestationem denotet: idem valet prognosticon e diuerso situ foetus in alterutro vteri latere; eadem fallacia laborat signum gemellorum, nempe *fusca* linea per longitudinem abdominis, & venter in medio *planior*, circa latera autem *protuberans*.
7. *Nimius embryonis motus.*
 - 1) Materni animi commotionibus iracundis potissimum inducitur.
 - 2) Suum etiam contribuit calor immodicus, abdomini admissus.
 - 3) Aliquando a mala ipsius foetus dispositione dependet.
 - 4) Ex-

- 4) Expofcit temperantia & acrimoniam biliofam corrigentia remedia, coniunctis neruinis epithematibus, corporis etiam & mentis tranquillitate.
8. *Dolores a calcitracione fœtus.*
- 1) Postremis menfibus hi dolores contingunt.
 - 2) Tenerioribus lacrimas fœpius excutiunt, immo lipothymias plane arceffunt.
 - 3) Abortum nullo modo minantur: nam infans ad partum fuum nihil contribuit.
 - 4) Tolerandi funt hi dolores, qui proxime ante partum euanefcunt.
9. *Debilitas embryonis.*
- 1) Hęc e motu rariore, leniore & vix fenfibili diiudicatur.
 - 2) Dependet fœpissime vel a debili matris constitutione, vel terroribus repentinis, aut mœroribus diuturnis.
 - 3) Succurritur roborantibus.
 - a) *Interne* ftomachico-carminatiuis.
 - b) *Externe* balfamis & emplaftris aromatizatis.
10. *Concretio fecundinarum.*
- 1) Certa figna non dantur, hanc fecundinarum cum vtero, extra placentam, concretionem dignofcere: hinc tanto minor eft occafio, vt illi occurrere poffimus.
 - 2) Cauffam vulgo in nimia defidia, & multa, vltimis menfibus, ad ignem obuervatione quærunt.
 - 3) Vbi huius mali fufpicio occurrit, ibi teneræ pinguedines gallinarum vel anferum meliorem vſum habent, quam ſpiritus vini, anifo vel caruo imbutus, qui vulgo abdomini illinitur.
11. *Circumuolutio funiculi vmbilicalis*, circa corpus, vel plane collum infantis.
- 1) Hęc a mulierculis perperam tribuitur motibus fufſum fortius extenſis; vnde fœtum circumagitari credunt; ſed talis volutatio tardis potius, quam repentinis, progreffibus contingit.
 - 2) Remedio pharmaceutico deſtituimur hic, immo & chirurgico, niſi ſub ipſo partu bona fortuna ſecundet.

12. *Superfoetatio.*

- 1) Rarissimum est accidens, ita vt inter numerosissimas millenarias vix vni eueniat; prostant tamen exempla apud *Sennertum* & alios.
- 2) Dependet omnino a coitu post conceptionem.
- 3) Vtrique foetui, & grandiori & superinducto recentiori, abortus periculum impender.

13. *Febres intermittentes.*

- 1) Hæ nullum adeo periculum portendunt, nisi incongruenter supprimantur; contumaciores tamen sunt in grauidis quam aliis subiectis. Immo notum est exemplum, quod grauida quædam febre tertiana correpta die vacuo partum septimestrem exclusit.
- 2) Tractentur lenissima methodo, suo loco commendata.

14. *Febres acutæ.*

- 1) Hæ grauidis semper sunt periculosæ, nisi vel sponte benignius se gerant, vel arte congrua moderamen obtineatur.
- 2) Præcipue autem abortum minantur.
- 3) Vnde cautius tractandæ sunt, nempe
 - a) Lenibus temperantibus nitrosis, præcipientibus, & antimoniatibus fixis.
 - b) Regimine lenissime diapnoico.
- 4) Anceps hic est venæ sectio. *Conf. D.D. Stahl's dissertatio de venæ sectione in febribus acutis.*

15) *Fœtus mortuus.*

- 1) *Signa.*
 - a) Matris languor, debilitas, immo lipothymia.
 - b) Horrores & volatici ardores.
 - c) Angustia præcordiorum.
 - d) Anxietates animi.
 - e) Dolores capitis vertiginosi.
 - f) Mammarum flacciditas & notabilis præsentia lactis tenuioris.
 - g) Cessatio motus embryonis.
 - h) Venter ad inguina delapsus, & onere insolito flaccidè pendens.
 - i) Sen-

- i) Sensibile frigus in illa regione.
- 2) *Causæ.*
 - a) Insignis grauidæ plethora.
 - b) Grauia animi pathemata, iræ, terroris, mœroris.
 - c) Morbida matris constitutio.
 - d) Diarrhœæ diuturnæ.
 - e) Dolores in ipso partu male succedentes aut administrati, cum diuturniore fœtus in vtero strictura.
- 3) *Methodus.*
 - a) Ad maturam cadaueris expulsionem propinentur pellentia specifica, e.g. hepar anguillæ, borax Veneta. Modo debitus situs, qui exclusionem concedit, adfit.
 - b) Ad vires restaurandas interponantur analeptica gratiora.
 - c) His autem irritis, & cessantibus ad partum doloribus, manualis extractio per chirurgum tentetur.
 - d) Expulso fœtu, femina, puerperarum more, sollicitissime tractetur.
 - e) Si vero neque per interna, neque per externa auxilia negotium succedat, embryo abit in putredinem, & febrem putridam, sapius lethalem, prouocat; quæ caute & leniter tractetur, ac elisio, criticis maxime diebus, per remedia, febrem non turbantia, denuo tentetur: analepticis vbique coniunctis.

V. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Grauidis generatim & vniuersis propemodum earum morbis conueniunt:
 - 1) Plethoræ imminutio per venæ sectionem, exceptis febribus acutis.
 - 2) Humorū temperatio per pulueres antispasmodicos.
 - 3) Lenissimæ laxationes, repetitæ, sed non diu continuatæ.
 - 4) Analeptica gemmata & carminatiua, in primis tragea rad. carlinæ & sem. fœnicul.

2. *Vena sectio* omnibus modis laudatur, præcipue in iunioribus, non obstante *Hippocratis* obseruatione, vt pote de largissima tum temporis vsitata sanguinis profusione agente; in sensibilibus tamen caute procedendum est:
- 1) *Tempus*: optime instituitur vel primis adhuc hebdomadis, nisi proxime ante conceptionem adornata fuerit; vel medio gestationis tempore, quod præcipue huic scopo quadrat; vel denique vltimis duabus aut tribus hebdomadibus; vel sub initium, medio tempore, & circa finem; vel toties, quoties motus spastici abortum minitantur.
 - 2) *Mensura*: hæc ad 6 circiter vncias accedat, maiore enim copia sanguinem emittere, periculum minatur, præstat potius hunc actum repetere; minore autem quantitate illam adornare, periculosiores turbas concitaret.
 - 3) *Locus*: celebratur quidem ordinarie in brachio e vena mediana, hodie autem non dubitamus, in pede venam secare: periculum enim, teste experientia, non inuoluit, & in rheumatico-arthriticis adfectibus circa lumbos, coxas & femora, præcipuum vsum habet. Inter ea opinionibus aliquando cedendum est. *Confer. dissertatio Hoselsini*, superius iam allegata.
 - 4) *Vsus venæ sectionis* post abortum præcipue necessarius est, nempe ante vel sub initium nouæ conceptionis; quo casu non contemnendum est *Waldschmidii* consilium de triplici venæ sectione.
3. *Pilulæ Becheriana*, multo magis autem *Stahliana*, in quam plurimis grauidarum malis optimum vsum habent; modo caueatur, ne loco genuinarum falsæ offerantur.
4. Neque spernendum effectum edunt *essentia succini* & *pimpinella alba*, moderate vsurpatæ; quæ sane multis parasangis antecellunt speciosis illis balsamis embryonum, aquis cordialibus, carbunculi, vitæ mulierum, & variis talibus odoriferis spirituosiss, carminatiuis calidis, ehiribus vterinis, aromaticis, oleosis, myrrhatis, quæ san-

guinem nimis turgefaciunt, & in vero periculo non indemniam deprehenduntur; *externe* autem odorifera illa & neruina non improbantur.

5. Sic etiam follicite abstinendum est a *diureticis acrioribus, purgantibus, emeticis*, quæ nimiam sanguinis commotionem & abortus periculum intentant. Sufficiunt *salia media* pro digestionem, *nitrum* pro temperationem, *potiuncula sennata & rhabarbarina* cum passulis, cremore tartari, sem. anisi, cinnamom. item rob tamarind. passul. pro catharsi.
6. *Fluxus sanguinis uterinus* vti præternaturalem statum in grauidis inuoluit, & paucissimis saltem exemplis innoxius obseruatur, ita maturum moderamen postulat.
7. Si vero iam proxime ad eruptionem tendant commotiones, *adstringentia* sæpissime vel frustra adhibentur, vel heteroclitos euentus inducunt; nisi causæ illarum materiales sufficienter prius correctæ & subactæ sint.
8. Vbi vero *inhibentia* locum habent, ibi ceteris præminent *gemmata*, species de hyacintho, coralliata, nucs mochata, in vino macerata &c. ad motum elisorium placandum.
9. Si grauidæ *prioribus* mensibus, præsertim tempore menstruo, hæmorrhagia obtingat, placidis adstringentibus non auscultans, & feminam ad syncopen vsque exhauriens, prognosis abortum ineuitabilem præfigit: hinc pro vita matris saluanda, exclusio sine omni trepidatione promoueat, nimiam enim illæ sanguinis profusiones longe certius & citius, abortu excluso, moderamen admittunt.
10. Quid autem de illa vteri hæmorrhagia sentiendum sit, quæ vel proxime, vel plures etiam hebdomadas ante partum aliquando obtingit, sequente tabula indicabitur.
11. *Lassitudo plethorica* cautius discernenda est a vera naturæ debilitate, ne spirituosos analepticos, plethorico statui quo-


vis modo contrariis, maior sanguinis orgasmus concitetur.

12. *Spontaneus vomitus* rarissime abortum ciet: peior euentus ab emeticis, in primis fortioribus, metuendus est; dantur tamen grauidæ, quæ gestationis tempore emeticum audacter, & quasi ordinarium suum, non obstantibus dehortationibus Medicorum, cum euphoria & nullo infelici successu, adsumunt.
13. De *varicibus* præter ea, quæ supra diximus, adhuc notandum, quod aliquando, licet rarissime, rumpantur; quo casu spiritus vini rectificatissimus, ad hæmorrhagiam inhibendam tuto adhibetur.
14. *Animipathematum* non datur medela pharmaceutica, effectus tamen noxii, ab illis metuendi, aliquando possunt occupari, præcipue si causæ materiales concurrant, e. g. biliosa acrimonia, siue *crassior* in primis viis, siue *subtilior* per sanguinem diffusa. Crassiori plus quadrant *absorbentia*, quam alia temperantia: tenuiori bili dicta absorbentia *segnius* succurrunt, præsentius autem *nitrum*, perite vsurpatum. Vbique laxationes rhabarbarinæ, pilulæ *Stahlianæ*, post iracundiam, clausa aluo, conueniunt.
15. Commotionum ipsarum ferociam *anodynis opiatis* compescere, infaustum est tentamen: tutius exhibetur massa pilularum de *cynoglossa*, quæ parcissimo vsu satis efficax est, efficacior tamen vsus *cinnabaris* peritus.
16. *Balnea*, quæ aliis circa proximum partus tempus, aliis maturius placent, non improbantur, præcipue in adfuetis & minus sensibilibus: modo plethora sit imminuta, & reliquæ excretiones legitime succedant; improbantur autem nimis calida, diuturnior in illis commoratio, & aëris frigidi admissio repentina: substituunt aliæ emollientia *linimenta*.
17. Quod ad *dietam* grauidarum attinet, consuetudo multarum regularum vim eneruat, & aliis aha concedit, vel interdicat.

18. Generatim notandum, quod non adeo facile in *qualitate*, sed potissimum in *quantitate* peccetur: hinc *temperantia* optima est norma.
19. Diæta nimium delicata, & scrupulosa vanitatem magis quam veritatem ostendit; quod exemplo numerosissimarum rusticarum toto die confirmatur, quæ sub simplice suo victu, & corporis laboribus, a quam plurimis incommodis, otiosas & delicatulas, sub pomposo suo apparatusu, vexantibus, satis liberæ viuunt.
20. Inter ea tamen, vbi sermones de conueniente diæta instituendi sunt, ibi crudi & crassi cibi, item *diutetica*, nempe allium, cepæ, petroselinum, bacca iuniperi, raphanacea, chærefolium, nimium salita, acida, flatulenta quodam modo improbentur.
21. *Calidis aromaticis* peregrinis præferantur nostratia, vtpote temperata.
22. *Peruerso appetitui* mature resistendum est, ne ille per habitum confirmetur, & foetui, vltimis præsertim mensibus, noceat.
23. Reiciatur *potus spirituosus*, vtpote præmaturum foetus exitum prouocans: vinum autem, sufficiente aqua dilutum, cereuisia tenuis, clara, thee, coffeé satis concedantur, vt noxia alui siccitas præcludatur.
24. Inter *motum & quietem* tale temperamentum obseruetur, ne nimia quies concoctionem impediatur, lassitudinem phethoricam & dolores artuum augeat; neque vehementior motus abortum elidat.
25. De *vectura* notandum, quod *vehemens & diuturna*, alio præcipue obstipata, minus adsuæta abortum non ita raro prouocare solet; *moderatio* autem, proximis adeo partui diebus, boni vsus sit, vias vterinas angustiores laxando, & ita ad feliciorum partum præparando.
26. Nocet *sublatio & gestatio onerum*, cum grauiore nisu contingens, ob diuturniorem halitus retentionem & diaphragmatis inde acvteri depressionem.
27. Nocet etiam manuum repentina in altum extensio: hac

- enim ratione abdomen & vterus simul contrahuntur. Magis autem omnes eius modi motus primis, quam posterioribus, mensibus nocent.
28. Somnus & vigiliæ idem moderamen postulant, respiciendo corporis temperamentum, vbi cholericis diuturnior somnus magis, quam phlegmaticis concedendus est.
29. De *ære* eadem valet temperatura: nimius enim calor humores in orgalimum concitat.
30. Venus summo studio fugiatur, quia abortum prouocare, & iuperfœtationem, licet hanc rarissime parere potest: alias causas tacemus.
31. *Animi pathemata* reliquis omnibus sunt potentiora, & hinc quam maxime suas merentur cautelas.
32. *Ira* & *terror* hæmorrhagiam vterinam & abortum suscitant, fœtum interimunt, aut infantem pauoribus & epilepsiæ reddunt obnoxium: insuper terror maxime signat fœtum, quo si forte grauida perturbetur, caueat sibi a faciei contactu, & dosin pulueris antispasmodici, cum absorbente quodam coniuncti, adsumat.
33. Quibus antea *abortus* contigit, circa illud ipsum præcipue tempus, ab his & nouæ commotionis occasionibus, non minus autem ab ipso metu reuersuri abortus, præ aliis sibi caueant.
34. Adfectus animi primis & vltimis, phantasia vltimis mensibus præcipuam suam efficaciam exserunt, & in embryonem deriuant. Post tales casus præter pharmaceutica, vbique conueniunt placida requies & modestum animi oblectamentum, nociuas impressiones dissipatura.
35. Tandem, quoniam certissimum est, quod mentis adfectiones maternæ cum animo embryonis communicentur, grauida bene meminerit, se duplici vinculo esse ligatam, animum, diuinis ideis & oblectamentis imbutum, conseruare.

36. Contingit aliquando, licet rarissime, vt grauidæ vltimis ante partum hebdomadibus *hemorrhagiam mammarum* experiantur; quo casu temperantia nitrosa cum cinnabarinis conducunt.



TABVLA CXXXV.

DE

AFFECTIBVS PARIENTIVM.

I. SIGNA PARTVS IMMINENTIS.

1. Frequentior vrinæ emissio.
2. Tenesmodes intestini recti constrictio, non quidem durabilis, sæpius tamen reuertens.
3. Prodit aliquando breui ante partum e vagina vteri mucus cruentus, cum insequente vrina turbida & sordida.
4. Vterus paulatim subsidet & ad os pubis vergit; quod mulieres exprimunt: *Der Leib hat sich gesenket.*
5. Mensura temporis, 40 nempe hebdomadam a prima menstrui fluxus emanatione, vel 20. aut 21. hebdomadam, a primo fœtus motu computando.
6. Præcipue si ea phasis lunæ, qua alioquin grauida menstruum fluxum experiri consuevit, simul congruat. *Plura de his vid. infra.*
7. Dolores dorsii & lumborum deorsum ad pubem vsque protensi.
8. Motus ipsius vteri spastici cum tremoribus genuum, pedum, & insequente apertura orificii vterini, wenn sich der Leib nach denen rechten Wehen gebührend öffnet.
9. Secundinarum ruptura, & contenti liquaminis effusio, succedente maiore vteri reseratione, vt conuexitas capitis quodam modo quasi promineat; feminæ dicunt: *Das Wasser ist gesprungen, das Kind ist in die Geburt getreten.*

II. PRO-

II. PROGNOSIS.

1. Partus *facilius* succedit iunioribus, vegetis, frugalibus, rusticis, & quæ sunt animi moderatioris: quo magis consueto menstruo tempori respondet, eo meliorem successum pollicetur.
2. *Difficilem* autem partum sequentes circumstantiæ minantur.
 - 1) *Ex parte matris:*
 - a) Habitus corporis plethoricus, nimis obesus.
 - b) Vel debilis, morbosus aut delicatulus.
 - c) Calculus vesicæ, cuius inde crepatura metuenda est.
 - d) Quæ inobedientes sunt, suisque adfectibus moderari nesciunt.
 - e) Primiparæ, præcipue annosæ, bey welchen es schwerer bricht.
 - f) Terror instantis tori.
 - g) Mala & cruda diata.
 - h) Dolores iusto diutius emanentes, languescentes, aut rarioribus interuallis reuertentes.
 - i) Dolores spurii, qui non ad partum, sed sursum versus præcordia & caput tendunt, cum leui animi deliquio, anxietate præcordiorum, odontalgia & cephalalgia, da sich die Wehen in die Höhe ziehen, und in den Kopf steigen.
 - k) Hæmorrhagia vteri partum antecedens.
 - l) præmaturus aquarum effluxus.
 - m) Membranæ secundinarum firmiores, rumpi nescientes.
 - n) Conuulsiones, parturienti superuenientes.
 - o) Defectus aperturae vteri, ob scirrhasas excreseantias, vel alias vaginæ læsiones.
 - 2) *Ex parte embryonis.*
 - a) Concretio secundinarum, vel harum ante partum excretio.
 - b) Circumuolutio funiculi vmbilicalis, circa collum embryonis.

c) Fœ-

- c) Fœtus male cõformatus, hydrocephalicus, vel plane intermortuus.
 - d) Gemelli, æquali enixu ad egressum promoti.
 - e) Fœtus peruerse positus, speciaticim, vbi capite prono super os pubis imminet, wenn das Kind über den Boden sichtet; vel pes aut manus præcedit.
 - f) Mola, quæ interdum cum ipso fœtu gestatur: de hac inferius plura.
- 3) His accenseri merentur:
- a) Imperitæ obstetricis machinationes & peruersæ actiones.
 - b) Partus circa plenilunium contingens, qui vti difficilior, ita etiam, in iunioribus, rarior esse obseruatur.

III. AFFECTVS IPSI ET ILLORVM TRACTATIO.

Inter symptomata, parientibus familiaria, occurrunt

1. Dolores spurii.

- 1) Hi torquent aliquando grauidam vel instance partus tempore, vel interdum 2. 3. hebdomadas ante partum.
- 2) Dignoscuntur e vago motu dolorifico, flatulento, modo transuersim per abdomen, modo sursum versus præcordia & caput, excurrentes.
- 3) Suscitantur per regimen incongruens, diætã crudam & calidam medicationem.
- 4) Discutiuntur
 - a) *Interne*: carminatiuis temperatis, e. g. pimpinell. alb. momento costi veri, caryophyll. aromatic. cardamom. masticat. frustulo panis melliti, exiguo calidi vini haustu.
 - b) *Externe*: neruinis, iisdemque carminatiuis: *fomentis* ex herb. pulegii, serpilli, chamomill. menth. *suffitu* e nuce moschata, caryophyll. cardamom. pauxillo croci cum vino dilutis, & feruido lateri vel filici adfusis.

2. Dyslocia, seu partus difficilis.

Kkk kkk

1) Hu-

- 1) Huius causas sub *prognosi* iam indicauimus.
- 2) In vniuersum partus facilitatur
 - a) *Emollitione* partium per balnea & infusus e furfuribus & paucis semine lini per 14. dies ante partum vsurpanda. Vulgus *interne* vitur iusculis pinguius cum multo oleo oliuarum: *externe* olea & vnguenta abdomini illinit.
 - b) *Alui* expeditione per *vitum* humectantem & leniora *laxantia*, per *clysteres* pure lubricantes e decocto hordei, auenæ, lacte, pingui iusculo carniū cum saccharo, vel sale communi, & oleo amygdalarum dulcium vel oliuarum.
 - c) Iusti temporis *expectatione*, motu corporis tolerabili, deambulatorio in hypocausto, donec veri dolores euidenter accedant.
 - d) *Moderate pellentibus* & promouentibus, quæ tempore necessitatis, post aquæ effusionem, orificii veterini referationem, & fœtus in illud ingressum, locum habent. e.g.
 - α) Borax veneta.
 - β) Crocus, partius exhibitus.
 - γ) Hepar anguillæ ad scrup. I. propinatum.
 - δ) Puluis secundinarum exsiccatarum, seu spiritus illarum, secundum *Ettmüllerum*.
 - ε) Pilulæ *Becheriana*, *Stahliana*.
 - ζ) Aquæ destillatæ, e.g. melissæ, puleg. lil. alb. verben. cheir. cinnam. sed moderate, ad drachmas potius quam vncias, sumendæ. *Ruinus* propinat drachm. sem. lauendul. cum aqua puleg. vel alia, & si necessarium est, post 2-3. horas repetit.
 - e) Eodem tempore etiam *externa* conueniunt, nempe
 - α) Neruino aromatica e pane mellito, piperato, quem vino Hispanico vel balsamo embryonum madefacere, & nuce mochata, caryophyllis, croco, cardamom. conspersum abdomini imponere licet.

β) Suf-

- β) Suffimigia ex his & aliis ; quibus nothi dolores euanescent, & legitimi promouentur.
- 3) In *debilitate* & morbosa matris constitutione succurritur debitis analepticis.
 - 4) Quando delicata *animi sensibilitas* subest, dolores fugiens, non solum analepticis, sed etiam adhortationibus seriis, ad constantiam laborum grauida animanda est.
 - 5) Vbi *dolores interrupti, vagi, vel languidi* sunt, eadem conducunt, quæ superius iam laudauimus.
 - 6) In doloribus *sursum uersis*, angustias præcordiorum, respirationem difficilem, odontalgiam & cephalalgiam proritantibus, puluis antispasmodicus, pilulæ *Becheri, Stahlii*, & clyster rem expediunt.
 - 7) Peccante *plethora* a nimis obeso parturientis habitu, venæ sectio in brachio ad præcautionem, immo etiam in ipso partus termino in pede potius adornanda, uti & temperantia commendantur.
 - 8) Deficiente *nisu* ad fortiora tandem, aliis irritis, progrediendum est, qualia sunt *sternutationes & emetica*, iuncta in habitioribus venæ sectione.
 - 9) Quando *membrana* secundinarum nimis *firma* sunt, (quo casu interdum, licet difficillime, integris membranis foetus inuolutus excluditur) sufficientia tamen imminentis partus indicia prostant, embryo etiam debito situ deprehenditur, perita & cauta obstetrix, non tam vnguibus, quam scalpello superius obtuso, easdem rumpat, & separet; qua ratione aquarum & foetus egressio promouentur. Vulgo dicunt; Das Wasser incipen. Vid. *Ettmüllerus*.
 - 10) Quando autem *aqua maturius* effluunt, & viæ nimis inde exsiccantur, obstetrix vaginam vteri & abdomen moderate inungat oleis amygdal. dulc. lil. alb. chamomill. oliuar. vnguent. alth.
 - 11) *Conuulsiones*, parturienti superuenientes, exposcunt

- moderationem per antepileptica, cinnabarina, lumbricos terrestres præparatos.
- 12) In *hemorrhagia uteri*, siue proxime, siue aliquot hebdomadis partum præcedente, & tam foetui, quam matri, vitæ periculum minitante, temperantia pellentivm vsum suppleant.
- 13) Si foetus *legitimum situm* non occupet, pellentia maximo damno adhibentur: hinc manus obstetricantis, seu chirurgi in debitum situm embryonem prius reponat, & vbi capite prono super os pubis imminet, wenn das Kind über den Bogen stehet, foetus caput *blande* sursum adigere nitatur.
- 14) *Fœtus* vel *ma'le conformatus*, vel hydrocephalicus, vel funiculo vmbilicali circumuolutus, vel plane intermortuus, vbi dystociam efficit, res fere conclamata est. De foetu tamen mortuo tractando videatur tabula antecedens.
- 15) Eandem difficultatem premunt, nullum autem auxilium pharmaceuticum admittunt, *gemelli* æquali enixu ad egressum promoti.
- 16) Tandem de *mola*, utpote non minima dystociæ causa, aliquid dicendum restat.
- a) Est concrementum membranaceum, fibrosum, quod apertum sanguinem spissum nigricantem exhibet.
- b) Interdum *sola*, interdum cum *foetu ipso*, gestatur.
- c) *Moronus* indicat exempla viuarum, monstrosarum molarum, foetum encantium, rostro, vnguibus &c. conspicuarum.
- d) Vnde orientur mola, quæstio est maioris momenti: non leuem enim maculam suspicionis adspergit illis, quæ extra coniugium easdem excludere solent; tuentur tamen recentiores, quod & sine viri congressu lasciuis ouula decedere possint.
- e) Sæpe autem a prægresso abortu, præcipue immaturo, originem ducunt, ætentis nempe laciniis secundinarum,

f) *Quæ*

- f) Quæ mola *sole* gestantur, in iunioribus facilius decedunt, & ad summum vltra annum spatium in illis non durant, in annosis autem per duos vel tres annos hærent, & non raro mortem inducunt; quæ vero cum foetu simul gestantur, ambiguum nutritionem, anxia symptomata, fluxus vterinos heteroclitos, & abortus periculum minantur.
- g) *Signa* sub initium satis dubia sunt, certius vero tum demum indicium habetur, quando post dimidium gestationis tempus verus embryonis motus non percipitur; sed palpitationes saltem lenes, rariores, & obscuræ. His accedunt perpetui quasi irregulares fluxus vterini. *Vid differentia tab. CXXXIV.*
- h) Quo casu fere concurrit talis flacciditas vteri & illius ligamentorum, vt sub mutatione decubitus ex vno latere in alterum pondus quasi in eodem hypogastrio volutari sentiat.
- i) Et licet abdomen, iustæ imprægnationis instar, turgescat, in eo tamen sapius discrepat, quod planius, & versus hypochondria latius, frequenter etiam certo tempore flaccidum, & dimidia parte quasi vacuum, conspiciatur.
- k) Sentitur etiam magis, quam ordinarie, pondus versus infimam abdominis regionem.
- l) Tanto certius vero mola præsentis signum est, quando vel nulli dolores ad partum iusto tempore contingunt, vel non sufficientes, vagi & inconstantes, aut vehementes etiam, nullam expulsionem producant.
- m) Quando mola cum foetu gestatur, prius non admittitur medicatio, quam post veræ & falsæ conceptionis exclusionem: quo casu vterus legitime repurgandus est, ad methodum sub abortu commendatam.
- n) Quando autem mola *sola* gestatur, & indubia illius

signa prostant, singulis mensibus, ad exclusionem usque, pilulæ *Stahlianæ* per decem & plures dies possunt propinari, coniunctis aliquoties circa plenilunium balneis temperatis.

3. *Retentio secundinarum.*

- 1) Hæc citius expedienda est, antequam uterus post partum iterum occludatur, alias grauiores hæmorrhagiæ, lipothymia & febres inflammatoriæ putridæ succedunt.
- 2) Promouentur autem secundinæ
 - a) Per tussim voluntariam, vel sternutationem puerperæ.
 - b) Per lenem attractionem funiculi umbilicalis, cavendo tamen, ne fortiore conatu abrumpatur.
 - c) Per modestam & cautam manum obstetricis, mit geschmeidigen, dünnen Händen.
 - d) Per dosim pilularum *Stahlis* vel *Becheri*, siue in pulverem redactam, siue aqua fœniculi solutam.
 - e) Per hepar anguillæ, aqua quadam uterina propinatum.
 - f) Per iuscula crocata.
 - g) Per clysteres domesticos.
- 3) Si vero frustra quædam remanserint, & post duodecim fere horas motus febriles insequantur, putredo inhibenda & exterminanda est: in quem finem laudantur:
 - a) Pilulæ balsamicæ *Stahlis*, *Becheri*, per aliquot dies continuandæ.
 - b) Essent. alexipharm. cum essent. succin. myrrhæ, cort. cascarill.
 - c) Salina colliquantia & temperantia.

4. *Prolapsus uteri.*

- 1) Non confundendus est cum relaxatione vaginæ uteri, nam uterque status occurrit, licet non nulli auctores prolapsum uteri negent.

2) Ple.

- 2) Plenarius vteri prolapsus a ruptura ligamentorum illius, præcipue latorum, dependet.
- 3) Illapsus in vaginam vel sinum tantum pudoris a laxitate horum ligamentorum producitur. Causæ *antecedentes* multæ sunt.
- 4) Euenit sæpe sub vel post foetum enixum.
- 5) *Symptomata* periculosa inducere potest, e.g. vrinæ suppressionem, tumores inflammatorios, gangrænam, sphacelum, vel vlcerationes cancrasas. Nihil de sterilitate dicamus, quam inducere solet.
- 6) Restituitur
 - a) Manuali repositione, antequam intumescencia superueniat.
 - b) Adspersione aluminis & mastichis puluerisat.
 - c) Sufficiente calore, incubando asseri calido.
- 7) Quando autem prolapsus talis in habitum degenerauit, tractandus est vti *procidencia ani*. Conf. tab. de teneffmo, item tabula XCVIII. cautel. 4.
- 8) Dantur peculiæres machinæ, quarum adplicatione habituali tali malo occurritur, e.g. annuli seu circuli ex ebore parati, parantur etiam eius modi circularia pessaria e subere.
- 9) Plenaria autem vteri dissectio, vt in casu necessitatis ab auctoribus quibusdam commendatur, ita negotium est periculo plenum.

IV. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Principium vitale vt intentionem suam in aliis morbis non semper continuis, sed per interualla repetitis motibus prosequitur, ita etiam in negotio partus tales motuum spasticorum interruptiones occurrunt, quæ sane non culpandæ, sed perite potius considerandæ & æstimandæ sunt.
2. Sic enim obseruare licet, quod parientes motus experiantur sub initium leniores, quibus foetus sensim ad legitimum situm promouetur; germanice, daß sich das Kind sencket, und vor die Geburt tritt.

3. Post hunc laborem natura paullulum acquiescere sapius obseruatur, deinde motus de nouo suscipit ad vterum aliquo modo aperiendum.
4. Hunc laborem plurimum noua sequitur requies, donec tandem ad vltimum laboriosissimum actum natura accedit, nempe ad secundinarum rupturam, vteri maiorem reperationem, foetus ingressum, daß das Kind in die Geburt trete; & tandem eiusdem exclusionem.
5. Hic sensim procedens naturæ labor, admiratione dignissimus, non solum vix non attenditur, sed toto etiam die, imprudentia præcipue obstetricum, turbatur, præcocibus nempe ad partum hortamentis, pellentibus præmaturis &c. vnde parientis vires friuole consumuntur, vt iusto deinde tempore ad labores impares existant, vel foetus ipse in situm incommodum deueniat.
6. Ad graues hosce errores euitandos notetur, quod vix vquam consultum sit, ad labores parientem excitare, antequam notabilis vteri reperatio superuenerit, cum aquarum effusione, & foetus ingressu. Deambulet potius seu circumducatur parturiens in hypocausto, vel sedendo aut stando propiora partus indicia exspectet.
7. Maximum parturientis officium in eo saltem consistit, vt spasmos seu dolores ad partum, a natura excitatos, prudenter administret, abdomen nempe comprimendo, halitum profundius inspirando, inspiratum sub vigore dolorum diutius detinendo, detentum non vno impetu, sed lenissime expirando, ab inutili eiulatu, quiritatione, immorigera situs mutatione & volutione abstinendo.
8. Clamores autem contentiosi, qui sub vltima foetus eruptione contingunt, non adeo compescendi sunt, quoties cum abdominis pressione iunguntur: hi enim non retardant exclusionem, sed potius quodam modo eandem promouent.
9. Quod ad *pellentia* & partum promouentia remedia attinet, merito prius considerandum est, num iisdem opus sit:
si enim

si enim energia naturæ iam sufficit, metuendum sane, ne, addito stimulo, nimium motus intendatur, & nifus superfluus dolorificus, aut hæmorrhagiæ nimix post ea inlequantur.

10. Maxime hoc valet de *emmenagogis* vulgatis calidioribus, e. g. myrrha, succino, elixiribus vterinis, oleis destillatis, croco & borace largiore; quæ omnia vel plane non, vel caute & parce vsurpanda sunt.
11. Immo ipsæ vsitata *aqua spirituosæ*, e. g. cinnamomi, vini Hispanici, quæ scopo, analeptico sub partu exhiberi solent, discrimen subiectorum postulant: plethoricis enim & cholericis iunioribus moderatissime concedendæ sunt; alias hæmorrhagiæ vel febres acutæ inducuntur.
12. Conferunt potius talibus *nitrosa temperantia*, e. g. puluis antispasmod. quæ orgasmum sanguinis temperant, & faciliorem partus successum promouent.
13. *Obstetrices* sæpe valde imperitæ, immo stupidæ sunt, & hinc illegitimum foetus situm sapius accusant, ac eundem corrigere satagunt: vnde arcendæ sunt a tali conatu, quod si vero mali situs suspicio obuenerit, res peritioribus, siue feminis, siue chirurgis, relinquenda est. Ceterum imperitia esset, iudicium de situ foetus exquisitum ab obstetrice ante requirere vel comprobare, quam secundinæ ruptura & aquæ effusio facta sit.
14. Eædem temperare sibi debent a stolida & audace *apertione secundinarum*, siue acicula, siue vnguibus illa tentetur; nisi membranæ tenuiores vna cum foetu prodeant, vel ad modum promineant, aut, in præternaturali partu, placenta prius sese offerat: hæc enim artificialis apertio non æque, ac spontanea ruptura, late dehiscit, neque ita iustum foetui exitum præbet. *Vid. Ettmüllerus.*
15. Sic etiam tales imperitæ quouis modo arcendæ sunt a rudi tractatione, ne læsionem vaginæ, vesicæ, immo ipsi infanti inferant.
16. In partus conatibus, quando femina sellæ vel lecto inflexis

xis genibus imposita est, *collum & genua mantilibus circumligantur*, ne spastici dolores illa inflent, & tumores relinquant.

17. Ad vltimum exclusionis nisum tolerabiliorem reddendum, *sustentatio ossis sacri*, siue manibus validioribus, siue alio fulcro, magnum leuamen adfert.
18. *Hamorrhagia uteri* ante partum, vti periculo non caret, ita operæ pretium esset, si remedium illud, quod *Henricus ab Heer* tamquam indubium commendat, vteriori tentationi subiiceretur. Est autem illud *testiculus equinus*, in taleolos concisus, vino immersus, cribano exsiccatus, puluerisatus, & ad vsum repositus. *Videantur dicti auctoris obseruationes.*
19. *Aluus sicca* remoratur partum, vnde emollienda est clysteribus, laxantibus, senna, passul. min. iusculis. Denudatio vero corporis & refrigerium, præcipue humidum, magna pericula minantur.
20. Præ ceteris etiam corporis & animi mollities, inquietudo, impatientia, & anxietatis querelæ exclusionem foetus reddunt difficiliorem; præcipue quando hypocaustum est angustum & nimis calefactum.
21. Denique *expectatio legitimi temporis* non infimum in negotio partus locum habet: quæ feminæ statum tempus mensium non habent, nihil exquisite expectare possunt; hæc quando ad tolerantiam sanæ sunt, & distinctum foetus motum adhuc persentiscunt, de partus vltra calculum suum dilatione nihil habent metuendum.
22. Quæ vero statos menses habent, illæ medio gestationis tempore motum foetus adnoent, & viginti abhinc hebdomadas numerent: si harum finis incidat in illud tempus, quo menses fluere solent, de partu instante satis certæ esse possunt; vbi autem consuetæ mensium euacuationi illarum finis non respondet, partus vel paullulum differtur, vel maturius expectandus est, prout nempe mensium terminus finem viginti hebdomadarum transgreditur, vel eundem præcedit.

TABVLA CXXXVL
DE
ADFFECTIBVS PVERPERARVM

I. **A**DFFECTVS.

1. *Nimius lochiorum fluxus.*

Hunc morbum superius peculiari tabula exhibuimus.

1: *Suppressio lochiorum*, siue in totum, siue in tantum. De hoc itidem speciali tabula superius actum est.

3. *Febres inflammatoria.*

1) Hæ puerperis non raro accedunt.

2) Oriuntur

a) Vel a stasi sanguinis post partum laboriosum, & a secundinis retentis.

b) Vel a lochiorum suppressione;

c) Vel ab animi pathematibus, e.g. terrore, iracundia;

d) Vel a refrigeratione.

3) Sæpius sunt funesta.

4) Tractantur vti aliæ inflammatoriæ febres, & ita exposcunt

a) *Resolutionem* per salina, absorbentia semi-saturata, pulueres temperantes.

b) *Discussionem* per essent. alexipharm. cort. aurantior. in primis cort. cascarill. cum regimine leniter dia-
pnoico.

c) Non neglecto *alui successu* per globul. moschat. clysterem domesticum, e decocto hordei cum oleo anethi & sale, item per pilulas *Becheri* vel *Staklii*.

4. *Febris miliaris seu purpura.*

1) Hæc puerperas, vt ad læsionem subeundam magis dispositas, in vno & altero loco non ita raro infeitat.

2) Exhibuimus hanc febrem superius tabula speciali.

5. *Febris papularis.*

1) Hæc, latioribus maculis conspicua, puerperas etiam

subinde inuadit; germanice: die Messel-oder Wiebel-Sucht.

- 2) Mitescit solis temperantibus & absorbentibus cum leni regimiae & aquis diapnoicis temperatis.
 - 3) Tandem, post 14. circiter dies, sordes biliosæ laxante quodam conueniente, e.g. rhabarb. vel manna, iusculo carnis soluta, eliminantur.
6. *Diarrhœa cholericodes.*
- 1) Huic ansam facile præbent
 - a) Iracundia.
 - b) Potus vel frigidus vel faculentus, tanto magis uterque simul concurrens.
 - c) Suppressio fluxus sanguinis.
 - 2) Magnis torminibus, doloribus & febre intestinorum inflammatoria stipata, satis periculosum symptoma grauidarum existit, præcipue si post 3. 4. dies non imminuatur.
 - 3) Tractantur:
 - a) *Interne*
 - α) Absorbentibus, e.g. matre perlarum, oc. cancri, corall. C.C. vffo.
 - β) Post correctam materiam ad roborandum rad. gentian. rubr. conuenit.
 - γ) Interpositis subinde rhabarbarinis & subinnctis anodynis correctis.
 - δ) Exhibendo vbique potum temperantem largiorem.
 - ε) Euitando adstringentia & narcotica.
 - ζ) Nitrum non nisi in potu dilutiore adhibeatur.
 - b) *Externe* fomentis e resoluentibus & tonicis.
7. *Flatulentia lochialis.*
- Hanc discutunt
- 1) *Interne*
 - a) Puluis e conchis præparatis, antimonio diaphoretico & croco martis antimoniato teneriore paratus.
 - b) Oleum amygdalarum dulcium.
 - c) Spi-

- c) Spiritus tartari, salis armoniaci anifat.
 d) Essent. cort. aurantiorum.
 e) Nitrosa in calidioribus, spiritus nitri dulcis.
 f) Iuscula carminatiua, crocata.
- 2) *Externe* neruina conducunt.
8. *Dolores post partum.*
- 1) Hi oriuntur facile
- a) Post partum difficilem.
 b) A residuo quodam frusto secundinarum, vel ad minimum sanguine in vtero coagulato.
 c) A vitiis lochiorum siue excedentium, siue suppressorum.
 d) A refrigerationibus.
 e) A neglectu legitimæ ligaturæ abdominis post partum.
 f) A vehemente infantis suctione.
- 2) *Sopiuntur*
- a) Tinctura cort. aurant. recent. saturat. cum syrupo cort. aurant. & de citro mixta, ac in aqua melissæ exhibita; cauendo a tinctura castorei.
 b) Compositionibus e zedoar. carlin. pimp. alb. angelic. chamomill.
 c) Iusculis carminatiuis, nuce moschata conditis.
 d) Aquis pulegii, meliss. ceras. flor. tiliæ; cinnamom. cydonior.
 e) *Specificis*, e.g. semine nigellæ, iusculo pingui exhibitto, vrina mariti ad cochlear. I. propinata.
 f) His tamen omnibus palmam præripiunt pilulæ *Stahlianæ* vel *Becherianæ* genuinæ.
 g) *Externe*
- α) *Clysteribus* carminatiuis.
 β) *Fomentis* odoriferis e spiritu salis armoniaci cum spiritu apoplectico; item e dictis radicibus cum chamomill. roremarino, mentha rubra, flor. sambuc. bacc. lauri.
 γ) *Linimentis*, scrobiculo cordis adplicatis, ex ol. anethi, irino cum oleis destillatis carminatiuis, menth. carui.

- 3) Licet autem hi dolores rarius in primiparis, quam aliis, occurrere credantur, docent tamen non pauca exempla, quod non prorsus ab hoc incommodo liberæ sint.

9. *Pauores.*

His succurrunt

- 1) Analeptica temperata, emulsiva, gelatinosa.
- 2) Vfus modicus vini generosi.
- 3) Gemmata.

10. *Tumor abdominis.*

- 1) Hic ortum sæpe repetit a ligatura abdominis post partum neglecta.
- 2) Exigit carminatiua & resoluentia, quæ inquinamenta vteri expurgare ac debitum tonum restituere valent, e.g.
 - a) Rad. bryon. hellebor. nigr.
 - b) Herb. betonic. origan. chærefol.
 - c) Præ omnibus pilulæ *Stablii* vel *Becheri* per 14. dies continuatæ, & post mensis interuallum repetitæ.

11. *Tumor pudendorum.*

- 1) Existit a partu difficili.
- 2) Præter alia incommoda dysuriam inducit.
- 3) Succurritur:
 - a) Vnguento althææ, quod præsentē ardore & inflammatione qualicumque remisceatur cum vnguento albo camphorato.
 - b) Sacculis e floribus chamomill. sambuc. semin. lini & paullulum camphoræ paratis, lacte coctis, leniter expressis & impositis.
- 4) Ipsi autem dysuriæ, item incontinentiæ vrinæ, quo modo succurrendam sit, suo loco quærat.
- 5) Quando *vulneratio* in illis locis præsto est, liquamen myrrhæ, oleum ouorum, vel alia balsamica congrua locum habent; euitando pinguinosa, quæ tumores facile inuitant.

II. *CAVTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. Quam primum femina peperit, quanto cyus in lectum bene ca-

ne calefactum deferatur, & abdomen illius, unter denen Rippen im weichen, latiore mantili ligetur.

2. Præcipue autem ab omni aëre frigido defendatur: superne enim sudore & inferne secundinarum liquamine madida ægerrime refrigerationem tolerat.
3. His insuper habitis, facile lochiorum suppressio, febres, tormina, flatus, tumor abdominis ein saftigter Leib, gleich einer schwangeren Frau, succedunt.
4. Ceterum vulnerata instar tractanda est, & vires refocillandæ sunt:
 - 1) Per summam corporis *requiem*.
 - 2) Per concessionem ipsius *somni*, neglecta illa traditione, quod puerpera intra tres post partum horas non debeat dormire; nisi quidem lipothymica vel synoptica plane metuenda pericula contrarium suadeant. *Vid. cautela & prognosistabulæ de lipothymia, item num. 16.*
 - 3) Per *iuscula*, non spirituosa, sed temperata, e carnibus gallin. bubul. quibus cuminum incoquatur.
 - 4) Item per *iuscula* e cereuisia defæcata cum cumino.
 - 5) Per *gelatinosa* e rasur. C. C. ebor. cum citro, ol. amygdal. dulc. cum ovo recente. momento cinnamomi.
 - 6) Per *potum* ex aqua hordei, passul. typhor. C. C. paratum.
 - 7) Per vinum aqua largius dilurum, quod post quartum diem, quando lactis horrores perpesti sunt, liberalius concedi potest; quo tempore ipsum vinum generosum extraneum, modice sumtum, egregie reficit.
5. *Calor* hypocausti æqualiter vbique conseruetur, & *potus* frigidus summopere fugiatur.
6. Vulgi feminarum illa est superstitio, quod puerperæ longe minimum bibere debeant; quod tamen de potu frigidus vnice intelligendum est: immo ne conducit quidem, solo calido illo potu & decocto puerperas ita macerare, vt sapius conquerantur, viscera sua a feruidis illis iusculis semi-cocta quasi & adusta esse.
7. Inter *excretiones* primum locum tenent *lochia*: vbi cauendum,

- dum, ne per inquietudinem & calida remedia ac regimina ad nimium fluorem perducantur, neque etiam, siue actuali, siue potenciali refrigerio, supprimantur.
8. *Diapnoë* moderate promouetur, & si etiam largissime succedat in succulentis, phlegmaticis, minime tamen turbetur.
 9. Ad *alui solutionem* primis diebus non ita properetur, habet enim principium vitale in massa sanguinea tantum occupationis, nempe negotium lochiorum & lactis dirigendum, vt primas vias aliquo modo negligere cogatur.
 10. Hinc non consultum est aluum eo tempore irritare, multo minus ventriculum ineptis & solidis cibis onerare, ne natura a labore suo maxime necessario auocetur.
 11. Cum gaudio sane, non semel sed sæpius, obseruare licuit, quod *pilula Stabliana*, sigillo auctoris munita, & hinc genuina, puerperis, iisque accuratam diætam obseruantibus, a primo partus die vsque ad nonum exhibitæ, aluum prius non soluerint, quam quarto circiter die, sub optima interim puerperarum euphoria: testimonio satis euidente, pilulas hæc non agere stimulando, sed naturam roborando, & ad scopos necessarios inuitando.
 12. Quibus tamen pilulæ hæc ad manus non sunt, illæ ad alui siccitatem, flatulentos & anxios motus inferentem, adhibeant clysterem pure emollientem, oleum amygdalar. dulc. & cibos lubricantes.
 13. *Animi pathemata* cane & angue peius fugienda sunt: terror enim lochia supprimit, ira hæmorrhagias insolescentes, febres acutas, diarrhœas cholericas producit; vtraque vero pathemata syncopicas reddunt puerperas.
 14. Absit *lucis splendida* ad spectus; sæpe enim in tenerioribus visus inde debilitatur: item tinnitus & susurrus aurium, vel plane auditus grauitas, inducuntur.
 15. Fugiantur crebræ & diuturnæ *sermocinationes*, excalefactionem sanguinis facile concitantes.
 16. Puerpera, largioribus lochiis exhausta, si in *syncope* aliquoties delabatur, & perpetuo obdormiscere gestiat, relin-

resuscitetur, ne hinc in lethalem soporem transeat.
Conf. num. 4. litt. b.

17. Solent mulierculæ protinus a partu *sacculos* carminatiuos abdomini imponere; quod minime improbandum; ad flatus enim discutiendos conducunt.
18. Sic etiam genitalibus, pariendi labore tumefactis, vinum calidum, linteis imbibitum, adplicant.
19. *Calida* in iuueniculis, præcipue plethoricis, maxime vitanda, & vires vinosis circumspecte excitandæ sunt.
20. *Orgasmus* sanguinis vbique occupetur per absorbentia, & nitrosa.
21. Ante nonum diem *lectum* non deferant puerperæ; neque prius *hypocaustum*, quam post 5-6 hebdomadas, quo tempore non incommodum est, nodulo quodam laxante, vel pilulis *Becherianis* leniter illas repurgare.
22. Si lochia non satis fluxerint, & largior diaphoresis successerit, pellentibus ea non reuocentur, sed diaphoreticis fixis & alexipharmacis res expediatur.



TABVLA CXXXVII.

DE

AFFECTIBVS LACTANTIVM.

I. AFFECTVS.

1. *Horrores lactis*, *Milch-schauer*.

1) Hi circa tertium vel quartum diem persentiscuntur.

2) Nulla directe medicatione indigent: sufficit circum-spectum regimen diapnoicum, & promotio perspirabilitatis mammarum.

3) Quando autem notabilis calor, vel febris plane inflammatoria iungitur, antifebrilia temperata adhibeantur.

2. *Inflammationes erysipelaceæ mammarum*.

Hæ, vti aliarum partium, optime discutiuntur.

M m m m m m

1) Spi-

- 1) Spiritu vini camphorato, essentia croci parce mixto.
 - 2) Sollicita externi caloris conseruatione.
3. *Lactis perruptio difficilis.*
Promouent hanc
- 1) Aluus laxa, per clysteres carminatiuos obtinenda.
 - 2) Lenis diaphoresis.
 - 3) Temperantia cum interpositis alexipharmacis.
 - 4) Obtectio mammarum cum panno.
 - 5) Fricctio illarum cum excutia.
 - 6) Focus per pelliculam mustelæ.
 - 7) Suctio.
4. *Lactis defectus.*
- 1) Defectus lactis est vel *totalis*, vbi nullum plane lac mammas ingreditur; vel *partialis*, ad infantem alendum non sufficiens.
 - 2) *Totalis* defectus obseruatur præcipue in illis, quæ nimis sero matrimonium inierunt, & insuper temperamenti sunt cholericici.
 - 3) *Imminutio* autem, seu *partialis* lactis defectus, dependet vel a sero falso; vel ab alimenti sufficientis inopia; vel a mœroribus & aliis animi afflictionibus.
 - 4) Vbi humores falso-biliofi peccant, ibi
 - a) Corrigantur per absorbentia, e.g. crystall. præparat. item lac lunæ, lumbricosterrestres.
 - b) Euacuentur per pilulas *Stahlii*, *Becheri*.
 - 5) Vbi vero iustum alimentum deficit, lactis defectus refarcitur
 - a) Cibis eupeptis, nutrientibus, emulsionibus, lacte animalium, pultaceis.
 - b) Carminatiuis, præcipue seminis cumini, nigellæ.
 - c) Plebs lardum cum lacte coctum celebrat.
5. *Lactis abundantia.*
- 1) Hæc imminuenda est, alias varia incommoda circa mammas, nempe nodi & abscessus, oboriuntur.
 - 2) Occurritur
 - a) Suctione alius simul infantis, vel catuli.
 - b) Emulsionem.

- c) Diætā parciorē, dilutā, potulentā.
 d) Sufficiente corporis labore.
- 3) Ad plenariam vero lactis *discussionem*, si vel non possint, vel, pro moribus corruptis, nolint lactare, adhibeantur
- a) *Interne* alexipharmaco-diuretica, & digestiua salina.
 b) *Externe*
- α) Sacculi sicci ex herb. chærefol. petroselin. menthæ, femin. coriandri, petroselini, camphora, parati.
 β) Spiritus vini camphoratus, crocatus, cum linteis applicatus.
 γ) Pro ditioribus cera alba liquetur, paullulum succi citri & camphoræ, in oleo solutæ, drach. I. addantur: huic liquamini linteam intingatur, statim per frigidam aquam trahatur, & post ea applicetur.
6. *Lactis tenuitas aquosa.*
- 1) Hæc vel a diætâ, vel concoctionis, vel humorum vitio dependet.
 2) Infantes atrophici inde redduntur.
 3) Corrigitur hæc tenuitas
- a) Diætâ mutatione.
 b) Primarum viarum expurgatione per pilulas *Becheri*, extract. panchymagog. *Crollii*.
 c) Harum deinde roboratione per stomachica.
 d) Serosorum humorum euacuatione per conuenientia phlegmagoga, e.g. ialappina.
7. *Lactis salsedo, & biliosa fluedo.*
- 1) Hæc vitia tormina, diarrhœas, vomitus, adfectus cutaneos scabiosos, immo exulcerationes & febriles ardores infantibus inducunt.
 2) Emendantur
- a) Absorbentibus, e.g. ocul. cancri, conch. præparat. matr. perlarum: nitrosis, rhabarbarinis.
 b) Diætâ conueniente, abstinendo a cibis nimium salsis, acidis, aromatizatis, item a potu spirituosissimo, corporis & animi excandescencia.

8. *Lactis mucida crassities.*

- 1) Hæc facile nodos mammarum inducit.
- 2) Attenuatur
 - a) Alexipharmacis.
 - b) Lenibus laxantibus, e.g. piululis *Becherianis*.
 - c) Moderato vini vsu.

9) *Stasis lactis.*

- 1) Hæc discutitur iisdem remediis, quæ num. 5. ad lactis plenariam discussionem commendata sunt.
- 2) His adnumeranda veniunt:
 - a) *Interne* absorbentia, crystallus montana, item sperma ceti.
 - b) *Externe*
 - α) Emplastrum de spermate ceti cum sale volatili vrinoso subactum.
 - β) Emplastr. diaphoret. *Mynsichti*.
 - γ) Compressio per vestimenta arctiora.

10. *Nodi mammarum.*

- 1) Hi a lactis vberiore adfluxu, mucosa crassitie & stasi exoriuntur.
- 2) Resoluuntur
 - a) Emplastris, modo commendatis, bona portione feminis petroselinis & coriandri imbuendis.
 - b) Frictionibus cum excutia fetacea, non valde aspera.
 - c) Pellicula mustelæ confricando & imponendo, quæ res in sensibilibus non contemnenda est.

11. *Abcessus mammarum.*

- 1) *Maturandus* est tempestive, vbi locum non magis habet discussio.
 - a) Emplastrum quoddam maturans circumferentiæ tantum dolenti imponatur.
 - b) Latius autem circa vel spiritus vini camphoratus crocatus, vel emplastr. de spermate ceti, aut diaphoreticum *Mynsichti*.
- 2) Facta maturatione *aperiendus* est abcessus per lancetam, si sponte rumpi recuset.

3) De-

- 3) Deinde, vt *penitius emolliatur* apertus abscessus, emplastrum diachyl. simplex, siue solum, siue diachylo cum gummi pondere æquali remixtum, addita camphora, adplicetur.
- 4) Hoc scopo obtento a digestiuis abstinenceatur, & solis *balsamicis* mundificantibus res absoluat, e.g. liquamine myrrhæ, vel, si hoc non sufficiat, mixtura ex essentia myrrhæ, succini & modico spiritus terebinthinæ parata.
- 5) Si vlcerosa inquinamenta simul adsint, lenia septica decocto tabaci, ol. philosoph. addantur.
- 6) *Interne*, si nihil obstat, laxatio tam in stasi, quam abscessu conducit, coniunctis diureticis, præcipue salinis, & nitrosis.
- 7) *Chirurgi* vana opinione ducti sæpe dubitant, in media mollitie abscessus apertionem instituere, utpote in loco decliuore: hinc ambitum eius, adhuc duriorrem, grauissimo certe periculo, infestant.
- 8) Vti leuiores mammarum abscessus incongrua tractatione in cancrasas vlcerationes deducuntur: sic contra facillimo modo breuique tempore perfanari possunt, si immodesta maturatio excludatur, discutientia continuentur, acria remedia proscribantur, & simplex tantum deligationis ac digestionis apparatus adhibeatur.

12. *Papillarum fissura.*

- 1) Hæc multa incommoda, insigni dolore stipata, infert.
- 2) Sanantur
 - a) Oleo ouorum cum liquamine gemmarum populi, loco alius pinguedinis, subacto.
 - b) Oleo ceræ.
 - c) Oleo lini cum ouis conquassato.
 - d) Butyro cum recentibus floribus calendulæ in formam linimenti redactio.
 - e) Liquore florum verbasci maris, & calendulæ in cli-bano parato.

Mmm mmm 3

f) Li-

- f) Liquamine myrrhæ.
- g) Vnguento de glycyrrhiza.
- h) Suctione matura cum vitro ad hoc negotium adaptato, *Ziche-Glasß*, antequam lac spiffescat.
- i) Præcauet hanc fissuram cupula cerea papillis iugiter ante & post partum imposita. Item *papilla vaccina* præparata & papillis lactantis traducta.

13. *Papilla nimis parua.*

Parua & nimis laticantes papillæ euocantur

- 1) Maturo emulsionis tentamine, præcipue in primiparis.
- 2) Suctione infantis robustioris.
- 3) Adplicatione vitri, angustioris colli, antea tolerabiliter calefacti.
- 4) Quando autem iustam papillarum conformationem compressionibus vestium & thoracum a iuuentute turbarunt, non mirandum, si post hac auxilia frustra adhibeantur.

14. *Ablactationis incommoda.*

Hæc euertuntur

- 1) Vel rara & parca suctione alius infantis, minus minusque de die in diem suppeditando.
- 2) Vel emulsione rarius & parcius, præcipue per vitrum, instituta.

II. *CAVTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

- 1. Commodum *alimentum* ad boni lactis productionem omnino necessarium est: consistit autem illud non in scrupulosa & delicata diæta, sed in simplice magis victu, sub corporis sufficiente motione adsumto.
- 2. Hoc adeo verum est, vt rusticæ plurimæ, *tenui auena* ventres, longe melius lac infantibus suis offerant, quam delicatula, otiosa, plenissimo cupediarum adparatu.
- 3. Conuenit tamen a dyspeptis, flatulentis, acidis, nimium salitis, abstinere: hæc enim, licet non semper matri, sæpius tamen infanti varia incommoda pariunt. *Acrida* quoque & *aromatica* parcius sumenda sunt.
- 4. Quod ad *potum* attinet, in vsum veniat cereuisarius, bene defæcatus: spirituosus autem, immo, in minus adfueris, per-

- perpetuo vinofus, minime commendetur, ob metuen-
das inde infantum conuulfiones.
5. Potus *frigidus*, & externa refrigerationes mammarum, lactanti & lactenti faepius detrimentum adferunt.
 6. Placidus corporis *motus vniuerfalis* vti plurimum confert, ita *particularis mammarum* insignem habet vsum, nempe frictio & pressio illarum, vt aquofum lactis propellatur, & ductus lactiferi amplificentur.
 7. Hic accusanda est vanitas illarum, quæ a primis iuuentutis annis, ad iunceam corporis gracilitatem sibi conciliandam, *thoracibus* mammas arcte constringunt, vt non solum tubuli lactei, sed & papillæ repressæ, debitam conformationem non adsequantur.
 8. *Animi pathemata* quam maxime noceant, quotidiana docet experientia; præcipue autem incommoda mammarum erysipelacea, nodi & abscessus inde proueniunt: hinc terrore aut ira commotæ mammas molliter prius fricent, & lac emulgeant, quam infantem admittant.
 9. Mensium, lactationis tempore, eruptio infantem varie adficit: hinc nec expectanda, nec promouenda est.
 10. Ad coagulationem lactis præoccupandam, infans, si vegetus sit, statim adplicetur: vtile enim est colostrum; vel moderata mammarum expressio ante surrogetur, quam præualuerit infarctus.
 11. Spiritus vini camphoratus *aquosior*, vti alias in morbis erysipelaceis, sensibilia subiecta & loca occupantibus, insigniter nocet, ita & hic non exigua mala parturit. Idem damnum a mixtura illius cum vnguinosis tenacibus, balsam. Peruvian. &c. expectandum est.
 12. *Nutrices* temere conducere, religioni matres sibi ducant: certe in se ipsas, proles suas & rem publicam peccant; vbi autem summa necessitas id vrget, sollicitè prius corporis & animi conditio eligendæ personæ examinetur. Lac diiudicandum si vsitato more offertur, Medicus caute se gerat. Vti enim quæcumque illius vitia correctionem admittunt: sic vnicum animi pathema plus damni in lactentem transferre potest, quam lactis vitiosa qualitas, quæ sine animi commotione contracta fuit.

TABVLA CXXXVIII.
DE
ADFECTIBVS INFANTVM.

I. **S**VBIECTA.

1. Non omnium promiscue, sed mollium, otiosorum, delicatiorum, corpore & animo sensibilibus hominum infantes morbis plerumque expositi, & tanto maiore commiseratione atque auxilio digni sunt, quanto innocentius aliorum vitia & errores luere coguntur.
2. Infantes autem a durioribus parentibus geniti, & durius mox a partu habiti, non ita facile in morbos, citra exterius iniurias, coniiciuntur.
3. Immo talium infantes sensim ita obfirmantur, ut & iniurias externas multo facilius superare possint.

II. **ADFECTVS.**

1. *Anaesthesia, seu immobilitas infantis.*
 - 1) Occurrit interdum, ut infans, recens natus, immobilis, & tamquam mortuus, iaceat.
 - 2) Excitatur
 - a) Inspiratione in os, & intestinum rectum per fistulam clysteris.
 - b) Fumo croci, naribus immisso.
 - c) Adspersione aquæ frigidæ, vel potius vini.
 - d) Suctione mammillarum.
 - e) Cepis dissectis, & naribus admotis.
2. *Color flauus, icteroides corporis.*
 - 1) Frequens quidem est hic color, sed nullius periculi.
 - 2) Cedit aquis diaphoreticis cum antimon. diaphoret. & syrupo laxanti.
3. *Difficultas deglutiendi.*
 - 1) Quando a frenulo linguæ maiore prouenit, hoc incidendum est. Conf. tabula CII.
 - 2) Aphthæ si in caussis sint, hæc methodo, inferius commendata, tractentur,

- 3) In tumore linguæ aquæ discurrentes adhibeantur.
 - 4) In eiusdem vero exulceratione oleum ouorum vsui sit.
 - 5) Mater quando in culpa est, vt vel lac deficiat, vel papillæ non satis promineant, &c. hæc vitia corrigantur secundum methodum, præcedente tabula commendatam.
4. *Distorsio caluaria.*
- 1) Hunc adfectum feminæ vocant: geschobene Köpfe.
 - 2) A partu difficili exoritur, nempe quando fœrus caput diuturna, intra collum vteri, detentione fortius comprimitur.
 - 3) Prudentis obstetricis vel chirurgi manu ad naturalem statum caput reponendum est.
5. *Hydrocephalus.*
- 1) Hæc serosa capitis intumescencia sæpe excipit caluariæ distorsionem, & eadem causa fundatur.
 - 2) Maturum auxilium postulat, quod euoluatur *tabula de hydrope particulari*; item *tabula chirurgica XXVI.*
6. *Imperforatio.*
- 1) Contingit aliquando, licet rarius, vt emunctoria non solum vrinæ, sed & fæcum aluinarum, obturata sint.
 - 2) Enascuntur hinc graua damna, & nisi mox auxilium præstetur, res conclamata est.
 - 3) Vbi membrana præternaturalis præsto est, ibi sola manus chirurgica requiritur. Conf. *tab. chirurg. LXXVII.*
 - 4) In causa obturantis mucilæniora abstergentia, e.g. lapis percarum, conch. semi-saturat exhibeantur.
 - 5) Coniunctis externe cataplasmatibus, cathetere, clystere.
7. *Neni materni.* Mutter-Mähler.
- 1) Non a quolibet visu, sed illo demum exoriuntur, qui cum peculiari aestimatione ipso animo confingitur; siue desiderii, siue auersionis, terroris, timoris.
 - 2) Hæ maternæ mentis fictiones infantis animæ post ea imprimuntur. *Vid. D.D. Stahl's dissertatio de affectibus grauidarum.*

- 3) A medio gestationis tempore ad partum vsque contingere obseruantur.
- 4) Dissolutio erroneæ huius structuræ passim obtinetur :
- a) Per secundinarum & sanguinis recentis lochialis adplicationem, non solum de matre propria, sed etiam alienis puerperis; modo infans, næuo tali affectus, ætate adhuc sit teneriore: in sensibilibus pubertatis ætas non omnem spem excludit.
 - b) Per sanguinem piscis barbi.
 - c) Per lignum fulmine tactum.
 - d) Laudantur etiam magnetica.
 - e) Item ros maialis.
- 3) *Retentio meconii.*
- 1) Hæc multa grauiora mala inducit, præcipue tormina flatulenta, cardiogmum, inquietudines, clamores, difficilem respirationem, pauores, conuulsiones.
 - 2) Vel tandem prorumpunt deiectiones biliosæ, decolores, æruginosæ, vitellinæ, wie gebackte Eyer.
 - 3) *Euacuandum* hinc est meconium primis post partum diebus:
 - a) Per syrup. de cichorio cum rhabarb. cui paullulum oxymell. squillitic. addatur.
 - b) Per syrup. rosar. solutium.
 - c) Per oleum amygdal. dulc. cum saccharo penidio.
 - d) Per succum rhabarb. cum manna vel syrupo folior. fennæ remixtum.
 - e) Per colostrum infanti propinatum.
 - f) Per pilulas *Becheri* vel *Stahlii*, matri vel nutrici singulis primis diebus exhibitas.
 - 4) Quando autem in diarrhœam erumpit, euacuantibus hisce coniungi debent corrigentia, quæ ardorem contemperant, in quem finem conducunt:
 - a) *Absorbentia*, præcipue crySTALLUS montana, siue per se, siue cum grano semis auri fulminantis exhibitæ; *vid. Ettmüllerus.*
 - b) *Mucilaginosæ*, e.g. gummi tragacanth. arabic. decoctum hordei, auenæ.

9. *Oppletio pectoris asthmatica*: das Köcheln auf der Brust. Occurritur huic

- 1) Prædictis laxantibus; item syrupo de alth. erysim. capill. ven.
- 2) Mercurio dulci ad gran. 1-2. propinato.
- 3) Emetico e syrupo & conferua flor. persic.
- 4) Vel antimonio diaphoret. cum duabus partibus nitri detonato.
- 5) Sulphure antimonii *seniore* cum acido tartari præcipitato: dosis a quarta grani parte, pro infantis ætate, ad granum integrum ascendit.
- 6) *Resolventibus*: rad. irid. Florentin. ari, spermate ceti, essent. alexiph. succin. aquis diapnoicis, tartaro vitriolato, cum absorbente permisto.

10. *Tussis*.

Hæc auscultat iisdem remediis resolventibus & laxantibus, quæ aduersus pectoris oppletionem modo commendata sunt.

11. *Coryza & grauedo*.

- 1) Hæc pariter per modo dicta remedia expugnantur.
- 2) *Externe* simul in subsidium vocentur aqua vel butyrum maioranæ.
- 3) Lactanti autem feminæ in eius modi casibus catarrhalia exhibeantur.

12. *Oculorum & aurium manationes serosa*.

- 1) Exhibeatur ad aliquot guttas essent. pimpinell. alb. cum essent. cort. lign. sassafr. remixt.
- 2) Interponantur laxationes, præcipue per mercurium dulcem.
- 3) Quo magis acris est materia, eo magis coniungantur mucilaginosæ, e.g. mucilag. femin. cydon.

13. *Raucedo*.

Hæc demulcetur incrassantibus, obtudentibus & delinientibus, e.g. oleo amygdalar. dulc. syrupo violar. aquis diapnoicis, mucil. fem. cydonior.

14. *Intertrigines*.

- 1) Hæ exoriuntur per occasiones sudoris, vrinæ, & acrimiam facum aluinarum, præcipue si a nutricibus ita squalide habeantur, vt harum rerum contactum diutius tolerare debeant infantes.
 - 2) In tali casu succurritur inpersione farinæ volatilis cum pauxillo camphoræ & cerussæ, item farinæ triticæ vel fæcalinæ.
 - 3) Si vero causæ *interna* subessent, interna simul pro rei conditione requirerentur.
15. *Obstructio narium mucosa.*
Hæc referatur aqua & butyro maioranæ.
16. *Vomitus.*
- 1) Hic moderate succedens subleuat potius, quam debilitat infantes.
 - 2) Quando autem excedere videtur, mucus intestinalis *κίτω* per clysterem educendus est.
 - 3) Adplicato simul *externe* emplastro, vel balsamo potius, stomachali.
17. *Diarrhæa biliosa, aruginosa, vitellina.*
Hæc tuto sistitur abstergentibus e matre perlarum, crystallo montana & antimonio diaphoretico.
18. *Obstructio alui.*
- 1) Excretio aluina durior & rarior, educto prius legitime meconio, præstat quidem molliore: robur enim infantis designat;
 - 2) Quando autem aluus vere obstructa est, soluitur:
 - a) *Interne* lenioribus laxantibus, superius sub num. 8. indicatis.
 - b) *Externe* per clysterem, suppositorium, præcipue e radice petroselinii adaptatum.
19. *Achores, crusta lactea, tineæ, & aliæ cutaneæ ulcerationes.*
- 1) Lactanti & lactenti exhibeantur lympham corrigentia, maxime essent. cortic. ligni sassafras.
 - 2) Interponantur conuenientes laxationes, præcipue per mercurium dulcem.
 - 3) *Externe* infanti adplicentur:
- a) Ole-

- a) Oleum ouorum cum oleo philosoph. remixtum, quod mundificat & consolidat.
 b) Oleum cheirinum, per infusionem paratum, cum olei philosophorum parca quantitate mixtum

20. *Impetigo.*

- 1) *Interne* conueniunt laxationes, alexipharmaca & absorbentia sulphurata.
 2) *Externe* capilli euellendi sunt, siue manibus, siue emplastis e pice, colophon. fermento &c. paratis: subiuncto fotu ex oleo laterin. ouor. essent. succin. sulphure.

21) *Parotides.*

- 1) *Interne* ad resoluendum exhibeantur lympham corrigentia, e.g. essent. alexipharmaca.
 2) *Externe*
 a) Emplastrum de tacamahaca.
 b) Epithema siccum e rad. irid. Florentin. aristoloch. long. herb. hyssop. sem. foenicul. farin. fabar. flor. chamomill. camphora, paratum & saepius calefactum.

22) *Aphtha.*

Sunt vel benignæ vel malignæ &c.

- 1) Dignoscuntur inflatione linguæ, cortice albo obductæ.
 2) Oriuntur vel a suctione, vel interno feruore.
 3) Absterguntur linteis, vino calido, cui mel & saluia immittenda, imbuto; item panno paullulum aspero, syrups acriusculis, e.g. diamor. dianuc. rob. cerasor. acidor. dilut. cum aqua saluiæ. Conf. tabul. med. LXXI. & chirurgica LXXIV.
 4) *Interne*, si febris concurrat, iungantur antifebrilia, præcipue aquæ diapnoicæ, & laxantia rhabarbarina.

23. *Dentitio.*

- 1) Prorumpunt ordinarie dentes priores circa vicesimam hebdomadem.
 2) Præcedit pruritus gingiuæ, e digitorum, vel aliarum rerum, in os intrusione colligendus.

- 3) Succedunt veri dolores, ex inquietudine, vigiliis, clamoribus coniciendi.
- 4) In aliis obstructio alui concurret, vbi negotium difficilius succedere, & notabilior febrilis æstus præsto esse, immo pauores, aut plane conuulsiones accedere, obseruantur.
- 5) In aliis autem vomitus vel diarrhœæ accedunt, & his dentes facilius prorumpere solent.
- 6) Vbi adstrictioris alui sunt, ibi lenes clysteres, laxationes, superius num. 8 nominatæ, conueniunt.
- 7) His subiungantur antifebrilia, diapnoica, antepileptica e lumbric. terrestr. cinnabar.
- 8) Externe autem gingiuarum cum dente lupi, lardo &c. fricentur.

24. Febriles motus.

His succurritur

- 1) *Interne*: aquis diapnoicis, colliquantibus, ostracodermatis semisaturatis, cum antimon. diaphoret.
- 2) *Externe*, si aluus adstricta est, clysteribus.

25. Pauores.

- 1) Quando *materia* is causa subest, hæc prius tollatur.
- 2) Si vero nulla talis causa subesse deprehendatur, satis efficax est hyacinthus orientalis.

26. Conuulsiones.

Hæ, pro causarum diuersitate, diuersæ etiam tractandæ sunt, e.g.

- 1) Excretiones sudoris repressæ promoueantur essentia alexipharm. succin. liquore C.C. succinato, interposito mercurio dulci.
- 2) Acrimonia, in intestinis hospitans, demulceatur oleo amygdalar. dulc. crysallo montana, subiuncto euacuante rhabarbarino.
- 3) In stasibus lymphalibus eadem remedia conducunt, quæ sub num. 1) indicata sunt.
- 4) In causa magis ferosa radix valerianæ, & aurum fulminans, præcipue laudantur.

5) In

- 5) In acutarum epilepsia cinnabaris, largiuscule propinata, conuenit.
- 6) In vermium caussa mercurius dulcis & myrrhata conducunt.
- 7) In statu *idiopathico* commendantur varia specifica, quæ tabula de *epilepsia* nominata sunt.

27. *Atrophia.*

De hac & rachitide vid. tabula de *atrophia*.

28. *Vermes.*

Tabula de vermibus euoluatur.

29. *Crinones, Nit. Esset.*

- 1) A materia lymphatico-mucosa, poros obstruente, & ibidem in corruptionem abeunte, originem ducere videntur.
- 2) Primo loco balnea adhibeantur;
- 3) Deinde tergum lacte illinatur,
- 4) Et quando capite crinones, prominent, nouacula abradantur.
- 5) Multi autem hic committuntur errores & caussarum fallaciæ. Sic notum est exemplum, vbi 5 hebdomadarum infantis vmbilico adplicabant nucis iuglandis corticem, melle, vitro veneto & farina triticea repletum. Cumque in hac massa foramina quædam intra horæ spatium adparerent, crinones accusabant; licet infans bene valeret.

30. *Strabismus, das Schielen.*

- 1) Aliquando a conuulsionibus prægressis remanet:
- 2) Aliquando autem ex mala aduëitudine contingit.
- 3) *Pharmacia* hic nullum habet locum, bene vero tarda *correctio* & desuefactio aduëitudinis illius peruersæ. In hunc finem peculiare machinæ inuentæ sunt.

31. *Fascinatio.*

- 1) Laudari solet balneum, ex herbis specificis antimagicis paratum, v.g. absinth. hyperic. sideritide, antirrhino, abrotano, polytrich.
- 2) Si corporis consumptio, sine euidente caussa, simul præsto

sto fit, serpillum addatur, coniunctis internis, atrophix destinatis.

32. *Cardiognus*, das Herzk. Gespänn.

- 1) Obstructionibus alui, torminibus, flatibus, & primarum viarum sordibus fouetur, vnde ventriculus & præcordia inflata sunt.
- 2) Aliquando a sudoribus vel achoribus repressis inducitur.
- 3) Iisdem remediis profligatur, quæ contra pectoris op-pletionem num. 9. commendata sunt.
- 4) Hoc malo quando laborant infantes, accusant vulgati-ssimo more in hisce quidem regionibus violentam caus-
sam, nempe *distorsionem subluxatoriam* das Verbrechen, in aliis autem Germaniæ prouinciis das Untwach-sen.
- 5) Præter ea in omnibus fere morbis, tam infantum, quam adultorum, hic loci accusare solent eius modi caus-
sam violentam prægressam, dicendo: der Patient hats vom Verbrechen bekommen, hat sich so stark unter der Arbeit angegriffen. Vnde necessarium est, vt pauca de his rebus dicamus: mox enim ad remedia partim frivola partim periculosa confugiunt, nempe vel ad pres-siones cum digitis oleo inunctis, vulgo streichen, vel ad violentas extensiones & repositiones, sie ziehen und martern den Patienten, bis es gefnactet hat.
- 6) Quæ damna vero ex falsis hisce indicantibus & indica-tis in ægros deriuentur; tristis loquitur experientia, & vidimus sane herniam scrotalem in tenellulo quo-dam sub ipsa extensione productam.
- 7) Non negamus quidem, dari aliquando eius modi vio-lentas distorsiones subluxatorias, vti in adultis sub ni-mis vehementibus & imperuosis laboribus, ita & in infantibus per incuriam ancillarum, wenn man die Kin-der hat schnappen lassen, rarissime autem has violentias occurrere, certissimum est.
- 8) Quando enim in adultis hanc distorsionem accusant, est

est saepe adfectus vel hypochondriaco-hystericus, vel spastico-arthriticus, speciatim lumbago hæmorrhoidalis; id quod vel exinde patet, quia ex leuissimis ordinarie causis excitatur, wenn man sich nur ein wenig schnelle bückt, ausstreckt oder umdrehet.

- 9) Vnde omnino mirandum est, quod vulgatissimus hic error ipsos adeo præclaros Medicos occupauerit. Specimen qui desiderat, legere potest *casum LVIII. in colleg. consultatorio Ettmülleri.*
- 10) Tanto magis autem mirandum est, quod in tenellulis hanc distorsionem subluxatoriam tam frequenter accusent: hi enim a violentis actibus & laboribus satis immunes sunt. Vnde extensiones illorum *torturæ* possunt adnumerari. Clysteres sane lenientes & carminatiui, aliquoties repetiti, periculoso huic tentamini longe sunt præferendi.

III. CAUSSÆ.

1. Vti de his sub ipsis morbis passim aliquid diximus, ita hoc loco summam adhuc notare conuenit, quod plurimi morbi infantibus ingruant a causis mere externis, pauciores sane ab interna ad morbos dispositione.
2. Sunt autem *externa* tales causæ præcipue sequentes:
 - 1) *Aeris* subitæ mutationes, dum enim ab aliorum arbitrio penitus pendent, modo lectis nimium recti incallescere & sudare coguntur, modo calentes, immo sudantes ex illis erepti, frigori immodeste exponuntur. Hinc oriuntur morbi
 - a) *Catarrhales*, e.g. tussis, coryza, oculorum & aurium manationes serosæ, oppletiones pectoris cum ronchis.
 - b) *Cutanei*, e.g. achores, crusta lactea, quo etiam referri possunt parotides, crinones.
 - c) *Febriles*.
 - 2) *Cibus & Potus* dum vel *quantitate* immodica, vel *qualitate* inconueniente, ipsis obruduntur. Pertinent huc

in primis lactis vitia, de quibus præcedente tabula iam dictum est, e.g.

- a) Lac tenue, biliosum, excitat tormina & deiectiones biliosas.
 - b) Lac nimium pingue inducit oppletiones pectoris, asthmata, immo catarrhos sic dictos suffocatiuos.
 - c) Lac impurum & venerea labe inquinatum infert adfectus vlcerosos, scabiosos malignos.
- 3) *Motus & quies.* His varia incommoda infantibus obliiciuntur: spectant hæc
- a) Immodestæ volutationes in cunis, quando pigræ nutrices vi quadam somnum per tantam concussionem obtrudere tentant, eo ipso autem infantes vertiginosos reddunt.
 - b) Ineptæ fasciarum stricturnæ, vnde motus voluntarius & circulatorius turbatur.
 - c) Præmaturæ ad standum & ambulandum coactiones.
 - d) Luxationes & distorsiones.
 - e) Interpellatio & turbatio quietis, vnde quoad animum morosi, quoad corpus autem torpidi infantes redduntur.
- 4) *Excretiones suppressæ, præcipue meconii.* Licet hæc a vitio principii vitalis deduci possint, non minimum tamen aliorum hominum errores & peruersæ administrationes contribuunt; vbi præcipue nutricum cruda, acida, vel alia inconueniens diætâ, & iniuriæ aëris accusantur.
- 5) *Animi pathemata.* Hæc merito ad extraneas etiam causas referuntur, ab aliis enim potissimum excitantur, e.g.
- a) Iracundia, quæ non solum ab hæreditaria parentum malitia, sed & variis externis irritamentis concitatur.
 - b) Terror stolidis gestibus, pulsationibus, trepidis clamoribus, infantibus incutitur, vnde pauores excitantur.

IV. PROGNOSIS GENERALIS.

1. Licet infantes ob nimiam corporis teneritudinem præ adultis grauius a morbis affligi iudicandi sint, docet tamen experientia, præcipue variolarum exemplo, quod morbidæ afflictiones minus illis periculi, quam adultis, adferant: vnde adfertum vulgi: ein Kind kan viel außſtehen, veriffimum est.
2. Quando autem autocratia naturæ in infantibus vel frigoris impedimentis, vel aliis externis iniuriis, friuole turbatur, tum maiores in illis ataxiæ, quam in adultis, metuendæ sunt.
3. Facile enim in tali perturbationis casu infantis natura ad vltimum illud & vehementiffimum conamen, nempe motus conuulſiuos, conuolat; quos si mature, viribus nondum exhaustis, ſuſcipiat, res minoris est periculi, quam si extremo veluti molimine hanc luctam vltimo adgrediatur, vbi non raro, nimium defatigata, penitus aufugit.
4. Conuulſiones *interna*, magis hypochondriacæ, torminoſæ, ſingultuoſæ, der innerliche Jammer dictæ, cum repentinis clangofis exclamationibus, infantibus intra terminum ſex hebdomadam adhuc incluſis, ſæpius ſunt lethales.
5. *Conſuetæ* conuulſiones vti facilius aliis malis ſuperueniunt, ita minus etiam periculi adferre obſeruantur.
6. Ceterum omnes morbi infantiles, ſiue ſponte, ſiue congrua arte, expugnati, breuiorem periodum & exitum habere conſtat: vnde etiam infans non facile febris *intermittenti* ſuccumbere deprehenditur.

V. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Vti omne punctum medelæ, infantibus adferendæ, corrigentibus & euacuantibus abſoluitur, ita leniora, tenera & ſecura pro hac infantili ætate omnino ſeligenda ſunt.
2. Hinc *eſſentias* non ingrediantur *acriora*, e.g. zedoaria, galanga, crocus, camphora: neque *elixiria, tinctura* e mul-

tiplicibus mistæ, præscribantur. Sufficiunt *temperata* e rad. pimpinell. alb. vincetox. helen. scord. item: *aqua diapnoica*, scabios. plantag. card. benedict. scorzoner. flor. tiliæ &c. antimon. diaphoret. tenerius.

3. *Essentia myrrha* in catarrhalibus & pectoris morbis non nisi parcissime, & quidem cum largiore portione essentia succini remixta, exhibeatur: in motibus febrilibus vtraque exfolet.
4. *Aqua fumaris* in acutis, præcipue exanthematicis, removeatur.
5. Sunt, qui *tincturam antimonii* ad multos infantum morbos, ipsas adeo febres, eximie laudant: sed licet hoc remedium, fortiter tartarificatum, in *chronicis adultiorum* malis non contemnendum sit, in morbis tamen infantum non solum operæ pretium non facit, verum etiam aliquando incommoda producere obseruatur.
6. *Emetica* vix vniquam necessaria sunt: si tamen consultum videatur, vomitum excitare, nudæ mechanicæ irritationes in faucibus fere sufficiunt; aut ad summum leniora adhibeantur, e.g. conferua florum persicorum, florum iaceæ: cauendo ab emeticis antimoniatibus & venereis. Vomitus autem *spontaneus* salutaris esse obseruatur, vnde mulieres dicunt: *Epen Kinder, Gedey Kinder*; modo caueatur, ne, ad vomitum talem excitandum consulto cibus repleantur.
7. *Mercurius dulcis*, extra febriles commotiones, tutum & elegans est catharticum pro infantibus non plane tenerimis: modo insipidus sit, & non vltra 3. 4. grana propinetur. Pulueris forma, si recte comminutus fuerit, absque omni hæsitacione potest exhiberi. Præter ea in grauibus symptomatibus, a scabie repulsa inductis, vsum præstat plurimorum expectatione maiorem.
8. *Manna, fenna, spina ceruina*, extra febres, ad aluum soluendam etiam possunt adhiberi; si autem quid febrile subsit, rhabarbarina commodissime exhibentur.

9. *Doses* remediorum *exiguas* in teneris infantibus ipsa ratio commendat: hinc absonum est, diffusas & crudiores formulas variarum radicum, magisteriorum, terrarum sigillatarum, calcium fatuarum, præscribere.
10. Mirandum sane est, quod B. *Ludovici*, vir alias meritissimus, & strenuus censor inutilium compositionum, a pulvere suo, infantibus destinato, vnicornu fossile & alia inepta continente peculiarem efficaciam expectare poterit.
11. Eiusdem census sunt vulgaria *antepileptica*, e.g. vngula alcis, vnicornu verum, lapis manati, corium humanum, puluis *Marchionis*, quæ omnia dubiæ semper fidei reputantur; immo nec specificum cephalicum *Michaëlis* vllam prærogatiuam meretur.
12. In grauibus intestinorum & præcordiorum pathematibus, cum tetris deiectionibus, eiulatus, pauoribus, *mucilaginosâ* crassioribus absorbentibus præferenda sunt.
13. *Vermes* infantum, vti *viui* sæpius atrophiam & conuulsiones, ita *necati*, & in intestinis putrefacti, malignos affectus cum mirificis symptomatibus producant, ita vt vulgus inde fascino & magicas incantationes arguat.
14. *Alexipharmaco-diaphoreticorum* vsus, quando necessarius est, nutricibus potius, quam infantibus adhibetur. *Antimonium* autem *diaphoreticum* temperatissimum est remedium diapnoicum, modo recte sit præparatum.
15. In *acutis*, præcipue exanthematicis, laxantia & nimia calefactiones exfulent, iusti autem temporis decursus & crises debite expectentur.
16. In omnibus acutis & æstuosis morbis, præcipue circa caput, *camphoræ* suspensio de collo, vel solutio eius linteis conspersa, ad diapnoicum, resolutorium & neruinum scopum ad modum utilis est.
17. In anginodeis malis plebs Belgica puluerem certarum cochlearum, quas *Hoorntjens* vocat, exhibet, cum indu-

- bio, vt fertur, successu. Huc spectat, quod *Bonetus* de amuletico *entali* vsu refert.
18. In *dentitione difficili* cerebrum leporis, aut sanguis cristæ galli, qui humores vehementius elicit, cum successu probabili vix vñquam adhibita sunt.
 19. *Crocus martis & sulphur*, quando ad intertrigines adhibentur, vlcerosas hæc eruptiones infeliciter retroPELLUNT.
 20. *Siriafis*, seu fontanellæ subsidentia, adhuc in teneris, fere lethale signum est; & tunc quidem temporis spiritus odoriferi frustra huic loco adplicantur, quorum alias efficacior vsus est.
 21. *Narcotica* cautissime exhibeantur: sola theriaca ad gran. I. sufficit.
 22. *Cinnabaris* specificam quidem antepilepticam efficaciam, quam ab aliquot viginti annis ipsi tribuerunt, non exhibet, exacerbationes tamen spasticas egregie mitigat, & relaxata hac ratione cutis strictura, transpirationem promouet: modo parvæ doses, vtpote satis efficaces, propinentur, largiores enim ventriculum grauare obseruantur.
 23. *Flatulentias*, a transpirationis repressione in intestino collo & cæco sub costis nothis generatas, falso mulierculæ pro concretionem partium, das Unwachsen, declarant: facile enim & oriuntur & euanescunt, cedunt etiam illitu per olea carminatiua, e. g. chamomillæ.
 24. *Achores* rubei coloris, & malignæ indolis, circa mentum, aures &c. variis externis tractare, intutum est. Sufficit oleum ouorum externe, interne autem conducunt absorbentia & diapnoica. His accedat congrua nutricia diætâ, a crudis, acidis & falsis libera.
 25. Quod ad reliquam infantis diætâ attinet, & tractationem, relinquitur quidem hoc negotium mulieribus, quoniam autem. Medicus non raro ad hoc con-

consilium aduocatur, sequentia sibi habeat commenda-
data.

26. Simplicitate plurimi infantes, pauciores pomposo adparatu, educantur; illi quidem satis commode, vegete, & optimo sæpe successu, hi vero plurimum peiore aut minus optato.
27. Hanc itaque simplicitatem Medicus vbique commendat, cauendo, ne scrupulosis, immo anxiiis muliercularum agitationibus in vanum simul abripiatur.
28. Recordetur omnino, quod ad corpus infantis a muco liberandum, & diaphoresin inuitandam, *balneo* quidem opus sit, plurimi autem simplicem saltem aquam, lac, aut cereuisiam eodem felici successu adhibeant, quo pauciores vino calido, aut neruinis decoctis, vtantur.
29. Meminerit, opinionum diuersitatem circa *pulmentum* parandum exigui esse momenti: sunt enim, qui e nuda farina & aqua; sunt qui adhibito lacte illud parant; sunt etiam qui loco farinae micam panis, vt pote iam fermentatam, adhibent: vtrobique prospero successu; modo *varietas*, & nimia ciborum obtrusio eui-
tetur.
30. Lactis & lactantis constitutio varias offert cautelas, quas præcedente tabula indicauimus. Restat monere, vt primis 24. horis a *consistentiore* lacte infantem detineant: meconium enim nondum euacuatam cum lactis talis accessu acriorem subit fermentationem, vnde tormina, eiulatus, immo conuulsiones exoriuntur. Admiranda sane etiam hic est simplex ac sapiens natura, quæ salutari intentione *colostrum* huic euacuationi destinat, quod autem a multis, tamquam impurum, reiicitur.
31. Lac vbi sufficiens est, ante tertium vel quartum mensem pultis alimento non quidem indigent teneriores, neque tamen illis nocet, primis statim hebdomadibus pulticulam adhibere.

32. Sordes oris statim post partum linteo quodam, vino imbuto, eluendæ sunt.
33. Pro *caussis* morborum superius iam accusauimus profundas infantum in cunis immersiones, frigoris & caloris repentinas alternationes, immodestas in cunis contusiones, nimias fasciarum stricturas, & reliqua, omni hinc studio euitanda, considerando, quod infantium malorum origo a mere externis & aduentitiis caussis vix non semper sit deriuanda.

F I N I S.



SERIES

SERIES TABVLARVM.

Tabula I. De morbis generatim	pag. i.
II. Plethora	7
III. Spiffitudine sanguinis	13
IV. Cacoehymia	18
V. Hæmorrhagiis generatim	23
VI. Hæmorrhagia narium	32
VII. Suppreffione hæmorrhagiæ narium	39
VIII. Hæmoptyfi	43
IX. Vomitu cruento	52
X. Mictu cruento	59
XI. Hæmorrhoidibus internis ordinatis & nimiis	66
XII. Hæmorrhoidibus externis & cæcis	77
XIII. Hæmorrhoidibus fuppreffis, decoloratis, albis, mucidis & fluxu hepatico	89
XIV. Fluxu menfium ordinato, nimio & hæmorrhagia vterina	104
XV. Suppreffione menfium	113
XVI. Fluxu lochiorum ordinato & nimio	124
XVII. Suppreffione lochiorum	133
XVIII. Congeffionibus completis generatim	139
XIX. Congeffionibus incompletis, feu rheumatifmo	149
XX. Inflammatione generatim	159
XXI. Cephalalgia	181
XXII. Cephalalgia iliaco-hæmatitica, feu clauo hÿfterico	193
XXIII. Cephalæa	199
XXIV. Ophthalmia	204
XXV. Odontalgia	212
XXVI. Otalgia, & reliquis aurium adfectibus	219
XXVII. Vertigine	229
XXVIII. Coryza, grauedine & phlegmatorrhagia	240
XXIX. Brancho & raucedine	250

SERIES TABVLARVM.

TabulaXXX. de Angina	254
XXXI. Tussi	266
XXXII. Asthmate	278
XXXIII. Palpitatione cordis	288
XXXIV. Phthisi	296
XXXV. Vomica pulmonum	313
XXXVI. Empyemate	320
XXXVII. Malo hypochondriaco-hysterico	325
XXXVIII. de Infarctu lienis	340
XXXIX. Scirrho lienis	347
XL. Infarctu hepatis	350
XLI. Scirrho hepatis	356
XLII. Atrophia	360
XLIII. Nephritide	368
XLIV. Calculo renum & vesicæ	376
XLV. Spasms generatim	390
XLVI. Adfectibus spastico-arthritis	398
XLVII. Hemicrania	409
XLVIII. Pleuritide spuria	417
XLIX. Malo ischiadico	421
L. Podagra, gonagra & chiragra	425
LI. Incubo	436
-LII. Asthmate spastico seu convulsivo	438
LIII. Singultu	443
LIV. Convulsionibus generatim	448
LV. Epilepsia	455
LVI. Febribus generatim	463
LVII. Febre ephemera simplice & plurium dierum	479
LVIII. Febre synocha, seu continente κατ' ἐξοχήν dicta	484
LIX. Febre continua simplice	489
LX. Febribus secundariis, vulgo symptomaticis	494
LXI. Febribus inflammatoriis generatim	500
LXII. Febribus biliosis, nempe febre cholericæ & caufa	505
LXIII. Phrenitide	519

SERIES TABVLARVM.

Tab. LXIV. de Paraphrenitide	526
LXV. Pleuritide & peripneumonia	530
LXVI. Hepatide	533
LXVII. Splenitide	547
LXVIII. Febre catarrhali benigna, seu veterum quotidiana continua	551
LXIX. Febre lenta	560
LXX. Febre hectica	567
LXXI. Febribus malignis & epidemicis generatim	576
LXXII. Febre catarrhali maligna petechizante	591
LXXIII. Febre petechiali	601
LXXIV. Febre Hungarica ceu castrensi	604
LXXV. Febre purpurea seu miliari, purpura vrticata & fe- bre scarlatina	607
LXXVI. Variolis & morbillis	617
LXXVII. Dyfenteria	631
LXXVIII. Peste	643
LXXIX. Febre quotidiana intermittente	651
LXXX. Febre tertiana	657
LXXXI. Febre quartana	666
LXXXII. Febribus compositis exacuta periodo	674
LXXXIII. Febre tertiana continua	678
LXXXIV. Febre quartana continua	682
LXXXV. Febribus corruptis, it. de nondum typicis	685
LXXXVI. Oedemate	689
LXXXVII. Cachexia	697
LXXXVIII. Hydrope vniuersali	707
LXXXIX. Hydrope particulari	722
XC. Ictero	727
XCI. Scabie	736
XCII. Scorbuto	749
XCIII. Fluore albo	762
XCIV. Gonorrhœa	769
XCV. Pollutione nocturna	779
XCVI. Lue venerea, seu malo Neapolitano	781
XCVII. Vitiis sudoris	794
XCVIII. Stranguria, dyfuria, & ischuria	798
XCIX. Incontinentia vrinæ	805
C. Diabete	809

SERIES TABVVLARVM.

Tabula CI. de Adpetitus excessu	811
CII. Adpetitus defectu, seu anorexia & nausea	815
CIII. Fœtore oris	819
CIV. Soda	820
CV. Cardialgia	823
CVI. Flatulentia	828
CVII. Colica	835
CVIII. Passione iliaca, seu miserere mei	847
CIX. Vermibus	852
CX. Obstructione alui	858
CXI. Tenesmo & procidentia ani	863
CXII. Vomitu	868
CXIII. Diarrhoea	874
CXIV. de Motuum vitalium defectu generatim	881
CXV. Tremore artuum	886
CXVI. Paralyfi & hemiplexia	888
CXVII. Apoplexia	899
CXVIII. Catarrho suffocatiuo	906
CXIX. Adfectibus soporosis	913
CXX. Lipothymia & syncope	919
CXXI. Memoriae debilitate	927
CXXII. Melancholia	929
CXXIII. Mania	934
CXXIV. Hydrophobia	940
CXXV. Tarantismo	944
CXXVI. Noctambulatione	947
CXXVII. Nostalgia	948
CXXVIII. Philtris	950
CXXIX. Ebrietate	955
CXXX. Venenis	959
CXXXI. Fulmine tactis	964
CXXXII. Strangulatis	967
CXXXIII. Aqua submersis	969
CXXXIV. Adfectibus grauidarum	972
CXXXV. Adfectibus parientium	991
CXXXVI. Adfectibus puerperarum	1003
CXXXVII. Adfectibus lactantium	1009
CXXXVIII. Adfectibus infantum	1016

I N D E X.

A.

A <i>Blactationis</i> incommoda	1014	rant, sed tenacitatem au-	
<i>Abortus</i> a quibus caussis oriatur	109. 128. 975	gent	519
obefis feminis non raro ob-		<i>citrata</i> habent efficaciam ab-	
tingit.	10	sterfuo - diureticam & si-	
in quo casu non possit impe-		mul præcipitantem	575
diri.	129. 987	- magis diuresin & diapho-	
quibus circumstantiis sit pro-		resin promouent	687
mouendus,	130. 987.	crassiori bili quadrant, non	
post illum vteri purgatio ne-		æque tenuiori	988
cessaria	132	nocent hypochondriaco-hy-	
quo modo præcaueri possit	130. 976	stericis	337
nouus vnde sequatur	129.	interdum ad præparantia	
	132. 135	pertinent	826
<i>Abrotanum</i> num sit specificum		nimia febres turbant	471
in fluore albo	768	- typum quartanæ in len-	
<i>Abscessus</i> ex interioribus ad ex-		tam transmutant	673
teriora proiectus, num		- - tertianæ simplicis in	
maturationem admittat	504	hecticam	680
interni sunt periculosi. ibid.		quo modo temperent orga-	
eius materia successiue euacu-		smum sanguinis	138. 483
anda est	176	pleraque in dysenteria nulli-	
mammaram	1012	vs sunt valoris	641
eius apertio quo in loco a chi-		marina habent vsfum diureti-	
rurgis institui solet	1013	co-colliquatiuum	483
<i>Absinthii</i> sal nihil specifici habet		marina acido saturata com-	
contra nimiam obesitatem		mentantur in adfectibus	
	12	pectoris chronicis	275
<i>Absorbentia</i> acrimoniam tempe-		- it. in febre hectica	572
			575
		ostracodermata quo modo	
		sudorem & diuresin pro-	
		moucant	600

INDEX.

<i>Absorbentia</i> terrea in sôda ple- rumque adhibentur 823	<i>Aceti</i> vaporem <i>Deckerus</i> lauda- re vult in coryza & graue- dine 249
terrea nimia nocent in hec- tica 574	destillatum nocet dentibus 218
- - concoctionem debi- litant 309	- in malignis nimis pene- trans est, & raucedinem causatur 590
- - in pectoris adfecti- bus chronicis tenacem mucum magis augent 275	rosatum, rutaceum, flor. ca- lend. castorinum in vomitu externe ad analepsin lau- dantur 874
- - nocent in infarctu hepatis 355	<i>Squilliticum</i> nihil specifici ha- bet contra nimiam obesita- tem 12
- - nocent in cachexia 706	<i>Achores</i> infantum 1020
terrea nullius efficacîæ sunt in scabie 747	externis illos tractare intu- tum est 1030
laudantur in malignis 588.	eorum repulsio conuulsiones causatur 451
589	<i>Acida</i> compescunt fermentatio- nes putredinosas & æstus febriles 477. 590
laudantur in stillicidio vrinæ infantum 809	nocent phthificis 311
<i>Absfergentia</i> quænam adhibenda in phthisi 306	laudantur in hæmorrhagiis 28
pectoralia commendantur in hæmoptyses declinatione 49	dulcificata in febribus no- cent 477
<i>Abstinentia</i> multorum & ma- gnorum morborum reme- dium 813	in variolis non admittuntur 590
<i>Acetofitas</i> citri inter acidâ pri- mum locum obtinet in malignis 590	mineralia cur absorbentibus in eadem formula non de- beant sociari 589. 590
- laudatur in stomacace 762	pungentia in primis viis hy- pochondriacorum nulla sunt 336
item in tussi 477	<i>Acidula</i> obesis, speciatim femi- nis
<i>Acetum</i> simplex non est tama- cre vt destillatum 590	
vt magis acidum obtineatur, adiiciuntur aromata 518	

I N D E X.

nis sterilibus salutare sunt	13	citat	143
<i>Acidula</i> in spissitudine sanguinis		<i>Acria</i> nocent dentibus	217
non reiciuntur	17. 294	nocent in adfectibus spastico-	
in adfectibus spastico-arthri-		arthriticis	407. 396
cicis non omnibus subiectis		<i>Acrimonia</i> & <i>spissitudo</i> non æque	
conducunt	409. 416	in vno subiecto conueni-	
nephriticos orgasmos tem-		vnt	754
perant, sed motum humo-		<i>Acrimonia</i> & <i>spissitudo</i> in vlceri-	
rum ad renes augent	389	bis scabiosis num sit causa	
hypochondriacorum asylum		pruritus & ardoris	143. 747
reputantur	337. 346	<i>Acupunctura</i> obesis exiguum le-	
in infarctu lienis non æque		vamen faciunt	13
conducunt	346	<i>Addephagia</i> quid?	811
in infarctu non contemnen-		ineffabile damnum adfert to-	
dæ sunt	367	ti generi humano	813
in cacochymia circumspecti-		<i>Adfluxus</i> humorum quo modo	
one indigent	23	tractandus	224
in nonnullis chronicis scir-		<i>Adiantum album</i> specificè lau-	
rhos hepatis inducunt	357	datur in vomitu cruento	
in hæmorrhoidibus nimis			56. 58
numquam suadendæ sunt	75	in motibus hæmorrhoidalibus	73
num conducant in suppressis		- - - in hæmorrhoidibus	
hæmorrhoidibus	102	nimiis	74
in læsione interna prohiben-		<i>Adpetentia</i> frigidorum & acido-	
tur	375	rum maior quam calido-	
phthificis non conducunt	311	rum quid designet	114
in œdematibus inueteratis		<i>Adpetitus</i> excessus	811
certissime nocent	696	defectus	815
earum abusus ascitem caussa-		quo modo restaurandus	566
tur & mortem accelerat	719	auctior post febrem recidi-	
		vam facile inducit	662
		hypochondriacorum vagus	
<i>Acorus</i> ut stomachicum lauda-		est	327
tur	238	peruersus grauidis interdici-	
<i>Acredo</i> salina rodens dolores ex-		tur	989
			<i>Adrosio</i>

I N D E X.

<i>Adrosio</i> ventriculi vnde dignosci queat 511	<i>Adstringentia</i> opportune adhi- lenda sunt 768
quo modo restauranda 513	in gravidis non temere sunt vsurpanda 987
<i>Adstringentia</i> : regulæ de eo- rum vsu 29	nocent in gonorrhœa mali- gna 772
sanguini exitum non aditum prohibent 29	nocent in hæmoptysi præma- ture adhibita 47. 50
quo modo operentur 29	quando in hæmorrhagia vte- ri exhiberi debeant 112
salutarem naturæ intentio- nem turbant 176	in hæmorrhagiis fontica ma- la adferunt 25. 29
vim suam non solum in pri- mis viis, sed etiam in reli- quis partibus exserunt 628	in effera hæmoptysi permit- tuntur 43. 51
damnantur in vomitu cruen- to 58	interna nocent in hæmorrha- giis narium 38
in febribus biliosis prothei- formia pericula inducunt 517	externa quando locum habe- ant in hæmorrhagiis nari- um ibid.
nocent in febre tertiana 661	nocent in hæmorrhoidibus nimis 75. 87
nocent in dysenteria 636. 640	nocent in hæmorrhoidibus suppressis 102
improbantur ad motus con- vulsivos sistendos 454	magno damno offeruntur hecticis 575
in cachexia quando adhiben- da 706	menses supprimunt 108. 112. 116
in asthmate fugienda 235	nocent in mictu cruento 66
febres turbant & supprimunt 471. 477	blanda quando in mictu cru- ento locum habeant 63
febrem lentam in hecticam promouent 566	nocent puerperis 131
in febribus intermittentibus scirrhos lienis caussantur 348	nocent vulneratis pulmonibus 308
in intermittentibus contu- macibus prudens eorum vsus conceditur 477	sanguinem reddunt spissum 40
in fluore albo moderate &	in so-

<i>Adstringentia</i> in soda detrimen- tum adferunt	823	humorum distributionem promouent	147
damnantur in adfectibus spa- stico-arthriticis	407. 421.	<i>Alchimilla</i> habet vim vulnerari- am	317. 319
	435	<i>Alexipharmaca</i> quando in feбри- bus exhibenda sint	477
cohibent sudores	797	post febrem superatam sunt continuanda	478
in vrinæ incontinentia cau- tissime sunt adhibenda	808	impetu febrili senescente co- piose propinata febrem re- vocant	558
in vomitu cruento non teme- re sunt adhibenda	58	non secura sunt in febre sy- nocha	488
<i>Adfuetudo</i> ægrotandi multum ad morbos contribuit	4	temperata laudantur in in- flammationibus	179
<i>Aegyptiorum</i> encheiresis calcu- lum extrahendi	387	moderata locum habent in hæmorrhagiis nimis	131
<i>Aequinoctia</i> hecticis periculosa sunt	571	in doloribus spasticis sine re- gimine sunt propinanda	409
<i>Aer</i> humido-frigidus asthmati ansam dat	281	calida in cephalalgia sunt fu- gienda	191
- - aut humido-calidus congestiones causatur	142	- nocent in plethora com- mota	11
- humidus hecticis magis a- micus quam siccus	576	in variolis non sunt vtilia eorum essentia in purpura excluduntur	582 615
<i>Aeris</i> nimia exclusio per tegu- menta purpuram inuitat	616	ad paralyfin tollendam suc- currunt	898
<i>Aestimatio</i> falsa quo modo cor- rigenda	237	falsæ de his remediis traditio- nes	586
<i>Agaricus</i> phlegmaticis ordinan- dus est	216	<i>Alexipharmaco-sudorifera</i> in ma- lignis mortem adferunt	598
<i>Album gracum</i> ad gargarismata commendatur	228. 260. 263	<i>Alexipharmaco-diaphoretica</i> cali- da nocent in congestioni- bus	147
præsente inflammatione in clysteribus laudatur	263.		
	851		
<i>Alcalia fixa</i> diuresin & æqualem			

<i>Alexipharmaco diaphoretica</i> nutri-	caute adhibenda	338
cibus potius quam infanti-	damnantur in lochiis plane	
bis sunt exhibenda	suppressis	137
1029	Alp quid sit	436
<i>Alexiteria</i> , quæ certæ speciei	<i>Alpini</i> obseruatio de Aegyptiis	
contagia tollant	in curando empyemate	324
599		
<i>Alkekengi</i> baccae calculum pel-	<i>Alterantia</i> in febribus quid præ-	
lunt, sed non resoluunt	fidii adferant	474. 476
388	in hypochondriaco - hysterico	
<i>Allium</i> nocet nephriticis	malo non profunt	336
376	<i>Alumen</i> nocet dentibus	217
laudatur in odontalgia	crudum adstringendi scopo	
217	additur gargarismatibus	762
oculis noxium non est		
212	vsu commendatur in sto-	
naugantibus solatium est ad-	macace	761
verius scorbutum	<i>Alui</i> adstrictio hypochondriacis	
762.	familiarissima	327. 339
eius abusus hæmorrhoides	adstrictio & obstructio sunt	
adfert	distinguendæ	858. 859
71	- 2 in grauidis	979
<i>Aloë</i> eius grana 2-3. alui excreti-	fluxus in febre lenta quo mo-	
ones promte prouocant	do tractandus	567
835	segnities habitualis non in-	
hecticis non conducit	commoda est	861
574	- quo modo expedienda	339. 340
sanguinem commouet, sed	obstructio in infantibus	1020
non ad exitum perducit	occlusio in variolis quid re-	
191. 338	spiciat	627. 628.
<i>Aloëtica</i> purgantia in omnibus	irritatio in variolis & morbil-	
sanguinis eruptionibus su-	lis periculosa	616
specta sunt	adstrictio nocet in febre	
59	catarrhali & petechiali	555. 559
nocent in hæmorrhoidibus		
cæcis		
87		
in hæmorrhoidibus suppres-		
sis caute sunt adhibenda		
102		
cur hæmorrhoides prouo-		
cent		
835		
in tenesmo hæmorrhoidali		
non conducunt		
867		
nocent in mensibus nimis		
112		
in malo hypochondriaco		

<i>Alui</i> Solutio in puerperis quomodo promouenda 131.	<i>Amygdala amara</i> in hydrophobia laudantur 943
1008	<i>Analeptica</i> laudantur in congestionibus 148
<i>Aluus</i> cur in malignis sit adstricta 587	post hæmorrhagias conceduntur 29
ficca remoratur partum 1002	non debent continere acria aromata 590
<i>Amaras</i> visceras referant & restaurant 719	<i>Anagallis</i> specificè laudari solet in melancholia hypochondriaca 934
optime corrigunt humores serenos corruptos 103	<i>Anæsthesia</i> infantum 1004
non omnia adpetitum excitant 818	<i>Anasarca</i> 797
non omnia, sed specifica, vermes enecant 857	<i>Angina</i> quid? 254
<i>Ambram</i> in aurem dolentem ingerere docet <i>Forestus</i> 225	sanguinea & mucosa 256
eius odorem cur auerentur nonnullæ hysteriæ 330	in acutis cur perniciofa 258
<i>Ambustio</i> in pede ophthalmiam contumacem curauit 210	- quo modo tractanda 265
<i>Amor</i> vesanus conuulsiones & epilepsiam causatur 451.	febri synochæ superueniens quo modo tractanda 489
458	febri catarrhali benignæ non numquam accedit 554. 557
<i>Amuletica</i> quando in congestionibus locum habeant 148	empyema producere potest 322
in hæmorrhagiis quando applicari debeant 30	febri catarrhali petechizanti facile superuenit 592
specifici nihil habent in ophthalmiis 210	595
- neque in epilepsia 462	<i>Anguilla</i> hepar laudatur ad exclusionem fœtus, molæ & secundinarum 129. 130
<i>Amygdala</i> in soda laudantur 823	cutis, fumus specificè laudatur in hæmorrhoidibus ru-mentibus 84
facile in austeram acescentiam degenerant 311	<i>Ani</i> pruritus 79. 82
amaræ animalia quadrupedia interficere dicuntur 858	excoriatio vnde veniat 93
	punctura ibid.
	<i>Ani</i>

I N D E X.

<i>Ani</i> paralyſis per ſtimulantia inducitur 898	<i>Anodyna</i> effluxum ſupprimunt, adfluxum vero non interceptiunt 65
<i>Animalis</i> , quod momordit, cor, hepar, cerebrum in hydrophobia laudantur 649.942	in congeſtionibus non debent adhiberi 147
<i>Anima</i> cur <i>συμπάθειαν</i> ſubeat 931	in empyemate adhibita ſphacelum inducunt 324
<i>Animi</i> abiectio in febris non eſt boni ominis 470.581	opiata in tuſſi non ſecure exhibentur 312
perturbationes vnde in hypochondriacis & hystericis oriantur 328.329	- in commotionibus animi non debent adhiberi 988
<i>pathemata</i> in producendis morbis quid valeant 4.237	post exiguum leuamen dolores grauioreſ inuitant 406.760
- - non datur eorum cura pharmaceutica 988	lenia commendantur in fluxu menſium rebeli 110
- nocent puerperis 1008	- - in hæmorrhagia veterina ibid.
- nocent lactantibus 1015	- - in fluxu lochiorum nimio 129
- nocent grauidis 990	- - in effera narium hæmorrhagia 36
commotiones nocent 131.148	- - in hæmorrhoidibus nimis 74
<i>Animus</i> trepidus trepidos etiam inuoluit motus vitales 646	- - in hæmorrhoidibus tumentibus 85
<i>Anni climacterici</i> heceticis ſunt periculofi 571	commendantur in doloribus calculoſis 384
in iis natura nouas reuolutiones ſuſcipit 901	commendantur in inflammationibus externis 172
<i>Annulus Helmontii</i> , quid valeat in hæmorrhoidibus cæcis 88	in ſtaſibus inflammatis provide ſunt adhibenda 547
antiſpaſticus in ſpasmis quid valeat 397	<i>Anomalie</i> hæmorrhoidales 91.92
<i>Anodyna</i> nocent in ſpasmis 17	<i>Anorexia</i> quid ſit 815
in paroxyſmo adhibita vel mortem, vel febrem heceticam cauſantur 406	differt a cardialgia 823

I N D E X.

<i>Antepileptica</i>	460. 461	<i>Antiscorbutica</i> quid valeant in malo hypochondriaco	337
quando exhibenda	462	acriora nil iuuant in hæmorrhoidibus suppressis	102
vulgaria cuius fidei in infantibus	1029	- nocent in malo venereo	758. 789
<i>Anthraces</i>	644	<i>Antiuenerea</i> quid possint in malo hypochondriaco	337
pestilentes quo modo tractandi	649	calida in gonorrhœa caute sunt adhibenda	776
recedentes cauterium reuocant	ibid.	lignosa nocent in hydrope	719
<i>Antihæcticum Poterii</i> cuius effectus sit	309. 575	- nocent in scabie	747
<i>Antihæctica</i> febrem lentam in hæcticam transmutant	566	<i>Untwachsen der Kinder</i>	1030
<i>Antimagica</i> commendantur in atrophia ab incantatione	367	<i>Apinus</i> , adfertum eius de cascarrilla in febribus examinatur	473. 599
quid valeant	954	vomitoria commendat in malignis	583
<i>Antimonium diaphoreticum</i> temperatissimum diapnoicum est.	1029	<i>Apium</i> nephriticis nocet	376
bezoardico minerali prærogatiuam non concedit	588	<i>Aphonia</i>	251
in hæctica nihil prærogatiui habet	575	per veronicæ decoctum curata	254
ad stases inflammatorias laudatur	543. 547	ex crapula quo modo tractanda	895
commendat <i>Sylvius</i> ad ulcerationes internas	309	<i>Aphtha</i> quando in febribus proueniant	476. 557. 584
<i>Antimonii fumus</i> suspectam tussim cohibet	276. 310	superueniunt dysentericiæ	634
laudatur in asthmate humido	287	funesti præsagii deprehenduntur	637
laudatur in fluore albo	768	de phthisi consummata testantur	300
<i>Antimonii morsuli</i> laudantur in variis adfectibus	408	infantium	1021
		<i>Apophlegmatismi</i> commendantur in cephalæa venerea	201.
			203

I N D E X.

<i>Apoplegmatizantia</i> laudantur in odontalgia 217. 218	<i>Apostafes</i> num has formet febris catarrhalis simplex 555
<i>Apoplexia</i> quid? 899	vide <i>metastafis</i>
vnde oriatur 36	<i>Apostema</i> quo modo tractan- dum 172
a coryza habituali in annosi- oribus 245	differt ab vlcere 291
non statim a vertigine immi- net 235	quando veteres in cerebro accusauerunt 201
in Finlandia communis est 905	<i>Apostematis</i> interni ruptio vnde dignoscatur 540
sequitur hæmorrhoides sup- pressas 72	ruptio in angina quo modo tractanda 261. 265
lenior spasmm cynicum in- terdum relinquit 902	<i>Apostematodes</i> inflammatio 160
vehementior lethalis est 899. 902	ad suppurationem, gangræ- nam, sphacelum immo cancrum facile tendit 170
a spasms vehementibus in se- nioribus oritur 395	quo modo tractanda 173
serosa & catarrhus suffocati- vus sæpe concurrunt 907	<i>Apri</i> dens præparat. 179
<i>Apolecticis</i> , qualis eorum exitus 902	<i>Aqua</i> calida salina ad clysterem extemporaneum laudatur in angina 259
multi habentur, qui catarrho spastico mortui sunt 909	extinctionis calcis viuæ quid efficiat in scabie 746
<i>Αποσάσεως & αποσήματος</i> diffe- rentia 176	- - œdemata repellit 696
<i>Apostafes</i> febriles vnde veniant 472	- fabrorum quid faciat in scabie 746
cum impetu partem inflant 156	fortis hausta quo modo tra- ctanda 963
œdemata pedum adferunt 691. 692	fumariæ ex diapnoicis remo- venda 559
ex variolis ad pulmones transferuntur 624	- infantibus in acutis non exhibenda 1028
stabiles sedes fiunt commoti- onum rheumaticarum 156	Hungarica in cephalalgia caute adhibenda 189
552	hypnotica <i>Dorncrellii</i> 215
	<i>Aqua</i>

<i>Aqua</i> hyssopi laudatur in asthma senili	286	non sine discrimine exhibendæ	1001
- laudatur in peripneumonia	537	<i>Aquarum</i> præmatura euacuatio in grauidis quid minetur	982
veronica vinosa, quo modo paranda & vsurpanda	275 276	<i>Aqua submersi</i> quo modo reuocandi	969. 970
- specificè laudatur ad tonum pulmonum roborandum	272. 275	<i>Aranearum</i> adpensio amuletice laudatur	671
- - laudatur in phthisi	307	<i>Arcanum duplicatum</i> catholicum wedelii	650
- - laudatur in broncho	253	<i>Ardor</i> inflammatorius differt ab æstu congestorio	161
- - laudatur in asthma senili	286	<i>Ardores</i> intolerabiles a congestionibus oriuntur	143
<i>Aqua</i> circa verticem fluctuantis sensus quid sit	194	<i>Aridura</i> partium ab atrophia differt	361
<i>Aqua calida</i> potus nephriticos solatur	376	partis vnde obtingat	890
cephalica spirituosæ nocent in lipothymiis scorbuticis	760	quo modo tractanda	894
cordiales nocent in adfectibus grauidarum	986	coxendicis vnde oriatur	423.
destillatæ calcis viuæ, chærefolii, flor. omnium, flor. sambuci nocent in inflammationibus	175	<i>Aristolochia rotunda</i> amaritie sua nullis simplicibus cedit	856
- card. bened. galegæ, plantag. scabios. scordii diapnoën promouent	590	<i>Aristotelis</i> opinio de sternutationis causa	244
flor. tiliæ, plantagin. scabios. scordii parum efficiunt in stasibus discutiendis	546	<i>Armoracia</i> radix suadet in tussi	278
spirituosæ parturientibus		laudatur in scorbuto	761
		<i>Arnica</i> in causa grumositatis ex lapsu commendatur	896
		<i>Aromata</i> quid valeant in scorbuto	761
		illorum reliqua efficacia	827
		<i>Arsenicum</i> in febribus adhibere non decet virum sincerum	665
			<i>Arte-</i>

I N D E X.

<i>Artemisia</i> in suppressione mensium quid præstet	123	nes incompletæ	140
<i>Arteria</i> asperæ relaxatio in raucedine non est	253	ad spasmos particulares referuntur	392
<i>Arteriola</i> quando in hæmorrhagiis narium rupta, quid faciendum	38	<i>Arthritico - spastici</i> adfectus num a debilitate partium, an a nimia strictura dependeant	407
<i>Arteriotomia</i> in hemicrania reicitur	415	- - proclives sunt ad refluxus internos	402
<i>Arthritis</i> quid sit	398	<i>Artuum grauitas & obdormitio</i> unde existat	7. 14
eius species	ibid.	in grauidis	964
& rheumatismus non sunt res maxime diuersæ	399	vid. tremor.	
vera & vaga	399	<i>Asa fætida</i> externe conducit in suffocatione hysterica	846
quæ sit illius a rheumatismo diuersitas	151. 152	<i>Asarum</i> laudatur in cardialgia	828
eius differentia a congestionibus simplicibus	399. 422	<i>Ascarides</i>	853
a malo ischiadico	421	vbi stabulentur	ibid.
per diaphoretica calida inducitur	158	nonnumquam diarrhœas causantur	876
strictè sumpta quo modo differat a podagra	398	<i>Ascites</i> unde oriatur	135. 707
scorbutica	399. 402	<i>Aselli</i> præparat.	387
vera quibus causis superueniat	497	<i>Asparagi</i> radix specificè laudatur in mictu cruento	64
vaga tumores in articulis relinquit	400	<i>Assodes</i> quid sit	500. 506
- ruit ad hæmorrhagias	402	<i>Asthma</i>	278
<i>Arthritici adfectus</i> quas hæmorrhagias respiciant	401	differt a tussi	279
numquam ad sanguinis eruptionem perueniunt	399	interdum tussis symptoma est	280
pernaces per hæmorrhoides soluantur	71	non in solo pectore, sed etiam hypochondriis interdum sedem habet	279
sunt motus erronei	401	& <i>pectorale</i> & <i>hypochondriacum</i> sequitur hæmorrhoides suppressas	92. 93. 96
in iis contingunt congestio-		<i>Asthma</i>	

I N D E X.

<i>Asthma</i> in febribus acutis suspectum est	283	<i>Atrophia</i>	360. 1023
<i>defectiuum</i>	279	unde originem trahat	361. 362
<i>chronicum</i> quo modo tractandum	286	quo modo differat a phthisi & hectica	297. 360
<i>senile</i>	281. 286	ab incantationibus an sit curanda	364
<i>spasticum</i> seu <i>convulsivum</i>	279. 393. 438	inueterata degenerat in rhabditidem	ibid.
- differt a catarrho suffocativo	906. 911	adultorum semper fere cum hectica complicata est	ibid.
- interdum est symptoma asthmatis defectiui	280	<i>Atrophicorum</i> abdomen cur tu meat	713
- iungitur interdum febribus malignis	440	<i>Auricula muris maior</i> in pectoris viciis laudatur	317
- spasticum ex pleuritide spuria oriri potest	420	<i>Aurium</i> adfectus	219
<i>siccum</i> quo tempore magis affligat	281	manationes serosae in infantibus	1019
- flatulentum	285	<i>Autocratia naturae</i> quid possit in morbis	4. 5.
- diuturnum, quae mala adferat	283	in nonnullis adfectibus artibus cedere cogitur	510
<i>venereum</i> quo modo curandum	ibid.	B.	
<i>Asthmatica</i> pectoris oppletio in infantibus	1019	B <i>Aculus corni</i> quid in rabie efficere dicatur	944
<i>Asthmatici</i> adfectus ex coryza habituali	245	<i>Bagliuini</i> commendat asthmaticis particulas nitrosas inter arandum	287
non nulli etiam capitis dolores sentiunt	287	eius observatio de motibus convulsivis puerorum	619
casus notabilissimus	287. 288	eius sententia de fluore albo	767
<i>Athleticus</i> corporis habitus quid de eo sentiat <i>Hippocrates</i>	9	eius sententia de alexipharmacis - sudoriferis in malignis	598
<i>Atheromata</i>	783	<i>Balbuties</i>	389
<i>Atonia</i> oesophagi, wenn es kollert bis in den Magen hinunter, unde oriatur	636	<i>Balnea</i> nimium feruida reiciuntur	
		Rrr rrr	

I N D E X.

cur in plethora commota	12	<i>acriora</i> in hectica nihil faci-	
non omnibus calculosis pro-		vnt	574
ficua sunt	389	- in mictu cruento reiiciun-	
in malo ischiadico non ad-		tur	66
probantur	424	- reiiciuntur in cephalæa	
in grauidis non improbantur	988		203
infantium qualia esse debeant	1031	- in calculo turgescientiam	
domestica commendantur in		sanguinis promouent	389
palpitatione cordis	294	- vulneratis pulmonibus	
repida alicuius efficaciam sunt		non conducunt	308
in spissitudine sanguinis	17	in gonorrhœa non promi-	
conducunt ad sudorem elici-		scue sunt adhibenda	775
endum	797	<i>temperatiora</i> in phthisi com-	
laudantur in omni tabe	367	mendantur	307
<i>Balsamum de Copaiua seu Indicum</i>		<i>Becheri pilula</i> vid. <i>Pilula</i>	
album quid præstet in go-		<i>Becchica</i> euacuatio non succe-	
norrhœa	775	dens phthisin causatur	301
in calculo renum non adpro-		<i>Becchica</i> congestiones quanam	
batur	389	sint	140
<i>Balsamum de Copaiua seu Indicum</i>		- quid intendant	146
album laudatur in susurru		<i>Bellis minor</i> leniter adstringit &	
& tinnitu aurium	225	discutit	311
<i>sulphuris</i> mictum cruentum		<i>Berg-Geßböber</i>	961
causari potest	62	<i>Beulen</i> , a lapsu, ictu, verberibus	
non conuenit in tussi	274	quo modo tractandæ	172
apoplecticum quid præstet in		<i>Bilis</i> num sit alcali vel acidum	
apoplexia	905		518
<i>Locatelli & Meibomii</i>	308	eius defectus non est causa	
<i>Balsama apoplectica & cephalica</i> in		hydropis	713
coryza & grauedine non		num amarore suo vermes	
conueniunt	249	enecet	857
<i>embryonum</i> in adfectibus gra-		an sit causa febris tertianæ	
vidarum damnantur	986		660
		in dysenteria quid mali infe-	
		rat	634
			<i>Bilis</i>

<i>Bilis</i> quo modo colicam biliosam inducat	839	de corruptionibus sphacellosis post mortem phreniticorum	526
excretio eius impedita icterum inducit	ibid.	<i>Boniis</i> tempore dysenteriae in folliculo fellis nullam inuenit bilem	635
flaua, vitellina, prasina &c. quid ad febres biliosas conferant	516	eius <i>liber de medicina Indorum</i> adlegatur	324
<i>Biliosa materia</i> expansa & diffusa non potest vno impetu inuerti	515. 516. 517	eius <i>pilula tartarea</i> laudantur in infarctu lienis	343
in febribus biliosis an secure per vomitum possit euacuari	475	<i>Borborygmi</i> quid sint	838
internas inflammationes pessimi euentus caussatur	511	<i>Borellus</i> commendat iaspidem rubram in hæmorrhagiis	30
<i>Biliosa acrimonia</i> per fermentescentia augetur	518	- succum vrticæ min. in hæmorrhagia narium	38
<i>Biliosa cruditates</i> primarum viarum motus spasticos exasperant	403	- sideritidem in pleuritide	536
deiectiones & decolores, wie gehackte Eyer	1018	<i>Borrichii</i> inuentum vesicis calidis sudorem promouere	721
<i>Birckmanni puluis stomachicus</i>	818	<i>Boyle</i> tractatus de specificis adlegatur	856
<i>Blatter-Peltgen</i> quid sit	630	<i>Branchus</i>	241. 250
<i>Blut</i> : schwarzes Blut, schwarzer Muth	14	quo modo differat a raucedine	250. 251
<i>Bluten</i> : wenn es kommt, wird der Kopf leichter	141	<i>habitualis</i> in catarrhum suffocantium abit	252
<i>Bolaria</i> viscera constringunt & hydropem caussantur	407. 435	grauior cum adfectibus venereis conspirat	251
magno damno heceticis offeruntur	574	<i>Brassica marina</i> temperate euacuat	720
<i>Bonetus</i> nasturtium aquaticum specificè laudat in pthysi	310	<i>Brassica muriatica</i> cur semina pinguia immisceantur	518
		<i>Bronchotomia</i> commendatur in angina	261. 266
		R r r r r r z	<i>BRUN.</i>

I N D E X.

<i>Brunneri potiuncula</i> laudatur in asthmate chronico 286	C.
<i>Bruta</i> cur raro morbis sint sub- iecta 3	C <i>Achexia</i> 697
hæmorrhagias non habent 25	est cacochymia proles 20
veras febres non incurrunt 467	non est primus hydropis gra- dus 697
<i>Bubones</i> pestilenciales 644	plenaria frequenter hecti- cam aut hydropem adfert 702
quo modo tractandi 649	a fluxu mensium nimio indu- citur 190
venerei vnde nascantur 782	euenit a lochiis suppressis 135
783	inducitur ab hæmorrhoidi- bus nimis 72
- quo modo tractandi 788	repulsa catarrhum suffocati- vum inducit 702
- sponte non tendunt ad suppurationem 793	<i>Cachectici</i> non sunt pro phle- gmaticis habendi 705
- non raro superueniunt gonorrhœæ malignæ 771.	<i>Cacochymia</i> 18
772	arctum eius vinculum cum cachexia ostenditur 18.20
vlcerascentes insignes corru- ptiones formant 779	quid per eam veteres & re- centiores intelligant 22
<i>Buso</i> in vino adusto maceratus laudatur in angina 265	veterum nomen suum omni- bus morbis ignotis dare debet 758
eum viuum <i>Holsari</i> in angina adhibent 266	tam frequens non est, vti vul- go accusatur 20
<i>exsuccatus</i> diuresin promouet 706	scorbutica omnium morbo- rum origo vulgo habetur 19. 22
- in hæmorrhagiis laudatur 30. 48. 75. 129	<i>Cadavera</i> non sepulta pestem caussari possunt 645
- in congestionibus specifi- ce laudatur 148	peste emortua cur liuescant & nigrescant 581
- commendatur in vrinae in- continentia 808	<i>Cacitas</i> ex ophthalmia diutur- na oritur 207
- eius os commendat <i>Hel- montius</i> in odontalgia 217	<i>Caci-</i>
<i>Bulimus</i> 814	

I N D E X.

<i>Cacitas</i> ex venæ sectionibus stantis non oritur	209	<i>Calculosi</i> hæctica pereunt	382
<i>Calculi</i> aliarum corporis partium	378	<i>Calculosi motus</i> ab ipso calculo distinguendi sunt	377
<i>Calculus renum & vesicæ</i>	376	<i>Calefacientia</i> in inflammationibus stasin promouent	176
eorum differentia	376. 377	nocent in hæmorrhoidibus	87
sæpe sine insignibus doloribus gestatur	377. 378	<i>Calida</i> nocent in cephalalgia sanguinea	198
renum aliquoties ex bonitate naturæ curatus est	382	reiciuntur in hæmoptysi	51
- ad hæmorrhoides proclives sunt, qui illo torquentur	72. 76. 380	externa adfectus ad interiora repellunt	421
- asperior excitat mictum cruentum	60. 62. 380	febris tertiana tolerare non potest	661
ex nephritide ortum habere potest	372	quartanam continuam in acutam inducunt	684
vesicæ vbi nascatur	380. 381	lentam in hæcticam febrem promouent	566
non est indolis pure terreæ	381. 387	acria sulphurea in scorbuto non ita efficaciter corrigunt	760
sine nephritide adfligere potest	368	<i>Calor</i> blandus in congestionibus efficaciter prodest	148
cum podagra sæpe coniunctus est	380. 432	in volis manuum post prandium phthiseos sæpe signum est	298
grandior febrem acutam aduocat	382	<i>Caluarie</i> distorsio in infantibus	1017
iactatæ eius curæ heroicæ in dubium vocantur	ibid.	<i>Camphora</i> in inflammationibus externis egregie satis facit	177. 178
quo modo explorari possit	380. 386	eius adpensio laudatur in acutis adfectibus infantum	1029
eius extractio vel exsectio	387	- - laudatur in sudoribus infantum repulsis	798
illum pellentia cautissime adhibenda sunt	388	eius aversio in hysteris, quo modo tolli possit	138. 539
nouam eius genesin medicus non potest intercipere	387	<i>R r r r r</i> 3	<i>Cam-</i>
<i>Calculus</i> sæpe mentitur malum hystericum	329. 377		

I N D E X.

- Camphora* ad ardorem mitigandum commendatur in scabie ferina 743
- Camphora* in stasi inflammatoria suppurationem impedit 223
- cur in œdematibus non conveniat 691.696
- num veneris incitamenta contemperet 939
- eius vsus internus circumspectus esse debet 178.546
- eius quantitas tincturas bezoardicas suspectas reddit 648
- interne cum nitrosis laudatur in cholera simplici 517
- quid valeat interne in angina 265
- ab Etmüllero in epilepsia laudatur 462
- nephriticis cautius exhibenda 375
- Camphorata* quo modo in otalgia & ophthalmia applicanda sint 208.211.223
- in deliriis multum commendantur 939
- nihil præsidii ad hydrocelem adferunt 727
- in paraphrenitide interne caute sunt adhibenda 529
- Cancer* unde oriatur 168
- occultus quid sit 350
- Cancris* combusti ad morsum canis rabidi laudantur 943
- laudantur in diabete 810
- Cancris* fluuiatiles vulgo creduntur febrem sympathetice curare 666
- Cancrorum oculi* sæpe sunt adulterati 589
- Canes* delicatuli facile morbis sunt obnoxii 3
- Canis* rabidi morsus 649
- Cantharides* : eorum vsus mitum cruentum provocare potest 62
- facile renes & vesicam adrodunt 719
- magis nocent in fluore albo, quam in gonorrhœa 768.
- 775.776
- adsumtæ quo modo tractandæ 963
- Capillorum* defluuium in phthiide de malo consummato testatur 300
- in febre hectica itidem 560.
- 569.571
- in scabie ferina incurabilem adfectum testatur 545
- Capitis dolores* in sexu feminino Medicos valde vexant 196
- qui a lue venerea originem ducant 182.195.199.201
- hypochondriacorum & hystericarum 327.328
- Caput* eius conspiratio cum ventriculo 181.184.190.234
- ab æstu & frigore post enormes narium hæmorrhagias defendendum est 38

I N D E X.

<i>Caput</i> interdum in asthmaticis simul adfcitur	287	<i>Etanda</i>	215
eius vertiginosa adfcitio signum plethoræ est	8	<i>Carminativa</i> in flatulentia prudentissime adhibenda sunt	834
qui sunt capitis æmptioris, podagræ præ aliis vulgo obnoxii creduntur	429	in qua colica locum habeant	843
<i>Carbones</i> : vapores eorum quæ damna adferant corpori	961	<i>Caro lupina</i> num in malo hysterico aliquid præstet	339
<i>Carbunculi</i> spem salutis in peste adferunt	580	<i>fumo indurata</i> nephritidem exacerbat	375
cito autem & numero plures erumpentes sunt infames	581	<i>Carphonum lapis</i> an efficax sit in hæmorrhagiis narium	38
<i>Cardialgia</i>	823	<i>Carthamus</i> temperate euacuat	720
nauseosa	ibid.	<i>Caruncula</i> in vrethra quo modo tollendæ	778
symptomatica viscera venæ portæ simul adfcit	824	<i>Carus</i>	914
synoptica vnde dependeat	ibid.	<i>Caryophylli</i> laudantur in odontalgia	218
paraphreniticorum exquisita est	527	<i>Cascarilla</i> lenit, sedat, discutit	537. 910
hypochondriaco - hysteriarum	325. 824	fouet adstrictionem vix sensibilem	478
- non est emeticis curanda	59	in hæmorrhagiis efferis	28
succellu temporis lipothymiam caussatur	825	laudatur vt lene anodynum in dolorum atrociora	45. 355
<i>Cardialgie</i> extremæ in febribus periculosæ sunt	471	laudatur vt egregium pectorale discutiens & sedativum	276
a lochiis suppressis	135	laudatur ad vomitum, diarrhœas impetuofas sistendas	494. 513. 567. 487
<i>Cardiogramus</i>	1024	in dysenteria salutariter conuenit	642
<i>Carduus benedictus</i> post febres vt tonicum laudatur	665	laudatur in turbis venæ portæ &	
<i>Caries dentium</i> quo modo tra-			

I N D E X.

tæ & hæmorrhoidibus	89	<i>Catarrhus</i> num ex capite in cau-	
	333	tatem arteriæ asperæ de-	
laudatur in fluxu lochiorum		fluat	237
nimio	129	simplex nulla febre stipatus	
laudatur in vomitu cruento		est	241. 553
	56	falso - acris inuoluit indolem	
commendatur in hemicrania		inflammatoriam	553. 554
	414	frigidus	140
commendatur in hæmopyysi		chronicus quo modo tractan-	
	48	dus	558
<i>Cascarilla</i> ob acredinem in angi-		eius lapsum in stomachum	
na non conducit	264	vulgus accusat	241
an aliquid specifici habeat in		quo sensu sit contagiosus	555
febribus	478. 599	<i>Catarrhales</i> seniorum adfectus	
<i>Casus</i> maior nephriticis non		conueniunt cum asthma	
conducit	375	defectiuo	276
<i>Castoreum</i> reicitur in malo hy-		<i>Catarrhus suffocatiuus</i>	906
stérico	338	vnde oriatur	245. 908
in infantibus infimi ventris		sæpe concurrit cum apople-	
non commendatur	447	xia serosa	907
improbatur in epilepsia	462	post tussim periodicam suc-	
externe pro odore in colica		cedit	270
adhiberi potest	846	post hæmorrhoides sup-	
<i>Cataplasma</i> discutiens ad stases		pressas euenit	72
congestas commendatur		a spasms vehementibus seni-	
	174	oribus obtingit	395
ab aurium adfectibus abesse		cautissime ab asthma con-	
debet	228	vulsiuo distinguendus est	911
<i>Catalepsis</i>	271	<i>Cathartica</i> fortiora damnantur	
<i>Cataracta</i> vnde proueniat	39	in cephalalgia	191
<i>Catarrhosi</i> ad vomitum procli-		<i>Causus</i>	505
ues sunt	249. 250	quo modo differt a febre cho-	
<i>Catarrhus</i> differt a rheumatismo		lerica	505. 506
	152. 241	ab Hippocrate febris lethifera	
vnde originem sumat	140	adpellatur	510
eius species	241		

I N D E X.

<i>Causus</i> eius materia peccans cor- rosivæ indolis est	519	<i>Cephalæa</i> apoplexiam præfagit	202
<i>Cauticum Sutorii & Zwingeri</i>	172	ab inquinamentis venereis & scorbuticis orta, quo mo- modo curanda	202. 203
<i>Cauteria</i> commendant veteres in cephalæa	201	<i>Cephalicum Michaëlis</i> specificum laudibus effectu non re- spondet	191
in fistula ani non sunt admit- tenda	89	nullam prærogatiuam in in- fantibus meretur	1029
<i>Celsus</i> quid in cholera promittat	517. 518	<i>Cephalalgia</i>	181
<i>Centaurium minus</i> ad tonum ventriculi roborandum laudatur	665. 818	sanguinea & serosa	ibid.
in febre lentescente prodest	665	eius differentia a cephalæa	182
<i>Centinodium</i> specificè laudant in effera hæmoptysi	48	quo modo differat ab hemi- crania	182. 410
<i>Cepæ</i> nauigantibus aduersus scor- butum solatio sunt	762	directe hæmorrhagiam nari- vm respicit	410
assætæ ad maturationem hæ- morrhoidum tumentium commendantur	85	in feminis pertinax & conti- nua obseruatur	182
frixæ in scorbuto exiguum edunt effectum	761	cum vertigine complicata cu- ius prognoseos	235. 239
vsus earum internus oculis non nocet	212	gravidarum	974
nephriticis non conueniunt	376	iliaco-hæmatica quid sit	193
<i>Cephalæa</i>	194. 199	<i>Cerebrum</i> cur neruorum origo & motus instrumentum non sit	232
quo modo differat a cephalal- gia	182	<i>Cerebrum leporis</i> in dentitione difficili probabile non est	1030
item a cephalalgia continua	199	<i>Cereuisia</i> cum succo betulæ vel semine dauci fermentata commendatur calculosis	386
ea adflcti sunt sensibilissimi	200	fermentescens puerperis non conducit	132
melancholiam interdum producit	200. 202	eius vapores fermentescen- tes	

I N D E X.

res quæ damna adferant	vit	17. 22
corpori 961	<i>Chlorosis virginum</i>	702
<i>Ceruus</i> totus an sit alexipharmacus 586	ad palpitationem cordis accedens quo modo tractanda	293
<i>Chærefolium</i> laudatur in phtisi 312	<i>Cholera</i> humida 506	
ad discutiendas stases debilitatis est efficaciam 546	quando sine febre fiat 516	
aliquid præstat in mictu cruento 65	<i>Cholerica</i> febris 505	
<i>Chamedris</i> num secundum <i>Paracelsi</i> adæctum sanguinem consumat 12	<i>Cholerici</i> quem edendi modum seruent 812	
<i>Chamomilla</i> - eius decoctum ad clysteres in hæmorrh. suppressis laudatur 98	<i>Chondrilla</i> vid. <i>Radix chondrillæ.</i>	
in colica non reiicienda est 846	<i>Chorea Sancti Viti</i> 941	
quid præstet in mictu cruento 65	<i>Cibi molliores</i> , præter consuetudinem sumti, intestinorum laxitatem causantur 327	
<i>Chelidonium minus</i> , minus efficax est in hæmorrhoidibus tumetibus 88	<i>acidi</i> cum bile & sulphure maiorem acrimoniam producunt 518	
<i>Chemosis</i> quid sit 204	- intus si sunt fugiendi 278	
<i>China china</i> quæ damna inducat in febribus 656	capparibus conditi laudantur in infarctu lienis 346	
in intermittentibus adhibita scirrhum hepatis sæpe inducit 357	<i>Cibus parcior</i> plethoricis commendatur 10	
in quartana icterum facile causatur 731	<i>dyspeptus</i> cur fluxum mensivm inhibeat 111. 116	
in tertiana continua nullum vlium obtinet 682	<i>Cichoreum</i> specificè laudatur in infarctu hepatis 354	
<i>Chiragra</i> 398. 421. 425	<i>Cinnabaris</i> cuius ætati & sexui maxime est accomodata 190	
hæmoptysin respicit 430	opiatorum vices sæpius supplet 190. 355	
<i>Chirurgia infusoria</i> hodie exole-	spasmos mitigat & transpirationem promouet 1030	
	in motibus moderandis fungitur	

gitur officio cotis	397	lyncope & torminibus colicis laudatur	338 333
<i>Cinnabaris</i> laudatur in coryza acriore	249	<i>Clysteres</i> laxantibus præteruntur in malo hypochondriaco, mictu & vomitu cruento	59. 66. 338
laudatur in grauidis	988	aliquoties repetendi sunt	844
larga dosi commendatur in cephalalgia & hemicrania	190. 414. 417.	maximum vsum habent in colica	843. 844
- - in asthmate spastico	441	quando in lipothymia adhibentur	925
- - in hæmorrhagiis	28	laudantur in epilepsia	462
antepilepticam non habet efficaciam	454. 1030	in dysenteria non habent exitium vsum	641
<i>antimoni</i> ab <i>Oswaldo Kremser</i> laudatur in asthmate	236	emollientes puerperis commendantur	131
<i>Cingulum tinctoris</i> in peste Galliæ inuentum	631	- laudantur in vrinæ vitiis	804
<i>Citri</i> succus pectori præ ceteris amicus est	317	acres cur in hæmorrhoidibus suppressis non sint adhibendi	101
<i>Citta</i>	812	iniecti sæpe per os egressi sunt	844
<i>Clauiani</i>	79	<i>Cochlearia</i> in scorbuto laudatur	760
<i>Clauus hystericus</i> quid sit & vnde nomen habeat	193. 194	<i>Cocta</i> , non <i>cruda</i> , purgare licet	664
- oculi vnde emergat	206	<i>Coctiones</i> veterum in febribus sunt secretiones	474
<i>Clyffus antimonii</i> tertium locum inter acida obtinet	389.	<i>Cæliaca passio</i> febrem cholericum interdum sequitur	512
<i>Clyster</i> extemporaneus	259	diarrhœa	875
aquosus simplex priorem educit	844	<i>Coffeæ</i> potus plus valet aluo expediendæ quam thée	333
motum peristalticum inuersum deorsum reuocauit	851	potus nimis saturatus tremorem artuum otiosis inducit	862
stimulans in vertigine commendatur	239		
e <i>veronica</i> laudatur in malo hypochondriaco - hysterico	338		
e <i>veronica</i> in nephritide,			

I N D E X.

<i>Coffee</i> num hæmorrhoides sup- primat	94	<i>Coma</i> , ei directe nihil adhiberi potest	918
<i>Colica</i>	835	ab opio inductum vix curatur	ibid.
anoterica	193	<i>Commotiones</i> animi, corporis & sensuum nocent post san- guinis iacturam	131
abdominis	ibid.	humorum plures generant impuritates	616
biliosa	836	- vehementes sanguinem in arctissimos meatus impel- lunt	541
conuulsiva	ibid.	- nocent in febribus	558
- a lochiis suppressis	135		585. 681
flatulenta seu pituitosa	392	febriles strictè dictæ a febr- ibus nondum typicis diffe- runt	681
-	836	<i>Conatus vomendi</i> in colica sem- per suspecti sunt	838
habitualis	838	in feminis vomitus cruenti- metum adferunt	839
hæmorrhoidalis	836. 838	<i>Conception</i> noua a lochiis suppres- sis impeditur	135
- vnde oriatur	72. 76. 96. 97	<i>Concha</i> præferuntur oc. cancr.	589
humorosa a pure spasmodica distinguenda est	843	<i>Concoctionis</i> vitia tussim prouo- cant	298
hysterica adficit intestina te- nuia	836	<i>Concrementa uteri fungosa</i> quo modo præoccupanda	977
iliaca	836. 847	<i>Concretio pulmonum cum pleura</i> an certis signis cognosci possit	296. 300
cum singultu mali ominis	445	vnde existat	303
nephritica ad hæmorrhoida- lem refertur	836. 847	<i>Condylomata</i>	97
saturnina quid sit	961	<i>Congestio</i> simplex s: completa	139
<i>Collyrium Weisbachii</i>	241		Con-
<i>Colocynthis</i> phlegmaticis ordi- nari debet	216		
eius pulpa ad clyσμα stimuli loco commendatur	259		
circumspecte debet adhiberi in hæmorrhoidibus sup- pressis	102		
<i>Color flavus</i> icteriodes infantum	1016		
<i>Colostrum</i> infantibus vtile est	1015. 1031		
<i>Coma</i>	913		
somnolentum & vigil	914		

I N D E X.

<i>Congestio</i> quo modo differat ab arthritide 399	<i>Consuetudo</i> quantæ sit efficaciæ 46. 425
incompleta rheumatismus vocatur 140. 149	<i>Contractura</i> ex podagra & chira- gra inueterata eueniunt 431
- difficilius curatur quam completa 144	<i>Contusio</i> quo modo tractanda 180
prima secundam prouocat 142	eius sensum plethorici post motum perferunt & 150
<i>Congestiones</i> non passiuæ, sed a- ctiuæ censendæ sunt 139.	<i>Conyza vulneraria</i> laudatur in vomica pulmonum 317
142	<i>Conuululus</i> 848
frequentiores sunt quam ob- structiones ibid.	<i>Conuulsiones</i> 448
in stagnationem & stasin de- ductæ quos effectus produ- cant 140	quo modo differant a spasms 393. 394
sanguinis ad caput & pectus 39	idiopathica: 448. 430. 456
cui scopo destinata: 301	cur circa phases lunæ occur- rant 450
becchicæ quamquam sint 140	uterinæ differunt a lipothy- mii & suffocationibus ute- rinis 449
pectoris grauiores sunt quam aliæ 144	epileptico hystericæ 118. 136
in consuetudinem deductæ refractariæ ibid.	symptomaticæ 451. 432
noxii earum motus quo mo- do æstimandi 146	variolas nonnumquam præ- cedere solent 450. 452
ulceroso ichorosa: 182	ex inualescente vertigine ex- oriuntur 235
<i>Corserua rosarum</i> vt anodynum laudatur in vomica pulmo- num 319	in febribus sunt periculosa: 452. 471
<i>Satyriouis</i> in adfectibus spasti- co-arthriticis prodesse di- citur 408	in acutis quando sint lethales 451
<i>Consolida saracenicæ</i> in nephriti- de & vomica pulmonum laudatur 317. 376	mortem præcedentes per re- media magis exacerbantur 454
	in consuetudinem dege- neratæ cum causis ma- terialibus proportionem non

non habent	451	<i>Corporis</i> motum nullum pos-	
<i>Convulsiones</i> interdum calculo-		sunt perferre cephalæa la-	
soph occupant	378	borantes	200
abortienti & parturienti su-		<i>Corpulentia nimia</i> Vid. <i>Obesitas</i> .	
peruenientes	452. 995	<i>Correctio</i> materiæ biliosæ facili-	
infantum	456. 798. 1022. 1027	or est quam euacuatio	512
<i>Corallia</i> rubra ppt. in excedente		impuritatam sine euacuatio-	
alui fluxu commendan-		ne frustranea est	21. 22
tur	567	<i>Correctoriam methodum</i> duæ fe-	
in dysenteria parum efficiunt		bres admittunt	665. 666
	641	in paucioribus morbis obue-	
<i>Corallina</i> in dysenteria num quid		nit	5
possit	ibid.	<i>Corrosiua</i> euitanda sunt in hæ-	
<i>Cordialia acriora</i> ad palpitationem		morrhoidibus cæcis	87
cordis nihil iuuant		<i>Cortex mezeris</i> laudatur in cory-	
	293	za & grauedine	249
<i>Corium</i> incensum ad suffocatio-		cascañillæ vide <i>Cascañilla</i> .	
nes hystericas laudatur	846	<i>Cortices aurantiorum</i> specificè	
<i>Corni arboris baculus</i> rabiem re-		laudantur in colica	846
fuscitare dicitur	944	in qualibet flatulentia intesti-	
<i>Cornu cerui</i> tam vstum, quam		norum bene se commen-	
philosophicum excluditur		dant	835
in malignis	589	<i>Coryza</i>	240
vstum in vermibus nihil ma-		branchum præcedit, immo	
gnopere præstat	858	cum illo coniuncta est	251.
<i>Corporis</i> constitutio materialis			253
ad morbos est procliuis	3	iisdem cum hæmorrhagia na-	
extenuatio nimia in graui-		rium rationibus innititur	
dis	981		33. 243
emacrescentia in phthisi	303	acrior, contaginosa, quo mo-	
gracilitas iunca quid noceat		do tractanda	247
	1015	chronica olfactum facile læ-	
habitus athleticus, quid de eo		dit	245
censeat <i>Hippocrates</i>	9	habitualis annosioribus & iu-	
motum cur plurimi renuant		nioribus periculosa	245
	9. 10	infantum	1019
			<i>Costus</i>

I N D E X.

<i>Costus verus</i> viscositates resoluunt	273	<i>Crocus martis</i> aperitius <i>Zwölferi</i>	in mictu cruento laudatur	64
stases catarrhales discutit	250	- intertrigines repellit	1030	
<i>Coxendicum</i> dolores ex hæmorrhoidibus cæcis	82	- adstringens in effera hæmoptylis laudatur	48	
<i>Creta</i> communiter in soda adhibetur	822	<i>metallorum</i> crude vsurpatus	irritat oculos	210
<i>Crinones</i> infantum	1023	<i>Crollii lapis admirabilis</i> laudatur	in ophthalmia serosa	308
<i>Crisis</i> febrium 469. 470. 474 simplex rara apud nos est	676	<i>Cruditas</i> primarum viarum vertiginis causa	229. 230. 234	
<i>Critica</i> euacuationes adferunt euphoriam	470	<i>Crurum</i> inflationes varicosæ in grauidis	980	
<i>Criticas</i> tentare commotiones febribus secundariis non conuenit	499	<i>Crusta lactea</i> infantum	1020	
<i>Criticum</i> nullum est paucum	32	eius repulsio conuulsiones causatur	451	
<i>Crocus</i> cachecticis non prodest	705	<i>Crystalli luna</i> pro scopo diuretico non commendantur	719	
in fluxu lochiorum moderate debet adhiberi	129. 132	tartareæ in vrina hypochondriacorum nihil peculiare denotant	327	
	134. 138	<i>Crystallus montana</i> sistit diarrhoeas	557. 642	
eius concursus tincturas bezoardicas deturpat	648	montana stypticum effectum exserit	517	
egregie laudatur in stasi erysipelacea	177	a <i>Cratone</i> in febribus biliolis commendatur	ibid.	
martis antimoniatus aperitius <i>Stahlis</i> laudatur in fluxu mensium rebellis	110	<i>Cucupha</i>	189. 339	
- - laudatur in mictu cruento	64	quid valeant in memoriæ debilitate	928	
- - laudatur in vomitu cruento	56	qua circumspessione in cephalalgia adhibendæ sint	189	
- - in hemicrania	416	it. in vertigine	239	
- - aluum non adstringit ut china chinæ	663. 671			

I N D E X.

<i>Cucupha</i> quibus subiectis in adfectibus ferolis conducant	249. 918	morrhoidibus turgentibus	84
<i>Cucurbitini</i>	853	<i>vulneraria</i> nocent in febribus lentis & hecticodeis	357
<i>Cucurbitula</i> mammis adposita menses cohibet	112. 124	<i>Decoctum emolliens</i> laudatur in odontalgia	216
<i>Cucurbitula</i> cum multa flamma in vomitu cruento adplicandæ	57	<i>equiseti</i> specificè laudari solet in mictu cruento	64
<i>Cucurbitula caca</i> commendantur in hæmorrhoidibus cæcis	84	loco ordinarii potus in febribus ordinatur	477
commendantur in mensium suppressione	119	<i>lignorum</i> laudatur in adfectibus spastico-arthriticis	406
<i>Cupula cerea</i> præcauet fissuram papillarum	1014	<i>millesolii</i> laudatur ad commotiones circa venam portæ	333. 334. 339
<i>Cura palliativa</i> in odontalgia idiopathica admittitur	214	<i>nepriticum Foresti</i> quem effectum habeat in mictu cruento	64
<i>Cura heroica</i> in febribus nocent	493. 499	<i>Decubitus</i> humorum quid sit	153 164
<i>Cynanche</i>	255	<i>Deglutiendi difficultas</i> in infantibus	1016
secundum Hippocratem vnde oriatur	554	in febribus malignis	598
qui pereunt, convulsionibus moriuntur	258	<i>Delicati</i> facile ægrotant, & difficilius curantur	325.
D.		<i>Deliria acuta</i>	935
D <i>ebilitas synoptica</i> grauidarum	982	ante primum septenarium minoris periculi sunt, quam post eundem	595
<i>Decocta hordei & avena</i> commendantur puerperis	132	chronica	935
ad maturationem hæmorrhoidum tumentium quo modo paranda	85	in febribus sunt symptoma periculosum	471
<i>prunorum</i> laudantur in hæ-		<i>Deliria</i> in febribus eueniunt die critico, quando vena est selecta	475. 476
		in febribus biliosis	511
		<i>De-</i>	

<i>Deliria</i> in febre Hungarica 605	<i>Dentium corruptio & dolor</i> a cephalalgia 183
hypochondriaca ab initio	- interdum phlegmonem
schema acutum interdum	gignit 163. 177
exhibent 520. 934	euullio quando fieri debeat 218
- caussa eorum vbi quaerenda 520	in dolore dentium an vermiculi accusari possint 214
a lochiis suppressis 135	<i>Desiderium</i> conuulsiones provocat 451
paraphrenitica 520. 526	<i>Diabetes</i> 809
<i>Delirium</i> a vermibus 857	<i>Diacodium Montani</i> vt anodynum laudatur in vomica pulmonum 319
<i>Democriti</i> adfertur: hominem totum a natiuitate morbum esse, in quantum verum 3	- in angina 264
Christ. Democriti specificum oleum 455	vehementius est quam M. P. de cynoglossa 274
<i>Dens apri</i> specificè laudatur in pleuritide & peripneumonia 536	<i>Dista cruda</i> sanguinem non reddit impurum 20
it. in inflammationibus 179	menfes suppressit 116
- specifica eius efficacia in statibus nulla est 546	<i>scrupulosa</i> quid ad morbos conferat 3
<i>hippopotami</i> laudatur ad spasmos 397	<i>spirituosa & aromatica</i> in plethora commota nocet 12
improbatur in malo hypochondriaco hysterico 339	<i>vinosa</i> hæmorrhagias narium restituit 40
- nocet in hæmorrhoidibus 75. 102	<i>infantum</i> 1030
<i>hominis phthisi defuncti</i> in odontalgia periculosum remedium 217	<i>lactantium</i> 1014
<i>Dentes sapientie</i> 214	<i>gravidarum</i> 988
<i>Dentitio</i> 1021	<i>Diaphoresis</i> post venæ sectionem in acutis summe necessaria est 677
difficilis conuulsiones causatur 451	conuenit sub saluatione 792
<i>Dentium dolor</i> nonnullis feminis signum grauiditatis est 215	commendatur in gonorrhœa & fluore albo 769. 779
	respicienda est in angina 265

I N D E X.

<i>Diaphoresis</i> immoderata nocet	<i>Diarrhæa</i> in scorbuto	760
in febre tertiana	in purpura	614
præmatura in febribus motus	in variolis	622. 877
naturæ turbat	in febribus malignis	582. 595
476. 483. 514	prodiga in febribus	471
in colica auget anxietates	impetuosa in peste	587. 595
846	in febre tertiana	658
<i>Diaphoretica calida</i> nocent in	in febribus biliosis	513
malo hypochondriaco	febris catarrhalis benigna ad	
336	eam valde inclinatur	544. 553.
- damnantur in rheumatis-		555
mismis	<i>Diarrhæa</i> suppressæ	877. 880
158	excedentes quo modo tra-	
- nocent in spissitudine san-	ctandæ	138. 595. 597
guinis	<i>Diascordium Fracastorii & Syluii</i>	
17	in inflammationibus inter-	
- damnantur in motibus	nis nocet	547
hæmorrhoidalibus	commendatur in diarrhœa	
77		879
positiua nocent iis, qui ad su-	<i>Dies nonus</i> in acutis periculosus	
dandum difficiles sunt	esse deprehenditur	492
797	<i>Digestiua</i> laxantibus sunt præ-	
- non conducunt in febre	mittenda	880
catarrhali	<i>Salina</i> magis materiæ quam	
558	ventriculo succurrunt	827
<i>Diarrhæa</i>	- cur vegetabilibus in febr-	
874	ibus sint præferenda	665
quo modo differat ab hæ-	<i>Diluens</i> cum diluendo bene suba-	
morrhoidibus albis & flu-	gitari debet	122
xu hepatico	<i>Diluentia</i> post hæmorrhagiam	
91	male suppressam expo-	
gravidarum	suntur	30
979	<i>Dionis</i> modus instituendi para-	
infantium	centesim	324
1020	<i>Dioptrica</i> sine necessitate non	
atrophicorum	adhibenda sunt	211
364		
cholericodes puerperarum		
1004		
critica & semicritica		
875		
cœliaca		
91. 875. 877		
colliquatiua in phthisi & he-		
ctica		
300. 304. 571		
in hepatitide		
541		
lienterica		
875. 877		
purulenta in variolis		
622. 626.		
628		
sanguinolenta sub saluatio-		
ne		
790		

<i>Discutientia</i> externa in adfectibus spastico arthriticis	404.	<i>Dolores colici & nephritici</i> differunt	369
	405	<i>capitis</i> , quo modo cum ventriculo conspirent	181. 184.
<i>Distorsio subluxatoria</i> vulgo das Berbrechen	1024	- in sexu feminino medicos vexant	190. 234
caluarix in infantibus	1017	<i>podagrivi</i> quibus verbis expriment	196
<i>Diuresis</i> in lue venerea non est negligenda	789	a lue venerea nocturno tempore communiter exacerbantur	426
in inflammatione prodest	180	parturientium spurii	992. 993
<i>Diuretica</i> temperata commendantur ad calculos minores pellendos	385	a calcitracione fœtus	995
cur ab auctoribus in empyemate præscribantur	375	eorum curatio non est postponenda mitigationi	983
in hydrope non promiscue adhibenda sunt	718	post partum	198
cur in malignis exanthematicis non habeant locum	588	- quo modo mitigandi	1005
<i>acria</i> grauidis nocent	987. 989.	<i>Dolorum</i> causæ explicantur	835
	978		143
- maiorem humorum decubitum ad renes causantur & calculum progenerant	374. 388	<i>Doppelte Glieder</i>	190
<i>calida</i> nephritidem & mitum cruentum causantur	62. 371. 374	<i>Dorncrellii</i> aqua hypnotica	362
stimulantia in vrina: vitii nocent	804	<i>Dorfi</i> spasticus adfectus non est pro nephritico declarandus	215
<i>culinaria</i> nephriticis non conceduntur	375	<i>Drusen</i> stypticum effectum exerunt	409
<i>Dolor coxarum & lumborum</i> in grauidis	980	<i>Dulcia</i> num generent flatus	778
<i>nephriticus & ischiadicus</i> differunt	369	<i>Dyghaus</i> a fellos præparat. in calculo laudat	832
in scirrho sperare iubet	364	eius pulvis sympatheticus in hæmorrhagiis laudatur	388
			29.
		<i>Dyscrasia</i> humorum	30. 48
			374
		I t t t t t 2	<i>Dys-</i>

<i>Dysenteria</i>	631	morrhoidibus suppressis	102
differt ab hæmorrhoidibus			
albis & fluxu hepatico	91	<i>Efflorescentia ulcerosa</i> in ore post	
nulla ab omni febre immunis	631. 633	febres sunt familiares	666
<i>alba</i> cum cholericis excretionibus non confundenda	632	<i>Effluuiorum præfigurationes & elastica potentia</i> num explicent	
- cur periculosior sit quam cruenta	637	conuulsionum causas	450
ad pauciores morbos pertinet, in quibus natura arti		<i>effusiones humorum</i> circa cerebri	
cedere debet	636	ambitum diuersa phænomena exhibent	393
eius complicatio cum hæmorrhoidibus cæcis	89. 643	<i>Eis</i> oben auf dem Kopf quid denotet	194
interdum febrem cholericam sequitur	312	<i>Eiulatus</i> ad hæmorrhagias narivm ansam dat	34
<i>Dyspnæa</i> est mitior gradus asthmatis	280	<i>Electuarium corticis chinae chinae</i>	
hypochondriaca	279	quando in febribus adhibendum sit	671
post hæmoptysin remanens,	49. 51	<i>Electuarium hieræ picræ</i> stimuli loco clysmata laudatur	259
<i>Dyslocia</i>	993	datur in hydrophobia	943
<i>Dysuria</i>	798	- specificè commendatur in	
sequitur hæmorrhoides externas turbatas	72	paraphrenitide	529
		<i>feminae hysc. alb.</i> commendatur in hæmoptysi	48
		<i>Eelephantiasis</i>	739
E.		<i>Elleborus niger</i> in nodulis laxantibus	10
<i>Ëberasche</i>	642	<i>Paracelsi</i> adfertum de illo	12
<i>Ebrietas</i>	955	<i>Elodes</i>	501
<i>Ebriosis</i> paralytici fiunt	891	<i>Elixir antihypochondriacum</i>	924
<i>Ebuli cortex</i> fortiter euacuat	720	<i>polychrestum</i>	599
- <i>Ebullitio sanguinis</i> quo modo placanda	10. 11	<i>proprietas</i> mucum resoluunt & euacuat	841
<i>Eccrisis</i>	470	- hæmorrhoides in Saxonia inferiore familiares facit	17. 73
iæterica in febribus biliosis	517	<i>Elixir</i>	
<i>Edulcorantia</i> nil iuuant in hæ-			

I N D E X.

<p><i>Elixir proprietatis</i> quando con- ducatur in suppressione lo- chiorum 136</p> <p><i>Elixiria calida</i> nocent in tussi 276</p> <p><i>uterina</i> grauidis nocent 986</p> <p><i>Emaciatio</i> atrophica icterum se- quitur 730</p> <p><i>Embrocaciones</i> commendantur in adfectibus spastico-ar- thriticis 409</p> <p>commendantur in rheumati- smis 157</p> <p>laudantur in congestionibus 148</p> <p>laudantur in cephalalgia 191</p> <p><i>Embryonis debilitas & nimius mo- tus</i> 983</p> <p><i>Emetica</i> nocent in plethora commora 12</p> <p>nocent in spissitudine sangui- nis 17</p> <p>fortiora menses supprimunt 116</p> <p>non conducunt in rheumati- smis 158</p> <p>in cephalalgia sunt fugienda 191</p> <p>infelici successu hypochon- driaco hysterice præscri- buntur 59. 335</p> <p>damnantur in inflammatio- nibus 178</p> <p>sola in hemicrania visus læsi- ones causari possunt 415</p> <p>infantibus vix vniquam ne- cessaria sunt 1028</p>	<p>gravidis abortum facile causantur 987. 988</p> <p>non suadentur in tertiana continua 681</p> <p>non profunt in febre lenta 466</p> <p>commendantur in paraphre- nitide 529</p> <p>ordinantur non numquam parturientibus deficiente nifu 995</p> <p><i>Emmenagoga</i> specificè laudantur in suppressione mensium 120</p> <p>tempore intermedio non sunt adhibenda 123</p> <p>- <i>calida</i> ad partum pellen- dum caute vsurpanda sunt 1001</p> <p><i>Emollientia</i> cum maturantibus in- separabilem nexum ha- bent 349</p> <p>in angina pure non adhiben- da 264</p> <p>in epithematibus relaxant poros 264</p> <p>nocent in inflammationibus externis 175. 176</p> <p><i>Emplastica</i> obstruunt poros, & discussionem staseos re- morantur 375</p> <p>in oedematibus incommoda causantur 696. 697</p> <p>tenacia & maturantia da- mnantur in rheumatismis 158</p>
---	---

I N D E X.

<i>Emplastra mucida</i> nocent in inflammationibus 175	<i>de spermate ranarum</i> laudatur in phlegmone 173
continuo adhibita obuiscant poros & impediunt transpirationem 535	- in scabie ferina 743
<i>epicarpia</i> per <i>Helmontium</i> & <i>Knæffelium</i> in quartana commendantur 671	<i>de spermate ceti Mynsichti</i> laudatur in inflammatione 171. 173
<i>Emplastrum de ammoniaco Foresti</i> laudatur in phlegmone & scirrho hepatis 173. 360	<i>stomachale Cratonis</i> 879
<i>ceratum de galbano</i> seu matricale laudatur in paralyfi 898	<i>Vigonis</i> cum mercurio in triplo laudatur ad nodos gallicos 787
in arthriticis spasms 408. 424	<i>Emprosthotonus</i> 390
<i>de cicuta Foresti</i> laudatur in scirrho hepatis 360	<i>Empyema</i> 313. 315. 320
<i>diachylon</i> cum gummatibus laudatur in phlegmone 173	differt a vomica 313
<i>diaphoreticum Mynsichti</i> commendatur in inflammationibus 171. 173	eius materia an per vrinam possit euacuari 325
<i>de meliloto</i> laudatur in phlegmone 173	<i>Emulsiones</i> temperant balsamica crimoniam seri 311
<i>miraculosum</i> commendatur in paraphrenitide 529	pro discussione in pectore laudantur 537
<i>Saponatum Barbette</i> laudatur in phlegmone 173	vsus habent in vrinæ vitii 804
- - in malo ischiadico 424	<i>amygdalata</i> commendantur in mictu cruento 64
- - in adfectibus spasticoarthriticis 408	dilutæ ordinantur in febribus 477
- . refoluit & relaxat 366	<i>Englische Kranckheit</i> 362
- - cur non ultra 10-12. horas in lumbis relinquendum 373. 375	<i>Epyglottidis</i> erosio 252
	<i>Epilepsia</i> 455
	in feminis a motibus hæmorrhoidalibus turbatis 77
	in quo differat a reliquis motibus conuulsivis 456
	habitualis circa insigniores phases lunæ recurrit 448
	456. 457.
	ex vertigine vehementi 235
	<i>Epi-</i>

I N D E X.

<i>Epilepsia</i> nocturna difficilius e- radicatur 457. 459	mationes in lactantibus 1009
uterina quo modo tractanda 328. 452. 453	<i>Essentia absinthii</i> composita vt stomachica commendatur 238
<i>Ephialtes</i> 392. 436	<i>Essentia adianthi albi</i> laudatur in pathematibus venæ portæ 56. 333
<i>Epithema</i> vulgare laudatur in congestionibus 145	- laudatur in fluxu hepatico 101
<i>Epithemata</i> sicca suadentur in ophthalmia 208	- in fluxu mensium rebelli 110
humida partes magis rela- xant 416	- in hæmorrhoidibus nimi- is 74
<i>Equiseti decoctum</i> in mictu cru- ento laudatur 64. 65	<i>alexipharmaca Stahlîi</i> com- mendatur in hæmoptysi 148
<i>Equitatio</i> in phthisi & hæctica commendatur a <i>Sydenhamo</i> 311. 576	- ad correctionem sangui- nis & lymphæ prodest 58. 396
<i>Erasmi</i> casus de delirio a vermi- bus 857	- transpirationem & diure- sin promouet 317. 319. 333
<i>Erotomania</i> personalis 935. 938. 952	- seroso-mucidam materi- am incidit & diapnoën effi- cit 560
<i>Erysipelas</i> 159	- impedit, ne motus feбри- les in lentam & hæcticam degenerent 558. 663
vnde oriatur secundum <i>Hip- pocratem</i> 554	- post febrem vires restau- rat 560
repulsum quid inferat 169. 711	- securum expectorans est 277
eius tota stasis simul discuti- enda 177	- commendatur phthificis tempore eustadias 308
per saturnina repulsum 178	- laudatur in mensium & lochiorum suppressione 123. 136
non debet ad suppurationem perduci 169	<i>Essentia</i>
in consuetudinem deductum quo modo tractandum 179	
internum plerumque perni- ciosum 169	
<i>Erysipelacea</i> sphaelositas in cu- te delitescere potest 169	
<i>Erysipelacea</i> mammarum inflam-	

I N D E X.

<i>Essentia alexispharmaca Stahlil</i>	paucis guttulis exhiberi debet	129
laudatur in recessione variolarum & turgescione emanante	626	
- laudatur in coryza & gravedine	246. 249	
- laudatur in broncho	253	
- laudatur in odontalgia	216	
- laudatur in otalgia	223. 227	
- laudatur in empyemate	323. 325	
<i>balsamica Stahlil</i> laudatur ad mundificationem & consolidationem	172. 224	
<i>cantharidum</i> a <i>Bartholino</i> & <i>Ammanno</i> in gonorrhœa laudatur	775	
<i>carminativa amara</i>	238	
<i>cascarille</i> laudatur in pleuritide & peripneumonia	535 537	
- laudatur in coryza & gravedine	246	
- - in cephalalgia sanguinea	197	
- ab <i>Apino</i> specificè laudatur in febris	478. 599	
<i>centaurii minoris</i> acidulata ad languorem adpetitus commendatur	818	
<i>Corticum aurantium</i> laudatur in doloribus post partum	835	
- vt stomachica & tonica laudatur	238	
<i>croci</i> in fluxu lochiorum		
<i>gentianæ rubra</i> viscositates resoluit	273	
- laudatur in hæmorrhoidibus albis	100	
<i>helenii</i> viscositates resoluit	273	
- laudatur in hæmorrhoidibus albis	100	
<i>hellebori nigri</i> methodo <i>Stahlil</i> parata laudatur in cephalæa	202	
- in vertigine	236	
- in paralyfi & hemiplexia	892	
- in catarrhis	249	
- commendatur ad hæmorrhoides promouendas	73	
<i>ligni sassafras</i> nimis calida est	248	
<i>myrrhæ</i> insignes turgesciones sanguinis concitat	747	
<i>millefolii</i> laudatur in commotionibus circa venam portæ	333. 334. 337. 339	
- - in hæmorrhoidibus nimis	74	
- - in vomitu cruento	56	
- - in diarrhœa & vomitu bilioso	513	
- - in mensium suppressione	120	
- - in clauo hysterico	197	
- - in fluxu mensium rebelli	110	
	<i>Essentia</i>	

I N D E X.

- | | |
|---|--|
| <p><i>Essentia millefolii</i> laudatur in car-
dialgia 327</p> <p><i>petasidis</i> commendatur in
inflammationibus 179</p> <p><i>pimpinellæ albæ</i> præseruandi
scopo in peste laudatur 650</p> <p>- in inflammationibus 179</p> <p>- viscositates resoluit 273</p> <p>- optime se gerit in turbis a
mercurio subnatis 792</p> <p>- commendatur in reliquiis
variolarum 629. 761</p> <p>- egregie se gerit in adfecti-
bus faucium 616. 627. 629</p> <p>- laudatur in tumoribus
glandulosiis 559</p> <p>- in hæmorrhoidibus albis
& fluxu hepatico 100. 101</p> <p>- in adfectibus grauidarum
986</p> <p>- in clauo hysterico 179</p> <p>- in vomitu catarrhosorum
250</p> <p><i>scordii</i> ad corrigendam mate-
riam malam laudatur
596</p> <p>- effectum habet discutien-
tem, balsamicum, diureti-
cum 317</p> <p><i>sabina</i> specificè laudatur in
suppressione mensium 123</p> <p><i>succini</i> sanguinem successiue
attenuat ibid-</p> <p>- tonum roborat in pulmo-
nibus 272. 273</p> <p>- commendatur phthisicis
tempore eustadias 308</p> | <p><i>Essentia succini</i> laudatur in ce-
phalæa 204</p> <p>- in cephalalgia 187. 189. 197</p> <p>- in congestionibus 147</p> <p>- in rheumatismis 159</p> <p>- in broncho 253</p> <p>- in carie dentium 215. 216</p> <p>- in hæmorrhoidibus cacis
89</p> <p>- in coryza & grauedine 246
247. 249</p> <p>- in adfectibus grauidarum
986</p> <p>- puerperis commendatur
138</p> <p>- laudatur in adfectibus ca-
tarrhalibus 248</p> <p>- - aurium 223. 227</p> <p><i>vincetoxici</i> laudatur in hæ-
morrhoidibus albis 100</p> <p><i>Essentia</i>, infantibus exhibendæ,
debent esse temperatæ
cholericis in scabie sicca non
præscribendæ sunt 747</p> <p><i>Ettmüllerus</i> post paroxysmum
epilepticum laudat cam-
phoram 462</p> <p>in infarctu hepatis laudat
gummi ammoniacum 354</p> <p>in vomica pulmonum com-
mendat hederam terre-
stem 317</p> <p>infarctum lineis intestino co-
lo adscribit 346. 335</p> <p>eius obseruatio de surdita-
te in acutis 223</p> <p style="text-align: right;">Vvv vvv <i>Fit-</i></p> |
|---|--|

I N D E X.

<i>Eitmüllerus</i> , eius obseruatio de mictu cruento critico 66	<i>Excreſcentia fungoſa</i> circa anum in infantibus cum ſcabiē venerea concurrunt 739
eius adfertum de cacochymia & cachexia 20	<i>Excretiones ſuppreſſæ</i> dolores augent 406. 407
<i>Euacuantia</i> quando noceant in hydrope 718	in febris a medico ſunt agnoscenæ 474
<i>Euacuatio</i> impuritatū <i>correcti-</i> <i>oni</i> mox ſubiungenda eſt 21. 22	inuoluntariæ in febris pe- riculoſæ ſunt 471
<i>emetica</i> & <i>cathartica</i> in febrī- bus bilioſis caute inſtituen- da 515	<i>Exeſſo tunica cornea</i> 206
in pluribus morbis neceſſaria, correctio in paucioribus 622. 336	<i>Exomphalos</i> non raro iungitur aſciti 709
<i>Euacuationes vniuerſales</i> præmit- tendæ ſunt <i>particularibus</i> 6	<i>Expectorantia</i> humores verſus pectus inclinant 146. 270 319. 375
<i>vehementes</i> in febris ſuſpe- ctæ ſunt 475	ulcerofam corruptionem in- ducunt 285
in congeſtionibus itidem re- iiciuntur 146	phthiſin cauſſantur 402. 558
<i>Euphorbium</i> laudatur in coryza & grauedine 249	non ſolum ex pectore, ſed & <i>per</i> pectus euacuant 275. 277. 309
<i>Euphraſiæ</i> laudes in ophthalmiis ſunt exiguæ 210	periculoſa ſunt in aſthmate ſpaſtico 442
<i>Exanthemata</i> non propelluntur ex particularum figura 579	fugienda ſunt in broncho & raucedine 253
legitime non ſuccedentia conuulſiones cauſſantur 450	damnantur in pleuritide & peripneumonia 421. 537
interdum cum ſingultu ſtipa- ta ſunt 445	ordinantur in vomica pul- monum & ſuffocationis periculo 316. 286
eorum reſſiones in febrī- bus periculoſæ ſunt 471	dulcia damnantur 319
<i>Excreſcentia hæmorrhoidales</i> 79	<i>Expulſiones</i> inflammatoriæ 165
<i>fungoſa</i> quoq; modo tractandæ 788	<i>Exſiccantia</i> nocent in hæmor- rhoidibus cæcis 87
	<i>Extenuatio</i> corporis nimia in gravidis 981
	Ex-

<i>Extractum</i> panchymagogum	<i>Fascinatio</i> in infantibus	1023
<i>Crollis</i> bene & leniter purgat	<i>Fascinum</i> in praxi frequentissime falso accusatur	954
- laudatur in rheumatismis	<i>Fatigationis</i> sensus in plethoricis conuenit cum rheumatismo vniuersali	8.150
- hellebori nigri laudatur in vertigine	<i>Faucium</i> erosio quo modo subleuanda	783.787
- laudatur in tussi	<i>Febres</i>	463
<i>tabaci</i> ad tussim pectoralem & chronicum commendatur	earum species	464.466
- quo modo propinari debeat	effectus earum semper salutaris, euentus sapissime irregularis	469
<i>theriacale</i> plurimum de opio participat	sibi relictae facilius restituntur quam turbatae	471
<i>Extumescencia rubro-liuida</i> quo modo tractanda	interdum rheumatismos seu metastases humorum efformant	153.154.472
	non a febre, sed cum febre patientes intereunt	469
F.	earum crisis & lysis	469.470
<i>Fabaria</i> , eius radix specificè laudatur in hæmorrhoidibus tumentibus	peruersa earum tractationes recensentur	357
<i>Facies Hippocratica</i> in hæcticis & phthisicis quid indicet	typum seruantes minoris periculi sunt	470
	stata sua tempora habent	471
<i>flaua</i> in nonnullis hepatis debilitatem denotat	<i>Febris</i> in corpus male dispositum ingruens, anomalizat	470
eius turgescens inflammatoria in variolis bonum signum est	<i>Febriles commotiones</i>	685
<i>Farina laterum</i> in soda non probatur	earum metaschematismus prudenter considerari debet	678
<i>Farinacea</i> laudantur in erysipellate	melancholiae hypochondriacae superuenientes schema phreniticum ab initio communi-	
<i>Fascina</i> quid ad epilepsiam conferant		

I N D E X.

muniter exhibent	934	<i>Febris simplex</i> in lentas & hē-	
in calculosis ante excretio-		cticas propendet	555.
nem calculi	373		558
in vera otalgia accedunt	219.	- ad diarrhœas valde incli-	
	220	nat	553
podagricis interdum eueni-		- ad tussim, coryzam &c. fa-	
unt	426	cile accedit	241. 245. 267.
nephriticos occupant	369		560
in infantibus	1022	- est contagiosa	555
<i>Febris acuta</i> legitima numquam		<i>Febris maligna</i> petechizans	591
pro causa habet saburram		- cur ita adpelleretur	594. 601
primarum viarum	475	- ad diarrhœas ad modum	
exquisitas periodos per septe-		prona est	592
narios absoluit	469	- ordinarie sine typo, sed	
resoluto lienis infarctui su-		non sine periodo est	ibid.
perueniens	345	<i>Febriçula catarrhalibus ad fines</i>	
<i>corrupta</i> periculosissima est		quando eueniant	555
	687	<i>Febris ad catarrhum suffocatiuum</i>	
ad 28. dies se extendens in		accedens, salutaris non est	
lentam transmutari vide-			911
tur	469	<i>Febris cholericæ</i>	505
a mictu cruento cohibito in-		<i>Febris composita</i> ex acuta periodo	
duci potest	63		674
<i>gravidarum</i>	984	<i>Febres compositæ</i> ad recidiuas in-	
<i>Febres biliosæ</i>	475. 505	clinant	682
difficiliter per se bonum fi-		cur tam frequentes sint in re-	
nem attingunt	510	gionibus nostris	675
transeunt in lentas & hēcticas		<i>Febres continentes</i> raræ sunt in re-	
	511. 517	gionibus nostris	489
in aliis tertianarium quid re-		- a <i>continuis</i> quo modo dit-	
ferunt	514	ferant	484. 489. 490
cum petechizantibus inter-		<i>Febris continua</i> simplex	490
dum concurrunt	519	<i>Febris corrupta</i> cuius indolis sit	
<i>Febris catarrhalis</i>	551		685. 686
<i>simplex</i> seu <i>benigna</i> non facile		<i>Febris ephemera</i> simplex & plu-	
format apostolæ	555	rium dierum	479
		<i>Febres</i>	

I N D E X.

<p><i>Febres epidemica</i> 576. 577 typum tertianarium non nunquam simulant 658. 665 <i>Febris hectica</i> 567 differt a lenta 560 ulcerationum internarum comes est 570 phthisi superueniens de malo confirmato testatur 299. 304 <i>Febris hemitritica</i> 514 <i>Febris horrida</i> 501 <i>Febris Hungarica seu castrensis</i> 604 <i>Febris inflammatoria</i> 160. 500 ad acutas pertinet 498 quem in finem a natura insti- tuatur 502. 503 pro partis inflammatae diuer- sitate, diuerse nominatur 500 accedit ad apostases febriles 156 puerperis non raro accedit 130. 134 1003 matutino tempore inuadens plus habet periculi 541 <i>Febris ad intestina conuersa</i> quid sit 634 <i>Febris intermittens</i> diuturna, pro catarrhali non est habenda 552 <i>Febres intermittentes</i> temporis ordines exquisitos non ser- vant 469 incongrue tractatae quid caus-</p>	<p>sentur 342. 344. 352. 355. 357. 656 <i>Febris lenta</i> 560 quibus causis superueniat 497 ex ephemera prognata quo modo se gerat 483. 567 quo modo in acutum muta- tur 499 a fluxu mensium nimio per- ennante 109 lentam exposcit curam 563 567. 664 <i>Febris lethifera Hippocratis</i> 510 <i>Febres malignae</i> 576 saepius lethales sunt, vel labem viscerum relinquunt 466 crisin stricte dictam non ex- hibent 578 nulli fere homini parcunt ibid. periodus earum breuis est 580 haemorrhagiae iis accedentes non carent periculo 33. 35 <i>Febris miliaris seu purpurea</i> 607 puerperas infestat 1003 <i>Febris papularis</i> ibid. <i>Febres pestilentes</i> permalignae di- cuntur 577 <i>Febris petechialis</i> 601 <i>Febres putridae</i>, quas & cur vete- res adpellauerint 489 <i>Febris quartana simplex</i> 666 sedem habet in visceribus cum vena portae connexis 668. 669. 673</p>
--	---

I N D E X.

<i>Febris quartana</i> vomitum cruentum subinde habet coniunctum	53	<i>Febris tertiana</i> raro ante quartum paroxysmum cessat	660
sæpe cum ictero concurrens	731	nihil critici habet	ibid.
autumnalis ad tempus vernale sæpe se extendit	669	aliquando contagiosa adparet	662
diu pro scandalo Medicorum habita est	ibid.	post vermes excretos aliquando soluta est	857
<i>continua</i> , ad hecticam indolem proxime accedit	682.	suppressa est reuocanda	664
	684	<i>continua</i>	668
<i>Febris quintana</i>	673	- exanthematibus non raro stipata est	680
<i>quotidiana</i> intermittens	651	- an ad biliosas referri possit	506
cur interdum continuat, licet vitium primarum viarum sublatum sit	653	- eius paroxysmi quo modo sibi respondeant	651
<i>continua</i>	551	<i>veterum extensa</i>	679
<i>rheumatica</i> differt a catarrhali	552	<i>Febres typicæ</i>	470
	607	<i>nondum typicæ</i>	685
<i>scarlatina</i>	607	<i>Seig-Wargen</i>	79
<i>Febris secundaria</i>	494. 495	<i>Fel</i> animalium specificè laudantur in ictero	732
minus commode vocantur		<i>carpionum</i> in inflammationibus iners remedium	179
<i>symptomatica</i>	496	<i>Femina</i> cur præ viris morbis sint obnoxia	3
exquisitum typum non servant	496. 497	plethoricæ sæpe steriles sunt	10
malignitatis non possunt argui	498	quædam per totam vitam menses non experiuntur	114
<i>febris septimana</i>	673	morbi earum plurimi a mensium vitiiis dependent	116
<i>synocha</i> seu <i>continens</i>	484	num phthisi magis sint expositæ quam viri	300. 301.
<i>tertiana</i>	676		304
XII. horas excedens pro notha seu composita habenda est	659		<i>Femi-</i>
anomala	ibid.		
acuto typo propinqua est	662		

I N D E X.

- Feminae* interdum podagra adfi-
ciuntur 429
multæ ad senectutem vsque
fluore albo laborant 765
- Fermentatio* an causetur conge-
stiones aut febres 142. 466
- Fermentum specificum* in febre ma-
ligna nondum satis explo-
ratum est 599
in variolis & morbillis non
potest determinari 621
- Ferrum* frigidum laudatur ad ex-
tumescentias rubro liuidas
174. 175
- Festuca* sub cranio latitantes con-
vulsiones caussantur 451
- Ficus ani* 79
- Sieber = Kuchen 355
- Filamenta* mucida in nephritico-
rum vrina 370
- Fissura papillarum* in lactantibus
1013
- Fistula ani* 83. 85
inducere potest hecticam 83
lacrimalis 206
vesicae 782
post paracentesin empyema-
tis 322
- Flammula cordis* accensio pro
caussa febris vulgo habetur
468
- Flammula carulea* ex faucibus e-
briorum erumpens 956
- Flatulentia* 828
quæ eius caussa sit 831
stataria vel oberrans 328. 829
- Flatulentia* consuetudinalis 832
sæpe consensualiter in moti-
bus hypochondriaco hy-
stericis oboritur, 327. 328.
337. 833
- hysterica* 328
- lochialis* 1004
- infantium* falso pro concretio-
ne declaratur 1024. 1030
in grauidis 979
flatulenta ventriculi disten-
sio non perfert vomitoria
239
- Flatus* anoterici seu ructus 833
- vesicae & uteri* rarius contin-
gunt 829
libera eorum emissio consue-
tudinem inducit 833
voluntaria eorum cohibitio
maiora facit mala 832
- habituales*: eorum suppressio
tympanitem & hecticam
inducit 833
- Flores bellidis min.* in discutien-
dis stasibus internis, mino-
ris sunt efficaciam 546
- graminis* laudant ad hæmor-
rhagiam narium promo-
vendam 189
- sulphuris* laudantur ad expel-
lendas repulsas efflorescen-
tias 453
- verbasci* laudantur in proci-
dentia ani 867
in hæmorrhoidibus tumen-
tibus 185. 689

<i>Fluor albus</i> differt ab ulceratione vteri interna 762	<i>Fluxus hepaticus</i> quo modo tra- ctandus 100. 103
supplet vices fluxus menstrui 97	<i>uterinus</i> grauidis noxius est 987
quando venereus habendus sit 765. 767	<i>Fætida</i> ordinarie perferre pos- sunt hystericae 185
feminas facile reddit steriles 765	<i>Fætor oris</i> 819
gravidarum rarissime euenit 979	cum fætoze ex naribus non confundendus 820
per maritum communicari potest 765. 778	nauseosus in lue venerea 783
familiariter concurrit cum gonorrhœa & scâbie vene- rea 739. 765	<i>Fætus</i> legitimus a mola discer- nendus est 973
morbus est pertinax & facile recrudescit 765. 767. 768	si legitimum situm non oc- cupat, quid faciendum 996
habitualis vteri prolapsum causatur 766	<i>abortiuus</i> quando promoueri debeat 130
benignus curatu difficillimus 765	<i>mortuus</i> quo modo expellen- dus 984
- a mensium suppressione 118	<i>Folia betulae</i> laudantur in colica feminarum 846
malignus seu venereus 762	<i>senne</i> sanguineis ordinanda sunt 216
- citius superatur quam be- nignus 765. 768	<i>Fontanellæ</i> subsidentia in teneris lethale signum est 1030
Sluß in den Magen gefallen quo modo intelligendum 241	<i>Fonticuli</i> in ophthalmia con- stantem vsum exigunt 209
Kalte und hitzige Flüsse 152	fluxus catarrhales iuniorum intercipiunt, sed cum in- commodo 242. 248
scharfe, salzigte Flüsse 140	eorum neglectio congestio- nes & rheumatismos causat satur 141. 154
- ist nicht kalt, ob gleich das Ge- fühl kalt ist 198	obesis parum leuaminis adfe- runt 13
<i>Fluxus aurium</i> 219	non nisi in statu seniorum sur- dastro adplicandi sunt 228
<i>hepaticus</i> 89. 91. 98	
conspirat cum hæmorrhoi- dibus 95	

<i>Foniculi</i> commendantur in cephalæa venerea	203	<i>Frictiones</i> conueniunt ad sudorem eliciendum	797
laudantur in adfectibus soporosis	918	commendantur in cephalalgia	187
commendari solent in asthma	287	laudantur ad reuulsionem in nephritide	373
<i>Foresti</i> decoctum nephriticum quid in mictu cruento efficiat	64	pedum suadentur in cephalæa	204
eius obseruatio de cephalæa	202	cum sale & aceto in vertigine	237
- - de iuvene vomica pulmonum laborante	319	- conducunt in hæmorrhoidibus turgentibus	84
<i>Formica</i>	79	post venam sectam in angina quando conueniant	272
<i>Fotus</i> calidi in effera hæmoptysi & vomitu cruento commendantur	48.57	cum panno aspero inflammationes caulari possunt	166
<i>Fouca</i> in variolis an præcaueri possint	629	<i>Griesel</i>	608
<i>Fraga</i> calculum pellunt, sed non resoluunt	388	<i>Frigoris</i> sensus circa futuram sagittalem in hysteriis	8.
<i>Franckii</i> antepilepticum	462.463		189. 194. 198
<i>Fraxini cortex</i> laudatur in infarctu lienis	345	- in doloribus a congestionibus ortis	143
<i>folia</i> siccata commendantur ad sudationes	721	<i>Frigus</i> num ardorem inducat	821
<i>Stress</i> -Sieber halten lang an	662	<i>Fructus fugaces</i> austeri singultum prouocant	444
<i>Frictiones</i> commendantur in effeferis narium hæmorrhagiis	37	<i>Fructus hortenses</i> fermentum specificum in dysenteria non constituunt	635
laudantur in hæmoptysi & vomitu cruento	48.57	<i>Fulmine tacti</i> raro restituntur	964
profunt in motibus spasticarthriticis	409	<i>Fumaria humoribus</i> ipsis tantopere non succurrit	706
vtiles sunt in congestionibus	148	in ictero vsu abstersiuum habet	731
		in lue venerea non conducit	789
			789
		Xxx xxx	<i>Fumi</i>

I N D E X.

<i>Fumi corrosivi hæmoptysin cau-</i> <i>fantur</i> 46	<i>dis placandum laudantur</i> 987
<i>Fumus sulphuris & antimonii pro-</i> <i>tussi sedanda laudatur</i> 310	<i>Genitalium partium læsiones vn-</i> <i>de dignoscantur</i> 569
<i>Fungus sambuci ad gargarismata</i> <i>specificè laudatur</i> 260	<i>Geniana rubra diarrhœas fistit</i> <i>& tonum roborat</i> 380
<i>Funiculè umbilicalis circumuo-</i> <i>lutio</i> 983	<i>Germanis nostalgia familiaris est</i> 949
<i>Furfuracea laudantur ad curam</i> <i>erysipelatis</i> 173	<i>Gesneri virga aurea laudatur ad</i> <i>resolendum calculum</i> 388
<i>Furores uterini</i> 935.938	<i>ut traumaticum laudatur in</i> <i>vomica pulmonum</i> 317
G.	<i>Gibbosi tussi siccæ subiecti sunt</i> 269
G <i>Aleni κόπος ἐκώδης</i> 426.427	<i>ex asthma breui post pere-</i> <i>vnt</i> 282.283
<i>experimentum de cane</i> <i>asthmatico</i> 279	<i>Glaciei frustum capiti impositum</i> <i>hystericæ sentiunt</i> 8.189.
<i>Galeopsis specificè laudatur in</i> <i>fluore albo</i> 768	194.198
<i>Galle dem Patienten in den Ma-</i> <i>gen getreten</i> 518	<i>Glandula externæ indurata de</i> <i>infarctibus glandularum</i> <i>mesenterii restantur</i> 363
<i>Gangrana quo modo existat</i> 170	<i>Glied ist eingeschlaffen</i> 889
<i>non est peculiaris species, sed</i> <i>summus gradus inflamma-</i> <i>tionis</i> 160.167	<i>doppelte Glieder</i> 362
<i>Gargarisma, quid circa eius ad-</i> <i>plicationem observandum</i> 263.265	<i>Globulus cereus commendatur in</i> <i>prolapſu vteri & relaxatio-</i> <i>ne spincteris vesicæ</i> 809
<i>adstringens laudatur in phre-</i> <i>nitide</i> 526	<i>Glossagra</i> 398
<i>Gargarismata commendantur in</i> <i>angina</i> 259.260	<i>Glycyrrhiza spissitudinem mol-</i> <i>lem & pulposam facit</i> 275
<i>laudantur in otalgia</i> 228	277
<i>Geden-Zeyl</i> 934	<i>Gonagra</i> 398.422.425
<i>Gemmata laudantur in animi pa-</i> <i>thematibus</i> 293	<i>hæmorrhoides externas re-</i> <i>spicit</i> 72.430
<i>ad motum elisorium in gravi,</i>	<i>a doloribus podagricis simul</i> <i>inuoluitur</i> 427
	<i>Gonor-</i>

<i>Gonorrhœa</i>	769	tractandi sint	985
quæ inter benignam & malignam medium locum occupet	770	<i>Gravida</i> aliquando menses experiuntur	111
familiariter concurrit cum scabie venerea	729	nonnumquam vomitum cruentum incurrunt	53
male tractata per morfulos antimonii curari dicitur	408	intumescencia a tumore cachectico - ascitico quo modo discernenda	952
Suppressa quæ damna inducat	772	iis hodie venam in pede secamus	192
- quo modo reuocanda	777	illæ sæpe experiuntur hæmorrhoides turgentes	81
virulenta primus gradus luis venereæ dicitur	762. 764	<i>Graviditatis</i> signa	215. 972
	772. 774	<i>Gravitas</i> artuum in gravidis	975
ob loci conditionem sæpe pertinax est	774	<i>auditus</i> , quo modo tractanda	219. 226
illam tractandi methodus specialissima	775	a metastasi febrili	228. 517
- - methodus Sydenhami	776	<i>Grylli</i> laudantur in calculo	387
<i>Cracilitatem</i> corporis iunceam sibi conciliare velle vanitas est	1015	<i>Güsse machen Flüsse</i>	244
<i>Graciliores</i> raro a calculo instantur	380	<i>Guldene Uder</i> , aureas qualitates non exferit, nisi legitime fluat	82. 101
<i>Gramen ossifragum</i> iumentis nocet	649	<i>Gummata gallica</i> , quo modo tractanda	783. 787
<i>Grammanni tinctura antiphthisica</i> pectori damna adfert	309	<i>Gummi ammoniacum</i> per pulmones & aluum euacuat	286
	575	- temperatissimum est	367
<i>Grauedo</i>	240	- ob efficaciam resoluendi in infarctu hepatis laudatur	313. 354. 364. 367.
ad febrem catarrhalem benignam accedit	557	<i>Gummi Galbanum</i> nimis acre obseruatur in atrophia	367
infantum	1019	- Arabicum mitigandi scopo in dysenteria laudatur	642
<i>Gravidarum</i> adfectus quo modo		- Boyle commendat in diarrhœis	881

I N D E X.

<i>Gummi gutta</i> fortiter euacuat	<i>Hamoptysis</i> in morbis chronicis
720	sepius funesta 47
<i>iuniperi</i> a nonnullis ipsi suc-	ex palpitatione cordis 291
cino præfertur 719	suppressa ulcerationes pul-
<i>resina</i> sanguinem concitant	monum relinquit 50. 63
178	<i>Hamorrhagia</i> in genere 23
<i>tragacanthum</i> Boyle in diar-	earum causæ, quæ vulgo ad-
rhœis commendat 881	legentur 26
<i>Gundelsheimeri</i> methodus in va-	quas utilitates adferant 27
riolis 628	qualis sanguis per eas ex-
<i>Gutta serena</i> a cephalalgia indu-	cernatur 31
ci potest 185	non perdunt thesaurum vitæ
<i>Gyratio</i> subiecti in vertigine vn-	26
de 231. 233. 234	arteriarum ad excessum faci-
	le inclinant 31
H.	criticæ 24
H <i>æmatites</i> vulgo in hæmor-	diuturniores ascitem causari
rhagiis adhibetur 30	possunt 710
non conducit in vomica pul-	hæreditariæ 26. 31
monum 319	habituales labem visceris ab-
<i>Hamophobi</i> in lipothymiam in-	dominalis sæpe coniun-
cidunt 884	ctam habent 35
<i>Hamoptysica</i> euacuatio non per-	inopportunæ in febribus
rumpens phthisin causatur	symptoma periculosum
301	471
molimina adiunt in broncho	moderatæ sponte subsistunt
251	25
<i>Hamoptysis</i> 43	nimiæ atrophiam & hecti-
omnium hæmorrhagarum	cam inducere valent 131
periculosissima est 47	364. 367. 570
cur plerumque lethalis sit ib.	quæ per palindromen adul-
pro prodromo phthiseos de-	tioribus accidunt, quid ve-
claratur 47. 51. 299. 300	lint 34. 35
periodica 43. 47	passiuæ quo modo tractandæ
effera quo modo tractanda	31
48	non succedentes suppressæ
	& tur.

I N D E X.

& turbata multas anomalias inuoluunt	25. 27. 30. 39	- abortum minatur	977
	101. 141. 142	- specialis differt a lochiorum fluxu	124
<i>Hæmorrhagia abortiua</i>	104. 987	- curatu difficilis est	109
<i>mammæ</i>	992	- adstringentibus caute tractanda	112
<i>narium</i>	32	<i>Hæmorrhagici motus</i> si non erumpunt, deliria caussantur	492. 502
quibus post annum XXX. contingat	34	<i>Hæmorrhoidalia molimina</i> non promiscue sunt promouenda	73. 74. 98
- in variolis & morbillinum damnum adferat	35. 628	<i>Hæmorrhoidarii</i> præcipites sunt in mictum cruentum, nephritidem & calculum renalem	53. 76. 380
- soluit cephalalgiam	185. 189	multi sunt calculosi	76
- soluit paraphrenitidem	529	<i>Hæmorrhoidalis fluxus</i> e ventriculo	54
- hypochondriacis, cachecticis & hydropicis nihil boni præfagit	35	serpigo	79. 81
- in senibus quo modo consideranda	ibid.	sudor	ibid.
- effera quo modo tractanda	36	<i>Hæmorrhoidales motus</i> transfugiantur & turbantes	72. 77
- habitualis in ætate minus congrua	35	anomalix	91. 92
- enormis in grauidis	974	excrementix	79
- critica & non critica suppressa quid causetur	35. 41	<i>Hæmorrhoides</i>	66
	582. 595	quo respectu beneficium naturæ & salutares dici possint	71. 97
- in scorbuto non est reprimenda	200. 760	sexui masculino magis quam feminino eueniunt	69
- suppressa grauiora damna infert quam excedens	39. 486	noxium accidens esse multi ex errore opinantur	101
ad eam prouocandam varia laudantur	189	vnde in Saxonia & Hungaria tam familiares sint	71
<i>naris dextra</i> hepatitidem soluit	541. 542	fluentes hæmoptysin præoccupant	49
in grauidis	974		
uterina	104		

I N D E X.

<i>Hæmorrhoides</i> iunioribus ex hæ-	<i>Hæmorrhoides</i> cum malo ischi-
reditaria dispositione flu-	adico & nephritico mutu-
unt 69	um habent commercium
iuniorum & annosiorum dif-	76. 423
ferentis sunt prognoseos 72	cum arthritide cognatæ sunt
in feminis mensium cessatio-	71. 76
nem excipere solent 97	differunt ab euacuationibus
facile recurrunt 70	sanguinis e superioribus
quæ raro eueniunt tumultua-	intestinis 63
riæ sunt 76	<i>Hæmorrhoides albæ</i> 89. 90
nephriticis salutare sunt 65	vices tenent fluxus hæmor-
372	rhoidalis 97
delirium soluunt 71	quo modo tractandæ 99
hipochondriacos subleuant	<i>caca</i> 77
71. 331	e cum dysenteria compli-
asthma sæpius mitigant 283	catæ 89. 643
splenitidem soluunt 549	<i>decolorata</i> 89. 90
icterum soluunt 730	<i>difficilius erumpentes</i> 98
podagram soluunt 432	emanentes 90
hæcticæ superuenientes de	<i>excedentes</i> refractariæ indolis
malo confirmato testantur	sunt 71
569. 571	<i>externa</i> differunt ab internis
suppressæ mictum cruentum	67. 77. 78
causantur 61	- earum molimina longin-
reuocatæ eundem soluunt 65	qua per totum fere abdo-
- vomitum cruentum sol-	men sæuiunt 80
vunt 57	raro sanguinem effundunt 82
obstructæ quid causentur 195	86
suppressæ quæ pathemata &	<i>furentes</i> 82
pericula inducant 72	<i>imminentes</i> quibus signis se
earum reuocatio in colica	prodant 68
hæmorrhoidali in præsens	<i>interna</i> 66
cordi non est habenda 345	- tempus aluinæ excretionis
per pellentia fortiora non	semper expectant 68. 80
sunt reuocandæ 58	- suppressæ transeunt in
cur aloëticis prouocentur 71.	motus externarum 72. 77
835	<i>Hæmor-</i>

I N D E X.

<i>Hamorrhoides molientes</i> s. <i>moli-</i>	<i>Hæctica</i> , quis eius sit scopus	574
mina hæmorrhoidalia	differt ab atrophia	360
mucida	scirrhum vel exulcerationem	pro fundamento habet 356
<i>nimia</i>		360
- vitæ iacturam non statim	quo modo ab adstringenti-	
inferunt	bus inducatur	29. 47
- quo modo tractandæ	sequitur hæmorrhagiam vte-	
- iu gravidis	ri	109
<i>re vera nimise</i> labem visceris	succedit mensium suppressio	
abdominalis prælagiunt	ni male tractatæ	118
	euenit a lochiis suppressis	135
<i>notba</i>	in tympanite statum concla-	
<i>ordinata</i>	matum significat	714
<i>periodica & vaga</i>	phthisi superueniens lethalis	
<i>suppressæ</i>		304
quo modo tractandæ	si ad ἀκμὴν peruenit, medica-	
<i>torminosa</i> a dysenteria distin-	tio est intermittenda	570
guendæ sunt		576
632	abdominalis & pectoralis	
<i>Hamorrhoides tumentes</i> cur κατ'	quo modo differant	297
ἰξοχὴν cæcæ vocentur		575
- sunt verus furunculus	chronica	567
	habitualis	568
- in ulcerationem fistulo-	renalis	372
sam transeunt	<i>Hæctici</i> sub finem copiosos su-	
83	dores habent	794
<i>turgentes</i>	<i>Hedera terrestris</i> specificè lau-	
- facile ulcerantur	datur in vrinæ vitis	804
- gravidis eueniunt	- commendatur in mictu cru-	
81. 981	ento	65
<i>verrucosa</i> ulcerascentes ex lue	laudatur in nephritide	376
venerea oriuntur	vt traumaticum in vomica	
783	pulmonum commendatur	
<i>vesica</i>		317
viæ earum insolitæ	<i>Zeimern, Zeim-Weh</i>	948
92. 96	<i>Zunger:</i>	
<i>Halß: steiffer Halß vom übeln lie-</i>		
<i>gen</i>		
391		
<i>Hæctica</i> febris		
eius tres gradus		
567. 568		
ex quibus signis appareat		
364		

Zunger : heiff = Zunds = Oct; fen = Zunger 811. 814	<i>Heluctius</i> nostalgia familiaris est 948
<i>Helleborina</i> in cephalalgia non sola sed cum aliis miscenda 191	<i>Heluigii</i> obseruatio de raucedine feminarum 254
nocent in hæmorrhoidibus cæcis 87	<i>Hemicrania</i> 398. 409
circumspecte adhibenda in hæmorrhoidibus suppressis 102	differta cephalalgia 182. 410
commendantur in vertigine 236	cur sinistrum latus plerumque adficiat 416
<i>Helleborus</i> num tantum sanguinis consumat 12	augefcente ætate vel cessat, vel ad pedes descendit 401
<i>albus</i> fortiter euacuat 939	libenter in plenariam arthritidem transit 412
in chronicis & hydrope quo modo adhibendus 719	periodica & paroxyzans interdum medicationem eludit ibid.
vis emetica per coctionem abigitur ibid.	<i>Hemiplexia</i> 888
<i>niger</i> in grauitate auditus laudatur 225. 227	<i>Hepar calidum</i> in obesibus veteres temperare voluunt 12
- ad sordes primarum viarum commendatur 396	interdum concrementum gerit, quod cum calculo concurrat 378
- melancholicis est ordinandus 216	eius constrictio aut expansio hydropem causatur 712
- eius fibræ commendantur in hæmorrhoidibus albis 99	<i>anguilla</i> ad foetum & secundinas excludendas laudatur 129. 130. 985. 994. 998
<i>Helmontius</i> negat cacochymiam 20	<i>galli nigri</i> specificè laudatur in hepaticide 547
eius adsertum de thesauro & balsamo vitæ 11	<i>Hepatis debilitatem</i> antiqui accusabant in fluxu hepatico 92
eius amuleticum in hæmorrhoidibus internis caute adhibendum 75	<i>inflammatio</i> omnium periculosissima est 168
eius annulus in hæmorrhoidibus cæcis 89	<i>infarctus</i> 350
	<i>scirrhus</i> 356
	viciu(m) vnde dignosci possit 568
	<i>Hepa-</i>

I N D E X.

<i>Hepaticus fluxus</i>	89. 91	algia	217
est malum chronicum	98	<i>Herba veronica</i> ad clysterem	
illum veteres per adstringen-		commendatur	338. 372. 383
tia tractare religioni sibi		<i>teucris folio</i> pro humectatione	
ducebant	103	vniuersali comendatur	223
<i>Hepatitis</i>	500. 538	<i>verbena</i> a <i>Foresto</i> specificè lau-	
ex pleuritide spuria oriri pot-		datur in cephalalgia	189
est	420	<i>wulneraria</i> in calculo exacer-	
fere semper transit in hecti-		bationem inferunt	389
cam	542	<i>Hiernia incarcerata</i> passionem	
<i>Herba abrotani</i> specificè laudatur		iliacam caussari potest	849
in ictero	731	præsente inflammatione non	
<i>adanthi albi</i> specificè laudatur		est incidenda	851
in pathematibus venæ por-		<i>Zerrn=Kranckheit</i>	433
tæ	56. 333	<i>Zerg abdrücken</i>	392
<i>britannica veterum</i>	757	<i>Zerg=Wurm</i>	362
<i>capilli veneris</i> resoluit stases		<i>Hiera picra</i> in ventriculi adfecti-	
mucidas & catarrhales	312	bus laudatur	818
<i>centaurii minoris</i> laudatur in		eius electuarium stimuli loco	
fluxu hepatico	103	ad clysmā	259
<i>equiseti</i> in mictu cruento per-		<i>Highmorus</i> primus malum hyste-	
tinaci commendatur	65	ricum cum hypochondria-	
<i>fumariæ</i> laudatur in fluxu he-		co conuenire docuit	326
patico	ibid.	<i>Hildanus</i> de hæmorrhagia per	
<i>hyssopi</i> stases sanguinis resol-		umbilicum	24
uit	228	<i>Hippocratis</i> aduertum de pletho-	
<i>iudaica</i> vid. <i>Sideritis</i> .		ra	10
<i>linariæ</i> quid præstet in hæmor-		sententia de athletico corpo-	
rroidibus tumentibus	88	ris habitu	9
<i>millefolii</i> specificè laudatur in		conceptus de mille saporibus	
pathematibus venæ portæ		non rectè interpretatur	22
	56. 333	eelogium, quod femina bis pa-	
laudatur in cephalalgia san-		tiatur morbum	3
guinea	197	acceptio rheumatismi	150
<i>persicariæ</i> alicuius efficaciam est		adfectus, quem magnos lienes	
in suppressione mensium	123	vocat	326
<i>sabaci</i> commendatur in odon-		Yyy yyy	<i>Hippo-</i>

INDEX.

<i>Hippocratis</i> adfertum de bile	518	remissionis	308
opinio de sternutationis causa	244	<i>Hiradinum adplicatio</i> commendatur in asthma	287
consilium de menstruis cohibendis caute adsumendum	112	commendatur in splenitide	550
effatum: soluta aluo, soluuntur febres	595	ad tempora commendatur in cephalæa	202. 415
per mulsùm & oxymel acrimoniam biliosam infringere vult	518	ad venam iugularem in epilepsia infantum a <i>Willisso</i> commendatur	462
eius ileon hæmarites	76. 193	ad apicem nasi ad hæmorrhagiam narium prouocandam commendatur	189
<i>Hirci sanguis</i> exsiccatus in hæmoptysi laudatur	49	<i>Hispaniæ regis & reginæ</i> exempla de damno chinæ chinæ in febribus	656. 657
<i>Hiradinum adplicatio</i> ad hæmorrhoides promouendas & reuocandas commendatur	57. 65. 73. 99. 102	<i>Homo</i> ad morbos summam habet procliuatatem	3
item in colica hæmorrhoidali	844	num totus a natiuitate morbus sit	ibid.
ad hæmorrhoides tumentes non debet fieri	87	<i>Hoornijens</i>	1029
laudatur in malo hypochondriaco	333. 335	<i>Horlacheri</i> scriptum de catarthis adlegatur	287
commendatur in hæmorrhagiis	27. 37	<i>Horripilationes</i> in febribus inflammationis vnde dependant	503
magnæ efficacix est in congestionibus	147. 157	<i>Horror</i> in variolis visceris inflammationem indicat	624
laudatur in adfectibus spastico-artriticis	396. 408	<i>Horrores lactis</i>	1009
in ipso paroxysmo hemicranico non inuoluit difficultatem	415	<i>Züste</i> ausgewachsen	362
commendatur in nephritide increbescente	373	<i>Humectantia</i> stasin augent	175
laudatur in phthisi tempore		<i>Humorum quantitas</i> plus peccat quam qualitas	6
		adfusio acrimoniam abstergere intendit	142
		proportio ad motus læsa ad caco-	

I N D E X.

cacochymiam quid contri- buat	20	<i>Hydrops</i> vniuersalis	707
conmotio vehemens sangui- nem in arctissimos meatus impellit	541	particularis	722
<i>Hyacinthus</i> vera ad animi pathe- mata placanda laudatur	293	eius species	707.708
<i>Hyatides</i>	707	thoracis ab empyemate dif- fert	320
quid ad hydropem conferant	712	pectoris seu pericardii	707.
<i>Hydrocele</i>	708.709.	- pro congestionibus san- guinis reputanda est	726
a pneumatocèle quo modo differat	722.723	supremæ regionis medullæ spinalis	708
<i>Hydrocephalus</i>	707.1017	omentalis	707
eius signa	723	ouarii muliebris	ibid.
<i>Hydrodes</i>	501	ficcus	710
<i>Hydrophobia</i>	935	vtricularis	707
<i>Hydropici</i> ischuria anguntur	892	<i>Hyosciami folia</i> ad dissoluendos carbunculos laudantur	649
effectus non tam frequenter sequuntur hæmorrhagias imperuosas	27	<i>Hyperemesis</i> post vsum vomitorii in febribus inducitur	656
adfectus quo modo ab œde- mate differant	689.690	<i>Hypocausta</i> humilia congestio- nes caussari possunt	143
<i>Hydrops</i> modo a vitio organo- rum modo humorum de- pendet	707.711.712	<i>Hypochondriaco - hystericum</i> ma- lum	325
cur ab infimis corporis parti- bus incipiat	713	horum conuenientia & diffe- rentia	326
sequitur hæmorrhoides sup- pressas	72	eius exacerbatio ad animi perturbationes progredi- tur	328
sequitur fluxum mensium ni- mium perennantem	109	calculum sæpe mentitur	329
ab erysipelate repulso induci- tur	178	impetuosè tractatum quæ ma- la sequantur	331.335
ex podagra incongrue tracta- ta euenire potest	432	eius causæ pure passiuæ refu- tantur	330
		<i>Hypochondriacum malum</i> quo mo- do a scorbuto differat	749
		Yyy yyy 2	<i>Hypo-</i>

I N D E X.

<i>Hyochondriacum malum</i> sequitur hæmorrhoides suppressas	quam qui a diætæ vitio ortus	72. 736
per hæmorrhoides soluitur	<i>Icterus</i> , color icterodes infantum post partum sponte euanescit	728
ad palpitationem cordis accedens quo modo tractandum	<i>Idea</i> mentis corporis constitutioni analogæ est	932
<i>Hyochondriaci</i> sunt flatulenti	matris animo embryonis communicatur	990
sputatores	<i>Ignis æstus</i> in foco culinario inflammationes caussari potest	166
mictu cruento facile corripiuntur	<i>Ileon hæmatites Hippocratis</i>	76. 193
<i>Hyochondriacorum & hysteriarum</i> vertigo fere incurabilis	<i>Iliaca passio</i>	847
<i>Hyochondrii sinistri</i> inflatio quid sit	superuenit hæmorrhoidibus cæcis	82
<i>Hyochondriorum</i> consensus cum utero	<i>Imperforatio</i> infantum	1017
<i>Hypopyum</i> vnde nascatur	<i>Impetigo</i> infantum	1021
I.	repulsâ asthma producit	281
I <i>alappa</i> sanguineis ordinanda	quo modo expellenda	285
<i>Jammer bey Kleinen Rindern</i>	<i>Impuritas humorum</i> sub ipsis motibus vitalibus quotidie augetur	22
<i>Iaspis rubra</i> in hæmorrhagiis laudatur	<i>Incantamenta</i> quid ad epilepsiam conferant	458
<i>Icterus</i>	<i>Incantatio</i>	954
symptomatice superuenit febribus biliosis	atrophiam caussari potest	367
eccrisis icterica in febribus biliosis non debet impediri	plerumque accusatur, quando infantes a vermibus obsessi sunt	853
a suppressis febribus, hæmorrhagiis &c. periculosior est	<i>Incisio</i> præmatura suppurationem reddit difficiliorem	176
	quando locum habeat in hepaticide	547
	<i>Incontinentia</i> urinæ	805

Incras-

I N D E X.

<i>Incrassantia</i> in hæmoptysi reiici- vntur	51	<i>Infarctus</i> <i>lienis</i> resoluti indici- um quale	345
nocent in hæmorrhoidibus suppressis	102	in ulcerationem transiens quo modo tractandus	345
puerperis non conducunt	131	facile in febrem quartanam transmigrat	342
in tussi moderate sunt adhi- benda	277	<i>hepatis</i>	350
<i>Incrassatio volubilis pulposa</i> di- stingenda est ab altera tenaci mucosa	ibid.	glandularum mesenterii	362
<i>Incubus</i>	392. 436		364
quo modo differat ab asth- mate conuulsivo	438	viscerum ab hæmorrhoidi- bus suppressis	72
<i>Infantes</i> præ adultis grauius morbis adfligi iudicantur	1027	- hæmorrhoidales	87
tussi stomachali humidæ ob- noxii sunt	269	<i>Infectio</i> ab hæmorrhoidibus vl- cerosis	71. 81. 83
cur conuulsionibus facile ob- noxii sint	1027	<i>Inflammati</i>	159
epileptici raro euadunt	459	differat a rheumatismo	151
magis ab acutis quam inter- mittentibus corripuntur	467. 1027	quis sit eius scopus	503
insensibilium parentum mor- bis sunt expositi	1016	reparationem apostematis facilitat	316
podagrici ad rariores casus pertinent	429	a causa inducta periculosior est simpliciore	517
eorum diætâ qualis ordinari debeat	1030	ad febres catarrhales mali- gnas accedens cuius indolis sit	596
<i>Infantis immobilitas</i>	1016	repulsa quo modo tractanda	180
<i>Infarctus</i> <i>lienis</i>	340	meningum cephalæam caus- satur	200
quo modo differat a spleniti- de	548	<i>Inflammationes</i> internæ & exter- næ	161
- a scirrho <i>lienis</i>	347	rarissime in exsanguibus par- tibus occurrunt	164
ab <i>Etmüllero</i> intestino colo adscribitur	346	vtili intentione a natura insti- tuuntur	165
		cur cum febribus exquisite non quadrent	504
		Yyy yyy 3	In-

I N D E X.

- Inflammationes* internarum partium gradu perniciæ differunt 168
 ventriculi, pancreatis, vteri 500. 506. 551
interna ab hæmorrhoidibus suppressis 72
 quo modo tractandæ 172
 a spasimis induci possunt 395
externa: his raro febris accedit 502
 diebus canicularibus grauiiores sunt 169
 quo modo tractandæ 170
 erysipelacæ mammæ in lactantibus 1009
Inflatio hypochondrii sinistri symptoma est mali hypochondriaci 326. 345
abdominis stabilis a lochiis suppressis 135
Iniectiones per syringam in calculo laudantur 388
 stimulantés in fistula hæmorrhoidali non sunt admittendæ 89
Instrumenta metallica cariem dentium causari possunt 213. 218
Intertrigines infantum 1019
Intestium rectum & colon sub motibus hæmorrhoidalibus adficiuntur 76
rectum ob stricturam spasticam cannulam clysticam interdum non admittit 392
colon rigidissimas stricturas post mortem sæpius exhibet ibid.
Intestinorum laxitas a cibis mollioribus oriri potest 317
Iöel specificè laudat hepar galli nigri in hepatitis 547
 eius infusum non conducit in tusi 275
Ipecacoanha radix quando adhiberi possit in hæmorrhoidibus suppressis 101
 vid. *Radix*
Ira conuulsiones prouocat 451
 ad hæmorrhagias disponit 25
Ischiadicum malum 398. 421
 quo modo ab arthritide differat 421
 mutuum commercium habet cum hæmorrhoidibus & nephritide 369. 423
 ad pertinacem podagræ indolem accedere solet 423. 424
 a pleuritide spuria oriri potest 419
 sequitur hæmorrhoides externas turbatas 72
 simul inuoluitur a doloribus podagricis 421. 427
 circa os sacrum promptius mitigatur quam quod femoris iuncturam occupat 423. 430
 per scarificationes profundas sublatum est 408
Ischia-

<i>Ischiadicum malum</i> , ischiadici ple rumque sunt nephritici 371	Kraft=Brühen	433
<i>Ischuria</i> 798	Krampf	393
<i>accedit nephritidi</i> 373	Krändliche, hinfällige Personen, welche nichts vertragen können	567
<i>nisi ante septimum diem tol- latur, funesta est</i> 802	<i>Kremsius cinnabarim antimonii</i> laudat in asthma	286
<i>Iudaei</i> cuiusdam experimentum in odontalgia adlegatur 216	Kugel, welche sich im Leibe herum wälzet, quid sit	328
<i>Iusuba</i> non conducunt in tussi 270	L.	
<i>Iulapia</i> analeptico - diapnoica pro discussione a pectore laudantur 537	L <i>Abes visceris</i> abdominalis ab hæmorrhoidibus nimis metuitur 72.73	
<i>acidulata Thonero</i> in patria magnam extimationem pepererunt 590	<i>Laboriosi</i> meliorem sanguinem habent quam otiosi 20	
<i>Iuniores hæmorrhoidarii</i> raro senescunt 69.72	quando rhenmatismis corri- piantur 153.154	
<i>podagrici</i> cur raro ad insi- gnem ætatem perueniant 430	<i>Lac</i> an in dysenteria adhiben- dum sit 642	
<i>Iuscula</i> tenuia, item vinosa com- mendantur puerperis 132. 136	calidum in dysuria laudatur 805	
K.	<i>croco</i> largius tinctum lauda- tur in ophthalmia 208	
K <i>Ergeri febrifugum</i> commen- datur in febre synocha 487	consistentius primis 24. horis infantibus non præben- dum 1931	
<i>Kind</i> ist beruffen 853.954	<i>Lactis cura</i> quid in phthisi valeat 311	
ist in die Geburth getreten 991 999.1000	- laudatur in hectica habitu. ali 574	
steht über dem Bogen 993.996	<i>horrores</i> 1009	
kan viel ausstehen 1027	perruptio difficilis 1010	
Spex Kinder, Gedy Kinder 814	defectus ibid.	
<i>Kopf</i> wird leichter vom bluten 141	<i>Lactis abundantia</i> 1010	
<i>Kóπος ἐκκώδης Galeni</i> 426	tenuitas aquosa 1011	
	<i>Lactis</i>	

INDEX.

<i>Lactis</i> falsedo & biliosa fluendo	1011	herba Britanica habetur	757
mucida crassities	1012	<i>Lapis carphonum</i> num efficaciam exhibeat in hæmorrhagiis narium	38
stasis	ibid.	<i>Lapis iudaicus</i> & <i>lyncis</i> ad lithontriptica refertur	387
<i>Lactantium</i> diæta qualis esse debeat	1014	<i>manati</i> specificè laudatur ad spasmos	397
illæ aliquando menses experiuntur	111. 1015	- caute adhibendus in hæmorrhoidibus	75. 102
<i>Lactinia</i> atrophicis non conducunt	367	improbatur in malo hypochondriaco-hysterico	339
<i>Lacrime</i> ad hæmorrhagias narium occasionem præbent	34	<i>admirabilis Crollii</i> laudatur in ophthalmia serosa	208
<i>Lacrimatum</i> profusio facilis in feminis quid designet	119	- laudatur in inflammationibus	179
inuoluntaria emissio in febre synocha infausti ominis est	486	<i>Lassitudo</i> plethorica a vera naturæ debilitate dignoscenda	987
effusio in ophthalmia serosa occurrit	205	<i>Laxantia</i> in corruptis & suppressis febribus paroxysmos reuocant	687
<i>Lactuca</i> succus in angina a Galeano laudatur	264	commendantur post paroxysmum epilepticum	462
<i>Lasio visceris</i> vlcerosæ in intestinum restitui non potest	570	in iunioribus loco venæ sectionis commendantur	37
diuersa eius conditio diuersam etiam naturæ oppositionem format	563	in flatulentia vim roborantem ventriculum habere debent	833. 834
<i>Læsiones</i> in corpore in animam redundant	931	<i>rhabarbarina</i> commendantur in hæmorrhoidibus nimis	74
quantitatis, qualitatis & motuum	1. 2.	communia puerperis non conducunt	131. 138
<i>Langelotti tinctura opii</i> in mictu cruento laudatur	64	cur in vomitu cruento non adhibenda sint	59
<i>Lancinationes</i> vnde oriantur	143		
<i>Lapathum palustre</i> pro veterum			

Laxan-

I N D E X.

<i>Laxantia</i> in mictu cruento non conducunt	66	<i>Leporis urina</i> vulgo adhibetur in surditate	228
flatulenta in singultu non habent locum	447	<i>vesica</i> in calculo laudatur	387
cum aloëticis coniuncta cephalalgiam augent	191	<i>Lepra</i>	737.739
<i>Laxationes per epicrasin</i> laudantur in suppressione mensium	119	<i>Lepra</i> non est ipsa morbus, sed tantum effectus cuiusdam morbi	748
in cacochymia	21	<i>Lepus marinus</i> a non nullis pro causa hæmoptyscos habetur	46
præservatorie laudantur in congestionibus	146. 157	<i>Lethargus</i>	913
<i>Leber-Stecken</i>	751. 982	<i>Leucophlegmatia</i>	713
<i>Lectioes multa</i> in hæmorrhagiis nimis nocent	31	<i>Lichenes</i> in gravidis	982
<i>Leges Mosaica</i> quo sensu sanguinem menstruataram impurum declarent	111	<i>Lieber-Brand</i>	951
<i>Leib</i> hat sich gesenket	991	<i>Lienes magni Hippocratis</i> quid sint	326
wenn sich der Leib nach denen rechten Wehen gebührend öffnet	ibid.	<i>Lienis infarctus</i>	340
ein sackiger Leib, gleich einer schwangern Frau	1007	<i>scirrhus</i>	347
als wenn alles im Leibe zerpringen oder der Leib aufplatzen wolte	392	<i>ulcerosa</i> corruptio vnde dignoscatur	568
<i>Lentium iuscula</i> nullius effectus sunt in variolis	629	inflatio	326. 345
<i>Lentigines</i>	751	<i>Lienteria</i>	875. 877. 879
<i>Lentilius</i> in fluxu mensium rebellis laudat vitellum oui, ex gallina mactata exfecti no		quo modo differat a fluxu hepatico	91
<i>Leporis cerebrum</i> in dentitione difficili probabile non est	1030	<i>Ligatura partium</i> in hæmorrhagiis quo modo instituenda	30. 31
		commendatur in hæmorrhagia narium effera	37. 38
		- in hæmoptysi & vomitu cruento	48. 57
		- in fluxu mensium rebellis	110
		- in cephalalgia	187
		- in congestionibus	149
		- in vertigine	237
		<i>Uzz zzz</i>	<i>Liga-</i>

<i>Ligatura parium</i> commendatur in	cultatem	921
nephritide	<i>symptomata</i> periculosior est	
- imminente paroxysmo e-	quam <i>idiopathica</i>	922
pileptico	in febribus est symptoma	
inflammationem causari	periculosum	471. 596
potest	euenit interdum ex inquietu-	
<i>abdominis</i> in puerperis	dine in febribus biliosis	5:6
<i>Ligna antiuenerica</i> in catarrhis	ab alui refectione in hæmor-	
simplicibus, conueniunt	rroidibus externis	80
	<i>scorbutica</i> minus periculi in-	
<i>Ligni tamarisci pocula</i> num quid	uoluit	760
profint in infarctu lienis	<i>uterina</i> a conuulsionibus ute-	
	rinis differt	449
	<i>Lipyrria</i> quid sit	300. 306
<i>Lignum fraxini</i> num lienem	<i>Lippitudo</i> ex ophthalmia serosa	
consumere possit	enaticitur	206
laudatur in odontalgia	<i>Liquamen lumbricorum terrestri-</i>	
<i>fulmine tactum</i> laudatur in o-	<i>um</i> vt tonicum commenda-	
dontalgia	tur in congestionibus	145. 148
<i>guaiacum</i> laudatur in cache-	<i>Liquor C. C. succinatus</i> laudatur	
xia	in conuulsionibus	455
<i>sanctum</i> : nihil specifici habet	<i>Lithargyrium</i> cum aceto nocet in	
in nimia obesitate	hæmorrhoidibus cæcis	87
<i>sassafras</i> aliquem usum habet	<i>Lithonriptica</i> practicum de-	
in adfectibus catarrhalibus	cantata non habent verita-	
	tis testimonium	387. 388
<i>Limatura orichalci</i> laudatur in	miæm cruentum producere	
hydrophobia	valent	60
<i>Linimenta</i> in grauidis adhiben-	<i>temperata</i> commendantur in	
tur loco balneorum	calculis minoribus pellen-	
<i>Lintea madida</i> in hæmorrhagia	dis	385
narium hepatis adplicata	<i>Lithotomia</i>	387
non adprobantur	<i>Litterati</i> præ aliis sunt morbis	
<i>Lipothymia</i>	obnoxii	3
duæ obseruationes de eadem	it. vertigini	231
	<i>Litteratorum morbus</i>	329
caussalis nexus inuoluit diffi-		
	<i>Loca-</i>	

<i>Locatelli balsamus pectoralis</i> in phthisi exiguæ efficaciam est 308	<i>Ludouici tinctura martis aperitiua</i> laudatur in mictu cruento 64
<i>Lochia</i> mensium prægressorum indolem imitantur 133.134 succeedentia indolem præ- gressorum induunt 133 <i>suppressa</i> multa damna & pe- cula inducunt 135 - non tolerant usum pellen- tium 137	<i>Lues venerea</i> 781 quo modo a scorbuto diffe- rat 750 quo modo ad Europæos trans- portata sit 784 differt a lepra 781 admittit fortiora abstergen- tia 758 etiam ossa adficit 782 quo modo id dignoscatur 792 cephalalgiam & cephalæam producit 194. 195. 199
<i>Lochiorum fluxus</i> ordinatus & ni- mius 124. 1003 legitimus & abortiuus 125 legitimus colore & odore di- gnoscitur ibid. excedere eum faciunt secun- dinæ retentæ 125. 128 magis actiue quam passiuè considerari debet 127. 128 excessui præ aliis hæmorrhæ- giis expositus est 128 <i>nimus</i> quo modo præoccu- pandus 130 <i>Suppressio</i> 133. 1003	<i>Lumbago rheumatica</i> 151 hæmorrhoidalis 1025 <i>Lumbrici</i> 853 <i>terrestres</i> resolvente & diure- tico effectu præditi sunt 345 - ad discussionem humo- rum in rheumatismis lau- dantur 156 - specificè laudantur ad mo- tus spasticos 397. 403. 408 - - laudantur in epilepsia 461. 462 - - laudantur ad propel- lendum icterum 735 <i>Lumbricus cordialis</i> 362 <i>Luna</i> an habeat dominium in humores 450 absolutum imperium in flu- xum mensium non habet 111
<i>Lotrices</i> cur mensium obstipa- tionem facile experiantur 116	<i>LZZ ZZZ 2</i> Luna
<i>Lotura per phlegma vitrioli</i> ad va- riolas superandas nihil confert 629	
<i>Luci piscis maxilla</i> a nonnullis laudatur ad inflammatio- nes internas 179	
<i>Ludouici puluis</i> , infantibus desti- natus, peculiaris efficaciam non est 1029	

I N D E X.

<i>Luna</i> , eius phases inter causas convulsionum referuntur		<i>Malum hypochondriacum</i> quo mo- do differat ab infarctu lie- nis	340
<i>Lunatica purgatio</i> quid sit	451	sibi relictum periculosum non est	331
<i>Lunatici</i>	947	turbatum quæ mala inducat	331. 335
<i>Lux limpida & splendida</i> nocet oculis post insignem san- guinis iacturam	132	remedia eius principaliora	331. 334
<i>Lycanthropia</i>	941	<i>Malum hypochondriacum</i> vid. hy- pochondriacum malum	
<i>Lysis febrium</i> quid sit	470	- <i>Neapolitanum</i>	781. 784
<i>Lyngodes</i>	501	<i>Mammarum inflammationes</i> ery- sipelacæ in lactantibus	1009
M.		<i>nodi</i>	1012
M acies differt ab atrophia	361	<i>abscessus</i>	ibid.
<i>Macula nigra vel fusca</i> in febre synocha infauti omnis sunt	486	<i>Mania</i>	934
<i>petechiales</i> a scorbuticis diffe- runt	591	a spectrorum phantasmati- bus	937
- quando eruptæ euphoriam non adferunt, purpura miliaris adhuc subest	595	ab hæmorrhoidibus suppres- sis	72
<i>scorbutica</i> non debent repelli	760	<i>Maniaci</i> per vincula & verbera non curantur	940
<i>Magica & Magnetica</i> remedia	951	<i>Manna</i> ad aluum solvendam in- fantibus exhiberi potest	1028
<i>Magnes arsenicalis</i> quid in peste valeat	649	hypochondriacis moderate exhibenda	338
<i>Magnesia alba</i> laudatur in conge- stionibus	145	<i>Manus tabe mortui contactus</i> in- farctus restituere creditur	366
<i>le Mal de Paris</i>	631	<i>Marasmus seniles</i>	297
<i>Malacia</i>	812	a nephritide spuria attrahitur	372
grauidarum	812. 978	<i>Marisci</i>	79
<i>Malarum tumor</i> odontalgiam sol- vit	214	<i>Marrubium album</i> in renum vitiis	
<i>Malignitas venenata</i> in febribus de corde propellenda	559		

vitiis damnum auget	312.	in infarctu lienis	344
	389		345
<i>Marrubium album</i> ad materiam abstergendam laudatur	312	nocent in podagra	435
<i>Mars</i> pectori inimicus est	309	<i>Massa pilularum de cynoglossa</i> vt lene anodynum laudatur	
<i>Martialia</i> pleraque agunt ad- stringendo	75. 191	in dolorum atrociam	145
stringendo aperiunt	122	- laudatur in cephalalgia	187. 197
in malo hypochondriaco non nisi ad tonum robo- randum ordinantur	333.	- tutissima est ad dolores calculosos mitigandos	389
	334. 336	- ferociam tussis sedat	317
<i>Martialium</i> vis aperiens & resol- vens cum discretione acci- pienda	17	- efficax est ad ferociam commotionum in grauidis	988
effectus eorum absorbens, fundens, colliquans nullus est	336	<i>pilularum de succino Cratonis</i> omnibus subiectis condu- cit	226
hecticis magno damno offe- runtur	574	- laudatur in rheumatismis	157
in vomitu cruento abesse de- bent	58	- laudatur in tusfi	271
palpitationem cordis augent	294	- correcta laudatur in adfe- ctibus catarrhalibus	284
nocent in cephalalgia	191. 192	<i>pilularum de ammoniaco Quer- cetani</i> laudatur in tusfi	271
ad menses reuocandos noxia sunt	118. 122	<i>Mast-Körner</i>	79. 981
damnantur in adfectibus spa- stico-arthriticis	407. 416	<i>Mastix</i> dentes a carie præfer- uat	218
nocent in atrophiam sine præ- missa euacuatione	367	<i>Mater perlarum</i> inter absorben- tia præfertur	589
in ictero præmature adhibita nocent	734	commendatur in ophthalmia serosa	208
post debitam humorum reso- lutionem in cachexia sunt adhibenda	706	<i>Materia</i> mouenda prius mobilis est reddenda	5. 476
quando locum habeant		ita non corrigitur, vt cum na- tura in gratiam redire pos- sit	493
		<i>Zzz zzz</i> 3	<i>Ma</i>

I N D E X.

- Materia peccans in malignis in*
 massa sanguinea hæret 519
 584. 585
 - - præceps periculum mi-
 natur 579. 580
 ex partibus nobilioribus ad
 ignobiliores proiicitur 692
 - - in febribus secundariis
 æquos est 499
 - in causo intestina adrodit
 519
 - in abscessu successiue eua-
 cuanda est 176
alba sub finem lochiorum
 non pro fluore albo haben-
 da 764
acris, caustica promte in sphace-
 celosam putredinem ruere
 solet 554
noxia successiue *secedens* ad su-
 perficiem corporis salu-
 tem promittit 581. 584
Materia congesta, translatio ad in-
 teriora periculosa est 155. 435.
 559
Maxilla lucii piscis specifica effi-
 cacia in stasibus discutiend-
 is nulla est 179. 546
Meconii retentio 1018
Medicamina, quæ viscera rege-
 nerent, -*Paracelsi* adscelæ
 promittunt 310
Medicus debet esse minister na-
 turæ 5. 472
 quid incipere debeat, post in-
 congruam venæ sectionem
 aduocatus 175. 599
- Medicus* genium febrium malig-
 narum ante oculos habere
 debet 582
 quid possit præstare in hecti-
 ca 570
 ei commendatur expectatio
 582
Medulla cruris vitulini ad matu-
 rationem hæmorrhoidum
 tumentium comendatur
 85
Meibomii balsamus pectoralis in
 pthisi exiguæ efficaciz
 est 308
Mel cum bile coniunctum colic-
 as & *καυσώδεις* inducit 518
 in clysteribus præsentem in-
 flammationem suppuratio-
 nem promouet 851
 in apostematibus pectoris
 non cõtemnendum 312
Mellita moderate in tussi sunt
 adhibenda 277
Melicerides vnde veniant 783
Melancholia 929
hypochondriaca 328. 331. 932
 sequitur hæmorrhoides sup-
 pressas 72
Melancholicorum aliqui reges se
 esse existimant 931
 formula pilularum in iis non
 commode operantur 239
Memoria exercitium in puerper-
 ris ad hæmorrhagias nari-
 um ansam dat 34
debilitas 927
Me-

I N D E X.

<i>Memoria debilitas cum vertigine</i>	fert quam excessus	118
<i>conspirat</i>	<i>emarzio</i>	113
<i>Meninges</i> neruis ortum præbent	- non est absolutum signum	
	<i>graviditatis</i>	972
<i>Meningum</i> renifus spasticus ner- vorum motum efficit	<i>eruptio</i> tempore lactationis	1015
<i>inflammatio</i> cephalæam pro- ducit	<i>retentio</i> seu <i>obstructio</i>	114
<i>sideratio</i> seu <i>sphacelus</i> ex phre- nitide succedit	<i>suppressio</i>	113
	- rheumatismos caussatur	154
<i>Mensum finxus</i>	<i>reuocatio</i> in mictu cruento est	
<i>ordinatus</i> largior discernen- dus est a nimio	respicienda	65
- - non est inhibendus	- non debet fieri per fortio- rapellentia	57
<i>nimius</i> in nondum maritatis suspectus est	vomitum cruentum soluit	58
abortum facile inducit	<i>ataxia</i> ex lochiis suppressis o- riuntur	128.135
quo modo curandus	<i>Menses stati</i> partus instantiam si- gnificare solent	1002
<i>inordinatus</i> phlegmonen aut erysipelas in facie caussa- tur	<i>Mensibus calidis & frigidis</i> laxa- tiones sunt intermittendæ	10
sub finem primi septenarii e- rumpens est præcipitatio naturæ	<i>Menstrui</i> sanguinis venenosa qualitas nulla	111
familiare illi est, vt consueta loca relinquat	<i>Menstruorum cohibitio</i> per cucuf- bitam ad mammas ab Hip- pocrate edocetur	112
feminæ quædam illam per to- tam vitam non experiun- tur	<i>Menstruus fluxus e ventriculo</i> quid sit	54
<i>cessatio</i>	<i>Mentha</i> in vomitu simplice spe- cificum feminarum habe- tur	874
- initium mali hysterici	<i>Mentis adfectiones</i> , vid. <i>Animus</i> . <i>idea</i> corporis constitutioni analogæ	931
- eam hæmorrhoides exci- pere solent		
<i>decoloratio</i>		
<i>defectus</i> grauiora damna in-		

I N D E X

- Mentis laesiones*, vnde communit
ter deducantur ibid.
- Mercurialia* in malo hypochon-
driaco non possunt admit-
ti 336
- nocent in hæmorrhoidibus
cæcis 87
- reiiciuntur in scorbuto 759
- Mercurialis cura* quo modo in-
stituenda 786
- quæ symptomata habeat 791
- Mercurius* coagulatus in annulis
antispasticis num quid pro-
fit 367
- Mercurius dulcis* purgandi scopo
phlegmaticis conducit 216
- tutum & elegans catharti-
cum est pro infantibus 1038
- vermes enecat 856
- laudatur in conuulsionibus a
vermibus, scabie repulsa
&c. ortis 451
- ob vim resoluentem laudatur
in adfectibus scirrholis
359
- it. in statu cephalæ inuctera-
tæ 203
- vomitus excitat in sensibili-
oribus 367
- laudatur in tussi 271 275
- in phthisi raro adhibendus
306
- quo modo saluatorium effe-
ctum amittat 793
- non debet ad XX-XXX. gr.
augeri ibid.
- Mercurius vita* vomitus pericu-
losos excitat 719
- ad variolas superandas non
sufficit 629
- Mespila* exsiccata diarrhœas si-
stunt 881
- Metallica instrumenta* dentibus
nocent 213. 218
- Metallicolæ* asthmatis sicco obno-
xii sunt 281
- Metaschematismum* motuum fe-
brilium ex naturæ inten-
tione æstimare conuenit
678
- Metastases febriles* vnde veniant
155. 156. 472
- repulsæ febrem reuocant 472
- alacitem causantur 711
- ad diaphragma paraphre-
nitidem inducunt 527
- phlegmonem non raro ef-
formant 160. 163
- materiæ resolutæ in para-
phrenitide ad aures fiunt
- Vide *Apostases*
- Methodus natura in febris* pro
optimo arcano habenda
474. 583.
- crassa* commouendi & euacu-
andi materiã halituosã
damnarur 475. 582. 583
- Methodus vulgaris* tractandi fe-
bres intermittentes repre-
henditur 656
- diaphoretica* placida in mali-
gnis commendatur 585.
- Metho-*

I N D E X.

- Methodus euacuatoria* in variolis vulgo commendatur 627. 628
- Gundelshheimeri* in variolis 628
- correctoria* in variolis locum habet ibid.
- - naturæ aduerfatur 474. 476
- in paucioribus morbis obuenit, euacuatoria in plurimis 5. 6. 336
- heroica* effectus funeftos accelerat 345. 493
- Mezerei cortex* laudatur in coryza & grauedine 249
- Michælis cephalicum specificum* effectu non refpondet laudibus 191. 1029
- Mictio involuntaria* extra delirium in acutis fignum eft aggonizantium 809
- Mictus cruentus* 59
- criticus* 66
- confpirat cum hæmorrhoidibus 65. 72. 82
- efferus & pertinax* quo modo tractandus ibid.
- genefin calculi antecedit 379. 383
- fenibus periculofus eft 62
- in exanthematicis morbis vitæ periculum minatur ib.
- repente & incongrue cohibitus grauiffima fymptomata inducit 63. 66
- Milch-Schauer* 1009
- Millefolium* eft leniffimum adstringens 58
- certiffimum & fpecificum fpafmodicorum motuum hypochondriacorum fedatium 355. 846
- vfus eius in hypochondriacis debet effe prouidus 58. 339
- dolores hæmorrhoidum fedat 73. 84. 87. 89
- caute in hæmorrhoidibus eft adhibendum 58. 75
- eius vfus per integrum menfem in hæmorrhoidibus tumentibus fuadetur 87
- laudatur in fluxu nimio lochiorum 129
- eius fuccus in hæmorrhagiis narium 38
- eius *effentia* laudatur in vomitu & diarrhœa biliofa 513
- in clauo hÿterico 197
- flore albo* in mictu cruento 65
- eius *comas virides* laudant ad hæmorrhagiam narium prouocandam 189
- nocet in calculo renum 389
- non fecurum eft in nephritide 375
- Millepedes* obftipationes glandularum fortius refoluunt 355
- specificè laudantur in ictero 732
- Miferere mei* 847. 849
- Miffio electina veterum* quid fit 141
- Aaaa aaa Mit

I N D E X.

<p><i>Mit=Esfer</i> 1023</p> <p><i>Mithridatum</i> in febris plus damni quam auxilii adfert 587</p> <p>inflammationibus internis non conuenit 547</p> <p><i>Mixtura simplex</i> flatulentis hypo- chondriacis conducit 442</p> <p>- laudatur in melancholia hypochondriaca 934</p> <p><i>tonico-neruina Stahlii</i> quem effectum habeat 28</p> <p>- cur in hæmorrhagiis com- menderetur 31</p> <p>- refoluit spissos humores 758</p> <p>- ardorem ventriculi corri- git 822</p> <p>- laudatur in otalgia 227</p> <p>- laudatur in cephalgia 187. 188. 197</p> <p>- - in rheumatismis 157</p> <p>- - in congectionibus 146. 147</p> <p>- - in hæmorrhoidibus 74. 75. 76. 100</p> <p>- - in mictu cruento 64</p> <p>- - in hæmoptysi 48. 50</p> <p>- - in vomitu cruento 56</p> <p>- - in vertigine 237</p> <p>- - in tussi 272</p> <p>- - in phthisi 273. 307</p> <p>- - ad æqualem distributi- onem sanguinis & tonum commendatur in multis</p>	<p>morbis 420</p> <p><i>Mixtura tonico-neruina Stahlii</i> in declinatione hemicranie 416</p> <p><i>Mola</i> 996</p> <p>pro foetu legitimo non est ha- benda 973</p> <p>eius exclusio quantocyus est promouenda 130</p> <p><i>Monachis</i> facile euenit febris e- phemera 480</p> <p><i>Montani diacodyum</i> laudatur in angina 264</p> <p>vehementius est quam massa pilularum de cynogliffa 274</p> <p><i>Morbilli</i> 617</p> <p>a grauidis in foetum propa- gantur 622</p> <p>quando semel effloruerunt non facile recedunt 622</p> <p>nobilioribus corporis parti- bus periculum minantur ibid.</p> <p>hæmorrhagie in illis num sint periculose 35</p> <p>extrusio illorum impetuosa periculosa est 622</p> <p>recessio illorum non adeo periculosa ibid.</p> <p>reliquie illorum asthma hu- midum gignunt 281</p> <p><i>Morbi</i>: eorum differentie prin- cipales vnde petantur 1. 2</p> <p><i>Morbi atatum</i> 2. 24</p> <p>- an sint periculosi 4</p> <p style="text-align: right;"><i>Morbi</i></p>
--	---

<i>Morbi</i> , in quibus principium vitale concurrere recusar, curatu difficiles sunt	891	<i>Maronii directorium</i> medicum adlegatur	857
chronici qui & cur extirpari nequeant	9	<i>Morosis</i>	952
vnde oriantur	15	<i>Mors</i> non nisi gradu a syncope differt	919
genium eorum Medicus perspectum habere debet	688	<i>Morsuli antimonii</i> laudantur in variis adfectibus	408
eorum tempora obseruari debent	6	<i>Morsus animalium</i> quo modo tractandi	649.963
multi per <i>αυτοκράτειαν</i> naturæ curantur	5	serpentum curatur per scorzoneram	599
sibi relictis quem exitum habeant	4.5	<i>Moschus</i> : eius odorem plurimæ hysteriæ auersantur	330
<i>hereditarii</i> raro profus auferuntur	4	eum <i>Forestus</i> in aurem dolentem ingerere docet	225
in consuetudinem degenerati ad modum pertinaces sunt	5	<i>Motus</i> : eorum medicina præcipua pars est præ eos felices & magis sunt respiciendi quam materia	6.435
<i>qualitatum</i> plurimi a quantitate dependent	20	non temere sunt sistendi ib. eorum sopitio non est tentanda, nisi causâ materialis sublata sit	293
<i>acuti</i> , a lipothymia incipientes, non sunt boni augurii	922	eorum cura non est postponenda mitigationi dolorum	198
- infeliciter decurrentes convulsiones causantur	451	naturæ sunt imitandi	120
<i>feminarum</i> plurimi a mensium suppressione dependent	116	a principio vitali materiali noxæ opponuntur	1
per <i>fascinum</i> seu <i>incantationem</i>	955	- prout materia noxia comparata est, augentur	1.469
<i>Morbos</i> curare nihil aliud est quam causas eorum tollere	366	<i>febriles</i> secundum materiam indolem a natura instituntur	583
<i>Morbus litteratorum</i>	329	peccant in excessu & defectu & hæc motuum vitia a communibus	

INDEX.

nibus causis deducere non possumus	901	<i>Motus hæmorrhoidales</i> in regione hepatis, splenis, ventriculi & superiorum intestinorum se exferentes cuius indolis?	76
<i>Motus</i> : deficientes in morbis periculosiores sunt quam excedente.	4. 884	circa mesenterium & per longitudinem ossis sacri, quid de iis sperandum?	77
duo motuum extrema paralytici & convulsivi motus in vno subiecto non raro conueniunt	898	<i>corporis placidus</i> optimum tonicum est	37
<i>deficientes</i> : eorum species	881	plurimi eum renuunt	9. 10
	882	scandalum quod circa eum plerumque accipitur, remouetur	16. 17. 159. 862
- per animi commotiones modo inducuntur, modo excitantur	885. 891	commendatur plethoricis	10
<i>extraordinarii</i> : cuius notæ	4	cacoehymicis	21
& materia in convulsionibus rite sunt tractandi	454	<i>violentus</i> in plethora commotavitetur	12
in progressu epilepsiæ motuum magis quam materiæ vitia sunt accusanda	456	commendatur hæmorrhagiariis	27
spasticorum motuum pertinacia magis quam materia culpanda est	435	suadetur feminis cephalalgia laborantibus	197
<i>intestinalis</i> subtilisationem inducit	138	cephalæa laborantes eum perferre non possunt	200
<i>circulatorii segnities</i> vnde dependeat	15	commendatur in rheumaticis	158. 159
- quid causetur	14	commendatur in coryza & grauedine	249
<i>proportio</i> ad humores <i>læsa</i> , quid ad cacoehymiam conferat	20	nisi ad consumptionem sanguinis per transpirationem insensibilem peragatur, insufficientis est	424
<i>hæmorrhoidales</i> non promiscue sunt promouendi	73	<i>Mulsum</i> acrimoniam biliosam auget	518
	74. 77	<i>Mundificationes sanguinis</i> circa æqui-	
- transfugi & titubantes nihil constantis agunt	72		

I N D E X.

<p>æquinoctia num quid pro- sint 22</p> <p><i>Muntingii</i> tractatus de herba Britannica adlegatur 757</p> <p><i>Murem campestrum Paracelsus</i> in phthisi laudat 310</p> <p><i>Muris ideam</i> sibi concipiunt fem- inæ hystericae 392</p> <p><i>Mus marinus</i> specificè laudatur in hæmorrhoidibus cæcis 84. 88</p> <p>in internis caute adhibendus 75</p> <p><i>Musti vapores</i> fermentescens quæ damna ferant corpori 234. 955. 961</p> <p><i>Mutationem ætatis &c.</i> soluere pilepsiam <i>Hippocrates</i> ob- servavit 459</p> <p><i>Mutter-Mahler</i> 1017</p> <p><i>Mutter-Wasser</i>, higræ, exsular- re debent in hystericis 338</p> <p><i>Mynsichii tinctura odontalgica</i> laudatur in odontalgia 217</p> <p><i>Myrrha</i> vehementius sangui- nem commouet 51. 123. 317. 319. 546</p> <p>externe egregium est balsa- micum 319</p> <p>eius concursus tincturas be- zoardicas deturpat 648</p> <p>vermes enecat, sed non in to- ro corpore 857</p> <p>commendatur ad decocta traumatica in empyemate 324</p> <p>dentes a carie præseruat 218</p>	<p>in fluore albo moderate ex- hibenda 766</p> <p><i>Myrrha</i> in suppressione mensi- um caute adhibenda 123</p> <p>feminas cachecticas in ascii- tem coniicit 705</p> <p><i>Myrrhata</i> damnantur in lochiis plane suppressis 134. 137.</p> <p style="text-align: center;">N.</p> <p>Nach-Wehen, quo remedio egregie mitigentur 835</p> <p><i>Navi materni</i> 1017</p> <p><i>Narcotica</i> adferunt stupores & deliria 587</p> <p>non sunt secuta in malo hy- pochondriaco - hystericò 339</p> <p>ad sedationem motuum non sufficiunt 421. 454</p> <p>damnantur in cephalalgia 190</p> <p>puerperis non conducunt 131</p> <p>infantibus cautissime sunt ex- hibenda 1030</p> <p>nocent in hæmorrhoidibus suppressis 102</p> <p><i>Narium pruritus</i> unde veniat 33</p> <p><i>mucosa obstructio</i> in infantibus 1020</p> <p><i>Nasturtium</i> commendatur in russi 278</p> <p><i>aquaticum Bonetus</i> specificè commendat in phthisi 310</p> <p><i>Natura</i> ad corporis integritatem intenta est 469</p> <p>Aaaa aaa 3 Na-</p>
--	---

<i>Natura</i> vitam non correctionibus, sed excretionibus absolvit	474	<i>Nausea a carnibus</i> signum graviditatis est	972. 977
non ex errore abundantem sanguinem generat	8	<i>Nephritis simplex</i> sine calculo esse potest	368 ibid.
excretionibus sanguinis facile advescit, licet plethora absit	26	<i>Spuria calculosa</i> cum podagra complicatur	369 432
non facile a tali excretionem desistit, quam multo labore obtinuit	27	a spastico dorso adfectu est discernenda	409
eius energiam in grauissimis morbis Medicus cordi habere debet	581. 583	ab infarctu lienis differt	340
eius autocratia in variolis & morbillis ad modum conspicua est	627	cum ventriculo & intestinis singularem consensum habet	375
eius methodus in febribus pro arcano habenda est	583	cum malo ischiadico & hæmorrhoidibus mutuum habet commercium	76. 369. 423
eius negotium in febribus duplex est	472	cur omnibus aliis inflammationibus leuior sit	371
eius methodus in febribus biliosis	518	a pleuritide spuria oriri potest	420
eius pugnam cum morbo veteres in febribus iam agnovērunt	473	simplex & calculosa superueniunt hæmorrhoidibus carcis	82
cur tam facile, immo ad lipothymiam vsque trepidet in scorbuto	749. 751. 754	<i>Nephritica renis sinistri</i> inflammatione differt a splenitide	548
in dysenteria arti cedere debet	636	<i>Nephritica</i> damnantur in doloribus circa lumbos &, hos sequentes, capitis	203
<i>Nauigationem</i> cur veteres heceticis commendauerint	576	<i>Nephritici</i> non semper mictu cruento laborant	60
<i>Nausea</i>	815	<i>Nervi</i> non ex cerebro sed meningibus oriuntur	232
inter causas occasionales mali hysterici refertur	330	<i>Nervina</i> acria, resinosa, sulphurea nocent in paralyti & hemi-	

I N D E X.

hemiplexia	895	<i>Nitrum</i> in pleuritide & peri-	
<i>Nervorum paris octavi</i> consensus		pneumonia	537
cum primis viis non negatur	181. 184. 190. 234	commendatur in hæmoptysi	47. 51
vellicatio & stimulatio num		ad expectorationem multum	
convulsiones excitare possit	450	valet	275. 277. 309
<i>Nessel</i> = Sucht, als wenn man einen mit Brenn- & Nesseln gepreisset hätte	608. 1004	ad stranguriam & dysuriam	
<i>Nihilum album</i> commendatur in		egregie laudatur	802. 804
ophthalmia serosa	208	in paralyfi mitigat	898
<i>Nitrum</i> incrassat tenues catar-		in ophthalmia insignem effectum edit	208
rhos	247. 559. 600	laudatur in odontalgia	215
in potu exhiberi potest ad æstus mitigationem	559	ad gargarismata præcipue laudatur	260. 263
item ad aluum expediendam	333	laudatur in melancholia	934
in malo hypochondriaco egregie laudatur	337. 338	dum tusim auget, parvis dosibus in asthmate, phthisi & vomica pulmonum versusurpandum est	284. 300.
puerperis tuto adhiberi potest	138		319
diarrhœas potius præoccupat quam prouocat	133. 626	eius virtutes in febribus laudantur	478
gravidis commendatur pro temperatione	987	in febribus malignis opio anteponendum	588
ad motus biliosos sistendos laudatur	514. 517. 519. 988	in febre hæctica non est reformatum	309. 324. 575
non nocet in dysenteria	641	in phthisi circumspicte adhibendum	309
laudatur in peste	749	lapides in pollinem reducere creditur	387
in scorbuto minuit acrimoniam humorum	761	<i>regeneratum</i> penetrantius operatur quam deperitum	512
commendatur in fluore albo benigno	766	- menses suppressos reseravit	123
optime se commendat in pollutione nocturna	780		

Nitrosa

<i>Nitrosa</i> sudorem magis promo- vent quam sistunt 442	<i>Nux moschata</i> simplex magis so- piens quam adstringens est 879
in acutis singulorum vel præ- cauent vel profligant 447	in diarrhœa contumaci lau- datur 830
in inflammationibus omni- bus aliis palmam præripir- vnt 544	<i>vomica</i> , quæ animalia necet 858
laudantur in catarrho suffo- catio 919	O.
<i>Nitrosas particulas</i> inter aran- dum respiratione attra- hendas <i>Bagliuius</i> asthma- ticis commendat 287	S ber-Colic 193
<i>Noctambulatio</i> 947	<i>Obesitas nimia</i> multa peri- cula infert 9
<i>Nodi pulmonum</i> vnde existant 296.300	qua ratione tractanda 12. 13
tussim caussantur 264	<i>Obdormitio</i> artuum vnde 7
arthritici 407	<i>Obstetrices</i> communiter valde imperitæ sunt 1001
<i>gallici</i> , quo modo tractandi 787	<i>Obstructio</i> quid vi vocis desi- gnet 340
<i>mammarum</i> 1012	alui, quo modo ab adstrictio- ne differat 859
<i>podagræ</i> non in omnibus sub- iectis proueniunt 428	quo modo commode refera- ri possit 340. 360
- ex podagra inueterata pro- veniunt 431	vasorum quo modo differat ab infarctu 340
<i>Noduli laxantes</i> cum helleboro nigro 240	glandularum mesenterii 361
<i>Nostalgia</i> 948	tunicæ villosæ 362. 363
<i>Nuclei duri sensus</i> in intestino re- cto quid designet 67	infantum 1020
<i>Nummularia</i> in phthisi specificè laudari solet 310	<i>vera</i> tam frequentes non sunt, vti congestiones 142
<i>Nutrices</i> non temere sunt con- ducendæ 1015	in vasis exilissimis non tam frequentes sunt quam vulgo venduntur 16
falsa earum diætæ ad calcu- lum infantum contribuit 380	<i>Oculi humidi</i> sunt signum pletho- ræ 8
	dolor eorum cum scintillis quid designet 33. 35
	paracentum iis post enormes hæmorrhagias 31. 38. 212
	<i>Oculi</i>

<i>Oculi humidi eorum suffusio</i> vnde 185. 413	<i>chronicum & habituale</i> perti- naces congestiones fouet 692
<i>Oculorum pericula</i> in variolis & morbillis quo modo auer- tenda 626	<i>pedum</i> a fluxu mensium ni- mio & perennante induci- tur 109
manationes serosæ in infan- tibus 1019	<i>Oedemata</i> ad interiora viscera re- pulsâ sôntica mala produ- cunt 693. 695
<i>Oculi cancrorum</i> iracundis præ- seruandi scopo commen- dantur 517	<i>ex apostasi</i> febrili quo modo modo tractanda 695
<i>azulterati</i> indolem habent terreorum crassorum 589	<i>rupta</i> funestum euentum ad- ferunt 714
<i>Odontalgia</i> 212	quando disparent, sympto- mata exasperantur ibid.
<i>symptomatica</i> cum stridore dentium in febribus acutis mortem præfagit 215	<i>gravidarum</i> asciti ansam præ- bent 74
<i>Odor</i> grauis & suauicolens in fe- minis cephalalgiam pro- uocat 185	<i>Oedematosi adfectus</i> hæmorrhoi- dibus suppressis superueni- entes periculosi sunt 103
salium volatiliium in cepha- lalgia sanguinea circum- specte admittendus est 198	<i>Oel-Schenckel</i> 176
<i>Odoramenta duplicis generis</i> in suffocatione hysterica vsu- alia 339	<i>Olea carminatiua</i> laudantur in su- furu & fluxu aurium 225
in cephalalgia parum auxilii adferunt 189	<i>cocta</i> in inflammatione auri- vm suppurascente facile surditatem inferunt 227
<i>excitantia</i> in epilepsia lenio- re, præcipue vterina non improbantur 461	<i>destillata</i> humores ad modum exagitant 11. 17. 189
<i>penetrantiora</i> ad interpellan- das conuulsiones adhiben- da non sunt 454. 461	- circumspecte adhibenda sunt in suppressione men- sium 123
<i>Oedema</i> 689	- maiorem decubitum hu- morum ad renes causan- tur 388
vestigia legit cachexiæ aucti- oris 690	- nocent dentibus 217. 218
	Bbbb bbb <i>Olea</i>

- Olea destillata* reiciuntur in rheumatismis 158
- caute in adfectibus aurium adhibenda sunt 227
 - *graucolenta* non nude adhibenda sunt ibid.
 - *calida* in paralyfi nocent, temperata conceduntur 896
- Oleosa* nocent in inflammationibus 175
- Oleum amygdalarum dulcium* laudatur in raucedine 253
- commendatur in mictu cruento ad æstum temperandum 64
 - animale* s. Dippelii specificè laudatur in conuulsionibus 455
 - anisæ Foresto* laudatur ad contusiones impuras 174
 - summa circumspèctione adhibendum est in tussi 277
 - calendula* ad dolores in hæmorrhoidibus tumentibus conuenit 85
 - chamomilla* laudatur in otalgia 227
 - caryophyllorum* quid in carie dentium valeat 215
 - cera* laudatur in carie dentium ibid.
 - laudatur in stomacace 75
 - cinnamomi* laudatur in paralyfi 893
 - ad sphacelum præoccu-
- pandum egregium esse dicitur 179
- hyperici* laudatur in scabie ferina 743
- juniperi*, nocet in inflammationibus 175
- lini* ad maturationem hæmorrhoidum tumentium commendatur 85
- specificè laudatur in effera hæmoptysi 48
 - myrrhæ per deliquium* temperatum est balsamicum 697
 - in empyemate laudatur 324
 - laudatur in scabie ferina 743
 - piperis* in quartana non omnibus subiectis promiscue conducit 673
 - ouorum* ad dolores in hæmorrhoidibus tumentibus conuenit 85
 - leniter camphoratum laudatur in variolis 626. 629
 - commendatur in tumore penis inflammatorio 778
 - laudatur ad consolidationem in scabie ferina 743
 - cum liquore florum verbasci quid præstet in hæmorrhoidibus cæcis 89
 - philosophorum* laudatur in stomacace 761
 - lenissimum septicum est & fungosas excrecentias aufert 778
- Oleum*

I N D E X.

<i>Oleum fabina</i> caute adhibendum in suppressione mensium 123	<i>Opiata</i> motus hæmorrhoidales supprimunt 102
<i>ex arillis sambuci</i> virtutem e- meticam habere dicitur 954	mensis supprimunt 116
<i>succini</i> in copia non debet ad- hiberi 227	lochia profus supprimunt 137
- in otalgia sumi potest ad essentiam balsamicam <i>Stah- lii</i> 225	reiciuntur in odontalgia 218
non habet vsum cephalicum 189	non conducunt in angina 264
- mictum cruentum caus- fari potest 62	fugienda sunt in asthma 285
<i>templinum</i> nocet in inflam- mationibus 175	in palpitatione cordis 294
<i>terebinthina</i> laudatur in odon- talgia 218	infarctum augent 345
nocet in inflammationibus 175	in calculo mortem accele- rant 389
<i>verbasci</i> ad dolores in hæmor- rhoidibus tumentibus con- venit 85. 89	damnantur in rheumatismis 158
<i>vitrioli</i> minus secure adhibe- tur in carie dentium 215	in adfectibus spastico-arthri- ticis contracturas relin- quunt 7. 406. 398. 416. 434
<i>Olfactus</i> facile læditur a coryza chronica 245	febres supprimunt 471
<i>Ophthalmia</i> 204	in febris biliosis prothei- formia pericula inducunt 517
<i>Opiata</i> : elogium de iis falsum est 6	reiciuntur in capitis dolori- bus 190. 198. 489
in hæmorrhagiis narium non debent adhiberi 38. 40	inducunt stupores & mentis alienationes 198. 587
nocent in hæmoptysi 50	ad irritationes in pectore non possunt commendari 276.
abesse debent in vomitu cru- ento 58	in diabete noxia sunt 811
	in colica non secura sunt 845
	deliria exasperant 939
	<i>correcta</i> in atrocia dolorum conceduntur 406. 434
	<i>Opium</i> in hæmorrhagiis adhibi- tum damna infert 112
	symptomata tantum fucat 682
	<i>Opium</i>

I N D E X.

<i>Opium</i> in lumborum & renum adfectu non adhibendum	804	<i>Ozana</i> ab adstringentibus vitri- olicis & aruginosis caussa- tur	38
non adhibendum si vestigia febrilia cum doloribus præsto sunt	845	P.	
eius vsus in dysenteria summa cautione indiget	640	P <i>Alpebrarum conglutinatio</i> in variolis quo modo referan- da	626
eius quantitas theriacæ vsum prohibet	648	<i>Palpitatio cordis</i>	288
<i>Opisthoronus</i>	390	a plethora oritur	8. 290
<i>Orexis canina</i>	811	vera ab aliis commotionibus distinguenda	288
<i>Organorum vitia</i> primariò in hy- drope accusanda sunt	711	non raro a vermibus fouetur	291
	712	a terrore inducta curatu dif- ficilis est	ibid.
<i>Orgasmus sanguinis</i> a quibus caussis inducatur	41	<i>idiopathica</i> rarior	288 289
<i>Orthopnea</i> est summus gradus asthmatis	280	notabile eius exemplum	294.
suffocationem minatur	258.		295
	283	essentiale symptoma est ma- li hypochondriaco- hyste- rici	327
signum est anginæ	256	<i>Pancreatis inflammatio</i>	551
<i>Orthostadia</i> puerperarum adfe- ctata reiicitur	130	<i>Panis largo butyro</i> illitus ante ci- bum sumtus laudatur ad expediendam aluum	339
<i>Os sepiæ</i> ad fluorem album & go- norrhœam malignam comendatur	767.774.777		340.860
<i>Ossa humana</i> specificè solent lau- dari in peste	649	<i>calidus</i> ex quo fundamento fluxum mensium inhibeat	111. 116
<i>Osteocopo: dolor</i> in febre quartana sentitur	667	pane cum aromatibus suba- cto & cocto vulgus vitur ad furditatem	228
<i>otalgia</i>	219	<i>Papauer erraticum</i> specificè lau- datur in pleuritide & peri- pneumonia	536
<i>Otiost</i> morbis præ aliis sunt ob- noxii	3		<i>Papilla</i>
<i>Oxymel</i> acrimoniam biliosam auget	518		

<i>Papilla</i> nimis parvæ	1014	modo tractanda	895
earum fissura in lactantibus		<i>Paralysis lingua</i> memoriæ labem	
	ibid.	inducit	891
- vaccinæ lactantibus con-		ex palpitatione cordis proue-	
veniunt	ibid.	nire solet	291
<i>Papularum</i> teneri ætati familia-		<i>Paralytodeæ</i> debilitates a con-	
rium <i>Hippocrates</i> mentio-		gestionibus oriuntur	144
nem facit	621	<i>Paralytici</i> communiter fiunt he-	
<i>Paracelsus</i> in phthisi ad modum		ctici	897
temperans est in promit-		<i>Paraphrenitis</i>	500. 526
tendis medicamentis	310	ad morbum Hungaricum ac-	
eius <i>unguentum</i> ad bubones		cedit	527
resolvendos laudatur	793	quo modo a phrenitide diffe-	
eius <i>spasmus fixus</i>	393	rat	520
eius adferrum de <i>belleboro</i> &		<i>paraplexia</i>	888
<i>chamadri</i> quo modo accipi-		<i>Parasynanche</i>	255
endum	12	<i>Paragorica</i> ad motus spasticos fe-	
eius tractatus von <i>Spital</i>		andos commendantur	
<i>Kranckheiten</i> adlegatur	310		396
<i>Paracentesis</i> necessaria est in em-		<i>Paresis ex colica</i>	889
pyemate	313. 322. 324	quo modo tractanda	897
in vomica pulmonum non		ex opio in colica adhibito	
numquam locum habet	532	cedit	845
locum habet in hydrope pe-		item per regimen diaphore-	
ctoris	320. 725	ticum	846
locum habet in pleuritide	532	<i>Parotides</i> in peste erumpentes	
in hydrope novus aquarum			644
proventus illam sequitur		infantum	1021
	715. 720	<i>Parturientes</i> ad labores excita-	
<i>Paracynanche</i>	255	re vix vmquam consultum	
<i>Paralysis</i>	882. 888	est	1000
vera a scorbutica differt	888	earum maximum officium in	
spuria purpurea	ibid.	quo consistat	ibid.
vnde infantili ætati obtingat		motus earum per interualla	
	890	repetuntur	999
<i>sphincteris ani</i> & <i>vesica</i> , quo		<i>Partus instans</i> secundum mensi-	

I N D E X.

vm conditionem iudicari potest	1002	tractandi	275
<i>Partus imminentiſ</i> ſigna	991	pectoris & renum conſenſus	313. 376. 382. 389
labores immodici & præmaturi cauſantur ſuppreſſionem lochiorum	134	<i>Pedilunia</i> laudantur in omnibus capitibus & pectoris congeſtionibus	187. 191
<i>difficilis</i> in quibus circumſtantiis metuendus	992	cautelâ circa eorum uſum ib. commendantur in hæmorrhagiis narium	37
- quibus remediis facilitandus	983	conducunt pro ſcopo reuulſorio in hæmorrhoidibus turgentibus	84
<i>Paſſio hysterica</i> quo modo cum malo hypochondriaco conueniat & differat ab eo	326	commendantur in angina poſt venam ſectam	262
<i>iliaca</i>	847	laudantur in ſuſurro & fluxu aurium	225
<i>Pathologia vulgaris</i> de ſalium generatione in corpore noſtro refutatur	19	in vertigine	240
<i>Pauli (Simon)</i> clyſterem ex herba veronicæ commendat in nephritide	372	laudantur in palpitatione cordis	294
radicem nigellæ laudat in hæmorrhagiis	30	commendantur in lochiorum ſuppreſſione	136
<i>Pauores</i> quo modo ab epileſia diſcernendi ſunt	456	ſuadentur in cephalæa	204
qui puerperis obueniunt	1006	laudantur in cephalalgia	187
<i>infantum</i>	1022		198
- epileſiæ ſolent eſſe prodromi	456	<i>alcalina</i> commendantur ad rigorem membrorum ſpaſticum emolliendum	405
<i>Pectoris oppreſſio</i> aſthmatica	1019	nimum <i>feruida</i> in plethora commota non ſunt adhibenda	12
- ſequitur hæmorrhoides ſuppreſſas	72	<i>Pellentia</i> & partum promouentia caute ſunt adhibenda	1000
<i>congeſtiones</i> periculoſiores ſunt quam capitibus & abdominis	144	ſub partu difficili adhibita fluxum lochiorum nimum cauſantur	128
<i>adfectus chronici</i> quo modo			<i>Pellen-</i>

I N D E X.

<i>Pellentia fortiora</i> ad hæmorrhoides & menses reuocandos non sunt adhibenda 58. 122	vitur	646
non sunt adhibenda in lochiis plane suppressis 136. 137	<i>Petechiæ</i> vnde nominatæ sint mature & copiose adparentes deterioris sunt indolis 581-	603
in calculo circumspecte adhibenda sunt 388	coloris rosei & floridi meliores censentur 603	
<i>Pentaphyllum</i> specificè laudatur in mictu cruento 65	sub peste erumpentes 635.	644. 646
<i>Periodi</i> per septenarios in febribus acutis a natura observantur 469	in variolarum interstitiis insignem malignitatem indicant 623	
conuersio in melius extra & ante periodum in febribus non est speranda 582	superueniunt dysentericæ 634.	637
<i>Peripneumonia</i> 500. 530	<i>Petroselinum</i> vrinam & calculum pellit, sed non resoluit 388	
quo modo a pleuritide spuria differat 417. 530	nephriticis non conducit 366	
vnde oriatur secundum <i>Hippocratem</i> 553	<i>Philonium Romanum</i> in malignis plus damni quam auxilii adfert 587	
accedit feбри catarrhali benignæ 554. 557	veteres eo utebantur vt anodyno in vomica pulmonum 319	
ab asthmate induci potest 283	palliativè dolores dentium sedat 215	
<i>Persicaria</i> a <i>Paracelso</i> in odontalgia commendatur 27	<i>Philtrum</i> 950	
eius herba alicuius efficaciam est in suppressione mensium 123	sanguinem inspissat & morbos lethales infert 15	
<i>Persicorum</i> nuclei commendantur in cephalalgia 188	convulsiones causatur 451	
<i>Pestis</i> 643	<i>Phlegmatia</i> 708	
varia schemata morborum exhibet 650	<i>Phlegmatici</i> calculosi exquisitos dolores non incurrunt 378	
summum gradum malignitatis constituit 577. 643	sunt flatulenti 830	
tribus modis salutariter sol-	<i>Phlegmaticis</i> cibi saliti conducunt 390	
	<i>Phleg-</i>	

I N D E X.

<i>Phlegmaticis</i> quem modum e-	<i>Phthisis pulmonalis</i> differt a vo-
dendi servant	mica
812	297. 315
<i>Phlegmatorrhagia narium</i> 32. 240	differt ab atrophia
<i>Phlegmone</i> 160	297
quo modo differat ab erysi-	aliquando sine febre est
pelate	297
non raro a metastasi febrili	non semper sequitur hæ-
oritur	morrhagias impetuosas
160. 163	27
eius signa	metus post largiorem hæ-
163	morrhagiam narium in
ad suppurationem sponte sua	iunioribus non plane de
non tendit	nihil est
163. 176	35. 303
contingit in extremis parti-	incipiens facilius potest cu-
bus	rari quam confirmata
163. 163	301.
post dolores dentium	303
interdum in facie occurrit	<i>confirmata</i> quibus signis adpa-
165	reat
173	299. 300
<i>Phlogoses hysterica</i> 123	- cur sit lethalis
<i>Phrenitis</i> 500. 519	303
ab aliis deliriis differt	- num unquam vere cura-
520. 934	ta sit
euenit iunioribus, quibus in	304
febre synocha excretio cri-	quo modo ab adstringenti-
tica non successit	bus inducatur
486	47
<i>Phrenitica symptomata</i> ab otalgia	ex asthmate oriri potest
induci possunt	283
222	ex coryza habituali in iunio-
<i>Phrenitici adfectus</i> in febribus	ribus
sunt symptoma periculo-	145
sum	item ex pleuritide & peri-
471	pneumonia
<i>Phricodes</i> 501	534
<i>Phthisis</i> 296	eius infrequentia in sexu fe-
<i>pulmonalis</i> quo modo ab he-	quiore ab aliis negatur
ctica abdominali differat	300
297	301. 304
cum hæctica aliarum parti-	quo casu etiam senioribus ob-
tium nobilium conuenit	tingat
308	283
	renalis
	382
	- a repentina suppressione mi-
	ctus cruenti inducitur
	66
	<i>Phthisici</i> fere omnes tussunt
	298
	eorum urinæ sanis ordinarie
	sunt simillimæ
	290
	<i>Pica</i>

<i>Pica</i>	812	<i>Pilula Stahliani</i> commendantur in	
quo modo superari possit	14	hæmorrhoidibus albis	100
grauidarum	978	item in fluxu hepatico	101
<i>Pili animalis</i> , quod momordit,		- in fluore albo benigno	767
externe laudantur	942	laudantur in cephalalgia	186
<i>Pilula Becheri</i> virtute aliquo modo			197
<i>Stahliani</i> cedunt		diarrhœam simplicem feliciter tollunt	878
<i>Pilula Stahliani</i> intentioni naturæ		febres suppressas facile reuocant	354
apprime respondent	131	ad tumores specialiter instructæ podagricis commendantur	435
laudantur in quam plurimis grauidarum adfectibus	986	egregie se gerunt in tumoribus post quartanam inductis	673
puerperis conducunt	131	in hæmoptysi caute adhibendæ sunt	51
	1008	num in mictu cruento sint adhibendæ	64.66
laudantur ad secundinas resistentes excludendas	129	in vomitu cruento conceduntur	57. 58
commendantur ad fœtum vel molam excludendam	130. 998	<i>Pilula amara</i> laudantur in hydrope	719
in abortus periculo se commendant	130. 976. 977	<i>Blancardi</i> ordinantur in gonorrhœa maligna	777
egregie laudantur in fluxu & suppressione lochiorum	129. 137	sic dictæ <i>cephalicæ</i> aloëticis carere debent in cephalalgia	191
solæ sufficiunt tam in suppressione quam nimio fluxu mensium	109. 121. 197	<i>Fancofurtenses</i> in tenesmo hæmorrhoidali non conueniunt	867
laudantur in malo hypochondriaco	333	<i>Wildegansii</i> specificè laudantur in paralyfi	893
flatus egregie discutunt & effectum simul roborantem exferunt	827. 833. 834	- successiue motus febriles in-	
laudantur in congestionibus	145		
- in rheumatismis	157		
- in inflammationibus	178		
in chlorosi virginum	293		

infringunt & sudorem excitant	663	leuanda	10
<i>Pinguedo grauidarum</i> nimia	981	<i>Plethorici</i> qualem habeant pulsum	8
<i>Pinguia</i> quam maxime nocent in inflammationibus externis	175	per medicamenta calida non sunt tractandi	661
- transpirationem perutilem impediunt	198	motum corporis renouunt	9
<i>Piper</i> cruditates viscosas egregie resoluit, ventriculum corrigit & sudorem excitat	826. 827	ex vertigine epileptici & convulsionibus obnoxii	235
vt specificum contra nimiam obesitatem frustra adhibetur	12	<i>Pleuritis</i>	500. 530
<i>Pisces duriores</i> nephriticis non conducunt	375	<i>vera</i> quando a spuria differat	417
<i>Plethora</i>	7. 10. 11	<i>spuria</i>	398. 417
multorum morborum causa & mater est	39	- hæmoptysin eminus intendit	430
per spissitudinem in morbidum statum transmigrat	15	augeſcente ætate vel cessat, vel ad pedes descendit	401
vt matrix vitiosæ qualitatis accusatur	491	- per remedia in congrua in veram mutari potest	420
<i>simplex</i> cur sæpe a principio vitali pro noxia materia reputeur	468	<i>Pneumatocele</i>	722
<i>commota</i> quædam inferat	9. 25. 26	<i>Podagra</i>	398. 421. 425
- suppressionem lochiorum causatur	134. 142	quo modo differat ab arthritide strictè dicta	398. 399
est causa congestionum	9. 142	cur patientes magis exagitet quam arthritidis specialis	401
turbat legitimum febris decursum	661	cur difficilius eradicetur	401.
gravidarum quo modo sub-			430
		morbus est dominorum	433
		eius conspiratio cum hæmorrhoidibus	65
		respicit hæmorrhoides externas	430
		sequitur hæmorrhoides turbatas	72. 77. 82
		ex malo ischiadico prouenire potest	423
			<i>Po</i>

<i>Podagra</i> ex pleuricide spuria ori ri potest 419	<i>Pompholyx</i> laudatur in ophthal- mia serosa 203
ad interiora repulsa tristia pa- themata caussatur 432. 435	<i>Poterii antihecticum</i> securum non est 309. 575
<i>Podagrici</i> communiter sunt ne- phritici & calculosi 80. 371 380	<i>Potulenta</i> in febribus minuunt æstum & faciunt sudores 476
iis omnibus aliquid febrilis euenire vana est speculatio 426	<i>Potus</i> cum motu debet esse con- iunctus 862
palindromæ eorum vnde de- ducendæ 77	sub frigore in febribus tepi- dus est porrigendus 666
<i>Podagricos</i> dolores quibus verbis ægrî expriment 429	versus somnum haustus stran- guriam excitare solet 805
<i>Podagricus tumor</i> quo modo ab œdemate differat 690	<i>frigidus</i> corpore calente stri- cturas hepatis & inflam- mationes inducit 166. 712. 713
<i>Pollicum eruptiones</i> violentæ in conuulsionibus frequenti- orem recursum procreant 454. 462	- in paraphrenitide incom- moda caussatur 529
<i>Pollutio nocturna</i> 779	- largior colicæ auctor est 839. 847
<i>Polypodium</i> commendatur in hæ- morrhoidibus albis 99	<i>calidus</i> in tussi commendatur 278
num aliquid præstet in malo hypochondriaco dubita- tur 336. 345	- prodest in diarrhœis 881
<i>Polyposi</i> ex improviso sæpe mo- riuntur 291	tepidus puerperis vtilior 132
<i>Polypus cordis</i> in morte anxia ge- neratus, pro causa morbi & mortis non est pronun- ciandus 726. 727	<i>spirituosus</i> grauidis non con- ceditur 989
ex palpitationibus cordis ori- ri potest 291	<i>Poudre de succession</i> 950
- nequaquam pro causa a- poplexiæ accipienda est 905	<i>Præcipitantia</i> nocent in hæmor- rhoidibus suppressis 102
	<i>prægnantes</i> interdum vomitu cruento sine periculo affli- guntur 53
	<i>Prauitius</i> commendat radicem plantag. aquat. in hæmor- rhoidibus tumentibus 84

I N D E X.

<i>Priapismus</i>	392. 396	<i>Puerpera</i> qua diætâ vti debeant	132
<i>Priapusceti</i> in hæmorrhoidibus		pilulæ <i>Stahlia</i> næ iis egregie	131
caute vsurpandus	75. 102	conducunt	
in malo hypochondriaco im-		purpura alba commune ea-	
probatur	339	rum symptoma est	612. 1003
<i>Primiparæ</i> a doloribus post par-		<i>Pulmentum</i> infantibus paran-	
tum liberæ non suat	1006	dum, quale esse debeat	1031
<i>Principium</i> agens principiis ob-		<i>Pulmonum</i> concretio cum pleu-	
stare solet	468	ra	296. 300 303
<i>vid. Natura.</i>		exulceratio vnde dignosci	
<i>Procidencia</i> ani	863	possit	296. 297. 568
<i>tunica vneæ</i>	206	- hecticam exacerbat	296
<i>Prolapsus</i> uteri in parturientibus		- remedia illi destinata	64
	998	læsio in peripneumonia	534
<i>Pruna damascena</i> ad expedi-		<i>vomica</i> a phthisi quo modo	
dam aluum laudantur	338	differat	297. 313
<i>Prunella</i> quid sit	255	violaciones	299
<i>Pruritus</i> vnde oriatur	143	tophi	296. 300. 301. 304 305
in scabie vnde dependeat	747		313
<i>ani</i>	79. 82	vulpis & ranæ specifica virtus	
<i>narium</i> quid designet	33	in phthisi exigua	310
<i>Ptarmico - errhina</i> in grauedine		interdum concrementum	
circumspecte sunt adhi-		calculosum in iis contine-	
benda	246. 247	tur	373
<i>Pterygium</i> vnde nascatur	206	& renum læsiones conspirant	312. 376. 382. 389
<i>Ptisana</i> coctæ laudantur in sta-		<i>Puls-plaster</i>	671
sibus sanguinis inflamma-		<i>Pulsatio aurium</i>	219
toriis	482	<i>Puluerulenta</i> in angina non con-	
<i>Puerpera</i> tamquam vulneratæ		ducunt	264
sunt considerandæ	130. 1007	<i>Pulsis abbatis Trithemii</i> in me-	
non decenter ligatæ colica,		morix debilitate nihil facit	929
deinde flatulentia adficiun-		<i>antepilepticus Stahl</i> i	461. 462
tur	837	- - <i>Franckii</i>	463
remediis sanguinem com-		<i>Pul-</i>	
mouentibus non sunt tra-			
ctandæ	131		

<i>Pulvis antispasmodicus</i>	397	vid. <i>Nitrum</i>	
<i>plurimis profuit in apoplexia</i>	905	<i>Pulvis Iulii Palmarii</i>	promorsu canis rabidi laudari solet
- largiter cinnabaratus vim anodynam præstat	397.414.		943
	417	<i>pannonicus rubor</i>	in febribus sudorem cohibet
- - laudatur in pleuriti- de spuria	420	<i>sternutatorius</i>	ad grauedinem expediendam
<i>bezoardicus</i>	occurrit vomitui in acutis		249
	874		eius abusus coryzæ causa 244
<i>cephalicus Michaëlis</i>	in epilepsia parum efficit	<i>stomachicus Birckmanni</i>	seu <i>Quercetani</i> laudatur in appetitus defectu
	462		818
<i>dentifricius</i>	218	<i>stypicus Mustani</i>	ad excrementas fungosas laudatur
- acrior cariem dentium caussatur	213		788
<i>Pulveres corrosivi</i>	asthma prouocant	<i>sympatheticus Dygbei</i>	in hæmorrhagiis laudatur
	281		29. 48
<i>Pulvis hydragogus</i>	in hydropse laudatur		in odontalgia
	721		215
<i>Ludouici</i>	infantibus destitutus, peculiaris efficaciam non est		in phthisi laudatur
	1029		307
<i>Marchionis</i>	dubiæ fidei in infantibus reperitur		- quo modo parandus
	ibid.		30
<i>Pulveres nitrosi</i>	longe post se relinquunt pulveres Pannonicum & Marchionis	<i>Volckammeri</i>	in calculo antispasticam habet efficaciam
	539		389
in colica, si vomitus superuenierint admodum efficaces sunt	845	<i>Puncturæ</i>	cum acubus, obesos parum iuuant
- laudantur in asthmate	284		13
- cinnabarini in deliriis & lithomyiis laudantur	601	<i>Purgans Barbette</i>	in epilepsia
<i>salino nitroso</i>	ad cruditates mucidas & ventriculi incommoda plus præstant quam carminatiua		461
	833	<i>Purgantia</i>	pro diuersitate temperamentorum sunt eligenda
			216
			non conducunt in hæmorrhoidibus cæcis
			87
			non sunt propinanda in tussisicca
			274
			damnantur in inflammationibus
			178
			in febribus lentis vitanda
			566
		Cccc ccc 3	<i>Pur-</i>

I N D E X.

<i>Purgantia</i> circa dies criticos pessimi sunt euentus	536	<i>Purgatio lunatica</i> quid sit	108
vehementiora maniacos in deterius deducunt	939	<i>Purgier</i> = Pflaster	366
- grauidis abortum conciliant	987	<i>Purpura</i> alba & rubra quo modo differant	608
in hydropo non secura sunt	721	<i>alba</i> in Saxoniam epidemice graffatur	612
per quas vias aquam asciticorum euacuent	722	- puerperis in hac regione familiarior quam aliis	135.
<i>acria</i> nocent in fluxu mensium nimio	112		579. 613. 1003
- raro in febribus conueniunt	475	- cum febre petechizante saepius complicatur	592.
<i>drastica</i> , in primis <i>aloërica</i> , in omnibus sanguinis eruptionibus suspecta sunt	59		595. 614
<i>fortiora</i> in vomica pulmonum non conueniunt	318	- nonnunquam ad modum insidiosè se gerit	617
- cur in hæmorrhoidibus suppressis non sint adhibenda	101. 102	- recessio eius saepe est lethalis	614
- hypochondriacis non conueniunt	335. 336	<i>rubra</i> in hysteriis schema suffocationis vterinæ ludit	612
- motus spasticos ad interiora vocant	407	- ex lochiorum suppressione oritur	135
- non conducunt in rheumatismis	158	- dysenteriaë aliquando superuenit	634
- ad nimiam corpulentiam remouendam damnantur	12	<i>urticata</i>	607
- nocent in plethora commota & spissitudine	217	<i>Pus</i> : vbi pus, ibi vlcus, falsum	297
- in conuulsionibus quando locum habeant	454	<i>album</i> per vomitum eiectum quid de eo censendum	305
		per vrinam secedens indicat abscessum glandularum mesaraicarum	543
		euacuatio eius ex auribus cephalalgiam soluit	186
		<i>Pyrola</i> ad vulnera pectoris laudatur	312. 317

Q.

- Q** *Vartanarii* vomitum cruentum interdum experiuntur 53
Quartanarium typum paroxysmi splenitidis obseruant 548
Quercetani puluis stomachicus laudatur in appetitus defectu 818
pilula tartarea laudantur in cardialgia symptomatica 827

R.

- R** *Abies canina* 941
Radix acacia laudatur in odontalgia 217
Radix acori adulterni seu pseudo-acori commendatur in hæmorrhoidibus tumentibus 85
 - commendatur in hæmorrhagiis 30
 - sub lingua detenta laudatur in phrenitide 526
angelica laudatur in odontalgia 217
ari resoluit & abstergit 312
 - præcipue commendatur in asthma humido 286
 - ad sudorem eliciendum commendatur 796
 - laudatur ad euacuandam colluuiem serosam 249
 - zingiberi acrimonia similis est 719

- Radix ari* commendatur in fluxu hepatico 103
 - laudatur in suppressione mensium 123
aristolochia vtriusque laudatur in carie dentium 215
armoracia in hydropo eximie se gerit 719
asari pro emetico & discutiente scopo prodest 911
 - in affectibus splenicis a nonnullis effertur 345
asparagi in mictu cruento vt specificum laudari solet 64
bardana laudatur in affectibus serosis 250
bisforta ad stricturam inferendam commendatur 170
 - in angina laudatur 264
bryonia vsum habet in fluore albo benigno 767
 - in infarctu lienis non improuide præscribenda est 345
cervicaria laudatur in odontalgia 217
chelidonii maioris in ictero conducit 735
chondrilla in hæmorrhoidibus cæcis facit quod potest 88
cichorei condita laudatur a *Stahlio* in infarctu hepatis 354
colchici a *Wedelio* in peste laudatur amuletice 650

Radix

I N D E X.

<i>Radix crocodilii</i> a Michaële lau- datur in cephalalgia 139	<i>Radix petasitidis</i> laudatur in sup- pressionē mēnsium 123
<i>curcumæ</i> specificè in icte- ro commendatur 735	- in adfectibus terōsis 250
<i>fabariæ</i> specificè laudatur in hæmorrhoidibus tumentibus 84	<i>pimpinella alba</i> valde tem- perata & tamen tenuium partium est ad penetran- dum 693
<i>gentianæ veræ</i> diarrhœas con- tumaces tollit 847.836	resoluit & discutit 179.250 537.630
- a carie præseruat dentes 218	- præseruandi scopo in pe- ste laudatur 650
- rubræ pro morfu canis ra- bidi laudatur 943	- pro morfucanis rabidi lau- datur 943
<i>jalappæ</i> temperate euacuat 720	<i>plantaginis</i> in peste laudatur 650
<i>imperatoriæ</i> commendatur in odontalgia 217	- <i>aquatica</i> in hæmorrhoidi- bus tumentibus commen- datur 84
<i>iris florentinæ</i> a carie præser- uat dentes 218	<i>pyrethri</i> commendatur in o- dontalgia 217
<i>ipecacoanhæ</i> præter virtutem emeticam ventriculum et- iam roborat 873	<i>rhodiæ</i> egregie laudatur in ce- phalalgia & cephalæa 187. 203
- laudatur in dysenteria a diætâ inordinata inducta 639.642	<i>rubie tinctorum</i> in paralyssi laudatur 898
- quando locum habeat in hæmorrhoidibus suppressis 101	- laudatur in carie dentium 213
<i>Leuistici</i> commendatur in flu- xu hepatico 103	<i>scrophulariæ</i> in hæmorrhoidi- bus cæcis facit quod potest 84.88
- laudatur in suppressione mēnsium 123	<i>symphyti maioris</i> laudatur in statibus repente congestis 174
<i>nigellæ</i> est subadstringens 30	<i>trifolii fibrini</i> specificè lauda- tur in phtisi 310
<i>ostratii</i> laudatur in fluxu he- patico 103	<i>valerianæ</i> : eius specificæ virtus
<i>petasitidis</i> laudatur ad vulne- ra pectoris 317	

virtus in ophthalmia tanta non est	210	phthisis & ulcera disponunt	558
<i>Radix valeriana</i> ab <i>Ital</i> is ad pleuraque venena laudatur	943	<i>Refrigerantia</i> in febribus lentis adhibitâ tumores œdematosos producunt	566
<i>vincetoxici</i> laudatur in adfectibus serosis	250	in acutis scirrhus lienis caussantur	348. 357
<i>vuularia</i> laudatur in odontalgia	217	<i>Refrigeratio repentina</i> post sudores quid efficiat	481. 503
<i>Rase-Uder</i>	939	<i>Regimen diapnoicum</i> post V. S. in febre catarrhali maligna commendatur	599
<i>Raucedo</i>	250	<i>coactum</i> sanguinem magis exagitat	11. 17
differt a broncho	251	- in congestionibus nocet	144. 147
constrictio potius quam relaxatio arteriæ asperæ in illa est	253	<i>Regurgitatio humorum</i> vehemens versus caput quid efficiat	393
vnde oriatur secundum <i>Hippocratem</i>	554	<i>Remedia calida & impetuosa</i> damnantur	11. 17
prodromus est erosionis faucium, vuulæ &c.	252. 783	- ad nimiam corpulentiam remouendam periculosa sunt	13
feminarum mensium obstructionem pro fundamento habet	254	sanguinem commouentia puerperis non sunt propinanda	131
infantium	1019	<i>Remedium domesticum</i> in cephalalgia	187
<i>Realgaris</i> seu sandaracæ fumus in tussi tutus non est	310	<i>Ren sinister</i> plerumque corrumpitur	372
<i>Recidiva tertiana febris</i> quo modo præoccupanda	666	<i>Renēs & pulmones</i> inuicem sibi prodesse & nocere possunt	312. 376. 382. 389
<i>Refrigerantia</i> hæmorrhagias narium supprimunt	40	<i>calculosi</i> semi-corrupci reperiuntur	379
reiciuntur in hæmoptysi	51	<i>Dddd ddd</i>	<i>Renēs</i>
nocent in hæmorrhoidibus cæcis	87		
in inflammationibus corruptionem post se trahunt	175. 375. 516		
nocent in rheumatismis	158		
in catarrho pectorali ad			

I N D E X.

<i>Renes eorum conspiratio cum</i>	<i>mationibus</i>	178
<i>vasis spermaticis</i>	<i>Renellentia in hæmorrhagiis</i>	
<i>eorum læsio vnde dignosca-</i>	<i>commendantur</i>	37. 48. 56
<i>tur</i>	<i>Renulsiões externa in fluxu men-</i>	
<i>eorum vlceratio vnde produ-</i>	<i>sium rebelli conceduntur</i>	110
<i>ducatur</i>	<i>Rhabarbarina ad aluum soluen-</i>	
<i>Repellentia præmature in hæ-</i>	<i>dam in febribus infantum</i>	
<i>moptysi adhibita phthysin</i>	<i>laudantur</i>	1028
<i>& hæcticam inducunt</i>	<i>Rhabarbarum abstergit & aliquid</i>	
<i>acria externa puerperis no-</i>	<i>adstringentis relinquit</i>	338
<i>cent</i>		641
<i>nocent in affectibus spastico</i>	<i>reuocat dysenteriam sup-</i>	
<i>arthriticis</i>	<i>pressam</i>	643
<i>externa in hæmorrhoidibus</i>	<i>post vomitum cruentum or-</i>	
<i>cæcis nocent</i>	<i>dinandum</i>	57
<i>Rerum non naturalium cautus &</i>	<i>pro scopo purgante choleri-</i>	
<i>scrupulosus vsus fontem</i>	<i>cis ordinandum</i>	216
<i>congestionum non attin-</i>	<i>iracundis vt præseruatium</i>	
<i>git</i>	<i>commendatur</i>	517
<i>Resina ialappæ laudatur in tussi</i>	<i>ad aluum aperiendam in hæ-</i>	
	<i>morrhoidibus turgentibus</i>	
	<i>laudatur</i>	84
<i>Resoluentia quænam conducant</i>	<i>commendatur in fluxu hepa-</i>	
<i>in inflammationibus ex-</i>	<i>tico</i>	103
<i>ternis</i>	<i>Rhachitis ab atrophia quo modo</i>	
<i>quid valeant in inflammatio-</i>	<i>differat</i>	361. 362. 364
<i>nibus internis</i>	<i>quo modo tractanda</i>	367
<i>commendantur in rheumati-</i>	<i>Rhagades</i>	79
<i>fismis</i>	<i>Rheuma quo sensu ab Hippocra-</i>	
<i>post lipothymias conducunt</i>	<i>te acceptum</i>	150
	<i>Rheumata arthritodea quibus</i>	
<i>Respirationis difficultas vnde ori-</i>	<i>caussis superueniant</i>	479
<i>atur</i>	<i>Rheumatica commotiones iuratum</i>	
<i>interceptio conuulsiones caus-</i>	<i>receptum habent ad lo-</i>	
<i>satur</i>	<i>cum semel adfectum</i>	156
<i>Retentio secundinarum quo mo-</i>		
<i>do tractanda</i>		
<i>998</i>		
<i>Retrouocantia nocent in inflam-</i>		

Rheu-

<i>Rheumaticis congestionibus</i> viam sternit apostasis febrilis	552	per integrum mensem suadet	87
<i>Rheumatismus</i>	140.142.149.241	fumum realgaris seu sandaracæ Græcorum pro tussi sedanda laudat	310
eminus tantum hæmorrhagiam respicit	140.149.153	eius exemplum de V. S. in pleurítico in dubium vocatur	536
differt ab inflammatione	151	<i>Rob diamorón</i> in angina sanguinea laudatur	262
- ab arthritide	152.399	<i>Rob di. mucum</i> in angina mucosa laudatur	262
- a catarrho	152.241	Rötheln auf der Brust	1019
- a stasi mucido-serosa	552	Rose	160.163
est congestio incompleta	140.142	weiße Rose	163
febriculam qualemcumque habet comitem	241	<i>Rosiones</i> vnde oriantur	143
non debet pro podagra interpretari	435	<i>Rothlauf</i>	160
ex apostasi febrili podagram inducere potest	429	<i>Rubefacientia</i> in hæmorrhoidibus cæcis nocent	87
simplex benignior est quam apostases febriles	156	<i>Rubinus sulphuris</i> non ad modum extollitur in tussi phthifica	310
non format abscessum strictedictum	158	<i>Ructus</i> vnde existant iis expositi sunt hypochondriaci	829 327
numquam est utilis	149.150.155	in tympanite familiariter concurrunt	710
stases pertinacissimæ indolis formare solet	151.155	suppressi varia incommoda producent	833
frigoris & caloris volaticam variationem coniunctam habet	153	<i>Ruhr: rothe und weiße</i>	631
sæpius a febribus oritur	154		
ad interiora translatus periculosi euentus est	155.156	S.	
<i>Rigores partium</i> podagricis eueniunt	431	<i>Sabina</i> specificè laudatur in suppressione mensium	123
<i>Risus sardonius</i>	391	laudatur in tinnitu aurium	
<i>Risuerius</i> millefolii vsum in hæmorrhoidibus tumentibus			227

I N D E X.

- Sabina* cachecticis non prodest
705
- Sabulum calculosum* discerni debet a tartarea urinæ concretionem 377
- Saburra* in primis viis hypochondriacorum vt plurimum nulla est 336
- Saccharata* mucositatem augent & excretionem impediunt 277
- in febribus non ita reicienda sunt 478
- Saccharum*: eius abusus dentibus nocet 217
- rosarum*, vt anodynum laudatur in vomica pulmonum 319
- saturni* in aqua rosarum solutum laudatur in ophthalmia 210
- cum nitro in crystallos redactum laudatur in ophthalmia 208
- Sacculi carminatiui* puerperis ad flatum discutiendos conducunt 1009
- discutientes* laudantur in nephritide 375
- in stasi erysipelacea 177
- Sal anglicanum* incidit & discutit 405
- pro scopo laxante laudatur in malo pypochondriaco 333
- laudatur in tussi hypochondriaca 273
- ob virtutem resoluentem & euacuantem in iſtero laudatur 734
- Sal anglicanum* dolores dentium sedat 218
- centaurii minoris* in clysteribus laudatur pro stimulo 833
- flatus e superioribus derivat 841
- commune* phthificis immannem tussim prouocat 311
- ad adfectus faucium conducit 263
- digestiuum* mucositates in primis viis resoluit, & diuresin promouet 197
- Syluii* non commendatur in febribus 655
- Sal*, quod lympham pinguem in obesis coagulat, recentiores corrigere volunt 12
- marinum* de nitro participat 390
- vitrioli* diu in ventriculo hæret, & spasmos eo conuocat 828
- a *Langio* commendatur in apoplexia & catarrho suffocatiuo 905. 911
- volatile* externe laudatur in mensium suppressione 120
- ficcum cum castoreo laudatur in otalgia 224. 225. 226
- Salia* in pectoris adfectibus caute debent adhiberi 278. 311
- Salia*

I N D E X.

<p><i>Salia</i> cuius ulcerationi inimica sunt 389</p> <p>eorum generatio in corpore nihil ad morbos confert 19</p> <p><i>digestiua</i> in cardialgia interdum vomitum spontaneum excitant 823</p> <p><i>media</i> grauidis pro digestionem commendantur 987</p> <p><i>urinosaf</i> in angina exiguam operam adferunt 264</p> <p><i>volatilia</i> motum tonicum inducunt, & humores diffusos in vnum locum comprimunt 198</p> <p>- non in humores, sed in vias agunt 337</p> <p>- orgasmum sanguinis & congestionem ad renes augent 375</p> <p>- sudores vel excitant, vel impediunt 483</p> <p>- materiam acrem catarrhalem vehementius commouent 559</p> <p>- in febribus adhibita tumores oedematofos & asciticos inducunt 31. 477. 489</p> <p>- in acutis scirrhus lienis & hepatis cauffari possunt 348. 352. 357</p> <p>- in febre lenta periculofa sunt 566</p> <p>- in hæmorrhagiis nocent 31</p>	<p><i>Salia volatilia</i> suppressionem lochiorum cauffantur 134</p> <p>- in hæmorrhoidibus & menfibus suppressis prouide adhibenda sunt 103. 122</p> <p>- palpitationem cordis augent 294</p> <p>- in adfectibus spastico-artriticis dolorem osteocopon relinquunt 407</p> <p>- in rheumatismis & podagra stuporem inducunt 158 896</p> <p>- quid efficiant in cephalalgia 192. 198</p> <p>- in hydropse viscera indurata adhuc magis constringunt 718</p> <p>moderate adhibita heceticis conceduntur 575</p> <p>in vertigine commendantur 236</p> <p>- post debitam humorum resolutionem in cachexia sunt adhibenda 706</p> <p>- <i>urinosaf</i> in spasmis cum tinctura alcalina mixta melius operantur 397</p> <p>- - qua ratione in congestionibus exhibenda sint 147</p> <p>- - quid in coryza & grauedine faciant 246. 247</p> <p><i>Salina</i>: eius reiectio præseruatiue laudatur in peste 650</p> <p><i>Salinatio</i> quo modo institueuda 785. 786. 787. 791. 792</p>
---	---

I N D E X.

<i>Salinatio</i> quæ symptomata habeat	790	tur	11
non potest institui, ubi læsio visceris adest	ibid.	<i>Sanguis</i> eius penum natura non ex errore conficit	8
repeti potest in robustis	293	per cibos euchylos non servatur purus	20
in hydropo nullo modo probatur	720	eius impuritas differt ab illius corruptione	19
in malo hypochondriaco detestanda est	336	optimus & floridus per resolutionem noxius euadit	22
in scorbuto tamquam noxia prorsus reiicitur	759	eius mundificationes circa æquinoctia non sufficiunt	21. 22
in adfectibus arthritico-contractis frustra laudatur	409	transfusio sanguinis boni massæ sanguineæ impuritates non remouet	22
ad corpulentiam nimiam remouendam temerarie suscipitur	12. 13	a quibus causis reddatur spissus	40
commendatur in scabie venerea	743	eius quantitas prius imminuenda, quam qualitas corrigatur	12. 22. 28
<i>Spuria Heluetii</i> periculosa est	791	stagnans vel discuti vel exsicari vel suppurari debet	167
<i>Salmuthi exemplum</i> de copiosa excretionè serii per nares adlegatur	243	eius adfluxus restaurationem apostematis faciliat	316
<i>Salsa</i> in vlcerationibus maiorem vellicationem causantur	311. 324	eius <i>orgasmus</i> a quibus causis inducatur, & quo modo tractandus	41. 42
<i>Sambuci cortex</i> fortiter euacuat	720	<i>crasis</i> quando peccat, quo modo corrigenda	41
- medius laudatur in inflammationibus externis	170	- quantitas magis quam qualitas in congestionibus respicienda	146
<i>folia Weisbachii</i> commendat in hæmorrhoidibus cæcis	88	- quantitas & spissitudo peccant in palpitatione cordis	294
<i>Sanguis</i> ab <i>Helmontio</i> thesaurus & balsamus vitæ adpellatur			

- Sanguinis crasis*, qualitas in hæmorrhagiis quo modo corrigenda 28
- spissitudo sæpius quam tenuitas & acrimonia est accusanda 70
 - eius depletio vertiginis causa 229. 230. 233. 237
 - eius congestiones & restrictiones versus caput quid designent 39
 - translationes ad pectus quid designent ibid.
 - excretionis extraordinariæ 24
 - spissitudo febres continuas rheumatico-inflammatorias profert 489
 - euacuatio reliquis medicamentis in spasms præmittenda est 398
- in pleuritide, peripneumonia, & hepatitide ad modum tenax est 537. 546
- asini* ad maniam sedandam a multis commendatur 940
- crista galli* quid efficiat 1030
- draconis* dentes a carie præservat 218
- a *Volckammero* specificè laudatur in dysenteria 642
- hirci* vulgo exhibetur in paralyssi 898
- *exsuccatus* ad abstergendum in hæmoptysi laudatur 49
- Sanguis leporis* specificè laudari solet in inflammationibus 179
- menstruus* prima vice erumpens item ibid.
- ægri tostus* instar pulveris sternutatorii in hæmorrhagiis effectum edere dicitur 30
- nigricans* in hæmorrhagiis vnde veniat 53
- in vomitu cruento vnde veniat ibid.
- ἀνω & κάτω* simul reiectus periculum minatur 54. 55
- in ventriculum effusus quando putrescit dira symptomata adfert 55
- congruatus* post vomitum cruentum in ventriculo restitans euacuandus est 57
- neque optimus neque pessimus per hæmorrhagias excernitur 31
- hemorrhoidalis* æque bonus ac reliquus 68. 75
- per plures annos, sensim & perpetuo effluens in hæmorrhoidariis observatus est 82
- cum vrina sub forma vermiculari in mictu cruento excernitur 60. 61
- ex hæmorrhoidibus in mictu cruento præueniens vnde dignoscatur ibid.
- San-*

I N D E X.

<i>Sanguis</i> eius iactura in mictu cruento non tam peri- culosa est, vti in aliis lo- cis 63	<i>Sapo Venetus</i> a Boyle in dysuria laudatur 805
<i>menstruus</i> non solum per vasa vteri, sed potissimum etiam per hæmorrhoidalia excer- nitur 111	<i>Saponata</i> in œdematibus laudan- tur 696
non est venenosus nec impu- rus ibid.	<i>Sapores mille Hippocrates</i> cui con- ceptui anam dederint 22
ex quo fundamento leges Mo- saicæ eum impurum decla- rent ibid.	<i>Satietas repentina</i> sub pastu hy- pochondriacis euenit 327
num grumofitas eum causse- tur 107	<i>Saturnina</i> in inflammationibus externis circumspecte sunt adplicanda 173. 178
venenatæ eius qualitates pro caussa variolarum & mor- billorum vulgo accusantur 631	<i>Satyriasis</i> 392. 396
circa viscera diu stagnans fe- brem quartanam, cachexi- am &c. caussatur 839	<i>Scabies</i> 736
<i>Sanguinei</i> quem modum edendi habeant 812	<i>humida</i> 736. 737
<i>Sanicula</i> colliquationem pro- mouet, hinc in phthisi & ad vulnera pectoris lauda- tur 312. 217	<i>ficca</i> ibid.
<i>Sapo purus</i> in resoluendis & ab- stergeudis mucositatibus efficax est 734	<i>ferina</i> 738
<i>Venetus</i> pro stimulo laudatur in clysteribus ad passio- nem iliacam 851	<i>venerea</i> ibid.
externe laudatur in malo ischadico 424	<i>maligna</i> complicata dici me- retur 737
	<i>repulsa</i> , quæ damna inferat 281. 451. 741
	- quo modo expellenda 285. 744. 746
	eius fermentalis indoles & contagii promittudo vnde concludatur 748
	in lue venerea & scorbuto est tantum symptoma ibid.
	in senioribus cautissime tra- ctanda 747
	quartanæ superueniens feli- cem febris decursum pro- mittit 670
	<i>Scarabæ equini</i> ad procidentiam ani ab <i>Hartmanno</i> extol- luatur 868
	<i>SCARA-</i>

. I N D E X.

<i>Scarabai maiiales</i> a Weikardo in hydrophobia laudantur	943	<i>Scirrhus</i> dolorificus adhuc sperare iubet	364
<i>Scarificatio</i> in quibus subiectis & adfectibus administranda u succulentis scabiosis conducit	747	eius discussio vix expectanda	347. 349. 358
commendatur in asthma	287	nonnumquam ex hepatitis & splenitide remanet	541.
laudatur in ophthalmia sanguinea	203		550
tolerari potest in cephalalgia	192	<i>hepatis</i>	356
<i>profunda</i> commendatur in adfectibus spastico-arthritis	408. 425	<i>lienis</i>	347
eius omisio rheumatismos causatur	154	<i>sanguineus</i>	350
improbatur in hydrope	720	<i>Scirrhi hepatis vel lienis</i> asthma siccum sustentant	285
nullius utilitatis est in malo hypochondriaco	335	<i>Scotodinia</i>	229
in oedematibus facile sphaeculum inuitat	697	<i>Scorbutus</i>	749
<i>narium</i> in apoplexia sanguinea locum habet	903	natales suos debet plethoræ	34. 754. 758
- vel retro aures commendatur in phrenitide	524	quo modo differat a malo hypochondriaco & lue venerea	749. 750
- <i>Ægyptiaca</i> ubi locum habeat	190. 678	occupat aliquando hypochondriacos & quartanarios	753
<i>Scelotyrbe</i>	751	nomen suum in omnibus adfectibus ignotis dare debet	758
<i>Scintilla oculorum</i> quid designent	33	neque breuem neque continuam medicationem perfert	760
<i>Scirrhus</i> hydropem vel hecticam pro comite habet	356. 358	non admittit fortiora abstergentia, sed temperantia	758
ad corruptionem magis sphaecelofam dispositus est	349. 358	<i>Scorbutici</i> nonnumquam vomitum cruentum incurrunt	53
		<i>Schäden</i> existit	178
		<i>Schaarbock's = Kraut</i> nomini non respondet	88
		Eee eeee	<i>Schar</i> =

I N D E X.

Scharlach=Sieber	508	rhoides externas turbatas	72
<i>Schellhammerus</i> venæ sectionem in vomica pulmonum sine læsione conscientiæ non prætermittendam statuit	319	<i>Sebesten</i> non conducunt in tussi	270
opinio de V. S. ad stases in- flammatorias dissoluendas	174	<i>Secundina retenta</i> fluxum lochi- orum excedere faciunt	127. 128 125.
eius observatio de terreis ab- sorbentibus	600	quo modo promouendæ sint	128. 998
<i>Schenckius</i> in mictu cruento commendat millefolium flore albo	65	earum <i>concretio</i>	983
Schielen	1023	<i>Secundinarum apertio</i> ab ostetri- cibus non facile tentanda est	1001
Schlag=Wasser in lipothymiis improbantur	760	- pulvis vel spiritus a mul- tis ad philtra celebratur	953
Schmerzen , welche keine Federn vertragen können	182	<i>Sedum vermiculare minus Weis- bachius</i> commendat in hæ- morrhoidibus dolentibus	88
Schwaden	961	in expeditione Danica vt e- meticum in paralyfi scor- butica expertum est	760
<i>Scordium</i> præ omnibus alexi- pharmacis laudatur in fe- bribus	473	See=Krankheit	869
<i>Scorzonera</i> delet venenum per morsum serpentum com- municatum	599	<i>Segmenta pinea</i> fornaci imposi- ta asthmaticis leuamen ad- ferunt	287
<i>Scrofuli</i> de infarctu glandula- rum mesenterii æstantur	363	<i>Semen aquilegia</i> laudatur in icte- ro	731
<i>Scrofulosi</i> tussi siccæ succumbunt	269	<i>carthami</i> temperate euacuat	720
<i>Scrophularia radix</i> specificè a <i>Wedelio</i> laudatur in hæ- morrhoidibus tumentibus	84 88	<i>cardui Maria</i> egregie tempe- rat & inflammationes præ- cauet ac mitigat	560
<i>Scroti tumor</i> sequitur hæmor-		- ad pectoris inflammatio- nes specificum est	1,9.316 535. 536
		<i>Semen</i>	

I N D E X.

<i>Semen hyoscyami palliative</i> odontalgiam sedat 215	<i>Sensibilitas</i> subiecti multum valet ad morbos fouendos 4.
<i>lini</i> valde mucidam reddit consistentiam humorum 844	inter causas occasionales mali hysterici refertur 330
<i>nasturtii</i> laudatur in ictero 731	<i>animi</i> in parturientibus 995
<i>sinapios</i> digestionem promouet 238. 841	<i>Septica</i> nocent in hæmorrhoidibus cæcis 87
<i>staphys agræ</i> commendatur in odontalgia 217	<i>metallica chirurgorum</i> damnantur in lue venerea 793
<i>violarum</i> in vrinæ vitiis a <i>Cratone</i> & <i>Hoffmanno</i> laudatur 305	<i>Serpigo hamorrhoidalis</i> 79. 82. 83
<i>urticæ vrentis Michaëlis</i> specificè laudat in asthmate 287	<i>Serpillum</i> laudatur in adfectibus spastico-arthriticis 408
<i>Semina diuretica</i> in cachexia caute sunt adhibenda 706	<i>Seruus podagricus</i> factus est, qui ocreas domini podagrici induit 435
<i>frigida</i> nauseam & spasmos in retribus biliosis augent 517	<i>Setacea</i> veteres commendabant in cephalæa 201. 203
- phthificis non conducunt 311	fluxus catarrhales cum incommodo intercipiunt 247. 248
<i>Senes</i> : eorum hæmorrhagiæ narium quo modo considerandæ 35	in ophthalmiis constantem sui usum exigunt 209
asthmate humido plerumque laborant 281	neglecta congestiones causantur 141
salia minus tolerant 384	<i>Seta suilla</i> ad hæmorrhagiæ narium prouocandam laudantur 189
<i>podagrici</i> ad seram senectutem viuere solent 431	<i>Sexus dignotio</i> in grauidis fallit 982
ad mictum cruentum contumacem procliuës sunt 62	<i>femininus</i> num hæmoptysi magis obnoxius sit quam virilis 45
<i>Senna</i> ad aluum soluendam infantibus potest adhiberi 1028	<i>Siccitas faucium</i> , mox post potum rediens, vnde veniat 164
hypochondriaco - hysterice moderate adhibenda 338	

I N D E X.

<i>Sideratio</i> seu sphaelus meningum ex phrenitide succedit	522	<i>Sitis</i> cur in malignis sit moderata	588
<i>Sideritis</i> laudatur in paralyfi & pleuritide	536. 897	<i>clamofa</i> quid fit	508
<i>Sinapi</i> fermentationem promovet, & visciditatem ventriculi refolvit	826	<i>Smaragdus vera</i> laudatur in animi pathematibus	293
commendatur in tuffi	278	<i>Soda</i>	820
<i>Signatura veterum</i> laudantur in hæmorrhagiis narium nimis	37	<i>Soldanella</i> temperate euacuat	720
<i>Sinapismi</i> commendatur in hæmorrhagiis	37. 48	<i>Solitudinis amor</i> in feminis quid designet	114
<i>Sinapismus Scnneri</i> laudatur in ophthalmia	208	<i>Solstitia</i> hefticis periculofa funt	571
<i>Singultus</i>	443	<i>Sommet= Gledfen</i>	751
rebus terrificis compescitur	444	<i>Somnia anxia</i> vnde oriuntur	7. 14. 33. 930
<i>Singultus</i> per expirationem cohibitam ceflat	445	<i>Somnus</i> puerperis eft concedendus	1007
in morbis acutis, præcipue circa dies criticos eueniens, lethalis eft	445. 471. 512. 528. 542	<i>podagricorum</i> cum pauoribus coniunctus eft	420. 427. 431
- quæ modo poffit præcaveri	446	ei valde dediti funt hypochondriaci	327
teneffimo fuperueniens periculofus eft	865	<i>Saporiferum correctum</i> in mania iocum habere poffet	939
colicæ fuperueniens mali ominis eft	445. 839	<i>Soporofi adfectus</i>	913
<i>chronicus</i> quo modo debeat compelci	447	in febribus periculofi funt	472
<i>Siagultuofa febris</i>	501	<i>Sorbi</i> exficcati in aluo nimis laxa & diarrhœa contumace laudantur	881
<i>Sinifis</i> in teneris lethale fignum eft	1030	<i>aucuparia</i> fungi in dyfenteria laudantur	642
		<i>Spafmus</i>	390
		quo modo differat a conuulfione	393. 394. 448
		repentinus & lentus	393
		mulcularis & fibrillaris	393
		<i>Spafmus</i>	

I N D E X.

<i>Spasmus fixus Paracelsi</i>	393	in hemicrania obseruatur	412
- ex colica per opium tractata succedit	845	eorum confusiones vulgo pro causa februm habentur	468
<i>cynicus</i> facile degenerat in conuulsiones	391. 395	<i>Spastica strictura</i> in intestino recto cannulam clysticam non admittit	392
in occipite feminarum	391	<i>Spasticus dorsii adfectus</i> pro nephritico non est declarandus	409
in œsophago & ventriculo deglutitionem impedit	392	<i>Spastico-arthritici adfectus</i>	394
<i>flatulentus</i>	392. 393		398
<i>thoracis</i>	392	<i>Spastico-conuulsui adfectus</i>	394
<i>vesica</i>	392	<i>Spasticus sensus</i> in thorace, scapulis & hypochondriis hæmoptysin minatur	34
<i>Spasmi</i> in lumbis, circa ilia, inguina præcedunt mictum cruentum	60	<i>Speck=Beulen</i>	783
<i>vehementes</i> in febribus periculosi sunt	471	<i>Species de hyacintho</i> in effera hæmoptysi laudantur	48
- cum veris conuulsionibus conspirant	394. 395	laudantur in omni fluxu nimio	131
sunt motus erronei, non tamen irrationales	394	<i>diaturbitb</i> cum rhabarbaro vehementer & incommodè vermes expellunt	858
in acutis & vulneribus sunt periculosi	393	<i>specificæ</i> post generatiora sunt exhibenda	397. 454. 459
in adfectus spastico: arthriticos sæpe mutantur	395	<i>antepileptica</i>	460. 461
<i>Spasmi particulares</i>	391	<i>antifebrilia</i> magis optanda quam speranda sunt	478
in conuulsiones facile transmigrant	395	<i>antisplenetica</i>	343
- ad scopum naturæ non perueniunt	395. 402	in colica	846
quo magis a loco excretionis sanguinæ remoti sunt, eo pertinacius insistent	402.	quando in <i>congestionibus</i> locum habeant	148
	430	contra <i>corpulentiam</i> nimiam nulla sunt	12
per anodyna opiata non sunt tractandi	17		
eorum oblectatio contraria		Eccc eee 3	Spe-

I N D E X.

<i>Specifica convulsivos motus</i> facilius compescunt quam spasti- cos 398	<i>Sphacelus</i> materiae biliosae infe- quutus quibus indiciis di- gnoscat 511
<i>domestica</i> in variolis impro- bantur 628	meningum ex phrenitide 522
in <i>hamorrhoidibus</i> fluentibus quid faciant 86	eius corruptio rupta vnde di- gnoscat 543
- - cæcis, quid de iis obser- vandum 88	ex erysipelate natus 169
in <i>inflammationibus</i> effectui non respondent 179	<i>Sphincteris vesicæ</i> stricturne spa- sticæ vehementer læuunt 392
in <i>melancholia hypochondriaca</i> 934	<i>Spina cervina</i> ad aluum expedi- endam infantibus potest exhiberi 1028
in <i>mensium fluxu</i> nimio adhi- bita nocent 112	<i>Spirituosa</i> in spissitudine sangui- nis magis exagitant 17
in <i>phthisi</i> 310	post hæmorrhagias non con- veniunt 20
ad <i>spasmos</i> nullius sunt usus 397	<i>fortiora</i> vulgo in lipothymia adhibentur 925
in <i>vrina incontinentia</i> 808	<i>balsamica</i> in cephalalgia caute iunt adhibenda 189
<i>Sperma ceti</i> in suffocationis peri- culo commendatur 286	<i>Spiritus acidi</i> in febribus laudan- tur 477
laudatur in mictu cruento 64	<i>acidus formicarum</i> præcellens antiparalyticum est 897
<i>Spermatica</i> vasa in nephritide si- mul adficiuntur 370	- post principia in motibus spastico - arthriticis adhi- bendus 409
<i>Spermatidis abundantia</i> , quæ con- vulsiones caussatur 453. 442	<i>ardens</i> post adsumtos cibos catarrhosis in vomitu com- mendatur 250
<i>Sperniola Crollii</i> in phthisi speci- fice commendatur 310	<i>cochlearia</i> nocet in scorbuto 760.
<i>Spey = Kinder, gedeh's Kinder</i> 814. 1028	in stomacace externe locum habet 761
<i>Sphacelus</i> 167. 169. 170	C. C. in acutis copiose inge- stus
passioni iliacæ superueniens, dolores quidem soluit, sed mortem adfert 848	
paralyfin plenariam excipit 891. 895	

I N D E X.

stus œdemata adducit	68.	flammationibus adhiben-	
	691	dus	177
<i>Spiritus fuliginis</i> vulgo exhibetur in paralyfi	898	<i>Spiritus camphoratus</i> commendatur in rheumatismis	157
<i>odoriferi</i> in sicca si frustra adhibentur	1030	- - laudatur in cephalalgia	187. 197
<i>oleosi</i> in apoplexia laudantur	905	- - in cephalæa	203
<i>nitri</i> lapides in pollinem reducere creditur	387	- - ad oculorum pericula in variolis & morbillis avertenda	626
- <i>dulcis</i> potens diureticum est	804	- - <i>crocatus</i> præ reliquis externis laudatur in motibus spastico-arthriticis	405. 408
- <i>acidus</i> in maiore copia corrosivus est	ibid.	- - laudatur in angina	261
<i>salis ammoniaci</i> laudatur in grauedine	557	in empyemate	323
<i>serpilli</i> laudatur in adfectibus spastico-arthriticis	408	<i>vitrioli</i> non reiicitur in malignis	590
- laudatur in paralyfi	897	- non profus reiicitur in stomacace	762
- - in cephalalgia	189	- minus secure adhibetur ad cauterisationem in carie dentium	215
<i>sulphuris per campanam</i> non reiicitur in febribus malignis	590	<i>vrinosi</i> stupidum rigorem relinquunt	407
<i>tartari</i> tartareas concreciones dissolvere creditur	387	<i>Spissitudo humorum</i> est causa congestionum	142
<i>vini</i> laudatur ad tussim stomachalem	277	& <i>acrimonia</i> non æque in vno subiecto conueniunt	754
- non roborat ventriculum, concoctionem autem promouet	958	<i>sanguinis</i>	13
- debet esse rectificatissimus		- paucis diebus non potest auferri	15
• in rheumatismis	158	<i>Splen</i> in motibus hæmorrhoidalibus simul adficitur	76
• aquosior adfectibus erysipelaceis insigniter nocet	1015	<i>Splenitis</i>	500. 547
<i>camphoratus</i> qua cautela in in-		in scirrhum transmigrat	550
		<i>Spodium</i>	

I N D E X.

<i>Spodium</i> commendatur in ophthalmia serosa	208	maturationem duci potest, per sectionem aperienda est	174
<i>Spör=Äpfel</i>	881	<i>Steatomata</i> vnde	793
<i>Sputum cruentum</i> quo modo differat ab hæmoptysi	43	<i>Stech=Körner</i>	536
quo modo tractandum	49	<i>Stein</i> : wenn es drückt wie ein Stein im Leibe	392
primarium signum peripneumoniæ est	45. 531. 534	<i>Stercus gallinaceum</i> in ictero nullius vitilitatis est	734
<i>purulentum</i> discerni debet a materia pultacea in tussi simplice	288	<i>suillum</i> seu <i>equinum</i> in hæmorrhagiis commendatur	31
- phthiæcos consummatæ certissimum signum est	299. 304	<i>Steriles</i> plerumque feminæ, quæ fluxum mensium non experiuntur	118
<i>Squilla</i> humores ad euacuationem egregie præparat	275	<i>Sterilitas</i> succedit, quando vitæ non sufficienter purgatur	129
<i>Stagnationes & stases</i> differunt a congestionibus	139. 144	a fluxu mensium nimio	109
<i>Stahl</i> eius <i>mixtura tonico-neruina</i> , <i>puluis antepilepticus</i> , <i>pilula</i> , <i>essentia alexipharmaca</i> . Videantur suis literis.		feminarum obesarum thermis & acidulis nonnumquam adfertur	13
<i>Stasis inflammatoria</i> a congestionem oritur	144. 167. 170	<i>Sternutatio</i> : quæ sint eius causæ	244
<i>mucido-serosa</i> differt a <i>stasi</i> vrente, rodente, venerea, vlcerafcente	552	humiditatem immobilem fluidam reddere vult	251
- liber manet a febre	553	deficiente nisu parturientibus ordinatur	995
<i>erysipelacea</i> tota est discutienda	177	<i>Sternutatoria</i> quando in adfectibus soporosis locum habent	918
eius discussio quo modo a natura instituat	540	in epilepsia adhibita causantur dolores capitis & alia mala	462
suppuratio symptomata reddidit grauiora	540	<i>Stillicidium urine</i>	806
quæ neque discuti, neque ad		<i>sanguinis</i> per quinque dies obferua-	ferua-

I N D E X.

seruatum est in hæmor- rhoidibus externis	86	<i>Stuporis sensus</i> vnde oriatur	143. 144
<i>Stimulantia</i> , in mensium sup- pressionione noxia sunt	122	<i>Styptica</i> hæmorrhagias narium supprimunt	40
conceduntur in lochiorum suppressione	136	<i>Subadstringentia</i> in effera hæ- moptysi conceduntur	51
damnantur in hæmorrhoidi- bus cæcis	87	- in vomitu cruento	56
<i>Stomacace</i>	752	- in fluxu mensium rebelli	110
<i>Stomachi</i> vitium vertiginis caus- sa	234. 235	- in hæmorrhagia vterina	111
<i>Stomachica</i> amara ad tonum ro- borandum efficacissima sunt	827	<i>Succinum</i> sanguinem successe attenuat	123
<i>Strabismus durabilis</i> ex distorsio- ne oculorum	458	habet aliquid tonici, est diu- retico-discutiens	189
<i>infantum</i>	1023	laudatur in fluore albo beni- gno	766
<i>Strangulati</i> quando & quo mo- do restituendi	967. 968	sine separatione suæ substan- tiæ commendatur ad mo- tus spasticos	397
<i>Strangulatio hysterica</i>	328	eius adpensio in coryza & grauedine nullius effectus est	247
<i>Stranguria</i>	798	<i>Succinata</i> in catarrhis simplici- bus, non autem febribus conducunt	558
& suppressio vrinæ tempora- ria in grauidis	981	<i>Succus citri</i> vt specificum con- tra nimiam obesitatem frustra adhibetur	12
<i>Stria sanguinea</i> in excrementis quid denotent	68	- <i>berberum, ribium</i> in hæmor- rhagiis commendantur	28
<i>Stridor dentium</i> in febribus acu- tis mortem prælagit	215	<i>betula</i> scabiem corpori con- ciliat	748
<i>Strobili pini</i> laudantur in adfe- ctibus spastico-arthritis	408	<i>urtica</i> in mictu cruento speci- fice laudatur	64. 65
<i>Stulti</i> per vincula & verbera non curantur	933. 940	<i>Ffff fff</i>	<i>Succ</i>
<i>Stupha Laconica</i> ad sudorem eli- ciendum conducit	797		
<i>ficca</i> ad sudorem commen- datur	721		

<i>Succi aciduli</i> ad sitim mitigandam commendantur 317	<i>largus</i> in febre ephemera hanc soluit 481
<i>Sudatio</i> non autem diaphoresis, salivationem impedit 792	<i>sanguineus</i> 24
in libero lecto, mit Spriegelin, in lue venerea præfertur 789	<i>spontaneus</i> copiosus hepaticidem soluit 541
<i>Sudatoria</i> cura quo modo instituenda 785. 786. 789	<i>symptomaticus</i> noxius est 470
<i>Sudationes molesta</i> in scabie sunt instituendæ 746	<i>Sudoris vitia</i> 794
quibus remediis comode in hydropè promoueri queant 720. 721	<i>Sudores</i> citius erumpentes turbant febrem 595
<i>coacta</i> icterum exacerbant 734	<i>infantium</i> repulsi conuulsiones caussantur 798
- in febribus lentis vitandæ 566	<i>hectici</i> passivi sunt 795
frequentes in corpulentia nimia temere instituuntur 13	- adstringentibus & anodynis non sunt adgrediendi 575
in paralyti nocent 898	<i>colligatiur</i> de phthisi & hectica consummata restantur 300. 304. 569. 571
in tussi non habent locum, nisi materia sit sublata 274	- in febre lenta quo modo tractandi 566
<i>Sudor Anglicanus</i> 479. 647	<i>nimii</i> per adstringentia non sunt tractandi 796
<i>frigidus</i> in febribus biliosis mali ominis est 512	- in variolis non sunt bonæ notæ 624
in fronte post antepilepticorum vsu salutaris 462	<i>suppressi</i> quæ damna adferant 795
<i>hamorrhoidalis</i> 79	<i>Sudorifera</i> ad venenatam malignitatem de corde propelendam non sunt ordinanda 558. 559
ad febris restitutionem omnino requiritur 470	in plethoricis vertiginem & aluum adstrictam caussantur 672
eius retardatio protrahit febres ibid.	in angina symptomatica non conueniunt 265
in febre tertiana ad modum salutaris 661	
febris lentæ cum hectico sudore non debet confundi 576	<i>Sudo-</i>

I N D E X.

<i>Sudoriferum regimen</i> in scorbuto nullius utilitatis est	759	<i>Sulphur</i> nullum ulcus curat, hinc in phthisi non quadrat	309
<i>Suffimigia</i> laudantur in hæmorrhoidibus tumentibus	84	<i>antimonii auratum</i> mirifice & momentance catarrhum suspendit	- 913
- in ontalgia	225	<i>crudum</i> in malignis non commendatur	590
- in adfectibus spastico-artriticis	409	<i>Sulphurea acria</i> in infarctibus occasionem præbent	336
- in fluore albo effectum discussorium præstant	768	<i>spirituosa</i> in hydropes calorem hecticum inducunt	718
<i>Suffocatio hysterica</i>	108. 328	<i>Superfetatio</i>	984. 990
a lochiis suppressis	135	<i>Suppressio hæmorrhagiæ narium</i>	39
<i>Suffocationes cardialgicæ</i> feminarum	117	<i>hæmorrhoidum</i>	90
<i>uterina</i> a convulsionibus uterinis differunt	449	<i>mensium</i>	116. 117
<i>Sulphur</i> laudatur in inquinamenti repulsis	285	<i>lochiorum</i>	133
eius flores in recessione scabiei commendantur	745. 746	<i>februm</i> intermittentium in infarctus hepatis & lienis inducit	355
laudatur in adfectibus pectoris catarrhalibus	275. 276	<i>Suppositoria</i> stimulantia nocent in hæmorrhoidibus suppressis	101. 102
eius fumus laudatur pro tussi sedanda	310	<i>Suppuratio staseos</i> inflammatoriæ quo modo tractanda	265
in inflammationibus internis sub initium & in declinatione efficax est	547	differt a vomica	313
pauca eius grana in hydropes non reiciuntur	718	<i>Surditas</i>	219
in manatione aurium prouide debet adhiberi	228	in acutis delirium aut hæmorrhagiam portendit	223
intertrigines repellit	1030	ex metastasi materiæ parareniticæ ad aures prouenit	228. 528
post variolas periculosum est	629		
nocet in hæmorrhoidibus cæcis	87	Ffff fff 2	<i>Suspi-</i>

I N D E X.

<i>Suspiria hypochondriacorum</i> profunda quid intendant	330	<i>Symptomata</i> febrium periculosa	471
<i>lipothymicorum</i> post excitationem quid velint	926	eorum dissimulatio in malignis periculosa est	582
<i>anhelosa melancholicorum</i> quid velint	932	<i>Synanche</i>	255
<i>Susurrus aurium</i>	219. 224	<i>Syncope</i>	919
<i>Sutorianum causticum</i>	172	quo modo ab appoplexia differat	899
<i>Sycosis</i>	79	ab hæmorrhagiis periculosa	923
<i>Sydenham</i> hæcticis & phthificis equitationem commendat	311. 565	in puerperis	1006
<i>tus</i> in infantum & puerorum per purgantia expugnare docet	278	a lochiis suppressis	135. 136
<i>eius</i> morbus, qui calculum mentitur	329	<i>Synoptica gravidarum</i> debilitas	982
- observatio de sanguinis constitutione in inflammationibus	545	<i>Synochus putrida</i>	484
- methodus tractandi passionem iliacam	852	<i>Syrupus althææ</i> in urinæ vitiis adhibetur	805
- - de V. S. larga & repetita in pleuritide & peripneumonia reicitur	536	de <i>erysimo Lobelii</i> & <i>liquiritiæ</i> laudantur in raucedine	253
<i>Sympathetica</i> in odontalgia incerta sunt	217	<i>scelotyrbicus Foresti</i> in scorbuto tutus est	761
<i>cura</i> febrium per cancrum fluuiatilem sine omni effectu est	666		
- in ictero rarius effectui respondet	735		
<i>Symptoma</i> quid sit	1. 496		
<i>Symptomata</i> medicum non debent deducere in errorem	476. 582		

T.

T <i>Abacus</i> vomitorium & alterantem effectum habet	911
<i>eius</i> vsus mediocris asthmaticis commendatur	287
- succus in stomachace traumaticum edit effectum	762
- - vel decoctum mundificandi scopo laudatur in scabie ferina	743
- folia masticata contra nimiam obesitatem frustra commendantur	12

Tabacus

I N D E X.

<i>Tabacus</i> , fumus vulgo commen- datur in odontalgia 218	rum efficacissime eueni- unt 827
- quid efficiat in coryza & grauedine 244. 247	<i>Temperantia nitrosa</i> faciliorem partus succesum promo- uent 1001
eius extractum tussim pecto- ralem & chronicam sedat 276. 297. 572. 307	<i>Tempora morborum</i> semper re- spici debent 6
<i>Tabes</i> fluxum mensium exce- dentem sequitur 109	<i>Tenesmus</i> 863
quo modo ei succurrendum 573	spasmis adnumeratur 392
<i>Tacten</i> 79. 981	<i>hemorrhoidalis</i> 68. 80
<i>Talileporum</i> in spasmodica re- num constrictione specifi- ce laudantur 805	<i>Tensiones</i> sunt acerrimæ dolo- rum species 143
<i>Tamarisci ligni pocula</i> num quid profint in infarctu lienis 346	<i>Terebrationem</i> capitis veteres commendabant in cepha- læa 201
<i>Tarantismus</i> 941. 944	<i>Terracatechu</i> in angina effectum habet adstringentem 263
<i>Tartarea urina concretio</i> non de- bet pro sabulo calculoso reputari 377. 382	<i>Terræbolares</i> nocent in hæmor- rhoidibus cæcis 87
<i>Tartarus tartarizatus</i> ad infar- ctum lienis ordinatur 342	<i>sigillata</i> in vomica pulmo- num non conueniunt 319
<i>vitriolatus</i> ex puluere bezo- ardico remouendus, quan- do diarrhœæ adsunt 557	<i>Terræ motus</i> pestem caussari pos- sunt 645
<i>Taqâzîs</i> 205	<i>Terror</i> conuulsiones prouocat 451
<i>Temperamenti mutatio</i> fit per fe- bres lentescentes 471	<i>Testa ouorum</i> calcinatæ in urina viciis laudantur 805
<i>Temperantia</i> post hæmorrhagi- am male suppressam sua- dentur 30	<i>Testiculus equinus</i> ad hæmorrhæ- giam vteri commendatur 1002
in hæmorrhagia vteri pellen- tium vsum suppleat 996	<i>Tetanus</i> 390
<i>nitrosa</i> in angustis præcordi-	<i>Thee</i> nimis saturatum adstringit 333. 362
	num hæmorrhoides suppri- mat 94
	Ffff fff 3 <i>Thee</i>

<i>Thee</i> ordinatur in nephritide & calculo	374. 285	<i>stulant</i>	696
<i>Theriaca</i> antiquorum diuinum remedium fuit in peste	648	<i>earum abusus</i> ascitem adfert	711. 719
in febribus plus damni quam auxilii adfert	587	<i>Wolckensteinenses</i> scabiem inducere solent	748
commendatur in vitiis sudoris	798	<i>Thonerus</i> per iulapia acidulata magnam sibi existimationem peperit	590
pro scopo anodyno in cardialgia commendatur	826	<i>Thori vsum pramatrum</i> puerperis sacra scriptura interdicit	132
in ulceratione œdematis ardorem excitat	697	<i>Thymus</i>	79
in inflammationibus internis non conuenit	547	<i>Tinctura antimonii tartarifata</i> ad correctionem sanguinis & lymphæ laudatur	58. 396
<i>caelestis</i> laudatur in cephalalgia	187	adultis non autem infantibus conducit	1028
<i>Therma</i> obesis salutare observantur	13	in rhachitide laudatur	368
in spissitudine sanguinis commendantur	17	<i>antiphthifica Grammanni</i> nullius boni effectus est	309. 575
laudantur in rheumatismis	158	<i>Tinctura antiphthifica</i> in febribus lentis & hecticis scirrhos hepatis caulantur	357
in atrophia non contem- dæ	367	<i>bezardica</i> camphora & opio inquinatæ inflammationibus internis non conueniunt	547. 648
in infarctu lienis quando suauendendæ	346	<i>Tinctura coralliorum</i> commendatur in effera hæmoptysi	48
num phthificis suauendæ, medici disident	311	<i>lacca</i> in odontalgia laudatur	217
in palpitatione cordis non reiciuntur	294	<i>martis aperitiua Ludonici</i> ad tonum ventriculi roborandum laudatur	566. 827
aliquid præstant in coryza & grauedine	248	<i>Tinctura</i>	
in nephritide	375		
in cacochymia circumspicione indigent	23		
in œdematibus cautelam po-			

<i>Tinctura martis aperitiua Ludouici</i> vt subadstringens laudatur in mictu cruento	64	fectum exhibent	66
- - in hæmorrhoidibus internis	75	<i>Topica</i> in pleuritide maiorem spem discussionis faciunt quam in peripneumonia	531
- - in hæmorrhoidibus albis	100	in vomitu cruento sunt fugienda	58
<i>odontalgica Mynsichti</i>	217	in incremento & statu congestionum nocent	147
<i>opii Langeloti</i> laudatur in mictu cruento	64	<i>emollientia</i> & roborantia in atrophia vitanda	367
salis tartari, vel antimonii laudatur in congestionibus	147	<i>frigida</i> in simplice infarctu scirrhum caullari possunt	348. 351. 357
<i>serra catechu</i> vt subadstringens laudatur in effera hæmoptysi	48	qua circumspectione adhibenda in scirrhis	354. 360
- - in mictu cruento	64	<i>sicca loco V. S.</i> adhibenda in rheumatismis	158
<i>Tinea infantum</i>	1020	<i>Tophi</i> differunt a vomica	313
<i>Tinnitus aurium</i>	33. 219	<i>pulmonum</i> vnde existant	296.
quò modo tractandus	225		300. 301. 304
<i>Tonica</i> cum lenibus anodynis laudantur in fluxu mensivm nimio	110	peculiarì folliculo inclusi mortem non accelerant	305. 315
- in hæmorrhagia vteri	111	ex adstringentium vsu	407
<i>Tonica martialia</i> quando in hæmorrhoidibus suppressis adhiberi debeant	102	<i>Tortura</i> podagricos dolores superat & profligat	143
<i>Tonicum optimum</i> est motus corporis	37	<i>infantum</i>	1025
<i>Tonus ventriculi</i> per stomachica restaurandus est	437. 827	<i>Todten=Brüche</i>	178
<i>Topica</i> commendantur ad erysipelas	173	<i>Tractiones</i> vnde oriuntur	143
- in cephalæa	203	<i>Tragea veterum</i> quid præstent in coryza & grauedine	249
- ad tumores pedum	706	<i>Transfusio</i> sanguinis boni inquinaciones eius non remouet	22
in mictu cruento nullum ef-			

I N D E X.

<i>Transplantatio</i> odontalgiae quo modo instituenda	217	venerea & lepra familiariter concurrunt	739
<i>Transpiratio</i> placida commendatur post incongruam venae sectionem	175	<i>Tumores calidi</i> per incongrua discutientia in frigidos mutantur	691
vim vitam materiae peccantis latius dissipat	534	<i>oedematosi</i> post tertianas & quartanas	662. 665
<i>Traumatica</i> pulmones stringunt & materiam profundius infarciunt	278	- post febres per apostasin formati	691. 692
febrem lentam in hecticam promouent	566	- ex stali erysipelacea	177
commendantur in vomica pulmonum	317	- phthisi superuenientes lethales sunt	304
- in calculo	385	- hydropici a mictu cruento incongrue cohibito	63
<i>Tremor artuum</i>	886	<i>pedum</i> in grauidis	981
<i>Trepanatio</i> quando in cephalæa locum habeat	204	<i>phlegmonodes</i> post dolores dentium	177
<i>Trifolium fibrinum</i> in scorbuto commendatur	761	post podagram quibus temperamentis eueniant	431. 432
<i>Tristitia</i> sanguinem reddit spissum, & simul naturam facit abiectam	40	<i>Tussis</i>	266
<i>Trochisci alhandali</i> laudantur in tussi	271	eius causa	302. 312
<i>de carabe</i> laudantur in mictu cruento	64	differt ab asthma	379
- in fluxu lochiorum nimio	129	non omnibus communis est	208
<i>Tumor</i> dolores spastico-arthriticos mitigat	430	ob salutarem finem opiatum non est sopienda	312
<i>abdominis & pudendorum</i> in puerperis	1006	diuturna non semper phthiseos signum est	270. 298
<i>malarum</i> odontalgiam soluit	214	non semper & perpetuo	477
<i>Tumores bubonodei</i> cum scabie		ad hecticam pertinet	569
		a vitriolicis exasperatur	466
		certis horis se extersens obstructionem visceris suspensam reddit	270
			<i>Tussis</i>

I N D E X.

<i>Tussis</i> eius ferocia quo modo compescenda 317. 318	<i>Tussis a scabie repulsa</i> quo modo tractanda 275
<i>catarrhalis</i> seu <i>serina</i> 266. 270. 600	<i>secca infantibus</i> sub dentitione familiaris 269
<i>clangosa & sonora</i> est signum hæmoptyscos 44	- iuuenum diuturna suspen- sa est 270
<i>habitualis</i> a phthisica <i>secca</i> quo modo dignoscatur 268	- <i>gravidarum</i> 975
- erosionem pulmonum inducere potest 270	- abicit interdum in ferinam 270
- quo modo tractanda 277 278	<i>secca & sonora</i> topus pul- monum prodit 300
post <i>hæmoptysin</i> remanens 46. 49. 51	cum <i>sputo colorato</i> in pleuri- tide & peripneumonia ob- seruatur 530
<i>humida</i> cum phthisi solet con- fundi 303. 304	<i>Stomachalis</i> <i>humida & secca</i> 267. 273
in siccam transiens non est boni ominis 270	<i>Stomachico pectoralis</i> 273. 277
- non semper totos pulmo- nes occupat 276	<i>valida</i> in febre catarrhali be- nigna quo modo mitigan- da 556. 557. 560
- sequitur hæmorrhoides suppressas 72	<i>vehemens</i> hæmoptysin non statim caussatur 46
<i>hypocondriaca</i> 267. 273	<i>vernalis</i> mitior quam <i>autu- mnalis</i> 270
vaga scirrhum in hepate in- spectum reddit 270	<i>Tussendi conatus</i> excussorius tus- sim magis introducit 276
<i>infantum</i> 1019	<i>Turis vaporem Deckerus</i> in cory- za & graucedine laudat 246
- & <i>puerorum</i> quo modo se- cundum <i>Sydenhamum</i> ex- pugnanda 278	<i>Tutia</i> commendatur in oph- thalmia serosa 208
pectoralis 266. 269	<i>Tympanites</i> 707
periodica 270	spasmi eam accensere con- tra rationem est 721
<i>phthisica</i> 268. 272	a lochiis suppressis 135
<i>pulmonalis</i> cedit extractio ta- baci 297	<i>Typhodes</i> 500
	G g g g g g g V. Vapor

I N D E X.

V.	
V apor turis & aceti circum-	
spective in coryza adhiben-	
dus .. 246. 247	
<i>Vapores acres</i> irritant asthma	
siccum .. 281	
<i>corrosivi</i> minerales sulphurei	
quæ mala producant 46.	
47. 299. 960. 961	
<i>Varices grauidarum</i> .. 980	
interdum rumpuntur 24.	
988	
<i>Vasorum lymphaticorum ruptio</i>	
quid ad hydropem confe-	
rat .. 712	
<i>Variola</i> .. 617	
non vno tempore erumpunt;	
posteriores sæpe conuulsi-	
ones caussantur .. 629	
nonnumquam conuulsiones	
eas præcedunt .. 450	
pustulas sesfiles exhibentes	
sunt periculosa .. 623	
desiccata vitæ iacturam ad-	
huc inferre possunt .. 622	
confluentes periculosiores	
quam distinctæ .. 623	
copia earum plures enecat	
quam inopia .. ibid.	
expulsio earum omni modo	
interdicitur .. 627. 628	
a grauidis in foetum propa-	
gantur .. 622	
infantes eas feliciter superant	
quam adulti .. 630	
<i>Variola</i> , reliquæ earum asthma-	
ti ansam præbent .. 281	
earum transplantatio .. 630	
<i>Ubertoldi</i> .. 193	
<i>Vellicationes</i> vnde oriuntur .. 143	
<i>Venaportæ</i> : spissitudo præ aliis	
eam adficit .. 15	
eius structura inter causas	
mali hypochondriaco-hy-	
sterici refertur .. 330	
<i>Vena sectio</i> vires non exhaurit,	
nec sanguinem vappidum	
reddit .. 248	
in qua corporis parte institu-	
enda .. 11. 12	
cur luna decrecente institu-	
enda .. 332	
ad senium est continuanda .. 64. 122	
natura ei facile adsuescit .. 120	
<i>stata</i> cæcitatem non caussatur .. 209	
cur interdum nullum, immo	
sinistrum, effectum exhi-	
beat .. 895	
commendantur in apoplexia	
sanguinea .. 903. 904	
: in catarrho suffocatiuo .. 910. 911	
: in cephalalgia .. 192	
- in coryza & grauedine .. 248	
tempestiua in tussi .. 274	
- in conuulsionibus .. 455	
commendatur in colica hæ-	
morrhoidali .. 844. 845	
<i>Vena</i>	

I N D E X.

<p><i>Vena sectio</i> ante conceptionem vomitus grauidarum impedit 872</p> <p>nouum abortum præoccupat 130</p> <p>- in epilepsia 462</p> <p>- in empyemate 324</p> <p>- grauidis in pede 130. 192 985. 986</p> <p>- in ipso partus termino 130. 995</p> <p>- in hæmorrhagiis 31. 42</p> <p>- in hæmorrhoidalibus motibus 73. 87. 102</p> <p>- in vertigine non solum instituenda sed etiam iteranda 236. 238. 239</p> <p>- in hemicrania 415</p> <p>- in hypochondriaco malo 335</p> <p>- ab initio inflammationis 171. 175</p> <p>- in inflammationibus partium vulneratarum 180</p> <p>- maniacis 938</p> <p>- in melancholia hypochondriaca 934</p> <p>- in lochiorum suppressione plenaria 136. 137</p> <p>- post mensium cessationem 121. 120</p> <p>- aut suppressionem 112. 120</p> <p>- in raucedine a mensium suppressione 254</p> <p>- in nephritide 374</p>	<p><i>Vena sectio</i> in palpitatione cordis 291. 292</p> <p>- phthificis 311</p> <p>- in plethora 10. 11</p> <p>- in soporosis adfectibus 917</p> <p>- ad sudores promouendos 797</p> <p>commendatur a practicis in vomica pulmonum 318. 319</p> <p>in empyemate 323. 324</p> <p>ad vomitum cruentum præoccupandum suadetur 57</p> <p>item ad mictum cruentum 64. 66</p> <p>in febribus directe non conuenit 475</p> <p>- circa dies criticos instituta pessimi est euentus 475. 598</p> <p>incongrua in acutis anginam prouocat 258</p> <p>quando in malignis instituenda 587</p> <p>in febre catarrhali petechizante summe noxia est 598</p> <p>sub initium febris synochæ est instituenda 487. 488</p> <p>post vrinam coctam instituta graues hæmorrhagias inducit 488</p> <p>in febre ephemera superuacanea 483</p> <p style="text-align: right;"><i>Vena</i></p>
<p>Gggg ggg 2</p>	

INDEX.

<i>Vena sectio</i> in adfectibus biliosis non est instituenda	515	non habet locum	158
in intermittentibus typum in continuam mutat	666.	<i>Vena sectio</i> , eius ommissio	154
	673	matissimos caussatur	154
num in febris compositis instituenda sit, Medico relinquitur	677	num in fluore galbo sit instituenda	669
num in febre lenta proficit	566	in asthmate sicco quando instituenda	287.287
in paroxysmo instituta adfectum reuocat	50. 147. 415.	num in pleuritide & peripneumonia instituenda	535. 536
	441	in superioribus corporis partibus non conuenit in infarctu hepatis	355
particularis post vniuersalem commendatur in febris compositis	678	<i>Vena saluatella</i> secunda commendatur in scirrho lienis & splenitide	350. 550
item in angina	259. 262	<i>Veneficia</i> conuulsiones prouocant	451
in fronte vel sub lingua in angina & phrenitide quæ incommoda inuoluat	262.	<i>Venena</i> sanguinem inspissant, & morbos funestos inferunt	15
	525	cur destruant œconomiam vitalem, nulla suppeditat ratio	941
in spasms caute instituenda	103. 407. 408. 415	<i>Venenum</i> quid sit	959
in hydrope non probatur	720	<i>Venerica ulcerosa constitutio</i> , quæ cephalæam excitat, cum carie ossium coniuncta est	201. 202
in gonorrhœa non necessaria	776	<i>Venerica viscositates</i> podagram inducere valent	429
in infarctu lienis non æque necessaria	344. 350	<i>ulcerationes</i> quo modo ab hæmorrhoidalibus distinguendæ sint	79. 81
in otalgia debet esse præseruatoria	228		<i>Venerici</i>
in multis morbis præseruatoria vtilior quam curatoria	104. 374		
curatoria in rheumatismis			

I N D E X.

<i>Veneri adfectus</i> conspirant	non superant	933
cum brancho		251
<i>Veneris impuritatibus</i> adfecti	<i>Verbrechen</i>	1024
experiuntur vlcerationes	<i>Vermes</i>	852
circa orificium ani	e putredine oriri probabile	854
<i>Venus</i> grauidis est fugienda	est	854
	quos motus inducant	855
eius abusus apud senes mi-	caussantur conuulsiones	450.
ctum cruentum caussari		855
potest	: cardialgiam	825
	- interdum tympanitem	711
<i>Ventosarum adplicatio</i> in hæmor-	atrophiam inducunt	362
rhagiis narium non ad-	non raro palpitationem cor-	
probatur	dis fouent	291
<i>Ventriculus</i> in motibus hæ-	in variolis turbas solent con-	
morrhoidalibus simul ad-	citare	630
ficitur	necati, sed non statim ex-	
consensum habet cum capi-	pulti, passionem iliacam	
te	caussantur	849
eius fata dolenda sunt	infantum	1023.1029
- adrosio pro pthisi non	<i>Vermiculi dentium</i> num in odon-	
reputanda	talgia accusari possint	214
ab hypochondricis accusa-	<i>Veronica</i> specificè ad clysteres	
tur	commendatur	338. 383.
eius prægrauatio incubum		842
caussatur	vt traumaticum in vomica	
nephriticis nocet	pulmonum laudatur	317
- inflammatio a stupefa-	eius decoctum in raucedine	
ctis externis doloribus in	cum effectu adhibitum est	
motibus hæmorrhoidalibus		254
- - quo modo tractanda	<i>Verruca</i>	79
	<i>Verschlenkung</i> der Gedärme	
spastici rigores deglutitio-		848
nem impedièntes	<i>Vertigo</i>	8.36. 229
<i>Verbera & vincula</i> stultitiam	G g g g g g g 3	<i>Ver-</i>

I N D E X.

<i>Vertigo</i> ægris restituta familia- ris 231. 233	<i>Vesicatoria</i> neglecta congestio- nes & rheumatismos caus- santur 141. 154
caduca 230	<i>Vesica aqua calida repleta</i> ad su- dorem eliciendum com- mendantur 721. 798
- facile transit ibid.	quid in variolis efficiant 629
eius vera & nouiter detecta caussa 231. 232. 233	<i>Vesica strictura spastica</i> in stran- guria & calculo vehemen- ter læuiunt 392
sine caussis materialibus 234. 235. 237	<i>Vibices</i> in peste erumpentes 644
non statim apoplexiam pro- ducit 235	<i>Vigilia nimia</i> quo modo oppu- gnandæ 601
hypochondriacorum & hy- stericarum cur difficulter curetur ibid.	<i>Villanouanus</i> millefolii vsum per integrum mensem sua- det 87
methodus tardior in graui malo obseruari non pot- est 239	<i>Vinosa diata</i> hæmorrhagias na- rium restituit 40
a vomitu anxio 240	<i>Vinum:</i> eius abusus ad hæmor- rhagias narium ansam dat 34
<i>Vesicatoria</i> veteres commenda- bant in cephalæa 201	eius potus insolitus conge- stiones causatur 142
in asthma commendari so- lent 287	gravidis & puerperis conce- ditur 131. 138. 989. 1007.
prope flexuram cubiti com- mendatur in odontalgia 216	<i>generosum</i> laudatur in lipothy- mia 925
in otalgia caute sunt adhi- benda 228	- in dysenteria 640
in ophthalmiis incommodo non carent 209	rubellum subadstringentis efficaciæ in ictero com- mendatur 736
in obesibus exiguum emolu- mentum adferunt 13	<i>medicatum</i> laudatur in hæ- morrhagiis 28
in apoplexia ne vesiculam quidem excitant 905	<i>Vinum</i>
in catarrho suffocatio præ- sentem effectum exhibue- runt 913	

I N D E X.

<i>Vinum medicatum</i> laudatur in cephalalgia & cephalæa 188. 203	<i>Viscerum læsiones</i> maioris sunt considerationis quam hu- morum vitia 519
<i>calidum</i> cum melle laudatur in angina 261	<i>infarctus</i> ab hæmorrhoidibus suppressis 72
<i>aromatizatum</i> summas altera- tiones & fermentationem facit in primis viis 826	<i>Viscus inflammatum</i> quo nobili- vs, eo periculosior status 503
ad inflammationem discuti- endam laudatur 171	<i>Visus hebetudo</i> 207
in palpitatione cordis sua- detur 294	<i>amisso plenaria</i> 206
epilepticis non conducit 462	<i>Vita otiosa</i> ad morbos pluri- mum confert 20-22
<i>Virga aurea Gesneri</i> specificè commendatur in urinæ vi- tiis 804	<i>longa hæmorrhoidariis</i> pro- mittitur 72
- in mictu cruento 65	<i>Vitellus oui</i> commode clysteri- bus additur 844
- in vomica pulmonum 317	laudatur in diarrhœis 881
- ad resoluendum calculum 387	ex gallina mactata exfectus laudatur in fluxu mensium rebelli 110
<i>Virgo cœnobio inclusa</i> e furore vterino maniaca 936	<i>Vitium</i> primarum viarum ver- tiginis causa 229. 230- 235
<i>Vires amissa & omissa</i> inter se dif- ferunt 883	<i>Vitriolica</i> adstringentia externa in hæmorrhagiis reiciun- tur 38
earum prostratio ab hæmor- rhoidibus nimis 72	<i>Vitriolum</i> ex minera martis Haf- siaca in mictu cruento lau- datur 63
- decremента extrema in febris periculosa 471	eius caput mortuum lauda- tur in dysenteria 642
<i>Visceris</i> destructio reparari non potest 4	<i>album</i> laudatur in ophthalmia 208. 210
abdominalis labes in hæmor- rhoidibus nimis diiudi- canda 72	- - in coryza & grauedine 249

Ulcera

<i>Vlcera antiqua</i> consolidata vomitum cruentum caussantur	54	tur in cephalalgia	187.
<i>venerea</i> quo modo tractanda	787		188. 197
<i>ani fistulosa</i> sunt contagiosa	83	<i>de arthanita</i> externa vnctione laxat	856
<i>manantia</i> : eorum repulsio conuulsiones caussatur	451	<i>Comitissa</i> laudatur in ischuria	803
quo modo tractanda in cephalæa	203	- in mictu cruento nullum effectum habet	66
<i>Vlceratio vteri</i> interna a fluore albo differt	762	<i>infrigidans Galeni</i>	ibid.
in gonorrhœa per tres annos durare & tamen curari potest	777	<i>linaria</i> quid præstet in hæmorrhoidibus tumentibus	84. 83
febri catarrhali malignæ superueniens	596	<i>mercuriale</i> in scabie quo modo adhibendum	744
<i>Vlcerosa dispositio</i> in pulmonibus	296	- infantibus scabiosis tuto non adhibetur	ibid.
<i>Vlcerum</i> expurgatio & mundificatio Paracelsi	310	- facile nodos sub brachiis caussatur	746
<i>corruptio</i>	140	<i>Paracelsi</i> ad bubones resolvendos laudatur	793
<i>Vlcus</i> ab apostemate differt	297	ex floribus <i>verbasci</i>	867
<i>pulmonum</i> differt ab empyemate	320	<i>Vnguinosæ</i> obstruunt poros	277
<i>phthisicum</i> segnius est quam apostema	297	<i>externa</i> maxime nocent in inflammationibus	175
<i>Vmbilici</i> profunda retractio in hystericeis obseruatur	328	damnantur in rheumatismis	158
<i>hamorrhagia</i>	24	pinguia reiiciuntur in cephalalgia	188
<i>Vnguentum alabastrinum</i> laudatur	-	<i>rancida</i> damnantur in hæmorrhoidibus cæcis	87
		<i>Vnguis</i> vnde nascatur	206
		<i>Vnguium liuor</i> in febribus biliosis inflammationem & mortem indicat	512
			Vni-

I N D E X.

<i>Vnicornu</i> num sit alexipharmacum	586	<i>Vomitoria lenia</i> quando locum habeant	ibid.
<i>verum</i> motus hæmorrhoidales suppressit	102	iis non conducunt, qui semel vomitu cruento correpti fuerunt	59
<i>Volatilia</i> impetuose agunt in atrophia caute adhibenda	367	ad ruptionem apostematis non sunt adhibenda	265
<i>Volckammeri pulvis</i> in calculo antispasticam habet efficaciam	389	in asthmate spastico non conceduntur	442
<i>Voluulus</i>	848	in asthmate stomachali vsurpanda sunt	285
<i>Vomica pulmonum</i> quo modo differat a phthisi	297.	in febribus rarissime sunt vsurpanda	475
	313	num in malignis admittenda sint	583
ad febres vulnerarias referenda	319	in febribus intermittentibus num conducant	475.
phthisi superueniens febrem lentam in acutam transmutat	299		656
differat ab empyemate	313.	febrem quartanam continuam in acutam inducunt	684
	315	num in apoplexia locum habeant	904
rupta degenerat in vlcus	315	quando locum habeant in lithothymia	936
vnde eius reparatio faciliorsit	316	in vertigine non semper locum habent	238. 239
<i>Vomitoria</i> quem effectum exerant in corpore	475. 515	in catarrho suffocatiuo commendantur	910. 911
hypochondriacis, melancholicis, maniacis maxime nocent	826. 828. 834. 934.	exposcunt conuulsiones per philtrea inductæ	453. 454
	939	<i>Vomitus</i>	868
in ictero maiores effusiones bilis caussantur	734	<i>simplex, periodicus</i> , in tertianis & acutis critiche contingens, salutaris	870
in hæmorrhoidibus periculosa	101		

H h h h h h h

Vomitus

I N D E X.

<i>Vomitus</i> num per vomitum curandus sit	873	lat	53.55
interdum sponte euenit scorbuticis	759	nonnunquam scirrhum in feminis sol-	
<i>pertinax</i> quo modo sopiendus	871	vit	349
anxius vertiginem plerumque habet		sequitur hæmorrhoides suppressas	53.72
coniunctam	240	<i>Vomitus</i> cruentus ex malo hysterico	
<i>Vomendi conatus</i> in feminis vomitus cru-		proenit	53.331
enti metum adserunt	839	a causis violentis ortus deterioris	
in colica semper suspecti sunt	838	consecutionis est	55
quo modo tractandi	873	<i>Vacuus</i> maiorem metum eruptionis	
<i>Vomitus biliosus</i> in hepatide	539	sanguinis incurit quam repletis	332
<i>asarabasi</i> ad vomitum proclues sunt	249	<i>Urina</i> calida ad chylerem extempora-	
dysenterix interdum conducit	634.	neum commendatur	259.440
	636.639	nonnullis arcanum est in flasibus in-	
in febre tertiana salutaris	658.661.664	flammatoriis	174
nonnunquam in febre ephemera ori-		hæmorrhoidariorum & arthritico	
tur	480	rheumaticorum granula, sabuli in-	
in febre continua obueniens non re-		flar, deponit	377.400
præmendus	494	- a sabulo calculosorum discernen-	
maturus & copiosus in febribus bilio-		dum	400
sis optima terminationis signum	510.511	phthisicorum varia est	299
<i>Vomitus</i> intempestius in febribus sym-		nephritidis simplicis arthriticorum	
ptoma periculosum	471	similis est	369
<i>gravidarum</i> raro per totam gestatio-		nephriticorum cum filamentis muc-	
nis periodum durat	977.978	dis procedit	370
- rarissime abortum causatur	988	hypochondriacorum limpida	327
- quo modo tractandus	872.978	impregnatarum atomos exhibet	
<i>infantum</i>	1020	aurantii coloris hecticam indicat	972-973
<i>Vomitus niger</i> vnde oriatur	55		344.351-357
in acutis signum lethale est	542.	<i>Urina</i> crassa & rubicunda in hydropse he-	
	870	cticæ complicatæ signum est	714
in febribus inflammatoriis prælagium		eius excretio in hæmorrhoidibus ex-	
mortis	542	ternis sæpe turbatur	80
<i>Vomitus</i> versus dies criticos splenitidem		- - larga in morbis quibusdam	
soluere dicitur	549	criticæ eueniens non est confundenda	
paraphreniticis euenit	527	cum diabete	809
<i>Vomitus cruentus</i>	52	eius emissio hysteriarum cum sensi-	
quo modo differat ab hæmoptysi	43	bilissimis doloribus	329
cur tam periculosus	55	cruda vel cocta cum surditate in acu-	
- <i>periodicus</i>	52.55	tis quid portendat	223
in iunioribus puellis facile repullu-		in febre diaria primo die cocta adpa-	
		ret	480
			<i>Urina</i>

INDEX.

<i>Urina eius frequens stimulus in grauidis</i>	980
nigra in casu lethifera est	§ 12
eius mutatio in omni febre requiritur	470
in malignis & epidemicis non multum alteratur	§ 87
purulenta renum vel vesicæ læsionem accusat	325
falsedo eius in mictu cruento	61
suppressio eius temporaria in grauidis	981
sana, pulsus sanus, æger moritur	470. 644
eius vitia cum podagra coniuncta sunt	432
in calculo concurrunt	379
leporis vulgus vitur in surditate	228
<i>Urtica minor</i> : eius succus specificè laudatur in hæmorrhagiis narium & hæmoptysi	38. 48
<i>Urtica vrens</i> specificè laudatur in asthma	287
mortua in fluore albo	768
<i>Vteri cancrosa adrosio</i> ex lue venerea	783
coagula, concrementa, ulceratio a lochiis suppressis	135
- quo remedio præoccupari possint	977
expurgatio quando necessaria	128. 130
vitio remoto femina interdum denuo concipere possunt	109
consensus cum hypochondriis & primis viis	111. 116
inflammatio quomodo tractanda	551
prolapsus in parturientibus	998
localis translatio nulla est in malo hysterico	330
<i>Vterina</i> in hysteriis exfulare debent	338
nocent in lochiis plane suppressis	137
<i>Utricularis hydrops</i>	707
<i>Uuule evasio</i>	783

W.

W asser Incipen	995
ist gesprungen	991
<i>Wedelius</i> : eius arcanum duplicatum catholicum in peste	650
rad. scrophul. & fabar. specificè laudat in hæmorrhoidibus tumentibus	48
W ehen, welche sich in die Höhe ziehen, und in den Kopf steigen	992
<i>Weisbachius</i> commendat folia sambuci & sedum vermiculare in hæmorrhoidibus dolentibus	88
eius collyrium	211
- encheiresis de balsamicis immediate pulmonibus adplicandis	307
W iebel-Sucht	608. 1004
W iesen-Bad	748
<i>Wildegansii pilula</i> motus febriles infringunt, & sudorem excitant	663
<i>Willisii</i> hirudinum adplicationem venæ iugulari commendat in epilepsia infantum	462
W ind-und Wasser-Pocken	618
W urm-Stöcke	854
W ürgen	873

Z.

Z acken	79. 981
<i>Zibethi</i> odorem hysterice auerfantur	330
Z iehe-Glas	1014
<i>Zingiber</i> corrigit materiam & incidit serosam visciditatem	719
vt stomachicum laudatur	238
phlegmaticis commendatur in cibis	249
<i>Zyringeri causticam</i>	172
<i>Zwölfferi</i> crocus martis aperitiuus vt mitius adstringens in mictu cruento laudatur	64
Hhhh hhh z	CORRI-

CORRIGENDA.

Pag. 6. lín. 4. leg. exstimulant. ibid. l. 5. l. analeptica. p. 10. l. 32. l. tractanda. p. 19. l. 3. l. in ibid. l. 4. l. uti p. 20. l. 10. l. salina. p. 37. l. 6. l. adplicatio. ibid. l. 28. l. sanguinis. p. 54. l. ult. tota deletur. p. 58. l. 30. l. topica. p. 62. l. 4. l. sanguinei p. 73. l. 27. l. poplitis. p. 79. l. 11. l. ficus. p. 106. l. 19. l. relinquent. p. 107. l. 18. l. ordinati. p. 111. l. 34. l. genitalibus. p. 127. l. 31. l. potius. p. 143. l. 26. l. oriuntur. p. 162. l. ult. l. augmentum. p. 189. l. 18. post tam l. in. ibid. l. 19. l. quam. ibid. l. 35. l. comas. p. 241. l. 18. l. somnolenti. p. 384. l. ult. tota deletur. p. 388. l. 14. l. effecturæ. p. 389. l. 1. l. commendantur. p. 397. l. 25. l. medio. p. 423. l. 14. l. extenuatio. p. 426. l. 19. l. exoritur. p. 431. l. 25. l. siue p. 435. l. 29. l. exagitantur. p. 460. l. 23. l. cranii. p. 567. l. 24. l. cholericò. p. 468. l. 5. l. rationali. p. 469. l. 24. l. impedito. ibid. l. 26. l. febre. p. 480. l. 19. deletur non. ibid. l. 32. l. in solitis. p. 484. l. 8. l. imminere. p. 487. l. 3. l. facilis. p. 509. l. 20. l. ventriculo. p. 528. l. ult. add. interpositis potionibus diapnoicis, itemque emulsionibus ex nucleis pinguibus paratis. p. 530. l. 7. l. naturalem. ibid. l. 25. l. vera. p. 531. l. 3. l. illæ. p. 534. l. 22. l. vitilicatis. p. 535. l. 18. l. camphoratus. p. 542. l. 14. l. res. p. 543. l. 35. l. emulsiones. p. 546. l. 22. l. substantia. ibid. l. 35. l. conuenit. p. 547. l. 8. l. composita. ibid. l. 9. l. conueniunt. p. 556. l. 8. l. antimon. p. 568. l. 1. l. manifeste. Ibid. l. 23. adde signa cadant in subiecta, quæ sensibilia sunt ab aurâ. p. 585. l. 4. l. hæc. p. 587. l. 9. deletur in. p. 589. l. 25. l. discernenda. ibid. l. 33. l. crasso. p. 598. l. 12. l. anginodis. p. 599. l. 13. l. damno. p. 614. l. 25. l. recessionem. p. 618. l. 17. l. distinctæ. ibid. l. 18. l. & confluentes. p. 619. l. 11. l. tolerabilis. p. 621. l. 4. l. de reliquo. p. 622. l. 11. l. suppuratoria. p. 623. l. 27. l. suppurationis. p. 625. l. 24. l. medicamentis. p. 634. l. 33. l. conuersa. p. 636. l. 25. l. liquidum. p. 637. l. 22. l. conuulsionibus. p. 639. l. 5. l. quater per diem. p. 244. l. 24. l. potissimum. p. 650. l. 35. l. legi. p. 656. l. 32. l. specimina. p. 666. l. 25. l. fluuiatilem. p. 668. l. 6. l. Sydenhamo. p. 674. l. 11. l. duabus. p. 680. l. 20. l. ratione. p. 684. l. 35. l. vsurpet. p. 687. l. 18. l. auctius. p. 689. l. 10. l. adiucimus. p. 690. l. 17. l. feminis. p. 691. l. 30. l. rubore. p. 692. l. 29. l. originem. ibid. l. 35. l. oedematosi, si. p. 693. l. 28. l. fassafras. ibid. l. 29. l. tartarifata. p. 695. l. 12. l. delitescat. p. 704. l. 4. l. instituat. p. 713. l. 21. l. particularum. p. 717. l. 9. l. præcipue. p. 718. l. 30. l. sulphurea. p. 720. l. 26. l. coagulatum. p. 722. l. 7. l. minoribus. p. 724. l. 15. l. probe. p. 727. l. 24. l. colore. p. 728. l. 31. l. colore. ibid. l. 36. l. scrobiculum. p. 731. l. 16. l. remedia. p. 734. l. 33. l. colorem. p. 742. l. 28. l. amalgama. ibid. l. 33. l. oxylopath. p. 749. l. 18. l. scorbuto. p. 754. l. 12. l. coagulationem. p. 755. l. 15. l. rubentes. ib. l. 21. l. catarrhalia. ib. l. ult. l. antiscorbutica. p. 757. l. 28. l. lubricantia. p. 758. l. 1. l. volatilia. ib. 26. l. falso. p. 759. l. 26. l. palpitationes, ib. l. 28. l. licet. p. 761. l. 34. l. stomachace. p. 766. l. 13. l. remedia. p. 780. l. 12. l. remedia. p. 783. l. 17. l. instar. p. 789. l. 27. l. accensò. ibid. l. 36. l. omnia. p. 795. l. 20. l. inducunt. p. 802. l. 26. l. Syrup. p. 803. l. 25. l. absumatur. p. 808. l. 28. l. exsiccatus. p. 857. l. 35. l. hinc. p. 875. l. 11. l. paululum. p. 886. l. 16. l. deficiente. p. 890. l. 8. l. reliquii. ibid. l. 34. l. materiales. p. 892. l. 20. l. paralyseos. p. 900. l. 1. l. sentiarum. ibid. l. 15. l. Stupido-grauatiua : p. 905. l. vitrioli. p. 923. l. 5. l. somno. p. 942. l. 29. 30. l. pili vulnere illigati efficaces. p. 945. l. 35. l. explicandum. p. 074. l. 30. l. venæ sectione. p. 981. l. 8. l. inflationes. p. 989. l. 11. l. diuretica. ibid. l. 26. l. plethoricam. p. 995. l. ult. l. exposcunt.

