

# **STUDIUL DISMETABOLISMULUI LIPIDIC ȘI GLUCIDIC ÎN ARTERIOPATIILE CRONICE OBLITERANTE ALE MEMBRELOR**

*Piroska György, Z. Brassai, Emese Györi, Gina Suciu, Corina Ureche, A. Puskás,  
C. Duda*

**Clinica Medicală nr.1  
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș**

**Autorii au urmărit incidența și prevalența hiperlipoproteinemiei și  
frecvența diabetului zaharat latent și manifest pe o cazistică largă de arteriopatii**

obliterante periferice 922 cazuri, la care diagnosticul clinic a fost confirmat prin explorare serioangiografică.

Din totalul bolnavilor (ateroscleroză obliterantă: 593; trombangită obliterantă: 208; arteriopatii obliterante mixte: 78; arteriopatie diabetică: 98; arteriospasm de diferite origini: 23 cazuri) lipidograma a fost patologică în 59,5% și s-a dovedit normală la 40,5%.

Tipurile cele mai frecvente de dislipidemie au fost: IIA-23,0%, IIB-19,4% și IV-16,3%. Defalcăt pe grupe de afecțiuni: în ateroscleroza obliterantă, lipidograma a fost patologică la 62,7%, cu tipurile dominante IIA-24,6%, IIB-21,0% și IV-16,5%. În trombangita obliterantă, incidența hiperlipoproteinemiei a fost de 44,2% cu predominanța tipului IIA-24,5%, urmată de tipul IV-12,5% și IIB-6,7%. În arteriopatiile obliterante mixte, lipidograma a fost patologică la 61,6%, dominând tipurile IIA-23%, apoi IIB-20% și IV-18%. În arteriopatia obliterantă diabetică am constatat hiperlipoproteinemie la 75,5%, cu predominanța tipurilor caracterizate prin creșterea prebetalipoproteinelor: IIB-36,7%, IV-26,6%. La bolnavii cu arteriopatie funcțională, hiperlipoproteinemie s-a evidențiat la 39,3% cu subtipurile IIA-17,4% și IIB-17,4%.

Din totalitatea cazurilor 10,8% prezentau diabet manifest și 25,2% prezentau diabet zaharat biochimic.

Din acestea decurg indicațiile terapeutice și necesitatea depistării active a diabetului zaharat.

---