

ROLUL ENDOSCOPIEI DIGESTIVE SUPERIOARE ÎN DEPISTAREA ȘI MONITORIZAREA LEZIUNILOR PRECANCEROASE GASTRICE

Simona Bătaș, Ligia Bancu, C.Dudea, G.Oltean, Ana Bratu, Ilona Csidez, Corina Ureche

Clinica Medicală nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În prezent se acordă o importanță mare în gastroenterologie depistării cancerului incipient și a leziunilor precanceroase gastrice pe cale endoscopică.

Studiul are la bază endoscoopiile efectuate în Clinica Medicală nr. 1 între anii 1988-1992 la un număr de 4332 de bolnavi. La 10,4% s-au depistat leziuni precanceroase, respectiv 66 de cazuri de gastrită atrofică (14,5%), 59 cazuri de polipi gastrici (13%), 57 de cazuri de metaplazie intestinală a mucoasei gastrice, apoi hiperplazie, displazie, polipoză gastrică, gastrită hipertrofică. În studiu am luat în considerare și 210 cazuri de ulcer gastric biopsiate, dintre care 41,72% au prezentat modificări ale mucoasei gastrice. Cazurile de stomac operat, în număr de 66, au prezentat modificări macroscopice și histologice în proporție de 63,64%. De remarcat ponderea netă a leziunilor precanceroase la sexul masculin între 51-70 de ani având cea mai mare incidență și amplificarea anuală a cazurilor.

La concluzie incidența crescută a leziunilor precanceroase impune monitorizarea endoscopică gastrică anuală la cei afectați, pentru a surprinde transformările maligne posibile.
