

## REZULTATELE CLINICII DE ORTOPEDIE ÎN TRATAMENTUL FRACTURILOR DIAFIZARE DE GAMBĂ

C. Ciugudean\*, L. Seres-Sturm\*\*, Ö. Nagy\*, M. Stoica\*, A. Bălinț\*,  
T. Băjaga\*, S. Pop\*

\*Clinica de Ortopedie și Traumatologie. \*\*Disciplina de anatomie  
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În lucrarea pe care o prezentăm ne-am propus o evaluare a rezultatelor tratamentului conservator în comparație cu cel sângerând sub aspectul timpului de spitalizare - vindecare și al complicațiilor, deoarece dispunem de puține statistici comparative pentru adoptarea unei conduite juste de tratament.

În ultimii zece ani au fost tratate 252 fracturi din care 37 (14,7%) au fost numai de tibia, iar 215 (85,2%) ale ambelor oase ale gambei; 169 (67,8%) din traumatizați au fost bărbați iar 83 (32,2%) femei.

Din cele 252 fracturi de gambă, 224 (88,8%) au fost tratate conservator și numai 28 (11,2%) chirurgical. Timpul mediu de spitalizare a fost cu 14 zile mai scurt la operați, însă timpul de recuperare al acestora, a fost cu 82 de zile mai lung decât la cei tratați conservator.

Frecvența pseudoartrozelor a fost de 14% la operați, față de 3,3% la cei tratați ortopedic.

În cazul fracturilor deschise, intervenția operatorie s-a limitat la transformarea acestora în fracturi închise, aplicându-se în continuare tratament conservator, iar în 7 cazuri s-a recurs la fixator extern.

Din cele arătate se poate trage concluzia că metodele conservative și cele chirurgicale minime fără abordarea focarului de fractură dau rezultate superioare tratamentului chirurgical și necesită o perioadă mult mai scurtă de vindecare și regenerare.