

REZULTATELE TARDIVE ALE ARTROPLASTILOR DE ȘOLD CU ENDOPROTEZE LA BOLNAVI CU COXARTROZĂ SECUN- DARĂ LA CARE ÎN PREALABIL S-AU EFECTUAT OSTEOTOMII

C. A. Bálint, C. Ciugudean, Ö. Nagy, Ileana Slavici-László, T. Bătaș

Clinica de Ortopedie și Traumatologie
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Coxartrozele secundare, pentru care s-au efectuat osteotomii inter- și subtrohanteriene de "flexie" sau de medializare, ridică probleme datorită angulației și devierii de ax femurale. Acest lucru face artroplastia cu endoproteză dificilă, iar

rezultatele tardive sunt nesatisfăcătoare datorită încălcării nejudicioase a componentelor, în contextul deficitului de arhitectură. Din acest motiv am ajuns la concluzia că osteotomia trebuie reluată artroplastiei, devenind timpul doi al intervenției, compactând și tranșa de osteotomie. Componenta femurală, special concepută de colectiv, este necimentată, iar compactarea se realizează prin filetare. Am practicat osteotomii-artroplastice la un număr de 9 bolnavi. 6 dintre ei revin la control la 1 an, respectiv 2 ani.

Considerând rezultatele în cadrul unui "scor" în care urmărim absența durerii, mobilitatea șoldului, mersul cu sau fără sprijin, vindecarea tranșei de osteotomie, cu calificative între foarte bine și nesatisfăcător, din cazuistică 8 cazuri se încadrează cu foarte bine și unul cu bine. Nu am avut complicații postoperatorii. Efectuându-se un număr mare de osteotomii de flexie și medializare în țară în ultimii 5 ani, numărul coxartrozelor secundare fiind în creștere, considerăm că metoda are o indicație care se va lărgi în viitor.
