

SURSE DE EROARE ÎN RINOPLASTIE

C. Drăgoveanu, Gh. Mălfay, S. Sabău, Nicuța Măgureanu

Clinica O.R.L.

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș

Dezvoltarea în ultimele două decenii a intervențiilor în scop estetic la nivelul piramidei nazale a marcat pe lângă bine cunoscutele succese și multiple eșecuri, fapt recunoscut de către toate centrele în care se practică aceste intervenții.

În principal eșecurile chirurgiei corectoare nazale interesează zona marginii anterioare osteo-cartilaginoase a piramidei și cea a vârfului nasului. Se analizează în această ordine de idei: depresiunea supraapicală osoasă, creasta nazală largă sau cea îngustă pensată, depresiuni și asimetrii ale vârfului nasului etc. Fiecare dintre aceste modificări, nedorite de către bolnav și de operator sunt consecința dificultăților de evaluare cât mai precisă atât a volumului exciziilor cât și a nivelului la care se practică unele incizii. Principiile generale operatorii ale rinoplastiei vor fi adaptate la particularitățile fiecărui caz.

Necesitatea remodelării mai precis a readaptării septului nazal la noua piramidă nazală favorizează postoperator nu numai un tranzit aerian normal ci în plus și o corectă poziționare a voletelor osteo-cartilaginoase nazale.
