

GRADINGUL HIPERPLAZIILOR EPITELIALE MAMARE CA INDICATOR AL FACTORILOR DE RISC PREDICTIV ÎN APARIȚIA ȘI/SAU DEZVOLTAREA CANCERULUI

Marina Bârsu

Laboratorul de anatomie patologică
Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiriacu" Cluj-Napoca

Foarte multe lucrări din literatura de specialitate (*Page și colab. 1990, 1991, Rajdu și colab. 1990, Rosai 1991, Shousha 1992*) sugerează existența unei continuități lezionale între hiperplaziile epiteliale mamare și carcinomul in situ și arată faptul că riscul de dezvoltare a carcinomului invaziv se corelează cu gradul de proliferare și atipie a hiperplaziilor.

Plecând de la aceste considerente autorul face un paralelism între diferitele

criterii de evaluare morfologică a hiperplaziilor epiteliale cu și fără atipii și ale cancerului mamar in situ.

Sunt prezentate avantajele și dezavantajele unui grading larg al leziunilor atipice și corelarea acestuia cu prezența focarelor de carcinom mamar în cazuistica I.O.C.N.

Se insistă asupra faptului că gradingul hiperplaziilor atipice în clase multiple, deși deosebit de riguros, este mai dificil de făcut și determină diferențe mari în apreciere de la autor la autor.
