

STUDIU ASUPRA UNOR AFECȚIUNI ALERGICE PROFESIONALE: ASTM BRONȘIC PROFESIONAL ȘI BRONȘITA CRONICĂ SPASTICĂ

stud. Ioana Jecan

Disciplină de specialitate

Universitatea de Medicină și Farmacie "Tilghe-Marcu"

Lucrarea de față se constituie ca un studiu asupra incidenței unor afecțiuni alergice profesionale: astmul bronșic profesional și bronșita cronică spastică, la muncitori internați în Clinica de Boli Profesionale.

Astmul bronșic profesional are același mecanism imunologic ca și celelalte forme de astm extrinsec, dar deține specificitate imunologică, fiind declanșat de contactul cu alergenii de la locul de muncă.

În vederea evidențierii cazuisticii de afecțiuni alergice profesionale, am lucrat la Clinica de Boli Profesionale din Târgu-Mureș, unde am studiat foile de observație ale bolnavilor internați în anul 1990. Din datele statistice, am tras următoarele concluzii:

- predominanța bolnavilor cu astm bronșic față de cei cu bronșită cronică spastică;
 - afectarea mai frecventă a sexului feminin;
 - frecvența mai mare a astmului bronșic la grupa de vârstă : 40-50 ani, vârstă corelată cu vechimea în muncă a persoanelor studiate;
 - agentul etiologic cel mai frecvent incriminat este praful vegetal-făina, urmat de pulberile minerale, pulberi silicogene, fibre textile și mase plastice;
 - simptomatologia este dominată de: tuse, dispneea paroxistică și de efort;
 - se evidențiază astmul bronșic la persoanele expuse profesional cu alte afecțiuni datorate dezechilibrului neurovegetativ;
 - vechimea simptomelor acuzate de bolnavi este relativ mică (sub cinci ani);
 - antecedentele heredocolaterale nu indică apariția fenomenelor spastice bronhopulmonare mai frecvent la persoanele din familii cu afecțiuni respiratorii;
 - rolul fumatului ca factor agravant în evoluția astmului bronșic profesional.
-