

PATOLOGIE CHIRURGICALĂ

MEGADUODEN-REZOLVARE CHIRURGICALĂ ORIGINALĂ

E.V.Bancu, T.Bara, S.Bancu

Clinica de Chirurgie nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

Megaduodenul este o boală congenitală gravă, cauzatoare de disfuncții digestive severe, ce se manifestă încă din anii copilăriei. În lipsa tratamentului, bolnavii ajung rar la vârstă adultă. Chirurgical, se pune problema delicată a reintegrării funcționale a duodenului în tubul digestiv superior.

Bolnava M.C. de 17 ani s-a internat la clinica noastră la data de 22.11.1989, cu diagnosticul de megaduoden gigant, prezentând grețuri și vărsături postprandiale, cefalei, vertij și adinamie, slăbire pronunțată în greutate. Diagnosticul a fost stabilit pe baza examenului baritat, care a relevat o dilatare enormă a duodenului în porțiunile D1-D2-D3, transformate, practic, într-o cavitate unică, cu un calibru variind între 8 și 21 centimetri, din care bariul nu s-a evacuat complet nici după 24 de ore. Examinările de laborator au indicat anemie, deficit hidtoionic și proteic.

Operația s-a efectuat la 29.11.1989. După rezecție gastrică 2/3, s-a introdus degetul în duoden și s-a efectuat o recalibrare tubulară prin plicatură a organului, cu suturi întrerupte. Prima ansă jejunală s-a interpus în "omega" între bontul gastric și cel duodenal, realizându-se un montaj în tripla anastomoză: gastrojejunală T-L, duodeno-jejunală T-L, și jejun-jejunală la piciorul ansei (Braun). Rezultat funcțional postoperator foarte bun.

Controalele efectuate la un an și la doi ani arată o evoluție fizică și funcțională foarte bună.
