

PANCREATITA ACUTĂ. TRATAMENT CHIRURGICAL. REZULTATE POSTOPERATORII IMEDIATE

M.Eșianu, C.Copotou, T.Grozescu, M.Baghiu, V.Bud, T.Bara, D.Zamfir, F.Coroș,
D.Marian, D.Florea, D.Száva, A.Lobonțiu

Clinica de Chirurgie nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Lucrarea de față prezintă un studiu retrospectiv a 620 de bolnavi cu pancreatită acută (PA) internați și tratați în clinica noastră în intervalul 1970-1991. S-au luat în considerare cazurile de P.A. care au beneficiat de intervenții chirurgicale, respectiv 341 bolnavi. Limitele de vârstă la bolnavii studiați au fost între 19 și 85 de ani, cu incidență maximă în decadele 4 și 5. Definirea factorilor etiologici implicați în patogeneza P.A. este importantă pentru că permite o terapie specifică. La bărbați a predominat ca etiologie alcoolul și factorul biliar care împreună au reprezentat 67,69% din cauzele evidențiable clinic sau anamnestice ale declanșării P.A. Durerea a fost practic prezentă în toate cazurile, cu debut brusc și violent în 80% din cazuri iar iradierile "în bară" în 60% din cazuri. Simptomele au fost variabile în perioada de la debut la internare în funcție de forma de P.A. Greșurile și vărsăturile, meteorismul, apăsarea musculară, febra, hiperglicemia au fost întâlnite des. Creșterea amilazelor a dus la stabilirea diagnosticului în 72% din cazuri. Starea generală la internare și evoluția ulterioară a bolnavilor au impus intervenția chirurgicală în 341 de cazuri. Tratamente chirurgicale radicale pentru PANH la 33 bolnavi au fost următoarele: pancreatectomie 90-95%=6; splenopancreatectomie 90-95%=11; splenopancreatectomie corporeo-caudală=4; duodenopancreatectomie cefalică=1; necrectomie pancreatico-peripancreatică=10. Șase din cele 8 decese înregistrate au survenit în primele 48 ore în condițiile stării generale de șoc ale bolnavilor care nu au putut fi recuperați, 2 bolnavi au decedat cu complicații septice postoperator. Din cei 25 de supraviețuitori 4 au prezentat complicații postoperatorii, necesitând reintervenții pentru evacuarea unor colecții purulente. Diabetul postoperator s-a manifestat la 12 bolnavi, 11 rămânând insulino-dependenți.