

APLICAREA ÎN URGENȚĂ A SEROMIOTOMIEI ANTERIOARE CU VAGOTOMIE TRONCULARĂ POSTERIOARĂ (OPERAȚIA SECUNDARĂ TAYLOR) ÎN TRATAMENTUL ULCERULUI DUODENAL COMPLICAT

T. Bara, E. V. Bancu, C. Copotoiu, D. Száva, C. Molnar

Clinica de Chirurgie nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie "Târziu-Mareș"

Operația a fost introdusă pentru prima oară de Taylor ca o variantă a vagotomiei proximale selective. În clinica noastră, începând din anul 1992, metoda a fost introdusă pentru tratamentul ulcerelor perforate sau hemoragice.

Metoda constă în vagotomia tronculară posterioară, cu seromiotomie anterioară, care se efectuează pe peretele anterior al stomacului, de la limita superioară a antrului până la joncțiunea esogastrică și sutura sau excizia și sutura ulcerului. Operația are scopul denervării celulelor parietale și păstrarea inervației antrului.

Pe o perioadă de 1 an metoda s-a aplicat pe un lot de 10 bolnavi cu rezultate bune, fără complicații postoperatorii imediate. La 6 săptămâni postoperator cei 10 bolnavi nu au prezentat tulburări funcționale, controlul endoscopic a evidențiat ulcere vindecate, controlul prin pasaj baritat nu evidențiază tulburări de evacuare, iar testele secretorii evidențiază anaciditate sau hipoaciditate.

Față de vagotomia proximală selectivă, de rezecția gastrică, de vagotomia tronculară bilaterală cu antrectomie, operația secundară Taylor este mai simplă, cu durată mai scurtă, cu complicații și mortalitate postoperatorie minimă.