

HEPATOSCINTIGRAFIA ÎN CIROZE

G. Stanciu

Clinica de Radiologie
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Este metoda de investigație de mare utilitate mai ales în ciroze, prin perfuzarea sistemului reticuloendotelial și celulelor Kupffer de radionuclidul ^{99m}Tc Au obținându-se relații morfologice și funcționale, putându-se astfel confrunta, sau să completeze celelalte date de laborator.

Importanța metodei constă și în faptul că se poate urmări în timp, prin repetarea ei, gradul de refacere sau de lezare a parenchimului hepatic.

Am avut cazuri chiar cu ascită dar cu suficient parenchim hepatic activ, perfuzarea fiind accentuată și în splină. Deci prin aspectul scintigrafic hepatic se poate

stabilii în ce măsură parenchimul dintr-o ciroză poate compensa funcțiile. hepatomegalia și splenomegalia ca reacții din stadiul I și II, printr-un tratament adecvat, se pot menține timp îndelungat ca neevolutive.

Hepatiile cronice, relativ frecvente, de asemenea beneficiază de această investigație, relațiile fiind morfofuncționale, iar dacă tot izotopul radioactiv cu tropism pentru parenchimul hepatic nu traversează decât limitat în splină/normal este de 7% avem un indicator favorabil.

Iradieră fiind un element gamma de penetrație medie, nu poate fi nocivă pentru bolnav, repetarea se poate face de câte ori se consideră că este necesar.

Probele hepatice, ecografia, puncția bioptică etc. sunt completate sau confirmate de hepatoscintigrafie, opinia noastră fiind că nu pot s-o substituie.

Numărul de investigații, în medie a fost de 244 anual.
