

OBSERVAȚII PRIVIND PATOLOGIA CUTANATĂ LA SUGARI, COPII ȘI ADOLESCENȚI

L. Năzăr, Ana-Maria Palkó

Clinica de Dermatovenerologie
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Dermatologia modernă corelațională consideră tegumentul cu toate manifestările sale ca fiind în strânsă dependență cu celelalte organe și cu mediul nostru înconjurător. Modificările pe care le suferă după naștere biologia copilului, de la an la an, explică în parte prezența exclusivă sau cu preponderență a unor afecțiuni cutanate, caracteristice pentru fiecare etapă. În cadrul consultațiilor de specialitate în perioada 1986-1990 (total consultații: 56.099) un număr de 5878 (10,47%) au fost sugari și tineri până la vârsta de 16 ani. Genodermatozele depistate (111 cazuri), reprezintă 1,88%. Piodermitele au reprezentat în primul rând de streptococi 4,23% și stafilodermii 3,47%, totalizând 7,70% din totalul consultațiilor. Un număr important de cazuri au provenit din categoria bolilor cauzate de elementele criptogamice (10,56%), iar prezența scabiei a fost semnalată în 14,69%. În 2,10% s-a pus în evidență pediculoză. Virozele cutanate sunt o prezență destul de frecventă în patologia cutanată infantilă. Virozele hiperplazice (veruci vulgare, plantare, plane juvenile, vegetații venenene) reprezintă 10,57% din cei consultați, urmează infecția herpetică cu 1,61%, Molluscum contagiosum cu 0,56% și zona zoster au fost mai frecvente la sexul feminin. Frecvența neobișnuită a zonei zoster la copii la vârsta de 4-8 ani, ridică o serie de aspecte patogenetice și de tratament. Algodermiile reprezintă prin numărul total de 2056 cazuri (35,48%), cele mai frecvente dermatoze fiind eczemele atopice și de contact, urticaria, prurigourile și eczematidele. În perioada la care se fac referiri, au fost luate în evidență 60 de cazuri de psoriazis, mai frecvent fiind întâlnit la băieți și debutând la o vârstă mult mai fragedă (3-4 ani), în comparație cu fetele (7-8 ani).
