

CAUZELE ICTERULUI OBSTRUCTIV ÎNTR-UN LOT DE 200 BOLNAVI ICTERICI

A. Bratu, Ligia Bancu, Simona Bătaș, Imola Török, C. Dudea

Clinica Medicală nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Pe un număr de 200 de bolnavi icterici examinați în perioada mai 1989 oct. 1992, am analizat cauzele obstructive determinante ale acestui simptom

Datele bolnavilor au fost înregistrate după un set stabilit de societatea europeană de studiu al icterului, Euricterus și comparate cu întreaga sa bază de date.

Bolnavii cu icter au provenit din clinicile chirurgicale (40%), clinicile medicale (48%) și din ambulator (12%). Datorită provenienței bolnavilor în cazuistica noastră icterul s-a datorat unor afecțiuni chirurgicale 43,02% și hepatitei virale 3%.

La bolnavii cu icter obstructiv s-a constatat că:

- 14,11% prezentau carcinom biliar sau pancreatic primar
- 24,45% boală litiazică
- 6,75 pancreatită acută și cronică
- 2,45 stricturi benigne ale căii biliare principale
- 6,13 alte cauze

Concluzii: boala litiazică reprezintă cauza chirurgicală cea mai frecventă a icterului obstructiv atât în cazuistica noastră, cât și în baza de date a Euricterus. Procentajul ceva mai mare din cazuistica noastră (24,45%) față de 16% în studiul general se explică prin proveniența bolnavilor.

O concluzie reală poate fi exprimată numai după prelucrarea cazisticii oferită de cât mai multe centre medicale.
