

SIMPTOMELE CU PUTERE DISCRIMINATORIE ȘI CELE CU IMPORTANȚĂ DIAGNOSTICĂ ÎN ICTERUL ACUT MEDICAMENTOS. REZULTANTA STATISTICĂ

*Ana Bratu, Imola Török, Smaranda Demian, Ligia Bancu, Simona Bățașu,
C. Duda*

**Clinica Medicală nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș**

Definiția icterului acut medicamentos acceptată de proiectul european al icterului este: "un istoric de expunere la un agent cunoscut sau suspectat a fi hepatotoxic a cărui îndepărtare duce la dispariția icterului. Dacă este posibilă obținerea unei biopsii hepatice, criteriile morfologice cuprind un spectru de modificări de la necroza acută, la steatoză, inflamații și leziuni celulare".

În studiul nostru, care cuprinde 200 de bolnavi icterici, am găsit un număr de 3 bolnavi care s-au încadrat în criteriile de mai sus. Drogurile înscrise au fost FELDEN (Piroxicam), RIFAMPICIN, PARACETAMOL.

Din analiza statistică a cazurilor noastre mixate cu 9014 cazuri din baza de date a Euricterus, aflăm că icterul acut medicamentos prezintă următoarele simptome cu putere discriminatorie: consum de hepatotoxice, caracterul descrescent al icterului, prurit prezent de 1-7 zile, aversiune la fumat, nu găsim consum de alcool. Următoarele simptome au importanță diagnostică: prezența de substanțe hepatotoxice, icterul cu caracter descrescând, prurit de 1-7 zile, aversiune la fumat, fără consum de alcool.

Statistic, reiese de asemenea că diagnosticul final în cazul icterului acut medicamentos rămâne doar o suspiciune, un diagnostic cu certitudine fiind imposibil de stabilit.
