

LOCUL REZECȚIEI TRANSURETRALE ÎN CANCERUL DE PROSTATĂ

D. Nicolescu, V. Ojan, I. Bător, M. Imbădrus, I. Negruș

**Clinica de Urologie
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș**

Opiniile din literatura de specialitate asupra oportunității rezecției transuretrale a cancerului de prostată (CC.Prostată) nu sunt unanime.

Lucrarea este o analiză retrospectivă a cazisticii autorilor, care însumează un număr de 320 CC.P. operate transuretral. Pe baza studiului efectuat, se relevă caracterul paliativ al acestei intervenții. Indicația sa majoră este dezobstrucția cervicoprostatică în vederea reluării spontane sau ameliorării actului micțional; subsidiar operația poate avea și un scop hemostatic, în cancerele sângerânde prin invadare uretrovezicală.

Deși dezobstrucția transuretrală a CC.P. este din punct de vedere tehnic asemănătoare cu TURP pentru adenom, ea prezintă față de aceasta următoarele particularități:

1. Pericol crescut de: a) perforație (prin dezvoltarea precară a capsulei chirurgicale și b) de incontinență (invazia tumorală a apexului prostatic).
 2. Necesitatea ablației cât mai complete a țesutului tumoral (rezecție tip lojă) pentru a crește intervalele dintre actele rezecționale.
-