

operație ginecologică;

- injectarea leziunilor vezicale radice cu Peroxinorm.

PRELUCRAREA PE CALCULATOR A TEHNICII TUR.P (Videofilm VHS/PAL, durata 8 min.)

D. Nicolescu, L. Schwartz, I. Bakos, R. Boja

Clinica de Urologie
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

TUR.P prezintă astăzi o tehnică unanim acceptată de adenomectomie.

Pentru a obține rezultate corespunzătoare, TUR.P trebuie să se efectueze în conformitate cu trei principii chirurgicale fundamentale: 1. al etajării, 2. sectorializării și 3. succesivității rezeceției.

Etajarea rezeceției. Traduce necesitatea subîmpărțirii adenomului în 2 sau 3 etaje, în raport de volumul său.

Sectorializarea rezeceției. Prezintă subdivizarea țesutului adenomatos din cadrul aceluiași etaj în sectoare.

Succesivitatea rezeceției. Etajele și sectoarele stabilite în prealabil vor fi rezecate în mod succesiv, într-o ordine bine stabilită.

Filmul prezintă, pe baza celor trei principii chirurgicale enunțate, principalele faze operatorii ale TUR.P, demonstrate pe un model de adenom simulat pe calculator.
