

APOPLEXIA UTERO-PLACENTARĂ DIN MATERIALUL CLINICII DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE NR.2 DIN TÂRGU-MUREȘ, PE UN INTERVAL DE 17 ANI (1976-1992)

C. Rădulescu, Carmen Rădulescu, Agneta Kovács, Ca. Kerezzes

**Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr. 2
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș**

A fost studiată morbiditatea prin apoplexie utero-placentară pe un interval de 17 ani în Clinica de Obstetrică și Ginecologie nr. 2 din Târgu-Mureș.

La 55 750 nașteri au fost 96 de apoplexii utero-placentare. După clasificarea Page în raport cu graviditatea cazurilor au fost 30 apoplexii utero-placentare gr.I, 11 gr.II, 32 gr.IIIa și 27 cazuri gr. IIb.

Dintre factorii etiologici s-a identificat o boală vasculorenală în sarcină (HTA indusă de sarcină și HTA asociată sarcinii) în 65 cazuri (67,57%), pielonefrită 4 (4,17%), traumatism abdominal 3 (3,12%), uter cicatricial 2 (2,08%), cardiopatii 2 (2,08%). La 20,98% nu a fost identificată nici o sursă patologică în sarcină, accidentul apoplectic s-a produs imprevizibil.

La 3 gravide s-au efectuat examene ecografice și s-a identificat o decolare incipientă, care s-a amplificat în zilele următoare, impunând o operație cezariană preventivă.

Nașterea s-a produs pe căi naturale la 38 gravide (39,5%).

S-a produs un deces matern la o gravidă cu HTA malignă și AUP std. IIb cu coagulopatie de consum. Mortalitatea perinatală a fost de 25% (24 de decese ante-, intra- și post-partum).

Apoplexia utero-placentară reprezintă și astăzi o cauză majoră de morbiditate și mortalitate maternă și perinatală.
