

INCIDENȚA SINDROMULUI DE AMENOREE-GALACTOREE ȘI STERILITATE DIAGNOSTICAT ÎNTR-UN SERVICIU AMBULATOR

C. Rădulescu, Caterina Gliga, Carmen Popa, stud. Z. Gál

Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr. 2
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În perioada 1984-1992 au fost consultate într-un serviciu ambulator un număr de 5 054 femei în perioada fertilității (18-45 ani).
A fost identificată o galactoree asociată cu tulburări de ciclu menstrual prin

insuficiență (oligomenoree-amenoree) și sterilitate la un număr de 97 paciente (1,726%).

În urma datelor anamnestice și a examenului clinic, s-a identificat la 35 cazuri apariția sindromului de amenoree-galactoree și sterilitate după un consum prelungit (peste 3 ani) de contraceptive orale (37,111%). Sindromul de amenoree-galactoree a fost asociat cu un sindrom de ovare polichistice (SOP) la 4 cazuri (4,123%). La 11 cazuri s-au efectuat investigații mai complexe (determinarea câmpului vizual, radiografie de șă turcească, TC hipofizară), constatându-se prezența unor microadenoame hipofizare la 6 dintre acestea. Două paciente au prezentat un sindrom de amenoree-galactoree asociat cu hipotiroidism iar la restul cazurilor etiologia sindromului nu a fost precizată (2,062% respectiv 46,391%).

Lucrarea vrea să atragă atenția asupra creșterii incidenței sindromului amenoree-galactoree și sterilitate paralel cu creșterea consumului de contraceptive orale, substratul sindromului fiind dezvoltarea unui microadenom hipofizar.
