

EXAMENUL CITOTUMORAL CERVICAL LA GRAVIDELE ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ

C. Rădulescu, Caterina Gliga , Carmen Rădulescu

Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr.2
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În perioada 1 I 1990 - 31 XII 1992 au fost efectuate 12371 avorturi la cerere în primul trimestru de sarcină. la 9215 gravide (74,488%) s-au recoltat înainte de intervenție examene citotumorale prin 2 frotiuri endo- și exocervicale.

Citirea și examinarea frotiurilor s-a făcut după Papanicolau (clasa I-V). Din grupul examinat 9027 (97,959%) au avut frotiuri normale (clasa I-II PAO), 184 (1,996%) au fost suspecte sau sugestive pentru un CIN și 4 cazuri (0,043%) au avut citologie pozitivă (PAP IV).

Reexaminările citologice, colposcopice și biopsice și tratamentele antiinflamatoare au modificat frotiurile din III în II la 125 cazuri, s-au identificat prin biopsii 7 displazii ușoare și medii iar restul nu s-au prezentat pentru reexaminare.

Din cele 4 cazuri cu cito IV s-au identificat : o displazie cervicală moderată, o displazie severă și un CIS.

Deoarece perioada de maximă fertilitate (20-35 ani) coincide cu cea a maximei incidențe de NIC și CIN, în lipsa unui citoscreening de masă la toată populația feminină cu risc, examenul citotumoral cervical la gravide poate constitui o metodă alternativă de identificare a unor leziuni de CIN și a cancerului preclinic de col uterin (std.IA).
