

TIPUL HISTOPATOLOGIC ȘI GRADUL DE MALIGNITATE, FACTORI DE EVALUARE PROGNOSTICĂ ÎN TUMORILE MALIGNE DE OVAR

Carmen Rădulescu, C. Rădulescu

Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr.2
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În intervalul 1 I 1964 - 31 XII 1992 au fost internate în Clinica de Ginecologie Tg.-Mureș 464 tumori maligne de ovar. Dintre acestea la 434 a fost accesibil un examen histopatologic din tumoră și metastaze sau dintr-o biopsie în formele avansate. Tipul histologic, numărul și proporțiile acestor malignoame ovarice după tipizarea OMS a fost următoarea:

1. Tumori maligne epiteliale comune	393	90,53%
2. Tumori stromale gonadale	21	4,83%
3. Tumori provenite din celule germinale	14	3,22%
4. Tumori mezenchimale nespecifice	6	1,38%

Din evaluarea noastră statistică majoritatea tumorilor maligne de ovar au fost cancere epiteliale "comune" (90,53%), tipul seros fiind predominant. Tipizarea trebuie privită cu rezerve, formele mixte sau predominante necesitând examenul complet și minuțios al tumorii și metastazelor.

Pe cazistica studiată gradul de malignitate după clasificarea OMS a fost: gradul I 82 cazuri (18,83%), gradul II 154 cazuri (35,48%), gradul III 198 cazuri (45,62%). La stadii clinice egale și tratamente standardizate, gradul de malignitate nu a fost un indiciu de prognostic precis.

Datele noastre corespund cu cele din literatura medicală care investighează alte criterii de evaluare a agresivității tumorale prin M.E., durata ciclului celular, anomaliile cromozomiale și mai des concentrația ADN din tumoare și culturi prin studii de citoflowmetrie.