

# **OTOMASTOIDITA LATENTĂ A SUGARULUI - O CAPCANĂ PENTRU PEDIATRU**

*Doina Drăgoveanu, Virginia Bodeanu, E. Balint*

**Clinica Pediatrie nr. 2  
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș**

Antibioticoterapia a făcut să scadă frecvența mastoiditelor acute la sugari și la copii; actualmente, se întâlnesc mai ales mastoidite subacute, cu semne infecțioase mai puțin pregnante, luând aspectul unei otite trenante care prezintă complicații regionale severe, otomastoidite.

Otomastoiditele trenante sunt frecvent întâlnite la copii între 3 luni și 5 ani. Frecvența lor este atât de mare, mai ales în primele luni de viață, încât este suficient să legitimizezi examenul otologic sistematic la fiecare bolnav. Otita latentă "astenică", complicată printr-o antrită, este de obicei bilaterală, insidioasă, generatoare de accidente toxice. Nu în puține cazuri, o toxicoză neinfluențată de tratament, sau foarte puțin influențată este întreținută de un focar otomastoidian.

Autorii urmăresc să ilustreze, la bolnavii internați în Clinicile de Pediatrie nr. 1 și 2 și antrotomizați între 1988 - 1992, că numai experiența clinică a medicului practician poate rezolva situația dramatică prin indicarea antrotomiei, în condițiile în care aici un examen clinic sau paraclinic nu indică afectarea otomastoidiană.

---