

perspectivă , avându-se în vedere introducerea în tratamentul diabetului zaharat a unui nou tip de insulină umană, combinată, înalt purificată, Mixtard 30/70 oferită de firma NOVO, împreună cu seringile Novopen.

Se expun concluziile de etapă ale studiului respectiv.

INCIDENȚA DIABETULUI ZAHARAT LA COPII SUB 4 ANI AFLAȚI ÎN EVIDENȚA CLINICII DE PEDIATRIE NR.2 DIN TÂRGU-MUREȘ

Julietta Dunca, Z. Pap, E. Balint, Minodora Nistor, Ildikó Bódizs

Clinica de Pediatrie nr.2
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În evidența Clinicii de Pediatrie nr. 2 din Târgu-Mureș se află în prezent 6 copii cu diabet zaharat având vârsta sub 4 ani. Dintre aceștia sunt 3 fete și 3 băieți.

Acești copii se află sub tratament combinat cu insulină rapidă (Actrapid) și intermediară (Monotard). Acestor pacienți li se determină periodic parametrii clinico-biologici, constatându-se că se află în stare de echilibru al diabetului zaharat.

Incidența infecțiilor este relativ mică.

Incidența diabetului zaharat sub vârsta de 4 ani este de 4,38% din totalul copiilor cu diabet zaharat aflați în evidența Clinicii de Pediatrie nr. 2 din Târgu-Mureș.
