

ADMINISTRAREA BRYOHERP-GELULUI ÎN TRATAMENTUL ZONA-ZOSTER

*E.Módy**, *I.Fízi***, *L.Vulcu****, *Emilia Oprea*****

*Disciplina de biochimie clinică și de imunopatologie

**Disciplina de botanică-farmacologică

U.M.F. Târgu-Mureș

***Institutul de Igienă, Sănătate Publică, Serviciu de Sănătate și Conducere, București

****Farmacia "Ephedra" Târgu-Mureș

La o persoană cu apărare intactă, această infecție duce la dezvoltarea unei imunități împotriva VVZ pentru tot cursul vieții. În posesia acestei apărări specifice, VVZ persistă în organism sub formă latentă și în urma unei reactivări, produce zona zoster. Zona zoster nu prezintă nici o prevalență sezonală, nici manifestări epidemice. În SUA, incidența zonei zoster este în medie de 1,3 cazuri la 1000 de locuitori. Incidența crește considerabil cu înaintarea vârstei de peste 15 ani.

La bolnavii imunocompromiși, administrarea medicamentelor cu efecte antivirale este de o importanță deosebită. Această necesitate a dus la obținerea unei serii întregi de substanțe cu acțiune inhibitoare asupra replicării virusurilor.

Familia Herpesviridae, respectiv subfamilia Alphaherpesviridae și membrii din această subfamilie au însemnatate și prin faptul că reprezintă prima familie virală la care s-a reușit să se obțină de cale sintetică substanța cu efecte antivirale, dintre care menționăm arabinozidul de adenină care este un analogon purinic, acyclovirul un derivat al guaninei și interferonul alfa, beta și gama. Medicamentele antivirale pot fi administrate și local sub formă de pudre, unguente și geluri. Din această categorie face parte produsul farmaceutic Bryoherp-gel. În urma administrării unui lot de 50 pacienți, s-a putut constata că plăgile se vindecă mai rapid, durerea se reduce și se micșorează pericolul suprainfecțării buzelor deschise cu microbi purulenti. Această substanță administrată local reduce rata de replicare a virușilor, astfel micșorează și șansa unei recurențe
