

DETERMINAREA ANTIGENULUI CA 125 ÎN EVALUAREA VINDECĂRII DUPĂ TRATAMENTUL CHIRURGICAL ȘI CITOSTATIC ÎN CANCERUL DE OVAR

Carmen Rădulescu, Viorica Lobonț, C. Rădulescu

*Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr.2
U.M.F. Târgu-Mureș*

După efectuarea unui tratament chirurgical primar completat în formele avansate de cancer ovarian de polichimioterapie, evaluarea vindecărilor se face în general prin examen clinic, examene ecografice, CT, iar în unitățile cu aparatură accesibilă și cu RMN. Au fost identificați mai mulți antigeni tumorali de suprafață în cancerele epiteliale ovariene, dintre care cel mai "popular" este antigenul CA 125 care poate fi identificat cu anticorpii OC 125. Chimioterapeuții au standardizat evaluarea unei vindecări după tratamentul citostatic complet, prin efectuarea la 10-12 luni de la terminarea acestui tratament, în cazul în care examenele clinice și paraclinice sunt negative, a unei laparotomii largi, numită second look. Aceste laparotomii second look datorită aderențelor intestinale între ele, la perete, la peritoneul pelvian nu sunt lipsite de riscuri. De asemenea prelevarea de biopsii din toate zonele suspecte comportă riscul unor leziuni organice, inclusiv intestinale.

Din 1993 în Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr.2 Tg.-Mureș au fost urmărite un număr de 18 bolnave cu cancer de ovar; dintre acestea 2 erau în std.II, 5 în std. IIIA, 6 în std. IIIB, 5 în std.IIIC. 13 bolnave au valori negative de CA 125 după terminarea tratamentului complet, 3 au valori de CA 125 pozitive prezente în timpul tratamentului citostatic din care la una valorile crescute s-au menținut și după terminarea tratamentului citostatic. S-a făcut second look cu intenție de verificare la 2 bolnave și chirurgie reductivă secundară la o bolnavă la care valorile de CA 125 erau în creștere. Controlul ritmic al vindecărilor și identificarea precoce a recidivelor și evoluției acestora se poate face prin determinări repetate de CA 125. Sunt speranțe ca în viitor prin folosirea unor baterii de anticorpi prin antigenii de suprafață ai cancerului de ovar să facă intervenția second look să aibă numai o însemnătate istorică.