

GRADUL DE PARTICIPARE A VIRUSULUI HEPATITEI DELTA ÎN CADRUL HEPATITELOR VIRALE ACUTE AgHBs POZITIVE

Cristina Golea, Monica Dănuț, Monica Sabău, Doina Bilcă,
Judith Farkas**, Mihaela Boaru, A.Hompoth*

Disciplina de epidemiologie și medicină preventivă

**Clinica de Boli Infecțioase nr.2

U.M.F. Târgu-Mureș

*Spitalul Clinic Județean - Laboratorul Central

Hepatita cu virusul delta apare în urma coinfecției sau suprainfecției la persoane infectate cu virusul hepatitei B, datorită caracterului defectiv al agentului cauzal, care necesită pentru replicare prezența virusului hepatitei B ca virus helper.

Pentru aprecierea gradului de participare a virusului delta în cadrul morbidității prin hepatită acută s-a testat prin tehnici imunoenzimactice prezența markerilor infecției delta (AgHD și anti-HD) la persoane cu evidențe serice pentru AgHBs.

Intervenția virusului hepatitei delta la morbiditatea prin hepatită acută AgHBs pozitivă a fost de 10,6%.

Curba de morbiditate a infecției delta a crescut paralel cu vârsta, rata maximă apărând la grupa de vârstă 40-49 ani.

Se constată predominanța suprainfecției față de coinfecție (57,1% față de 42,8%).

Hepatita acută delta predomină la sexul masculin (85,7%).

Se constată o proporție crescută a cazurilor de hepatită acută delta la pacienții care provin din mediul urban (69,2%).