
BRONȘIOLITA ACUTĂ. CONSIDERAȚII CLINICO- TERAPEUTICE ASUPRA CAZURILOR INTERNATE ÎN CLINICA DE PEDIATRIE NR. 3 ÎN 1994

Liliana Vilecanu

**Clinica de Pediatrie nr.3
U.M.F. Târgu-Mureș**

Bronșiolita acută - boală respiratorie de etiologie virală- frecvent întâlnită la vârstele mici este o afecțiune potențial severă, cu risc mare de insuficiență respiratorie. Din cauza acestui fapt, diagnosticul de formă clinică

de gravitate se impune a fi precizat cât mai precoce, pentru a se putea aplica - în funcție de aceasta - un tratament cât mai adecvat. În acest scop, am analizat 55 cazuri de bronșiolită acută internate în clinica de Pediatrie nr. 3 în cursul anului 1994. După forma clinică de gravitate, cele 53 cazuri s-au distribuit astfel: Forme ușoare (discrete) de boală, 12 cazuri; forme moderate, 22 cazuri; forme severe, 15 cazuri și foarte severe, 4 cazuri. În funcție de aceste 4 forme clinice de gravitate, stabilite pe baza unor criterii clinice în principal (ritmul respirator, gradul dispneei, al tirajului, al stării de hidratare, prezența sau absența cianozei, a crizelor de apnee și a stării de conștiență mai mult sau mai puțin afectată), recomandăm, în funcție de rezultatele obținute, 4 categorii de măsuri terapeutice, mergând de la îngrijiri la domiciliu (în cazurile ușoare de boală) și până la internarea în servicii de terapie intensivă fiind necesare intubație sau ventilație mecanică, administrarea de corticoizi i.v., antibiotice i.v., oxigen umidificat, bronhodilatatoare în aerosoli, teofilină i.v., adrenalină s.c. și, bineînțeles, monitorizare. În felul în care a fost concepută și realizată, lucrarea se constituie într-un ghid diagnostic și terapeutic, ușor reținut mai ales de medicii pediatri care asigură asistența primară a copiilor.
