

TUBERCULOZA LA COPIL ÎN PATOLOGIA CLINICII DE PEDIATRIE NR. 1, TÂRGU-MUREȘ

Beatrice Gabor, Csilla Todea, Marinela Gabor, Amalia Făgărășan, Eva Kiss

Clinica de Pediatrie nr. 1
U.M.F. Târgu-Mureș

Autori evaluează frecvența dificultăților de diagnostic pozitiv în diferite forme clinice ale infecției cu bacilul Koch la copil, studiind cazuistica Clinicii de Pediatrie nr. 1 Tg.-Mureș între anii 1990-1994.

Frecvența bolii în populația infantilă este în creștere. S-au depistat în 1990: 3; 1991: 2; 1992: 1; 1993: 10; 1994: 10 cazuri de tuberculoză infantilă în patologia Clinicii de Pediatrie nr. 1.

Dificultățile de diagnostic pozitiv derivă din faptul, că la copil prima infecție tuberculoasă poate fi asimptomatică sau prezintă simptome nespecifice, testul screening IDR la tuberculină deseori este echivoc, examenele de laborator sunt nespecifice, dacă leziunea primară este mică semnele radiologice pulmonare sunt greu detectabile, probele bacteriologice din aspiratul gastric și matinal și evidențierea bacilului din exudate și țesuturi rămânând cea mai directă metodă de diagnostic la copil.