

PEDIATRIE (II)

LOCUL ȘI ROLUL MALFORMAȚIILOR CONGENITALE ȘI AL ANOMALIILOR DE POZIȚIE ALE TUBULUI DIGESTIV ÎN PRODUCEREA VĂRSĂTURILOR LA SUGAR

*Doina Drașoveanu, Z.Pap, E.Balint, Cristina Orasan, Daniela Marcu,
Virginia Bodescu*

Clinica de Pediatrie nr.2
U.M.F. Târgu-Mureș

Între manifestările clinice pentru care un medic pediatru este cel mai adesea solicitat, vărsăturile reprezintă unul din simptomele cele mai frecvent întâlnite. Aceasta nu înseamnă ca vărsătura este un simptom banal, chiar dacă, așa cum afirmă Glazmann: "sugarul și copilul mic au o tendință fiziologică la vărsături". Vărsătura în patologia pediatrică reprezintă un semn de falsă banalitate prin consecințele ei și pentru că poate constitui semnalul unor afecțiuni severe, care potențial pun în pericol viața sugarului.

Lucrarea de față se vrea o reactualizare a unor cunoștințe legate de un simptom pe cât de frecvent, pe atât de important în practica pediatrică.

S-au luat în studiu cazurile de sugari cu malformații ale tubului digestiv, internate și diagnosticate în Clinica de Pediatrie nr 2 și 3 pe o perioadă de 10 ani, căutând să stabilim rolul lor în producerea vărsăturilor, în raport cu factorii favorizanți: alimentația, handicapuri biologice, prezența unor boli asociate.