

---

# **CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA CAZURILE DE SEPTICEMIE INTERNATE ÎN CLINICILE DE PEDIATRIE NR. 2 ȘI 3 ÎN ULTIMII 10 ANI**

**Liliana Pripas**

**Clinica de Pediatrie nr.3  
U.M.F. Târgu-Mureș**

**Am studiat cazurile de septicemie, 0-16 ani, internate în Clinica de  
Pediatrie nr. 2 și 3 în ultimii 10 ani (1985-1994). Este vorba de 73 cazuri, a**

căror distribuție pe anii calendaristici a arătat o medie de 7,3 cazuri pe an, cu două vârfuri de frecvență a câte 10 cazuri în 1987 și 1992. După vârstă, cele mai multe cazuri s-au întâlnit la sugari (43 cazuri), urmate de 15 cazuri la nou-născuți. În funcție de terenul biologic, cei mai mulți copii cu septicemie au fost distrofici (28 cazuri din 73), apoi rahitici, prematuri și cu malformații cardiace congenitale. Etiologia a fost dominată de germenii gram-negativi (48 cazuri), urmată de cea stafilococică și numai într-o mică măsură de germeni condiționat patogeni. Pe grupe de vârstă, etiologia a fost diferită: la nou-născuți au predominat germenii gram-negativi, în timp ce la sugari și copii peste 1 an, stafilococu s-au situat pe primul loc. După poarta de intrare, în cele mai multe cazuri ea a fost digestivă, apoi respiratorie și mai puțin cutanată, respectiv ombilicală la nou-născuți. Tabloul clinic a variat de asemenea după vârstă, febra lipsind uneori la nou-născuți, la care icterul a fost cel mai important semn clinic, alături de hepatosplenomegalie, hemoragii cutaneo-mucoase. Numărul leucocitelor a fost de asemenea scăzut în unele cazuri. Metastazele au fost cel mai frecvent pulmonare, respectiv pleuropulmonare. Antibioticoterapia s-a aplicat conform antibiogramelor, iar evoluția a fost de peste 3 săptămâni de zile în cele mai multe cazuri. Au decedat 11 copii din cei 73 cu septicemie (cei mai mulți fiind sugari).

---