

ASPECTE ETIOPATOGENICE ÎN BOALA DIAREICĂ ACUTĂ A SUGARULUI ȘI COPILULUI MIC

Alexandrina Ioana Borza

Clinica de Pediatrie nr. 1

U.M.F. Târgu-Mureș

Pe un lot de aproape 500 sugari și copii mici, internați în Clinica de Pediatrie nr. 1 Tg.-Mureș cu diagnosticul de boală diareică acută (BDA) s-a urmărit pe durata a doi ani principalele aspecte etiopatogenice ale bolii.

Deși în scădere, incidența BDA este încă crescută fiind prezentă în procentaj de 13,8% din totalul internărilor. Proveniența din mediul rural este mai mare (56,5%) și se explică prin slaba rețea de microcentrale pentru aprovizionare cu apă potabilă în mediul rural. BDA sunt mai frecvente la sugarii mici (31%) și la cei mari (43%). O frecvență mai mare se găsește la prematuri (19%) și la malnutriți (31%) datorită rezistenței mai scăzute la infecții și toleranței digestive scăzute, neexistând o diferență semnificativă în spectrul etiologic.

Dintre factorii determinați cei mai importanți sunt cei infecțioși (42%) și alimentari (13%). Principalele carențe alimentare sunt alimentația artificială, greșeli în tehnica alimentației și a diversificării alimentației. Într-un număr mare de cazuri (43%) există un determinism mixt (infecțios și alimentar).

Factorii favorizanți existenți în procentaj de 45% constau în principal din condiții necorespunzătoare de locuință și microclimat.

Prin multitudinea de factori implicați în etiologie (determinanți, favorizanți, medicali, sociali) BDA rămâne și pentru viitor o problemă de sănătate publică.