

AFECTIUNI ASOCIATE ȘI FACTORI FAVORIZANȚI AI ESOFAGITEI DE REFLUX

Ligia Bancu, Simona Bătagă, Ana Bratu, Imola Török, Ilona Csidey

Clinica Medicală nr.1
U.M.F. Târgu-Mureș

Esofagita de reflux este o afecțiune frecventă pe care o găsim asociată altor maladii care pot favoriza refluxul patologic gastroesofagian.

Scopul studiului nostru, constă în analiza bolilor asociate esofagitei de reflux în cazuistica serviciului nostru de endoscopie digestivă, pe o perioadă de trei ani (1992-1994).

Diagnosticul clinic de esofagită de reflux a fost urmat de examinarea endoscopică și biptică în toate cazurile. Pe baza examenului endoscopic s-a pus diagnosticul de reflux la un număr de 286 cazuri. Leziunile macroscopice au determinat clasificarea după criteriile Savary Miller în esofagita peptică gradul I, II, III.

Bolile asociate esofagitei de reflux în cazuistica noastră au fost: ulcer duodenal (30%), stomac operat (24%), ciroză hepatică cu ascită (20%), hernie hiatală (8%), cord pulmonar cronic (8%), colecistectomie(6%), gastropatie diabetică (4%).

Refluxul esofagian a fost favorizat de: fumat (33%), alcool (53%), droguri (40%), asocieri (53%).

Helicobacter pylori a fost prezent în 68% din cazuri.

În bolile asociate frecvent esofagitei de reflux, ca și în prezența factorilor favorizanți, mucoasa esofagiană trebuie examinată sistematic în scopul surprinderii leziunilor într-o fază precoce și evitării evoluției spre stadii avansate, după care, cum se știe reprezintă etapa premergătoare dezvoltării cancerului esofagian.