

DUODENITA CU EXULCERAȚII MULTIPLE ASOCIATĂ INFESTAȚIEI CU GIARDIA LAMBLIA

*Simona Bătagă, Ana Bratu, Ligia Bancu, Imola Török, Rodica Rediș,
Cristina Hajdu, C.Dudea*

**Clinica Medicală nr.1
U.M.F. Târgu-Mureș**

În ultimii ani infestația cu *Giardia lamblia* este din ce în ce mai frecventă, cu manifestări clinice polimorfe și o serie de modificări endoscopice. Scopul acestui studiu este de a corela modificările endoscopice cu aspectele clinice și histopatologice.

Endoscopia digestivă superioară efectuată în cadrul Clinicii Medicale nr.1 a pus în evidență 17 pacienți cu aspect particular de duodenită: bulbul și a doua parte a duodenului prezentau exulcerații adânci, concentrice, cu o mucoasă palidă în jur. S-au efectuat biopsii din a doua parte a duodenului, din bulb și din antru. Simptomele clinice ale bolnavilor au fost: dureri epigastrice (88,8%), meteorism și flatulență (82,3%), acuze neuropsihice (64,7%), alergii (58,8%), greață (47,0%), scădere în greutate (41,1%), diaree (29,4%).

În biopsiile duodenale s-a pus în evidență un mare număr de *Giardia lamblia*, cu atrofie accentuată a vilozităților și o reacție inflamatorie, infiltrat cu neutrofile și eozinofile. În 4 cazuri din biopsia gastrică s-a pus în evidență *Helicobacter pylori*, iar în două cazuri *Giardia lamblia* pe zonele de metaplazie intestinală din antru. Aciditatea gastrică a fost normală sau scăzută. În urma tratamentului cu Metronidazol, Furazolidon și Fasisign, simptomele și exulcerațiile vizualizate endoscopic au dispărut.

Se concluzionează că acest tip de duodenită se datorează unei infestații marcate cu *Giardia lamblia*.
