

# ASPECTE ALE HEMORAGIEI DIGESTIVE SUPERIOARE LA BOLNAVII CU CIROZĂ HEPATICĂ

Rodica Pop, Simona Bălagă, C.Dudca

Clinica Medicală nr. 1  
U.M.F. Târgu-Mureș

Ciroza hepatică este una dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive, incidența sa fiind în continuă creștere. Una dintre complicațiile redutabile ale cirozei hepatice este hemoragia digestivă superioară. Lucrarea are ca scop urmărirea incidenței acesteia la bolnavii cu ciroză hepatică, etiologia ei, corelarea hemoragiei digestive superioare cu clasificarea *Child* a cirozei hepatice.

Au fost luați în studiu 658 bolnavi cu ciroză hepatică internaj în Clinica Medicală nr.1 între anii 1992-1994. Dintre aceștia, 144 (22,03%) au prezentat hemoragie digestivă superioară. În urma endoscopiei digestive superioare s-a stabilit sediul hemoragiei. În funcție de datele obiective și de laborator, bolnavii au fost clasificați în clasa Child A, B, C

Din 144 pacienți cu ciroză hepatică 137 au prezentat la examenul endoscopic hemoragie din varice esofagiene (95,15%), 6 cazuri din ulcer (4,16%), 5 din ulcer duodenal și 1 caz din ulcer gastric, 1 caz de gastrită erozivă medicamentoasă (0,69%). 64 de bolnavi (44,44%) au fost încadrați în clasa Child C de ciroză hepatică. Au decedat prin hemoragie digestivă superioară 49 de pacienți (34,02%). Sexul preponderent a fost cel masculin (73,5%), iar categoria de vârstă mai frecventă a fost între 41-60 de ani.

Hemoragia digestivă superioară a fost prezentă la bolnavii studiați, în proporție de 22,03%, fiind o cauză frecventă de deces (34,02%). Bolnavii din clasa Child C prezintă riscul cel mai mare. Se impune, în perspectivă, sclerozarea varicelor esofagiene la bolnavii cu ciroză hepatică, cel puțin după prima manifestare de hemoragie digestivă superioară.

---