

STUDIUL ECOGRAFIC ASUPRA CHISTURILOR HIDATICE HEPATICE

G.Fodor

Clinica Medicală nr.2
U.M.F. Târgu-Mureș

Studiul a fost efectuat în serviciul de ecografie abdominală a Clinicii Medicale nr.2 Tg.-Mureș. A fost utilizat un ecograf Shimadzu pe o caznistică prelucrată de 2000 bolnavi, diagnosticându-se 9 cazuri de chist hidatic.

Se atrage atenția asupra frecvenței mari între perioada relativ scurtă de timp a cazurilor de îmbolnăviri depistate ecografic - 9 cazuri/2000 bolnavi, incidența = 0,45%.

În 5 dintre cazurile depistate s-a confirmat chirurgical, 1 caz a fost laborator negativ, 2 cazuri pozitive, 2 cazuri ambulatorii nu au putut fi urmărite. Chisturile - 9 cazuri în total - erau localizate în lobul hepatic drept, fără complicații decelabile ecografic, existența chisturilor fiind documentată în 2 cazuri. Diametrul mediu al chisturilor hidatice a fost de 5,16/4,11 cm.

Se poate afirma o incidență alarmantă a cazurilor de parazitoză hepatică hidatică la o populație studiată, majoritar urbană, concentrând atenția asupra necesității elaborării unui program de prevenție și screening.
