

VALORILE COLESTEROLULUI SERIC LA BOLNAVI CU LITIAZĂ BILIARĂ

L.Farkas, G.Fodor, C. Gadl

Clinica Medicală nr.2
U.M.F. Târgu-Mureș

Legat de relația stabilită de indicele litogen, s-a urmărit existența
colerației între colesterolul seric și incidența calculilor biliari. Indicele litogen
= colesterol/fosfolipid + săruri biliare Majoritatea calculilor biliari 80% sunt

calculi de colesterol, calculi micști fiind reprezentați în proporție de 14%, iar cei de bilirubină în proporție de 6%.

Se analizează cazurile de litiază biliară diagnosticate ecografic la nivelul clinicii noastre în perioada iunie 1993-decembrie 1994. Pe o cazuistică de 2000 de bolnavi examinați, incidența litiazei biliare a fost de 170 cazuri. 8,5%, dintre care au fost cuprinși în studiu 120 bolnavi - 50 de bolnavi fiind ambulanți. Vârsta medie: femei = 55,6 ani, bărbați = 59,8 ani, ponderea litiazicilor: femei 76,5%, bărbați = 23,5%. Incidența litiazei a fost găsită crescută la grupa de vârstă de peste 60 de ani. Drept valori normale ale colesterolului seric se consideră acceptate: 150-250 mg% / 3,88-6,46 mmol / l / la grupa de vârstă sub 60 ani, 220-300 mg% / 5,68-7,80 mmol / l / la bolnavi peste 60 de ani. Tabelele și graficele lucrării relevă o majoritate covârșitoare a bolnavilor litiazici având nivele serice de colesterol în limite normale.

În cazuistica noastră nu se poate dovedi existența unei relații prin raport matematic formulat în indicele litogen, între colesterolul seric și incidența litiazei biliare. Considerăm necesară aprecierea modificărilor compoziției bilei ca și factor determinant în litogeneză.
