
CORELAȚII ULTRASONOGRAFICE - HISTOPATOLOGICE ÎN COLECISTITA ACUTĂ LITIAZICĂ ȘI COMPLICAȚIILE SALE

Ana Bratu, Imola Török

Clinica Medicală nr. I
U.M.F. Târgu-Mureș

Pentru a investiga rolul ecografiei abdominale în aprecierea modificărilor histopatologice ale peretelui vezicii biliare în colecistita acută calculoasă și în complicațiile sale, am evaluat ultrasonografic, prospectiv, 201 pacienți, consecutiv, în perioada 1 ian. 1991 - 31 dec. 1993.

Diagnosticul ultrasonografic preoperator s-a comparat cu diagnosticul intraoperator și examenul histopatologic. Diagnosticul ecografic a fost confirmat chirurgical în 84,07% din cazuri, histopatologic la 82,58% din pacienți și n-a fost confirmat în 17,42% din cazuri. Cazurile neconfirmate pot fi explicate prin timpul care s-a scurs între examinarea ecografică și intervenția chirurgicală în hidrops și colecistita acută, precum și datorită dificultății diagnosticului ecografic în perforația veziculei biliare, carcinomul vezicular și sindromul Mirizzi.

În concluzie observăm că examinarea ultrasonografică poate detecta modificările histopatologice ale peretelui veziculei biliare cu o sensibilitate de 100%, specificitate de 99,59%, acuratețe de 99,60% și valoare pozitivă de 82,58%.
