

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC AI ACCIDENTELOR GASTROINTESTINALE GRAVE ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ

Marșovici, Lia Georgescu, Anca Cozoș, Mirela Dumbrevă, O. Bodea

Clinica de Reumatologie și Recuperare
U.M.F. Târgu-Mureș

Incidentele și accidentele gastrointestinale serioase sunt evenimente importante și recvente la bolnavii cu reumatisme inflamatorii supuși tratamentelor cu antiinflamatoare nesteroidiene. În acest studiu clinic au fost identificați și evaluați factorii de risc ai accidentelor gastrointestinale grave la bolnavii cu poliartrită reumatoidă, "posibilă" sau "definită" (clasică) după criteriile ARA.

S-a realizat un studiu clinic retrospectiv al factorilor care ar putea contribui la riscul producerii unor accidente gastrointestinale grave, supunând analizei un lot de 120 de bolnavi cu poliartrită reumatoidă "posibilă" sau "definită" internați consecutiv în Clinica de Reumatologie și Recuperare între

anii 1992-1994. Influența relativă a severității bolii, tratamentele de fond administrate, în special corticoterapia, anamneză de ulcer peptic, vârsta de debut a bolii și vechimea bolii au fost criteriile evaluate în acest studiu.

Incidența accidentelor gastrointestinale la bolnavii studiați a fost de 4% în fiecare an. Studiul nostru reconfirmă faptul că vârsta de peste 60 de ani, anamneza de ulcer peptic și utilizarea corticoterapiei reprezintă factori de risc, însă rata cea mai mare a accidentelor gastrointestinale grave a fost evidențiată la bolnavii cu poliartrită reumatoidă cu manifestări extraarticulare: vasculita (argumentată biptic), neuropatia periferică, nefropatia, ulceratii cutanate, serozita, afectarea oculară, nodulii reumatoizi, crioglobulinemia, (11%). La această categorie de bolnavi riscul accidentelor gastrointestinale este independentă de utilizarea în arsenalul terapeutic a corticosteroizilor.
