

PREVENIREA MELANOMULUI MALIGN ÎNTRE POSIBILITATE ȘI REALITATE

L. Năszl

Clinica de Dermatovenereologie
U.M.F. Târgu-Mureș

Terapia melanomului malign indiferent de procedeul ales, este și în zilele noastre decepționantă. Singurul factor care ar putea influența realmente prognosticul bolii îl poate constitui precocitatea depistării și distrugerii radicale. În Europa morbiditatea oscilează între 4-14‰. În ultimii ani asistăm la o creștere alarmantă a cazurilor de melanom malign. În 10% a cazurilor apare pe o piele aparent sănătoasă, în 20% prin transformarea lentigoului malign, în 30% se dezvoltă din nervii nevocelulari pigmentari, iar în restul cazurilor apar forme atipice (amelanotic, anorectal, conjunctival,

ocular, pseudobotriomicotic, subunghial etc.). Uneori toate previziunile prognostice sunt răsturnate, deoarece delimitarea stadială clinică nu concordă cu starea reală de malignitate. Autorul prezintă observațiile clinice din acest domeniu, concluzionând că pe lângă perfecționarea metodelor clinice și paraclinice, pe lângă progresele realizate în domeniul tratamentului, prevenirea melanomului este cea mai benefică armă din arseneul terapeutic. Autocontrolul are o importanță deosebită. Prevenirea înseamnă o conștientizare perfectă între pacient și medic. Se prevede ca persoanele cu o piele albă, cu pistrui, cu păr blond să nu se expună la soare. Riscul crescut la îmbolnăvire înseamnă: prezența melanomului în antecedente familiale, localizarea nevului pe talpă, palme, sau pe teritorii expuse microtraumatismelor, dacă după vârsta de 35 de ani apar formațiuni pigmentare noi. Momentul transformării maligne a unui nev (deci melanom în stadiul I) se poate recunoaște prin următoarele semne clinice și subiective: crește în dimensiune, își schimbă forma inițială, suprafața devine netedă și lucioasă, pigmentația se intensifică și devine neuniformă, apare un infiltrat la baza nevului, poate să sângereze, se formează un chenar de culoare cenușie-surie, câteodată și eritematos, se semnalază de către bolnav o senzație de prurit, de tensiune locală, furnicături.
