

STUDIUL ETIOLOGIC, CLINIC, TERAPEUTIC ȘI EVOLUTIV AL SINDROMULUI ERITRODERMIC

S. Morariu

Clinica de Dermatovenerologie
U.M.F. Târgu-Mureș

Eritrodermia sau dermatita exfoliativă este o dermatoză de tip eritematodescuamativ, ce interesează tegumentul în totalitate, sau în cea mai mare parte, fiind însoțită sau nu de manifestări din partea altor organe și sisteme, cu o etiologie extrem de variată, evoluție adesea cronică și un prognostic uneori rezervat.

În lucrarea de față am studiat 43 de cazuri de eritrodermii internate în Clinica de Dermatologie în perioada 1990-1994. Am utilizat date anamnestice și paraclinice, examinări clinice, rezultatele terapeutice, evoluția în timp a bolnavilor.

Am constatat o prevalență a eritrodermiilor de origine dermatologică și în special a celei psoriazice și infecțioase, urmate de cele prin afectuni de sistem - hematodermiile și de cele ale NN și sugarului, idiopatice și medicamentoase. Am înregistrat prezența recidivelor în special în hematodermii și eritrodermia psoriazică, existența cazurilor refractare la tratament în cele idiopatice și de sistem, a cronicizării eritrodermiilor psoriazice, prin afectuni de sistem și celor idiopatice. De asemenea am încercat să decelăm factorii favorizanți și declanșanți implicați în apariția eritrodermiilor și a recidivelor.

Dermatita exfoliativă constituie o foarte importantă dermatoză datorită dificultăților de stabilire a cauzelor unui număr relativ mare de forme idiopatice, a evoluției trenante, a numeroaselor recidive și a formelor refractare la tratament.