

RATA INFECȚIEI URINARE DUPĂ ADENOMECTOMIE DESCHISĂ, COMPARATIV CU CEA TRANSURETRALĂ

L.Bakos, D.Nicolescu, Orsolya Mártha

Clinica de Urologie
U.M.F. Târgu-Mureș

Prevenirea infecției urinare postoperatorii în adenomul de prostată are un interes deosebit în aprecierea succesului terapeutic. Ea este dependentă în primul rând de tehnica operatorie aplicată.

Scopul lucrării este să demonstreze avantajele rezecției transuretrale în prevenirea infecțiilor urinare postoperatorii.

La Clinica de Urologie din Tg.-Mureș între 01.1.1991 și 31.12.1993 s-au internat un număr de 954 bolnavi cu adenom de prostată, din care am selectat 2 loturi de câte 100 de bolnavi cu indicație operatorie și urocultură sterilă preoperator. Unul dintre loturi a fost operat deschis (transvezical), celălalt lot a fost rezecat transuretral. La ambele loturi a fost urmărită prezența infecției urinare în perioada postoperatorie imediată, până la un an.

La bolnavii operați transuretral s-a menținut sonda uretrală în medie de 2,5 zile, în schimb la cei operați deschis au avut un drenaj urinar reprezentat de cateterul uretrovezical în medie de 9 zile. Am constatat că infecția urinară este semnificativ mai mare la grupa a 2-a.

Pe baza experienței personale autorii prezintă opiniile privind metodele de restrângere a incidenței infecției urinare postoperatorii în adenomul de prostată.
