

PRINCIPIILE TRATAMENTULUI ENDOSCOPIC RADICAL AL TUMORILOR VEZICALE SUPERFICIALE

Orsolya Mártha, I.Bakos, I.Dumbrăveanu, S.Nedelcu, D.Nicolae

Clinica de Urologie
U.M.F. Târgu-Mureș

În tratamentul tumorilor vezicale superficiale locul primordial îl ocupă tratamentul endoscopic, rezecția transuretrală a tumorii (TUR.V).

Rezecția în scop terapeutic, asociată cu biopsii Bressel și de cartografiere vezicală reușește, în majoritatea cazurilor de tumoare superficială vezicală, să atingă coeficientul de radicalitate.

Lucrarea de față trece în revistă noile aspecte în terapia endoscopică a tumorilor vezicale superficiale, bazându-se pe experiența clinicii de peste 15 ani (1979-1994).

În decurs de 2 ani, între 1993-1994, în Clinica de Urologie Târgu-Mureș s-au efectuat 518 rezecții transuretrale pentru tumori vezicale, dintre care 102 (19,72%) pentru tumori superficiale. Datele statistice arată o predominanță a apariției tumorilor vezicale superficiale la bărbați, mai ales în intervalul de vârstă cuprins între 50-60 ani.

Prin această lucrare dorim să subliniem importanța rezecției transuretrale în una sau mai multe ședințe, asociate cu biopsii Bressel în tratamentul radical al tumorilor vezicale superficiale.

Concluziile lucrării sunt:

1. În tratamentul tumorilor vezicale TUR.V reprezintă placa turnantă pentru diferitele mijloace terapeutice, în funcție de agresivitatea tumorilor.

2. TUR.V reprezintă intervenția de elecție pentru tumorile vezicale superficiale pTa.

3. Multifocalitatea tumorii și displazia mucoasei cresc incidența recidivelor.

4. Fenomenul de progresie și de conversie este mai puțin frecvent în tumorile vezicale superficiale pTa decât în pT1.