

ROLUL REZECȚIEI TRANSURETRALE PALEATIVE (TUR-Vp) ÎN TUMORILE VEZICALE INFILTRATIVE

O.Golea, D.Nicolescu, I.Dumbrăveanu, I.Negruț

Clinica de Urologie
U.M.F. Târgu-Mureș

Autori își propun să studieze dacă, și în ce măsură TUR-Vp în tumorile vezicale infiltrative depășite chirurgical contribuie la ameliorarea stării clinice a bolnavilor și a speranței lor de viață.

Au fost studiați 127 bolnavi cu tumori vezicale, depășite oncologic, internați în Clinica de Urologie Tg.-Mureș în perioada 1990-1992, și urmăriți până în 1994.

Au fost încadrați astfel bolnavii cu tumori cu evoluție locală avansată (T₄); cu adenopatii metastatice și metastaze în diferite organe sau/și cu tare organice asociate care contraindică operațiile de anvergură. O altă categorie sunt bolnavii care au refuzat cistectomia totală, când aceasta a fost posibilă.

Ameliorarea calității vieții bolnavilor a fost analizată folosind criterii clinice și paraclinice specifice.

Concluziile acestui studiu sunt:

1. TUR.Vp are un impact psihologic pozitiv, iar bolnavul nu se va simți abandonat.

2. Ameliorează semnificativ calitatea vieții astfel: stopează hematuria, implicit anemia secundară; diminuează polakiuria crescând capacitatea vezicală; cedarea disuriei prin deblocarea colului vezical infiltrat tumoral; scăderea ratei infecției urinare și ameliorarea sindromului cistic.
