

CONSIDERAȚII PE MARGINEA LITIAZEI VEZICALE SECUNDARĂ OPERAȚIILOR OBSTETRICO- GINECOLOGICE

L.Schwartz, V.Oșan, I.Negrut, D.Nicolescu

Clinica de Urologie
U.M.F. Târgu-Mureș

Din analiza cazuisticii de 10 ani (1985-1994) a Clinicii de Urologie din Târgu-Mureș, de litiază vezicală secundară la sexul feminin, se constată o incidență a sa de 46,43% la subiectele care au fost supuse unor operații obstetrico-ginecologice.

Lucrarea relevă drept factor etiologic al acestui tip de litiază vezicală, un corp străin intravezical, reprezentat de firele de sutură neresorbabile aplicate intempestiv trasvezical în cursul unor operații obstetrico-ginecologice.

Scopul lucrării noastre este de a sesiza specialiștii ginecologi asupra pericolului litogenetic al materialului de sutură neresorbabil aplicat trasvezical și a propune folosirea de suturi resorbabile în operațiile efectuate pe organele vecine vezicii urinare.

Se concluzionează că.

- Litiaza vezicală secundară la femei are drept cauză etiologică în peste 46% din cazuri firul de sutură neresorbabil aplicat intempestiv transvezical
 - Diagnosticul pozitiv se stabilește pe baza unor semne caracteristice radiologice și ecografice: poziție neobișnuită și fixitatea concreamentului.
 - Tratamentul constă în litotriție transuretrală asociată cu extragerea endoscopică a firului de sutură.
 - Profilaxia litiazei vezicale iatrogene constă în utilizarea de material de sutură resorbabil în toate operațiile din vecinătatea vezicii.
-