

STUDIUL FACTORILOR ETIOLOGICI ȘI AL ATIPILOR CELULARE ÎN URETROPROSTATITE

I.László, M.Péter, Sanda Piros, V.Filep, D.Nicolescu, B.Sebe*

Disciplina de microbiologie

*Clinica de Urologie

U.M.F. Târgu-Mureș

În lucrările noastre anterioare privind etiologia uretroprostatitelor (UP) am arătat că pentru aplicarea unui tratament eficient este necesară stabilirea factorilor etiologici care iau parte în declanșarea și menținerea infecției.

În perioada anilor 1994 - martie 1995 de la bolnavi cu UP s-a recoltat secreție prostatică și urină (proba Stamey), care au fost prelucrate prin metode microbiologice complexe de diagnostic. Din tulpinile de bacterii izolate s-a efectuat antibiograma, iar în cazul levurilor fungigrama. În secreția prostatică au fost studiate și modificările celulare. În total au fost examinate 345 de persoane. La 231 de bolnavi s-a examinat secreția prostatică și urina și la 114 bolnavi cu UP numai urina.

Rezultatele sunt următoarele: chlamidii s-au găsit în 27,7%, Entamoeba urogenitalis în 27,2%, chlamidii + Entamoeba în 12,9%, Candida în 8,2%. Candida + Entamoeba în 2,59%, chlamidii + Candida în 0,86%, Staphylococcus aureus haemolyticus în 34,6%, Staphylococcus epidermidis + alte bacterii în 15,5%, Acinetobacter c. + alte specii bacteriene în 17,3%, Escherichia coli în 10,8%, alte specii bacteriene (corynebacterii, Micrococcus, klebsiela, Streptococcus faecalis, Neisserii saprofite) în 15,5%. Celule atipice din cele 231 de cazuri s-au decontat în 5,6%.

În urina a 114 bolnavi au fost prezente următoarele microorganisme: chlamidii în 21,9%, Entamoeba urogenitalis în 28%, chlamidii + Entamoeba în 5,2%, Candida în 1,7%, Candida + Entamoeba în 3,5%, Staphylococcus aureus haemolyticus în 26,4%, Staphylococcus epidermidis + bacterii diferite

în 24,5%, Acinetobacter c. + alte specii bacteriene în 14,9%, Escherichia coli în 14,9%.

După cum reiese din datele sus menționate, diferențe deosebite privind flora microbiană a secreției prostatice și a urinei (când a fost examinată numai urina proaspăt recoltată) nu am constatat.

Față de anii anteriori se poate observa incidența mai crescută a infecțiilor chlamidiene.
