
TRATAMENTUL PERCUTANAT AL CHISTURILOR RENALE SOLITARE PRIN FENESTRAȚIE

R.Boja, O.Golea, L.Schwartz, C.Cantâr, S.Nedelcu, D.Nicolescu

Clinica de Urologie
U.M.F. Târgu-Mureș
Film Video VSH

Incidența chisturilor renale solitare marchează o creștere aparentă în zilele noastre, datorită progreselor imagisticii. Astfel, ecografia poate identifica și localiza cu precizie existența unui proces expansiv renal și să-i precizeze caracterul solid sau lichidian. În plus, a devenit posibil diagnosticul

chisturilor malignizate, pe baza examenului ecografic, fluoroscopic (substanță de contrast injectată intrachistic) și a examenului citologic din lichidul aspirat.

Începând din anul 1985 punctia percutanată aspirativă ghidată ecografic urmată de sclerozarea pereților chistului a înlocuit cu succes abordul chirurgical deschis. Rata recidivelor acestei metode este relativ mare în cazul chisturilor voluminoase, motiv pentru care începând din octombrie 1994 am introdus pentru aceste chisturi un nou procedeu: fenestrația endoscopică a chisturilor.

Filmul prezintă prin imagini externe și endoscopice această nouă tehnică efectuată pentru prima dată în țară la Clinica de Urologie Târgu-Mureș. Experiența mică (8 cazuri până în prezent) nu ne permite să tragem concluzii ferme asupra eficienței acestei metode.

