

FACTORII ETIOPATOGENETICI ȘI MIJLOACELE DE APĂRARE ALE ORGANISMULUI ÎN INFECȚIILE TRACTULUI URINAR

Gr.Dogaru, Carmen Căldăraru

Clinica Medicală nr.3

U.M.F. Târgu-Mureș

În condiții normale, tractul urinar este rezistent la infecții: bacteriuria în sine, fără existența unor factori favorizanți de ordin local și/sau general, nu determină persistența infecției urinare. Echilibrul dintre mecanismele de apărare ale organismului și multiplicarea bacteriană poate fi alterat în prezența unor particularități receptive ce țin de rinichi, tractul urinar și de ordin general.

Studiind 387 bacteriurii semnificative confirmate în Clinica Medicală nr.3 Tg.-Mureș în perioada 01.01.1989 - 31.12.1994, autorii analizează corelația dintre factorii etiopatogenetici și mijloacele de apărare ale organismului. În 47,8% din cazuri se constată asocierea unor factori etiopatogenetici de ordin general, pe primul loc situându-se diabetul zaharat (în 18,09% a cazurilor). În 25,32% a bacteriuriilor confirmate se asociază factori favorizanți ce țin de particularitățile receptive ale rinichilor și ale tractului urinar, pe primul loc situându-se litiaza urinară (în 10,59% a cazurilor), urmată de staza urinară de diferite alte cauze decât litiaza (în 7,49% a cazurilor). În 26,87% din bacteriuriile confirmate nu s-a constatat prezența unor factori favorizanți de ordin local și/sau general.

Datele studiului confirmă valoarea relapsei dintre factorii etiopatogenetici și mijloacele de apărare ale organismului.